



Agachadiza común. Primavera. Adulto (18-II).

IDENTIFICACIÓN

25-28 cm. Partes superiores negras y rojizas, listadas; pecho ocre, moteado de oscuro; vientre de color blanco; capirote negro, con lista longitudinal ante; alas pardas, con puntas blancas en secundarias; cola barreada de negro y leonado; pico largo, verdoso.



Agachadiza común. Diseño de cabeza y capirote,



ESPECIES SIMILARES

De estructura similar a la **chocha perdiz** (34-36 cm), que es de tamaño mucho mayor y franjas del capirote transversales; la **agachadiza chica** es de menor tamaño (19-22 cm) y la estría central del capirote es oscura.



Chocha perdiz



Agachadiza chica

SEXO


No es posible sexar esta especie por el plumaje.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera sólo en ejemplares con contraste en las coberteras del ala si mantienen plumas **juveniles**, más desgastadas que las cambiadas y sin mancha negra en la punta; terciarias con barras oscuras anchas separadas por líneas ante estrechas y borde claro estrecho en la punta; coberteras primarias con punta redondeada; primarias con punta bastante aguda; pluma externa de la cola sin una muesca evidente.

Adulto con todas las coberteras del ala de la misma generación; coberteras medianas con el raquis negro claramente alcanzando la punta; terciarias con barras oscuras tan anchas como las claras y punta blanca ancha; coberteras primarias con punta cuadrada; primarias con punta redondeada; pluma externa de la cola con una muesca evidente.



Agachadiza común. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: izquierda adulto; derecha juvenil.



Agachadiza común. Determinación de la edad. Diseño de la punta de coberteras primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Agachadiza común. Determinación de la edad. Diseño de la punta de primarias: arriba adulto; abajo juvenil.



Agachadiza común. Determinación de la edad. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.



Agachadiza común. Determinación de la edad. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en noviembre-diciembre. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, par central de plumas de la cola (a veces todas) y pequeñas y medianas coberteras; suele estar terminada en octubre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca plumas corporales, cola, terciarias y coberteras del ala.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso




Agachadiza común. Primavera. 2º año (18-II).

05190 Agachadiza común (*Gallinago gallinago*)



Agachadiza común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (18-II); abajo 2º año (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Diseño del capirote: izquierda adulto (18-II); derecha 2º año (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Diseño del pecho: arriba adulto (18-II); abajo 2º año



Agachadiza común. Primavera. Diseño del dorso: izquierda adulto (18-II); derecha 2º año (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Diseño de la cola: izquierda adulto (18-II); derecha 2º año (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Adulto: diseño de coberteras del ala (18-II)



Agachadiza común. Primavera. 2º año: diseño de coberteras del ala (18-II)



Agachadiza común. Primavera. 2º año: diseño de coberteras primarias (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Diseño de terciarias: izquierda adulto (18-II); derecha 2º año (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Adulto: diseño de primarias (18-II)



Agachadiza común. Primavera. Adulto: diseño de coberteras primarias (18-II)



Agachadiza común. Primavera. 2º año: diseño de primarias (18-II)

05190 Agachadiza común (*Gallinago gallinago*)



Agachadiza común. Primavera. Adulto: diseño de secundarias (18-II)



Agachadiza común. Primavera. 2º año: diseño del ala (18-II)



Agachadiza común. Primavera. 2º año: diseño de secundarias (18-II)



Agachadiza común. Otoño. Adulto (24-VIII).



Agachadiza común. Primavera. Adulto: diseño del ala (18-II)



Agachadiza común. Otoño. 1º año (11-IX).

05190 Agachadiza común (*Gallinago gallinago*)



Agachadiza común. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (24-VIII); abajo 1º año (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (24-VIII); derecha 1º año (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Diseño del capriote: izquierda adulto (24-VIII); derecha 1º año (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (24-VIII); derecha 1º año (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Diseño del pecho: arriba adulto (24-VIII); abajo 1º año (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Diseño de una mediana cobertera del ala: arriba adulto (24-VIII); abajo juvenil (11-IX)





Agachadiza común. Otoño. Adulto: diseño de coberteras del ala (24-VIII)



Agachadiza común. Otoño. 1º año: diseño de coberteras del ala (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto (24-VIII); derecha 1º año (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (24-VIII)



Agachadiza común. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Adulto: diseño de primarias (24-VIII)



Agachadiza común. Otoño. 1º año: diseño de primarias (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Adulto: diseño de secundarias (24-VIII)



Agachadiza común. Otoño. 1º año: diseño de secundarias (11-IX)



Agachadiza común. Otoño. Adulto: diseño del ala (24-VIII).



Agachadiza común. Otoño. 1º año: diseño del ala (11-IX).