

# Admicin 20% L.A.

Ficha técnica

No. DE REGISTRO Q-0970-015 USO VETERINARIO Solución inyectable

## Fórmula



Cada 1 mL contiene:

Oxitetraciclina base..... 200 mg

Vehículo c.b.p..... 1 mL

## Mecanismo de acción



Interfieren en la síntesis proteica y por tanto en el crecimiento y multiplicación de las bacterias. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro.

## Indicaciones



Admicin 20% L.A., es un antibiótico de amplio espectro y de acción prolongada que actúa contra bacterias Gram positivas, Gram negativas, Micoplasma y Rickettsias, sensibles a la fórmula, causantes de enfermedades como: anaplasmosis, neumonías bacterianas, pasteurelisis, mastitis, metritis, diarreas, leptospirosis, clostridiasis, artritis infecciosa, actinobacilosis, ántrax, listeriosis y micoplasmosis que afectan a los bovinos (carne y leche), ovinos y caprinos.

## Dosis



1 mL/10 kg de peso corporal  
(equivalente a 20 mg de oxitetraciclina por kg de peso corporal).

Cada 72 horas como segunda aplicación en caso de infecciones severas o a criterio del Médico Veterinario.

## Vía de administración



Intramuscular profunda.

## Advertencias



Después de la administración intramuscular puede provocar reacción local, con una coloración amarillenta. Contraindicación en animales hipersensibles a la fórmula. No aplicar en animales en crecimiento. En bovinos: no aplicar más de 10 mL en un sólo sitio de inyección. En ovinos y caprinos: no aplicar más de 5 mL en un solo sitio de aplicación. No administrar durante la primera mitad de la gestación, ya que afecta el desarrollo dental ocasionando pigmentación permanente de los dientes (amarillo, gris parduzco), así como alteraciones de desarrollo esquelético, debido a su acción quelante con el calcio. No combinar con otros antibióticos como amikacina, ampicilina sódica, glucocorticoides y Penicilina G. Su uso prolongado puede inducir el desarrollo de micosis por supresión de la flora normal. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

## Tiempo de retiro



No usar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No utilizar la leche procedente de animales tratados hasta 96 horas posteriores a la última aplicación.



## Almacenamiento



Consérvase en un lugar fresco y seco a temperatura entre 15 y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Deseche por medio de la incineración. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

## Presentaciones



Frasco de 50, 100, 250 y 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
INFORMACIÓN TÉCNICA EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO

Registros sanitarios:  
GT: MX542-07-01-6638 NI: MV-11059 PA: RF-6185-12 SV: HN: MV-1-5831  
® Marca registrada. Hecho en México por: Adler Pharma, S. de R.L. de C.V.  
Crisantemo No. 12, Col. Arroyo de las Flores, C.P. 45606, Tlaquepaque, Jalisco, México.  
Tel: (33) 3133-8595.

Adler

www.adler-la.com