



Ziram Granuflo es un excelente fungicida para el control preventivo de enfermedades. Actúa por contacto por lo que su uso debe de ser como protectante, interfiere con la respiración del hongo con una formulación única que proporciona un control efectivo de un amplio espectro de enfermedades.

Ingrediente Activo

Ziram

Presentación

Bolsa de 1 kg / Saco de

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **ZIRAM GRANUFLO**:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón de algodón, mascarilla con filtros, lentes de seguridad, guantes y botas impermeables. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco.
- Ventile el transporte durante 20 minutos previo a la descarga.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
- **Si el producto fue ingerido:** Si la persona está **CONSCIENTE**, enjuague inmediatamente la **boca**. **NO INDUZCA EL VÓMITO** a menos que un médico se lo indique. Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 mL de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso. Una hora después del carbón activado, administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 mL de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
 - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - **Si el producto se absorbió por la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 - **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

ZIRAM GRANUFLO pertenece al grupo químico de los Ditiocarbamatos.

Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto específico, por lo tanto debe hacerse un tratamiento sintomático y cuidados de soporte.

Signos y síntomas de intoxicación. Por vía oral: Náuseas, vómitos, salivación y sudoración excesiva, diarrea, coma, contracciones de pupila y convulsiones. **Por vía dermal:** Causa sensibilización por contacto con la piel. **Por vía inhalatoria:** No hay riesgo de exposición por esta vía. Durante las aplicaciones, no se forma polvo respirable.

USO AGRÍCOLA

Logo del producto y/o de la empresa

ZIRAM GRANUFLO

ziram

Fungicida / Gránulos dispersables

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	% en peso
ziram: <i>Bis-dimetil ditiocarbamato de zinc</i>	76.00%
(Equivalente a 760 g/kg)	
Ingredientes Inertes: Dispersante, humectante	24.00%
TOTAL :	100.00%

Registro único:
RSCO-FUNG-0397-301-034-076

Contenido Neto:



Nocivo en caso de ingestión

Número de lote:

Fecha de fabricación (año/mes/día):

Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y LAS ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ZIRAM GRANUFLO es un fungicida recomendado para el control de las enfermedades que a continuación se indican:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
Cebolla (7)	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	3.0 - 4.0	Aplicar al follaje cuando la planta tenga seis semanas de edad. Repita cada 5 días dependiendo de las condiciones ambientales.
Chile (7)	Antracnosis <i>Colletotrichum capsici</i>	3.0 - 4.0	Aplicar al follaje cuando la planta se encuentre en floración y fructificación. Repetir cada 5 días dependiendo de las condiciones ambientales.
Jitomate (7)	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i>	2.0-3.0	Iniciar las aplicaciones en cuanto la plántula emerja o cuando la planta esté establecida (dos semanas después del trasplante). Repetir a intervalos de 7 a 10 días. Aplicar a intervalos de 5 días si las condiciones son de lluvia.
Vid (14)	Mildiu de la vid <i>Plasmopara viticola</i>	400 g/100 L de agua	Aplicación al follaje y frutos. Realizar 4 aplicaciones en intervalos de 7 días.
Manzano (14)	Roña <i>Venturia inaequalis</i>	400 g/100 L de agua	Aplicación al follaje. Realizar 3 aplicaciones en intervalos de 14 días.

Tiempo de reentrada a campos tratados: Después de 12 horas.

() Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **ZIRAM GRANUFLO** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto, rompa el sobre en la parte superior. El agua a utilizar para la aplicación debe ser limpia, libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada de **ZIRAM GRANUFLO**. Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Lave la bolsa vacía y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Deposite el envase vacío en un Centro de Acopio Autorizado.

Es muy importante realizar previamente la calibración del equipo, para determinar el volumen de agua adecuado de acuerdo al tamaño de la planta, a fin de obtener una cobertura uniforme del follaje. Utilice boquillas para la aplicación de fungicidas que le permitan obtener una densidad entre 50-70 gotas/cm².

Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.