



John Adams
Library,



IN THE CUSTODY OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY.



SHELF NO

ADAMS

80. Q

V. 1



V. 4. voll.

6.









Daudet sculp. Lugd. 1731.

CHRISTIANI WOLFII,

CONSILIARII AULICI HASSIACI, MATHEMATUM ET
PHILOSOPHIAE IN ACADEMIA MARBURGENSI PROFES-
SORIS PRIMARII, PROFESSORIS PETROPOLITANI
HONORARI, SOCIETATUM REGIARUM
BRITANNIAE ATQUE BORUSSIAE SODALIS


E L E M E N T A
M A T H E S E O S
U N I V E R S A E.

T O M U S, P R I M U S,

Qui COMMENTATIONEM DE METHODO MATHEMATICA,
ARITHMETICAM, GEOMETRIAM, TRIGONOMETRIAM PLANAM,
& ANALYSIM, tam FINITORUM quam INFINITORUM complectitur.

EDITIO NOVA,

PRIORI MULTO AUCTIONE ET CORRECTIOR.



GENEVAE.

Apud MARCUM-MICHAELEM BOUSQUET & SOCIOS.

M D C C X X I I.

ADAMS 80.2

v. 1

SERENISSIMO PRINCIPI AC DOMINO,

D O M I N O,

W I L H E L M O,

HASSIÆ LANDGRAVIO,

PRINCIPI HERSFELDIÆ, COMITI

CATTIMELIBOCI, DECIAE, ZIEGENHAINÆ,

NIDDÆ ET SCHAUMBURGI, &c. &c.

EXERCITUS EQUESTRISSIMO FOEDERATI

BELGII GENERALI LOCUM TENENTI,

LEGIONIS PRÆTORIANÆ DESULTORIÆ CHILIARCHÆ,

N E C N O N

OPPIDI TRAJECTI MOSANI SUPREMO

PRÆFECTO BELLICO, &c. &c.

PRINCIPI AC DOMINO CLEMENTISSIMO.



ERENISSIME PRINCEPS,
DOMINE CLEMENTISSIME,

Scientia Mathematica Imperatoribus, Regibus & Principibus ab omni ævo in pretio fuere, ut non modo munificentia sua eas promoverint, sed & ipsimet animum ad eas excolendas

das applicaverint. Non Opus est, ut de ALPHONSO X. Castellæ ac Legionis Rege, & ULUGH BEIGHO, TAMERLANIS MAGNI nepote, Astronomiæ instauratoribus, de MATTHIA Hungariæ Rege inventorum mathematicorum insigni remuneratore, de FRIDERICO II. Daniæ & Norwegiæ Rege atque RUDOLPHO II. Imperatore TYCHONIS Mecanaticibus, de FERDINANDO, magno Etruriæ Duce, GALILÆI Protectore, de CAROLO II. & LUDOVICO XIV. Angliæ & Galliæ Regibus, Societatum Scientiarum conditoribus, de Duce BURGUNDIÆ, Elementorum Geometriæ scriptore & de pluribus aliis, Principibus summis dicamus: Eccur enim è longinquo petenda sunt exempla, ubi domestica prostant? Cur ad vetusta provocandum, ubi præsentia intuemur? Nemo profectò ignorat, quæ WILHELMUS IV. Hassiæ Landgravius successu felicissimo, quo TYCHONI, Phœnici illi Astronomorum, iudice HEVELIO, palmam dubiam reddidit, Astronomiæ & Mechanicæ instaurandæ gratiâ Cassellis molitus est. Et orbis universus admiratur, quæ Magnus Parens Tuus, CAROLUS, Sapientis cognomen instar ALPHONSI dudum meritus, in omni Mathefi ac Philosophia experimentalis præstitit atque munificentiam tanto Principi dignam deprædicat, quæ Artes Mathematicas & Naturæ cognitionem promovet. Tu, PRINCEPS SERENISSIME, qui omnibus virtutibus emines, quæ Heroëm in bello, Regnatorem in pace exornant, nullis Principum in Scientiis Mathematicis magno æstimandis secundus. Quare cum Elementa mea Mathefos universa multo auctiora novoque habitu induta, ut Opus planè novum existimari debeant, denuo in lucem proferam, quo via plana ad omnem theoriam & praxin sternitur, veræque methodi leges, ad accuratè & utiliter philosophandum

*phandum vitæque negotia dextre gerenda apprime necessaria
 animo Lectoris sensim sensimque instillantur; nullus dubitavi,
 PRINCEPS SERENISSIME, ad pedes Tuos ea deponere,
 certo persuasus Tibi non improbatum iri meum in Scientiis
 humano generi adeo utilibus propagandis studium. Deus Te
 seruet Principum Hassiæ Decus! Ita vovet,*

SERENISSIME PRINCEPS,
 DOMINE CLEMENTISSIME,

SERENISSIMI NOMINIS TUI

MARBURGI d. 8.
 Martii 1730.

Humillimus cultor
 CHRISTIANUS WOLFIUS.

PRÆ-



P R Æ F A T I O.



T s i nullo tempore, quo scientiis honos fuit, defuerint viri egregii, qui præclaris ingenii ac virtutum dotibus supra communem mortalium sortem evecti divina illa Mathematica digna statuerunt, in quibus elaborarent, nec infelici successu suspiciendis inventis eadem amplificârunt, quemadmodum veterum monumenta palam loquuntur; ante nostram tamen ætatem ad illud fastigium non fuerunt evecta, in quo hodie constituta miramur. Neque indigna sunt, quæ in dies magis magisque excolantur & explosâ loquaci sophisticâ in scholas revocentur, cum neminem, nisi aut tardiore fuerit ingenio, aut ignarus artis osor affectu præpeditam habuerit mentem, fore existimem, qui non eorum puritatem, evidentiam ac sublimitatem miretur & ob utilitates innumeras inde in genus humanum redundantes de Arte nostrâ præclare sentiat. Mentem enim humanam valdè perficit Mathesis, ad Philosophiam aliaque studiorum genera & latius, & profundius, & utiliùs tractandum instruit, ad solidiorem doctrinam adminicula inexpectata suppeditat, maximas ad vitam utilitates affert.

primè necessarium pronunciamus & sine eo ad solidam rerum cognitionem perveniri posse negamus.*

Equidem non ignoro, homines quosdam, cum sint in Mathesi hospites ac planè rudes; se jactare, quod audiverint Mathematicos de rebus Mathematicis optimè, de aliis à Mathesi alienis pessimè judicantes: veruntamen quod ad tam inconsideratè dicta reponam, non unum habeo. Quoniam nimirum non quævis terra Mathematicum alit (neque enim creantur in Academiis ut Doctores;) sanè non apparet, undè imperitus Artis obrectator certus fuerit factus, sibi rem cum Mathematico fuisse. Quid si Agrimensorem viderit, aut Architectum, aut Conspicillorum politorem, aut Instrumentorum fabrum, aut Virum, cui data est docendi quidem, sed non sciendi Mathesin potestas? Quis enim adeò infans est, ut unumquemque censeat titulo, quem fama fallax aut fortuna cæca eidem tribuit? Non insolitum, nec inauditum, ut, quem ignari judicant Matheleos apprimè peritum, quem Professores *Euclidis*, *Apollonii*, *Archimedis alterius* elogio etiam post fata mactant, idem tamen à Mathematicis summis, verè idoneis harum rerum arbitris, Matheleos imperitus appelletur. Enimvero etiamsi hoc demus, Artis nostræ osorem audivisse Mathematicum de rebus ad Mathesin non spectantibus judicantem; nondum tamen video, unde cognoverit, quod malè judicaverit: aliter enim nisi judicaret qui ingenii acumine pollet, aliter qui haud altiùs vulgo sapit, inter ingenium acre & hebes nullum

* MELANCHTHON, loc. cit. Si qui non rotos se huic studio dedit, tamen his ad judicia formanda non opus est cognitione Elementorum Geometriæ. Idem paulò ante: Cum demonstrationes Geometriæ maximè sint illustres; nemo sine aliquâ cognitione hujus artis perspicit, que sit vis demonstrationum, nemo sine eâ erit artifex methodi.

lum foret discrimen, nec concedendum erat, in Matheſi cum laude verſatis res quaſlibet profundius ſcrutari datum eſſe. Denique ſi vel maximè aliquando contigerit, Mathematicum aliquem de rebus ad ſe non pertinentibus malè judicàſſe; hinc ſaltem colliges, ipſum occasione ita ferente de re, quam nondum meditatùs fuerat, per præcipitantiam, vitium ἀγνοουμένης tantum non ſemper familiare, ſtatuiffè.

Neque enim defendimus, quod eâdem operâ, quâ quis Mathematica ſibi familiaria reddit, ceterarum quoque rerum cognitione animum imbuat, & criminationis loco habemus, ſi qui per malitiam affirmant, quod Mathematici gloriantur, penes ſe ſolos eſſe principia veritatis; ſed quod Matheſeos cultura reliquis ſtudiis præmiſſa efficiat, ut alias diſciplinas faciliùs, rectiùs & profundius percipere poſſis, ubi ad eas induſtriam atque aſſiduitatem attuleris, id verò eſt quod aſſeveramus. Neſcio verò, quâ fronte, qui inexperta loquuntur, majorem ſibi fidem haberi velint, quàm iis, qui niſi experta non conſitentur. Utinam tandem, qui Eccleſiæ ac Reipublicæ præſunt, caverent ne ad cetera ſtudia tractanda animum appellerent, niſi Mathematicâ cognitione imbuti, neque ullus dubito fore ut aliam Eccleſiæ, aliam Reipublicæ faciem contueremur. † Ut enim taceam, quæ

** 3 à

† MELANCHTHON, loc. cit. *Facient deſerta & neglectæ artes Mathematicæ, multis jam ſeculis. Nam proxima ætas (quidni & noſtra?) juventutem ab hac verâ Philoſophiâ ad inſuſſimas cavillationes abduxerat. Nunc, poſtquam hæ exploſe ſunt è ſcholis, amittendum erat, ut pura & nativa Philoſophia traderetur, quæ conduceret ad ſolidam doctrinam conſequendam. Nam hæc noſtra ætas ſatis commonefacit nos, quantum opus ſit Reipublicæ perfectâ doctrinâ, quia multi paſſim, tum inopiâ judicii, tum quia diſertè explicare nihil poſſunt, ſparſerunt aut defendunt opiniones abſurdas & confuſaneas, ex quibus in Eccleſiâ magna certamina, magna diſſenſiones extiterunt. Nec finis horum malorum erit ullus, niſi ad veram & eruditam ſtudioſorum rationem juventus revocata fuerit.*

à doctrinâ in Ecclesiam & Rempublicam redundant , emolumenta , plurimùm refert , si , qui ob eruditionem utrique præficiuntur , sint assidui , considerati , moderati & veritatis amantes , quos Mathefeos studium efficit , ubi ita tractetur , ut amplificet usum rationis ,

Quotquot humanæ mentis vires cognoscere student earumque usum scrutari gestiunt , eos ad Mathematicam culturam invitamus. Ostendet Algebra atque Geometria sublimior , nihil esse tam abditum , quin detegatur : docebit Astronomia cum Geographiâ , nihil esse à sensibus hominum tam remotum , quin id satis distinctè cognoscere & accuratè dimetiri valeamus : testabitur calculus Astronomicus , quantâ certitudine futura cœli phænomena prædicere liceat , etsi Genius nullus motuum , quibus sidera feruntur , leges Astronomis revelaverit : Optica cum Astronomiâ discrimen inter repræsentationes rerum in intellectu & in imaginatione monstrabit : Arithmetica , Trigonometria & Analysis regulas generales suppeditabunt , quibus in inveniendis dirigatur intellectus & unâ cum sensibus compescatur imaginatio , ne meditationes turbet : Methodus denique Mathematica rectum rationis usum manifestabit.

Quanta sit vis Mathematicam in Scientia naturali , ex Statica , Mechanica , Hydrostatica , Aerometria , Hydraulica , Optica , Catoptrica , Dioptrica , Astronomia & Geographia abundè perspicitur : quæ omnes argumenta quædam Physica solidiùs atque profundiùs pertractata exhibent , quàm sine Mathefeos Principiis fieri poterat. Nonne enim Physici est explicare motum , gravitationem corporum , proprietates aëris , Phænomena visûs , structuram universi , naturam &

pro-

proprietates corporum Mundi totalium ? Quod si verò quæ de motu solidorum in Staticâ & Mechanicâ , de gravitatione corporum in fluidis in Hydrostatica , de motu fluidorum in Hydraulicâ , de aëre in Aerometriâ , de visu in Opticâ , Catoptricâ & Dioptricâ , de corporibus Mundi totalibus eorumque motuum legibus in Astronomiâ & Geographiâ traduntur , cum iis conferre dignatus fueris , quæ de iisdem argumentis in Physicorum systematibus occurrunt, demtis præsertim iis , quæ ex Mathematicorum voluminibus descripta sunt ; quantum discriminis intercedat inter Doctrinas Physicas Principiis Mathematicis superstructas atque Mathematicorum operâ excultas , & inter ea dogmata quæ Mathematicorum opem adhuc desiderant , illicò constabit. Unde non miramur ROBERTUM BOYLIUM, de Scientiâ naturali experimentando præclare meritum , ita scribentem : † *De Mathematicâ nonnihil tibi propositurus sum , eum inprimis in finem , ne fortè (quod & mihi olim evenit) seducaris Philosophorum istorum modernorum autoritate , qui cum Physici objectum sit materia , Mathematicas disciplinas , tanquam abstractis saltem quantitibus & figuris occupatas , studio naturali obesse magis , quàm prodesse contendunt. Quamvis enim opinionem ipsius KEPLERI , trium Imperatorum Mathematici aliorumque Astronomorum recentium absurdam , hominibus persuadentem , quòd Mathematica quempiam ad Studium naturale faciliùs absolvendum non omnino*

† In Considerationibus circa utilitatem Philosophiæ naturalis experimentalis, Exercitat. VI, §. 1. & 2. p. m. 483.

omnino idoneum reddere possit, restabilire & defendere aliquando conatus fuerim; ingenue tamen confiteor, quod experimentis meis in specie Mechanicis, Mathematica in Physica usum ingentem mihi demonstrantibus, sæpe jam exoptârim, ut in Geometriæ theoriam & studium Algebrae speciosæ, quam puer fermè addidici, majorem impendissem partem temporis & industrie, quæ Planimetriæ & Fortificatoriae (de quâ me integrum Tractatum scripsisse memini) aliisque Practicis Mathematica partibus à me attributa fuit. Imo nec miramur ingenue profitentem: * Vereor, implorandam esse à Mathematicis lectoribus veniam pro iis rebus, quas, si in Mathesi magis pollerem, accuratiùs tractâssem. Alibi nimirum ostendi †, tum demum in scientiâ naturali ad certitudinem seu evidentiam perveniri & dominium in res creatas obtineri, si Mathesis ad Physicam applicetur.

Nisi utilitates, quas Mathesis ad vitam affert, sponte suâ occurrerent attentis; non modò Arithmeticæ, Geometriæ practicæ, Architecturæ, Mechanicæ, Hydrostaticæ, Hydraulicæ usus in Oeconomia amplissimus facilè ostendi, sed etiam evidenter demonstrari posset, maximam felicitatis humanæ partem Mathesi superstructam: ut taceam commoda, quæ Mathesis præstat absolutis studiis Academicis in exteras regiones excurrentibus, quibus maxima utilitatis ac voluptatis ex itinere capiendæ pars perit, si in illâ fuerint hospites ac peregrini.

Cum adeò disciplinarum Mathematicarum utilitates innumeras mente attentâ perpenderem, propriâ autem experientiâ edoctus non ignorarem, desiderari adhuc Matheos universæ

* In Præfat. ad nova Experimenta Physico-Mechanica de vi Aëris elasticâ.

† In Præfat. ad Elementa Aerometricæ, A. 1709. seorsim edita.

versæ Elementa, quæ ad illas consequendum sufficerent; ante triennium idioma patrio Elementa Matheseos' universæ publici juris feci, in quibus ea potissimum explanavi, quæ ad praxin tendunt, adeoque theorias prætermisi, quarum non adeo manifestus est usus. Dum liber adhuc sub prælo sudabat, contigit ut multi eundem expeterent: † quo ipso adductus Bibliopola desiderabat, ut eundem in sermonem Latinum transfunderem. Hujus ego desiderio annuens bonam jam operis partem habitu Romano indutam prælo destinaveram, cum consultius mihi videretur, si theoretica uberius exponerentur, quam in Opere Germanico ad juvandum primos tyronum conatus composito fieri par erat, ut Latinum scilicet etiam satisfaceret ad sublimiora tendentibus. Quæ igitur sermone Latino prodeunt Elementa, à Germanicis multum differunt novoque ordine digesta sunt. In iis elaborandis tantum operæ collocare non licuit, quantum opus istiusmodi requirere videbatur. Præterquam enim quod sex, minimum quinque per diem horas instituendæ juventuti Academicæ cum in Mathesi, tum in Philosophia impendam; varia obstacula alia impediverunt, quo minus omnia ex voto fierent. Quoniam nimirum Bibliopola, qui aliquos jam sumptus in editionem fecerat, instabat, ut opus cœptum perficerem; singulas fere propositiones typis describendas tradere coactus fui, quamprimum a me in chartam conjectæ essent, typothetis scilicet quotidie pensum semidiurnum a manu mea expectantibus. Quodsi ergo quædam in hoc opere

Tom. I.

de-

† Elementa ista Germanica ab eo tempore jam quarta vice typis rescripta, & in compendium redacta, quod ter lucem aspexit.

deprehendis, quæ jure displicent, ea nec mihi placere scias velim. Si totum displicet, ut meliora des hortor, gratum & mihi & aliis facturus. Interea patere, ut hoc duce utantur, quotquot ad solidam Mathematicam cognitionem non sine operæ, sumptuum & temporis compendio adspirant, quamdiu desit magis fides. Theoretica & practica eadem industria exposui: Ex his unusquisque seligat, quæ ad palatum suum esse existimaverit, reliqua aliis, non sibi dicta putet. Indicem geminum subjunxi: quorum alter est rerum atque verborum, ut his Elementis etiam instar Lexici Mathematici uti possint, quorum studia eodem juvantur; alter Elementa *Euclidea* cum nostris confert, ut, quæ ex *Euclide* passim citantur, etiam in nostris inveniri possint, nec *Euclideanis* habeant opus, qui nostra possident. Vale, Lector benevole, & his nostris utere, Tomum alterum, qui Opticam, Catoptricam, Dioptricam, Perspectivam, Trigonometriam Sphæricam, Astronomiam, Chronologiam, Geographiam, Gnomonicam, Pyrotechniam, Architecturam militarem atque civilem, una cum Bibliotheca Mathematica complectetur, propediem expectans. Dabam Halæ Magdeburgicæ ipsis Calendis Octobris A. 1713.

PLATO apud *Theonem Smyrnæum*, Cap. I. p. 20.

Adolescentibus eorumque ætati conveniunt Disciplina Mathematicæ, quæ animam præparant & defæcant, ut ipsa ad Philosophiam capeffendam idonea reddatur.



MONITUM AUTORIS

DE EDITIONE NOVA.

NOVAM horum Elementorum Editionem daturi operam dedimus, ut multo correctiora prodirent, multo etiam auctiora. Etenim in singulis disciplinis ea adjecimus, quæ adhuc desiderari posse videbantur & viam ad ulteriora sternunt: quo ipso contingit, ut disciplinæ nonnullæ novam plane formam adeptæ fuerint, & quæ in Editione priore per duos Tomos digesta fuerant, in hac posteriore quatuor Tomis complecti necesse fuerit. Ita in Tomo primo, qui nunc prodit, ut taceamus, quæ passim interspersa sunt, Arithmeticæ accesserunt capita novum & decimum integra de fractionibus decimalibus & sexagesimalibus, Geometriæ caput secundum partis posterioris de sectione & situ planorum, Trigonometriæ & Algebrae problemata varia, quæ vel utilitate sese commendant vel quædam inveniendi artificia continent per cetera nondum insinuata. Accessere etiam tum Geometriæ, tum Analyfi finitorum, tum Analyfi infinitorum figuræ novæ tabulis æneis incisæ. Et quoniam Philosophiam certam ac utilem effecturi Mathematicum notitiam amplificamus, ut ad eam capessendam animi defæcati præparentur, nuperque in

Opere Logico † methodum , quæ convenit doctrinæ solidæ, accuratius delineavimus , quam hæctenus ab aliis factum fuerat , ac inprimis genuinam demonstrationum formam distincte exposuimus ; ideo demonstrationes ita digessimus , ut exempla regulis ad amussim respondeant , & Elementa hæc manu assidua volventibus naturalis ratiocinandi modus sua veluti sponte sese insinuet nascanturque in animo ideæ , quæ Logicæ præceptis respondent. Nulli igitur dubitamus fore , ut , qui in his Elementis attentamente perlegendis fuerint assidui , fructus eximios percipiant : id quod quemadmodum speramus , maxime optamus. Dabam Marburgi Cattorum d. 11. Martii A. 1730.

† Prodiit A. 1728. in 4^o.




TYPOGRAPHUS LECTORI. S.



*Abes, LECTOR BENEVOLE, Optimorum
Matheseos Elementorum, quæ hæcenus extant,
optimam Editionem. Quorum præstantia &
utilitas sic omnibus nota est, ut illa com-
mendare, id sane foret tua abuti patientia.
Adde, quod commendationem omnem inutilem
reddit nomen, quod præ se ferunt, Celeberrimi WOLFII.
Ex Secunda Hallensi Editione, quæ Anno superiore prodiit
ista accuratè descripta est; nihil quicquam ausi fuimus im-
mutare nisi innumeros gravissimosque Typographi errores,
qui, in difficili Scientia, molestissimi sunt Tyronibus, quo-
rum gratia conscripta sunt Elementa. Si qui supersint, eos
numero paucissimos esse, sensumque minimè turbantes spera-
mus, quos faciliè condonabis, BENEVOLE LECTOR, si
digneris eos corrigere quos in Erratis ad calcem notavimus.
Ceterum, pluribus etiam aliis respectibus hanc Editionem
prioribus preferendam esse contendimus. Nam ut de Chartæ
candore, Characterum, Figurarumque nitore taceamus;
Algebrae signa sæpius in illis pessimè disposita, & inde incom-
modos*

modos sensus exhibentia, ubique in hac nostra Editione in ordinem redegitur. Et quia Matheseos cursus non solum legendus est & pervolvendus; sed sapius, Dictionarii instar, evolvens, curavimus ut in superiori margine Capitum tituli legerentur.

Quibus, cum tuo, BENEVOLE LECTOR, commodo inseruire animus fuerit, id equi bonique consulas rogamus. Vale. Ex Typographia nostra, die 16. Jul. 1731.



PRIVILEGIUM

SACRÆ CÆSARÆ ET CATHOLICÆ MAJESTATIS.



CAROLUS SEXTUS,

Divinâ favente Clementiâ Electus Romanorum IMPERATOR semper Augustus, ac Germaniæ, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiae, Sclavoniæ, &c. REX; ARCHIDUX Austriæ; DUX Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & Würtembergæ; COMES Tyrolis, &c. Agnoscimus & notum facimus tenore præsentium Universis: Quòd, cùm Nobis Noster Sacrique Romani Imperii fidelis dilectus MARCUS MICHAEL BOUSQUET, ejusque CONSORTES, Bibliopolæ Genevenses, humillimè exponi curârint, quem in modum CHRISTIANI WOLFII *Opera Mathematica cum Figuris, in Quarto*, prelo committere resolverint; vereantur autem, nè æmulum invidiâ hanc Editionem imitantium impendii & laboris sui fructu frustrentur: Ideoque Nobis demissè supplicârint, quatenus eorum indemnitati Privilegiò Nostro Cæsareò succurrere clementissimè dignaremur, Nos submissis pariter ac æquis eorum precibus annuendum censuerimus. Ac proinde autoritate Nostrâ Cæsareâ omnibus Bibliopolis, Bibliopegis, Typographis & aliis quibuscunque rem Librariam seu negotiationem exercentibus firmiter inhibemus, vetamus, & interdiciamus, ne quis supra nominata CHRISTIANI WOLFII *Opera Mathematica cum Figuris*, sub hoc aliòve titulo, aut forma, per Decem Annorum spacium ab hodierno die computandum, intra Sacri Romani Imperii, & Regnorum Ditionumque Nostrarum Hæreditariarum fines recudere, vel aliis recudenda dare, aliorumvè impressâ apportare, citra prælatorum Impetrantium eorundemque Hæredum ac Successorum voluntatem & assensum in scriptis obtentum ausit vel præsumat. Si quis verò secus faciendo Privilegium hoc Nostrum seu Interdictum violare, contemnereque præsumpserit, eum non solum ejusmodi Exemplaribus ubicunque locorum repertis, perperam quippe recu-

lis

sis seu oportatis (quæ dictus MARCUS MICHAEL BOUSQUET, ejusque CONSORTES, sive propriâ autoritate, sive Magistratûs illius loci auxiliô sibi vindicare poterunt :) de facto privandum, sed & Decem Marcarum Auri puri poenâ Ærario seu Fisco Nostro Cæsareo & Parti læsæ ex æquo pendendâ, omni spe veniæ sublatâ mulctandum decernimus, dummodo tenor hujus Nostri Privilegii in fronte Libri impressus reperiat, & consueta Quinque Exemplaria Consilio Nostro Imperiali Aulico exhibeantur. Mandamus itaque omnibus & singulis Nostri & Sacri Romani Imperii Regnorûmque & Dominiorum Nostrorum Hæreditariorum subditis & fidelibus dilectis, tam Ecclesiasticis quàm Sæcularibus, cujuscunque statûs, gradûs, dignitatis aut ordinis fuerint, præsertim verò iis, qui in Magistratu existentes, vel suô, vel superiorum suorum loco, jus justitiamque administrant, ne quemquam Privilegium hoc Nostrium Cæsareum violare, spernere, aut transgredi patiantur: Sed si quos contumaces compererint, constitutâ à Nobis mulctâ eos puniri, & quibuscunque modis idoneis coërceri curent, quatenus & ipsi gravissimam Nostram indignationem prædictâque poenam evitare voluerint. Harum Testimonio Litterarum manu Nostri subscriptarum, & Sigilli Nostri Cæsarei appensione munitarum, quæ dabantur in Civitate Nostri VIENNA, die quinta Aprilis, Anno millesimo septingentesimo trigesimo uno, Regnorum Nostrorum Romanorum vigesimo, Hispanicorum vigesimô octavô, Hungarici & Bohemici verò pariter vigesimo.

CAROLUS.


L.S.

*Ad Mandatum Sac. Cæs.
Majest. proprium.*

J.S. HAYECK DE WALDSTÄTTEN.

Ut:

DE



DE METHODO
 MATHEMATICA
 BREVIS COMMENTATIO.

P R Æ F A T I O.



I quid mei iudicii est operam non inanem sumit, qui Methodum Mathematicorum diligentissime rimatur. Ejus enim vim qui tenet, is non modo ad Mathemata percipienda animum, quantum potest, attendit & rationes evidentiae illorum funditus perspicit; verum ad alias etiam disciplinas, utut labore non adeo facili, cum fructu tamen profusus insigni, eandem transfert. Quodsi vero Mathesis non aliam præter hanc unicam cultoribus sui afferret utilitatem; eidem tamen gnaviter incumbere deberent, quotquot disciplinarum studia ingrediuntur. Eumque in finem studium Mathematicum


ticum tantopere commendant viri docti ac intelligentes, quos inter (a) LOCKIUM, (b) MALEBRANCHIUM, (c) TSCHIRNHAUSIUM nominasse sufficiat, quorum in Philosophia rationali illustranda solertia haud paucorum opinionem vicit. Hanc igitur de methodo mathematica commentationem mole exiguam, sed rerum ubertate gravem Elementis Matheſeos univerſæ præmiſi, ne in iis deſiderari paterer induſtriam meam, quorum ad recte philoſophandum quam maxime neceſſaria eſt cognitio: (d) imprimis cum exiguus admodum ſit eorum numerus, quibus interiora methodi ſunt perſpecta; multo minor autem illorum, qui methodo mathematica prompte utuntur. Cæterum hæc commentatio de methodo ſingulari cum attentione perlegenda, &, ubi Arithmeticæ ac Geometriæ elementa evolvuntur, præcepta methodi ſunt relegenda, tum ut penitus intelligantur, tum ut appareat, quomodo iis ſatiſfiat. Ita demum Matheſeos ſtudium vere acuet intellectum.

(a) In Tractatu de directione ingenii (qui inter opera poſthuma idiomate Anglico Londini 1706. edita habetur) p. 30.

(b) De inquirenda veritate lib. 6. c. 6. & 7.

(c) In introductione ad Matheſin & Phyſicam Germanice conſcripta p. m. 17. & ſeqq.


(d) Uberius huc ſpectantia expoſuimus in Logica ſeu Philoſophia rationali.



CONSPECTUS COMMENTATIONIS DE DE METHODO MATHEMATICA.

Methodus Mathematica definitur §. 1. & ejus forma generaliter describitur §. 2. Hæc ut specialius explicetur, docetur quid sint definitiones §. 3. & harum gratia traditur explicatio notionum tum in genere §. 4. cum in specie clararum §. 6. obscurarum §. 7. distinctarum §. 8. confusarum §. 9. adequatarum §. 10. 11. & inadequatarum §. 12. Ostenditur, quænam notiones in numerum definitionum admittantur §. 13. 14. 15. Definitiones dividuntur in nominales & reales §. 16. 17. 18. Exponuntur quatuor modi inveniendi definitiones nominales §. 19. 20. 21. 22. & quatuor alii inveniendi reales §. 25. 26. 27. 28. Indicatur, quomodo innotescat, quod definitiones tam nominales §. 23. 24. quam reales §. 29. possibiles sint. Declaratur indoles axiomatum & postulatorum §. 30. 31. 33. & abusus quidam notantur §. 32. Disseritur quoque de experientia §. 34. 35. 36. 37. Definitur Theorema §. 38. & distincte agitur de propositionis partibus, Thesi, atque Hypothesi §. 39. 40. 41. 42. & de demonstratione §. 43. 45. 47. ubi etiam docetur usus citationum Mathematicis in demonstrationibus solennis §. 44. Similiter declaratur Problematum §. 48. Corollariorum §. 49. 50. Scholiorum §. 51. ratio. Afferitur Methodi Mathematicæ universalitas §. 52. & ratio redditur, cur interdum Mathesis judicium acuere debeat §. 53. interdum minus §. 54. Denique respondetur ad objectiones, quæ contra Methodum Mathematicam a nonnullis afferri solent §. 55. 56. 57.

DE METHODO MATHEMATICA BREVIS COMMENTATIO.

§. 1.  *PER Methodum Mathematicam intelligo Ordinem, quo in tradendis dogmatis suis utuntur Mathematici.*

§. 2. Ordiuntur autem Mathema-

tici a definitionibus; inde ad Axiomata & Postulata, in Mathesi mixta ad Experientias seu Observationes, progrediuntur; his tandem Theoremata & Problemata superstruunt: ubique vero Corollaria & Scholia, si e re visum fuerit, annectunt.

§. 3. Sunt autem *Definitiones* primæ rerum notiones, quarum ope inter se distinguuntur & unde, quæ de ipsis concipiuntur, reliqua deducuntur.

§. 4. Per *Notionem* quamlibet rei cujuslibet in mente representationem intelligo.

§. 5. Notionum differentiam primus distincte tradidit sagacissimus *Leibniti-
us* (a): quæ quanti sit ponderis, pauci hætenus agnoverunt.

§. 6. Est scilicet *Notio clara*, quæ ad rem oblatam recognoscendam sufficit, e. gr. quod figura data in numero triangulorum habeatur.

§. 7. *Obscura* est *notio*, quæ ad rem oblatam recognoscendam non sufficit. Talis est e. gr. plantæ, ad cuius conspectum dubitas, utrum ea sit nec ne, quam alio tempore alibi videras & cui hoc vel illud nomen tribui suevit.

§. 8. Clara *notio distincta* habetur, si notas recensere valeas, ex quibus rem oblatam recognoscis: e. gr. quod circulus sit figura, linea curva in se redeunte terminata, cujus singula puncta ab eodem puncto intermedio æqualiter distant.

§. 9. *Confusa* est *notio* clara, si notas, ex quibus rem oblatam recognoscis, recensere minime valeas, ut in tales sit resolubilis: qualis est e. gr. *notio* coloris rubri.

§. 10. *Distincta notio adequata* dicitur, si & notarum, ex quibus componitur, notiones distinctas habueris: e. gr. *notio* circuli paulo ante tradita censetur adequata, ubi curvæ in se

redeuntis, puncti intermedii, distantia æqualis & terminationis notiones distinctas habueris.

§. 11. In hac analysi cum progredi liceat, donec ad notiones irrefolubiles perveniatur; notionum adæquatarum dari gradus manifestum est, in præsentem tamen non explicandos. Sufficit monuisse, quod notiones quædam confusæ admitti queant, quarum evolutio ad demonstrationes non apprime necessaria. Ita *Euclides* non resolvit notionem æqualitatis, ut eadem notiones trianguli æquilateri, rhombi & figurarum regularium ingrediatur. Propositiones enim, ad quarum demonstrationem necessaria erat, facile ipsi sine probatione concedi poterant, e. gr. Quod æqualia eidem tertio sint æqualia inter se; quod figuræ sibi mutuo congruentes sint æquales: quod æqualibus per æqualia multiplicatis facta sint æqualia &c. Defectum scilicet analyseos suppleant propositiones, quæ per experientiam satis certæ sunt.

§. 12. *Inadequata* est *notio*, si notarum, quæ distinctam ingrediuntur, non nisi confusas notiones habueris.

§. 13. In numerum Definitionum Mathematicarum non admittuntur nisi notiones distinctæ, &, quantum fieri potest aut pro re nata sufficit, adæquata.

§. 14. Hinc in Definitionibus subsequentibus non utuntur vocibus, nisi vel ex antecedentibus, vel aliunde satis intelligatur, quæ res iis subjiciantur.

§. 15. Et, si quando notione confusa contenti sumus, res, ad quam spectat, obvia

(a) In Actis Eruditorum An. 1684. p. 537.

obvia sit necesse est, ut vel præsentem quandocunque libuerit percipere, vel sæpius jam olim perceptæ haud difficulter reminisci valeamus.

§. 16. Definitiones vero ad duas classes commode revocantur. Sunt nimirum aliæ nominales, aliæ reales.

§. 17. *Definitio nominalis* est enumeratio notarum ad rem oblatam ab aliis distinguendam sufficientium. Talis est quadrati, si figura quadrilatera, æquilatera, rectangula esse dicatur.

§. 18. *Definitio realis* est notio distincta, rei genesis, hoc est, modum, quo fieri potest, exponens. Talis in Geometria est Circuli, si per motum lineæ rectæ circa punctum fixum describi concipitur.

§. 19. Ad definitiones nominales multis modis pervenitur: quos inter primus nominari debet, si ad rem præsentem, quam percipimus, attendimus. Hac ratione Astronomis innotuit, Eclipsin Lunæ esse privationem luminis Lunæ plenæ. Cum cura vero distinguenda sunt, quæ distingui possunt, eaque fini singula primum sigillatim considerari, mox inter se conferri debent, ut definitio notio distincta evadat, qualis (vi §. 13) esse debet.

§. 20. Definitiones hac vel alia methodo investigatas expedientes varias plerumque determinationes animadvertimus, quibus omissis generaliores evadunt. E. gr. Si ex definitione *Trianguli* quod sit spatium tribus lineis comprehensum, linearum numerus expungatur; notionem *Figura* habebis, quod sit spatium lineis terminatum.

§. 21. Si determinationes in definitionibus obvias consideres, alias iis geminas comminisci datur: qua ratione definitiones aliæveniuntur. E. gr. Ubi perpendis figuram trianguli a ternario laterum numero dependere; quaternarium aut numerum quemcunque alium ternario majorem substitue, ut definitio *Figura quadrilatera* aut *multilatera* cujuscunque prodeat.

§. 22. Quemadmodum vero (vi §. 20) determinationes quædam omitti, sic etiam novæ superaddi possunt. E. gr. in definitione trianguli, species & ratio linearum, quam inter se habent, determinari potest. Ponamus nimirum lineas esse rectas; generalis notio trianguli in notionem *Trianguli rectilinei* abit. Ponamus porro esse latera omnia inter se æqualia; notio trianguli generalis in notionem *Trianguli æquilateri* degenerabit.

§. 23. Definitionum per methodum primam inventarum realitas extra omnem dubitationis aleam posita. Quis enim, quæ actu existere cognoscit, utrum esse possint nec ne, dubitabit? Dubitaret enim, num perciperet, quæ se percipere sibi conscius est: id quod valde absolum. E. gr. Si quis Lunam deficientem intuetur; quod Eclipsin pati possit, dubitare nequit. Idem de illis definitionibus judicium esto, quæ a possibilibus abstrahuntur.

§. 24. Alia vero definitionum per methodum tertiam & quartam inventarum est ratio. Utrobique enim arbitrium regnat, sive juxta tertiam determinationes datas in alias similes convertas,

sive juxta quartam datis alias superaddas : nostrum autem arbitrium nullam rebus existendi necessitatem imponit. Licet e. gr. spatium tribus lineis rectis comprehendi possit, inde tamen nondum liquet, quod etiam quatuor, quinque aut pluribus quotcumque aliis terminari queat. Et quamvis tres lineæ rectæ spatium comprehendant; inde tamen nondum apparet, quod inter se æquales esse possint. Tales itaque definitiones possibles esse demonstrandum est: id quod Geometræ circa figuras præstant, dum earum constructionem tradunt.

§. 25. Definitiones reales vel a priori inveniuntur, vel a posteriori innotescunt. A priori definitiones reales investigabis, si ex plurium possibilium, quæ tibi innotuerunt, combinatione novum quoddam possibile producis, e. gr. ex combinatione machinarum simplicium machinam quandam compositam, cujus nullam antea habebas notionem. Et in hac quidem methodo casui sæpe aliquid datur. Exemplo est compositio telescopii per fortuitam combinationem lentis convexæ cum concava detecta, narrante *Borello*.

§. 26. Difficilius idem præstatur, si ex data definitione nominali realis invenienda. Hoc enim in casu notiones distinctas eorum evolvere tenemur quæ in ista continentur, ut appareat, qualia ad rei formationem requirantur; postea cognitiones jam ante acquisitas mente recolere debemus, visuri num talia succurrant, per quæ rei formationem concipere licet. E. gr. datur in

Astronomia definitio nominalis Eclipsis Lunæ, quod scilicet sit privatio luminis Lunæ plenæ; invenienda est definitio realis ejusdem. Lumen igitur lunare & plenilunium meditari debemus. Ubi istud a Sole secundum lineas rectas in corpus lunare incidere & tempore plenilunii Ecliptici Lunam Soli diametraliter opponi, adeoque Tellurem duobus hisce corporibus interpositam in locum Soli oppositum projicere umbram succurrit; haud difficulter innotescit, Eclipsin Lunæ oriri, si ea umbram terræ ingrediatur.

§. 27. A posteriori definitiones reales innotescunt, si rei formationi præsentis attendimus. E. gr. Si quis videat in campo circulum describi, fune circa clavum fixum in gyrum acto; is genesis circuli concipit per motum lineæ rectæ circa punctum fixum.

§. 28. Ad definitiones reales quoque pervenitur, dum compositum totum in suas partes simplices resolvitur, quod in organicis potissimum locum habet. Hac ratione e. gr. structuram machinæ jam extantis assequimur.

§. 29. Circa hoc definitionum genus duo consideranda sunt, antequam de illarum possibilitate judicare licet, nempe 1°. utrum ea existant aut existere possint, nec ne, quæ ad genesis rei concurrere assumimus; 2°. num ab iis proficisci queant, quæ in formatione rei iisdem tribuimus: id quod ex natura definitionis realis (§. 18.) liquet. Horum vero certitudinem vel experientia, vel eorum, quæ per consequentias legitimas alio tempore deduximus, reminiscen-

nifcentia confequimur. Ita, e. gr. in definitione circuli fuperius (§. 27.) tradita per experientiam claret, lineam rectam circa punctum fixum in gyrum agi poffe. Aft in definitione Eclipsis Lunarum ratione, experientia licet ftipata, aflequimur, Lunam Telluris umbram ingredi poffe.

§. 30. Definitiones tam reales, quam nominales cum in fe confiderari, tum inter fe conferri poffunt. Quicquid ex confideratione eorum, quæ in una definitione continentur, immediate deducitur, *Axioma* vocatur, fi quid rei convenire, aut non convenire enunciet; *Postulatum* vero, fi quid effici poffe affirmet vel neget. E. gr. Ex geneft circuli liquet, omnes rectas ex centro ad peripheriam ductas inter fe æquales effe, cum unam eandemque lineam in diverfo fitu referant. Hæc adeo propositio in axiomatum numero habetur. Aft dum per eandem definitionem intelligitur, ex quovis puncto quovis intervallo circulum describi poffe: id inter postulata collocatur.

§. 31. Quoniam igitur axiomatum & postulatorum veritas per intuitum definitionum, ex quibus fluunt, cognofcitur, demonstratione nulla indigent. Vera enim effe intelliguntur, quamprimum realitas definitionum fuerit evicta. Et hoc intuitu *propositiones per fe nota*, item *ex terminis manifesta* dicuntur.

§. 32. Multi hac axiomatum proprietate abutuntur, dum præmiſſas fyllogifmorum, quas probare nesciunt, pro axiomatibus venditant. Hinc vi-

deas in axiomatum numerum referri propositiones, quas sine probatione non admittunt intelligentes. Equidem negandum non est, ipsum *Euclidem*, qui in dæmonſtrando fe virum præſtitit, propositiones utique demonſtrabiles in axiomatum numerum retuliſſe, propterea quod æqualitatis, congruentiæ, lineæ rectæ aliarumque rerum notiones explicare non poterat: monuimus tamen jam in ſuperioribus (§. 11.), ipſum non ſuppoſuiſſe niſi propositiones, quarum certitudo ſtatim cuique patet per recordationem vel maxime confuſam eorum, quæ olim ſæpius experti ſumus aut etiamnum, ſi ita viſum fuerit, denuo extemplo experiri poſſumus, immo quibus in iudicando tantum non quotidie utuntur omnes, quale e. gr. eſt, quod eidem tertio æqualia ſint æqualia inter ſe; item quod figuræ & lineæ rectæ ſibi mutuo congruentes ſint æquales. *Euclidis* igitur exemplum abuſum, quem taxamus, minime tuetur.

§. 33. Notandum nimirum, eo minorem fieri axiomatum numerum, quo ſufficientius notiones evolvuntur. Immo ſi verum fateri fas eſt, vera axiomata non ſunt niſi propositiones identicæ.

§. 34. Cum axiomatibus & poſtulatibus etiam Experientiæ nonnunquam confunduntur. *Experiri* autem dicimur, quicquid ad perceptiones noſtras attentè cognofcimus, e. gr. dum, accenſa candela, conſpicua fieri videmus quæ ante non apparebant.

§. 35. Experientiæ itaque ſunt rerum ſingularium, quoniam nonniſi res ſingulares

gulares percipimus. Quamobrem ad illas provocans casum singularem in medium proferre tenetur, nisi vel sensui, vel memoriæ fuerint obviæ: id quod in Mathesi exactissime observatur. Neque enim, e. gr. in Astronomia Solis orientis & occidentis observationes recensentur, utpote quotidianæ ac omnibus fatis notæ. Diametri vero apparentis Planetarum observationes, a diversis Astronomis, tempore diverso, diversisque instrumentis celebratæ, fideliter referuntur, cum non in cuiusvis potestate existant.

§. 36. Mathematici quoque experientias a conclusionibus inde deductis accurate distinguunt, aliis ut plurimum has cum istis confundentibus. E. gr. Quod, candela accensa, corpora, quæ ante non apparebant, in conspectum prodeant, per experientiam innotescit. Quodsi vero perpendens, lumen in causa esse, cur tenebris discussis appareant, & una expendens rerum naturalium eodem modo se habentium eundem esse effectum, infero; Quicquid lumine colustratur, videri potest: hæc propositio non in experientiarum, sed conclusionum per legitimam consequentiam inde derivatarum numerum referenda.

§. 37. Istiusmodi conclusiones omnis experientiis commemorantur, si modus, quo ex his eliciuntur, omnibus fuerit cognitus atque perspectus. E. gr. Maximam Solis declinationem non immediate metimur, sed ex data elevatione Æquatoris & altitudine meridia-

na Solis in solstitio invenimus. Proprias igitur de ea observationes traditurus, non altitudinem Solis meridianam in solstitio observatam annotet opus est, sed sufficere potest, ut ipsam declinationem statim indicet. Si enim constet, quantam elevationem Æquatoris assumerit; nec quanta meridia fuerit altitudo Solis ignoratur. Quod si vero non appareat, quomodo propositio data ex prævia quadam experientia eliciatur; casus singularis omnino adducendus, ut ratio deductionis ad examen revocari possit. Quod enim aliquid perceperis, cum demonstrare nequeas; ut credatur, iure poscis: sed quomodo unum ex altero deductum fuerit, cum rationis examini subsit, ut fides deductis habeatur, sine ratione flagitas.

§. 38. Propositio theoretica ex pluribus definitionibus inter se collatis eruta *Theorema* appellatur. E. gr. Si in Geometria triangulum cum parallelogrammo super eadem basi & ejusdem altitudinis confertur, & partim immediate ex ipsis eorundem definitionibus, partim ex aliis ipsorum proprietatibus jam ante erutis inferitur; Parallelogrammum esse trianguli duplum: ea propositio in theorematum numerum referenda.

§. 39. Duo autem sunt, quæ in omni theoremate attentionem merentur, *Propositio* nempe atque *Demonstratio*. Ista quidem enunciatur, quid rei cuiusdam sub certis conditionibus convenire possit, quid non: in hac autem rationes

raciones exponuntur, ob quas intellectus illud ipsi convenire concipere valet.

§. 40. Absolute possibile non est nisi ens à se: reliqua vero omnia tantum admissio alio possible esse intelliguntur, hoc est, nil eorum est sine quadam conditione. Hæc igitur in propositione una exprimenda. E. gr. Triangulum est dimidium parallelogrammi, si bases & altitudines fuerint sigillatim æquales. In propositione itaque tam basium, quam altitudinum æqualitas exprimenda. Hinc quælibet propositio in *Hypothesin* & *Thesin* commode distinguitur: quarum ista conditiones recenset, sub quibus aliquid affirmatur, vel negatur; hæc vero complectitur, quod vel affirmatur, vel negatur. E. gr. in propositione allata hypothesis est, *si triangulum & parallelogrammum super equali basi & ejusdem altitudinis existant*; thesis autem, *illud hujus dimidium est*.

§. 41. Notandum vero, si in ipsa rei definitione conditiones, de quibus dixi, continentur, hypothesin distincte non exprimi. E. gr. Si tres in triangulo anguli 180. graduum dicantur; hypothesi carere videtur propositio: quæ tamen statim comparet, si pro voce trianguli definitionem ejus substituas. Ita enim habet propositio: si quædam figura tribus lineis rectis terminatur; tres habet angulos junctim sumtos duobus rectis æquales. En hypothesin, quæ urget, ut tres lineæ rectæ spatium comprehendant.

§. 42. Datur autem in propositione affirmativa necessarius nexus inter hypothesin atque thesin; in negativa au-

tem nullus concipi potest, sed hæc illi repugnat. Quoniam scilicet in subjectoprehenditur, quod hypothesis involvit; ei quoque convenire debet, quod in thesi continetur. E. gr. in hoc theoremate, quod *triangulum sit dimidium parallelogrammi super eadem basi & ejusdem altitudinis*, primum triangulo tribuimus basin & altitudinem basi ac altitudini parallelogrammi æquales; dein asserimus, quod sit parallelogrammi dimidium. Posterius concipitur propter prius.

§. 43. Nexum inter thesin & hypothesin in propositionibus affirmativis; repugnantiam in negativis *Demonstratio* manifestat. Eorum igitur definitiones, quæ in hypothesi ac thesi continentur, eorundemque proprietates ex istis derivatæ aut aliunde cognitæ demonstrationum principia existunt. Quoniam vero in Mathesi principia non admittuntur, nisi quæ ante fuerunt evicta; definitiones ac propositiones, quibus demonstrationes superstruuntur, citari solent, partim ut appareat, genuina principia adhiberi; partim ut ignaris constet, unde ipsorum certitudo haurienda.

§. 44. Enimvero citationes definitionum, axiomatum, postulatorum, theorematum & problematum non exiguum habent usum, nec sine ratione in Mathesi singulis cogitationum generibus singula nomina imponuntur. Demonstratio namque non convincit nisi principiis demonstrandi extra dubitationis aleam positis. Quamobrem ex citationibus liquet, quamnam tanquam vera supponenda sint, antequam verita-

tis propositionis datæ convinci possit. Et quoniam definitiones primi conceptus existunt, axiomata vero ex iis immediate deducuntur, theoremata vero vel immediate, vel mediate ex iisdem derivantur; ex nomine veritatis cujuslibet, ad quam in demonstratione provocatur, statim addiscitur, utrum multa supponenda sint, nec ne, & quo ordine sit procedendum, ut convictio locum habeat. Immo cum ad veritatem definitionum, axiomatum & postulatorum, theorematum & problematum judicandam peculiaribus artificijs opus sit; nomina veritatum citatarum simul methodos in memoriam revocant, quibus principia demonstrandi persuadeas convincendo.

§. 45. Non alia vero est ratio ex principiis conclusiones inferendi, quam quæ in omnibus libellis Logicis, ubi de syllogismo agitur, dudum exposita. Sunt enim demonstrationes Mathematicorum congeries quædam enthymematum, ita ut omnia vi syllogismorum concludantur, omissis saltem præmissis, quæ vel sponte meditantibus occurrunt, vel per citationes in memoriam revocantur. Perfecta autem ut sit demonstratio, præmissæ syllogismorum novis syllogismis tandiu probandæ sunt, donec perveniatur ad syllogismum, in quo præmissæ sunt vel definitiones, quas jam constat esse possibiles, vel propositiones aliæ identicæ.

§. 46. Equidem demonstratu haud difficile foret, (a) genuinam demonstrationem, quæ convictionem plena-

riam pariat, fieri non posse, nisi cogitationes nostræ juxta regulas syllogisticas dirigantur; his tamen ambagibus in præsentem opus non est. Cum enim de quæstione facti disputemus; exempla allegasse sufficit. Scilicet non ignotum est, *Clavium* demonstrationem propositionis primæ Elementi primi *Euclidis* in syllogismos resolvisse: immo *Herlinum* atque *Dasypodium* sex priora Elementa *Euclidis* & *Henischium* integram Arithmeticam per syllogismos in forma exhibitos demonstrasse.

§. 47. Equidem non ignoro, esse hac nostra præsertim ætate non paucos, qui sibi persuadent, demonstrationum mathematicarum formam à legibus syllogismorum abhorreere, multo minus concedere, illas vim omnem ad convincendum ab his unice habere; sed nec me latet, contrarium videri Viris non modo præclara judicii vi pollentibus, sed & attentione magis severa utentibus; quorum autoritas me permovet, ut eam in rem penitus inquirerem & sic præjudicium ex præcipitantia in judicando ortum cognoscerem. Fatetur certè *Leibnitius*, (b) vir in *Mathesi* & omni eruditione reliqua summus, firmam esse demonstrationem, que præscriptam à *Logica* formam servat. Similiter *Johannes Wallisius*, Mathematicus profundus, (c) agnoscit, id, quod in *Mathesi* proponitur probandum, syllogismi unius pluriumve ope deduci. Immo ingeniosissimus etiam *Hugenius* (d)

obser-

(b) *Acta Erudit.* A. 1684. p. 541. conf. *Essais de Theodicée* p. 37. 40. 41. 73. (c) *Operum Mathematic.* Vol. 3. f. 180. hoc est *Logic.* lib. 3. c. 22.

(d) *Acta Erudit.* A. 1711. p. 477.

(a) Ostendimus id in *Logica* §. 551. & seqq.

observavit , *paralogismos in Mathesi sapius vitia forma existere*. Verum enimverone autoritatibus magis, quam rationibus (e) pugnare videar (quamquam in hoc argumento maximum pondus habeat tantorum virorum autoritas,) fontes præjudicii vulgaris retegere libet. Quamdiu scilicet in Mathesi versamur, figuris & characteribus in ratiocinando juvamus, ex quarum inspectione non minus, quam ex aliarum propositionum citatione multæ præmissæ syllogismorum suppleantur: ad quod si non satis attendatur, quam sancte in demonstrationibus mathematicis leges syllogismorum custodiantur non apparet.

§. 48. *Problemata* facienda proponunt & tribus partibus constant, *Propositione* scilicet, *Resolutione* ac *Demonstratione*. In propositione, quid fieri debeat, indicatur. In resolutione singuli actus ordine decenti recensentur, quibus efficitur, quod erat faciendum. Denique in demonstratione evincitur, factis iis, quæ resolutio præcipit, effectum intentum obtineri. Quoties itaque problema demonstrandum, in theorema convertitur, cujus hypothesin resolutio, thesin vero propositio constituit. Generalis enim omnium problematum demonstrandorum (ut jam innuimus) tenor hic est: Factis iis, quæ resolutio præcipit, illud quoque efficitur, quod erat faciendum. Quare non opus est, ut de problematibus plura dicantur.

§. 49. Rationes subinde non desunt,

cur ad casus speciales applicentur propositiones generales, & ex quibusdam propositiones sæpe alias prona consequentia deducere licet. Quæ utroque modo eruuntur propositiones *Corollaria* nuncupantur.

§. 50. Primum corollariorum genus demonstratione non indiget. Quod enim in genere de omnibus in universum casibus demonstratum fuit, de hoc vel isto in specie ut denuo demonstraretur opus non est. E. gr. ubi de omnibus triangulis ostensum, tres angulos eorum una sumtos duobus rectis æquari; idem in specie de triangulis rectangulis confirmari haud debet. Ast alterum corollariorum genus demonstrationem requirit. Quotiescunque nimirum ex aliis propositionibus aliquid infertur, ratio illationis indicanda. E. gr. Si theoremati, cujus modo mentionem feci, hoc corollarium subjungatur; *in triangulo rectangulo unus saltem actu rectus esse potest*: ratio illationis non negligenda, quod scilicet, positis duobus actu rectis, tertius nihilo æqualis foret.

§. 51. In *Scholiis* denique tam definitionibus, quam propositionibus earumque corollariis subjungi solitis; obscura declarantur, ad dubia respondetur, usus doctrinarum indicatur, historia ac fontes inventionum describuntur, & si qua alia scitu nec injucunda, nec inutilia occurrunt, inferuntur.

§. 52. Explicatam hætenus methodum qui probe perpendit, ejus universalitatem haud dubie agnoscet nec diffitebitur, sine ea ad solidam rerum cogni-

(e) Vide eas in *Logica* §. 551. & seqq.

tionem perveniri haud quaquam posse. Dicitur vero *Methodus mathematica*, inmo sæpius *Geometrarum methodus*, quia huc usque Mathematici fere soli, in Geometria imprimis, ejus leges sancte custodiverunt. Quanquam enim non defuerint, qui eandem aliis disciplinis applicare studuerunt; conatui tamen ipsorum eventus minime respondit. Etenim nunc notiones non satis eolverunt, nunc sine probatione assumerunt quæ maxime probari debebant, nunc per saltum ratiocinati sunt, inferentes nimirum, quæ nullo argumento inferri possunt.

§. 53. Explicatæ methodi legibus cum ex asse satisfiat in Mathesi præsertim pura, non ex vano prædicatur, quod Mathemata judicium acuant, hoc est, quod eorum cultores promptitudinem acquirant veritatem quamlibet, ad quam cognoscendam animum appellant, accuratius, quam alii solent, judicandi. Exercitio enim comparatur judicandi etiam ac ratiocinandi habitus, quale demonstrationum mathematicarum meditatio censeretur debet.

§. 54. Fructus igitur, quem ex studio Matheseos maximum percipere licet, participes non fiunt, quotquot praxes quasdam mathematicas aliasque parum mathematici habentes, vulgo tamen ad eandem referri solitas, addiscunt. Licet enim in vita communi utiles existant; neminem tamen iudicii acumine ac inveniendi habitu beant, quia per §. præc. hæc non nisi à serâ demonstrationum meditatione expectare licet.

§. 55. Superest ut ad objectiones

duas respondeam, quas contra methodum Geometrarum nonnulli afferre solent, præsertim cum satis prævideam non defuturos, qui easdem contra Elementa mea Matheos urgebunt. Nempe vitio vertitur Geometris, 1. quod multa definiant, quæ definitione non habent opus, & quod multa probent, quæ probatione non indigent: 2. quod ordinem, quo generaliora & simpliciora specialibus & compositis præponi necesse est, negligant, nec ad unum argumentum pertinentia uno loco absolvant.


§. 56. Objectioni primæ ut satisfiat, explicandum est, quando definitiones sint superflue & quales esse debeant propositiones, ut probatione non indigeant: id quod ex fine definitionum atque indole demonstrationum redditur manifestum. Definitiones nimirum hunc habent usum, ut vel subsequenter aliis intelligendis inserviant, vel principia demonstrandi præbeant. Ostendant igitur adversarii, *Euclidem* aut *Geometram* alium ullam dedisse definitionem, qua nec ad subsequentes explicandas, nec in propositionibus demonstrandis utuntur. Quamdiu vero exempla istiusmodi in medium afferre nequeunt, Geometras reprehendere desinant, quod nimii sint in definiendo, & suum potius errorem agnoscant, quod definitionibus non alium tribuant usum, nisi qui in rebus definitis agnoscendis & ab aliis distinguendis consistit. Diximus porro superius, præmissas syllogismorum tamdiu continuandas esse, donec ad definitiones, quas jam constat esse possibles, & propositiones

tionem identicas perveniatur. Sine ratione itaque non admittuntur nisi propositiones identicæ ac experientiæ claræ, in quibus notiones primæ fundantur. Reliquæ propositiones omnes sunt demonstrandæ. Ostendant igitur adversarii *Euclidem* aut Geometram aliam propositiones identicas & notiones in experientiis claris fundatas demonstrasse. Quamdiu vero hujusmodi exemplum nullum in medium afferre valent; Geometras reprehendere desinant, quod probent, quæ probatione non indigere ipsis videntur, & potius discant, quod in demonstrando nunquam nimis accurati esse possimus, præsertim ubi extra Mathesin versamur, nec ut ibi figuris

ac characteribus in ratiocinando juvamus.

§. 57. Quoniam igitur rigor in demonstrando laudi ducitur Geometris (§. 56.); nec ordo jure taxatur, quo sine in demonstrando accurati esse nequimus. Eo nimirum ordine singula proponenda sunt, quo unum ex altero facilius infertur. Quare cum satis experiamur, id fieri minime posse, si in unum cumulum congerantur, quæ de subjecto eodem cognosci possunt; *ordo scholæ* Philosophis vulgaribus relinquendus & à Geometris aliisque, quibus res profundius meditari datum est, *ordo natura* retinendus.

F I N I S .



ELEMENTA

E L E M E N T A
A R I T H M E T I C . Æ .

P R Æ F A T I O .



ON dubito fore aliquos , qui mirabuntur , quod Elementa Matheseos universæ conscribens *MATHESIN UNIVERSALEM* præmittam. Enimvero quam perperam nonnulli Mathesin universalem appellant , eam ego ab Arithmeticâ diversam non agnosco. Quantitates enim , quarum affectiones & relationes in eâ considerant , pro numeris indeterminatis habeo : quæ etiam ratio est , cur non aliæ ipsarum , quam numerorum sint affectiones ac relationes. Ea igitur , quæ in Mathesi universali vûlgo tractari solent , ego in Arithmeticâ pertracto : quò rationum potissimum doctrina spectat. Calculum tamen numerorum indeterminatorum , quem *LITTERALEM* appellare solent , non integrum trado , quia in demonstrationibus Arithmeticis & Geometricis integro opus non habeo. Plenior adeo explicatio *ANALYSI* reservatur. Nec rationum doctrinam ope calculi hujus folius demonstro , quia cum rigore demonstrandi , quem mihi observandum proposui , ea demonstrandi ratio non subsistit , utpote in quâ multa communiter sine probatione assumuntur , quæ & à veteribus demonstrata , nec mihi sine probatione concedi posse visa sunt , ubi solidam doctrinam cordi habueris. Ve-

ram-

ram autem *MATHESIN UNIVERSALEM* in desideratorum numero colloco, eam nempe, quæ leges metiendi generales & ad omnium rerum quantitatem determinandam mensuras convenientes præscribit: nec repertu adeo facilem judico. Cæterum quæ commodiùs ope calculi litteralis eruuntur, nec ad communis Geometriæ elementa intelligenda necessaria sunt; ea ad *Analyfin* rejeci. Tyrones sub initium præces arithmeticas solas cum definitionibus sibi familiares reddere debent, theorematibus problematumque demonstrationibus omiſſis. In calculo exercitati theoremata ad multa exempla numerica applicent, ut non modo eorum sensum clare perspiciant, sed eadem quoque memoriæ firmiter insigant, quò in promptu sint, quoties iis vel ad demonstrandum, vel ad inveniendum opus est. Iis intellectis problematum demonstrationes expendere, ac his perceptis inoffenso pede ad theorematum demonstrationes progredi licebit. Absit autem, ut quis arbitretur, omnibus calcandam esse hanc semitam. Quorum enim est major mentis acies, congenita vel aliis studiis acquisita, & faciliùs conservatur attentio; illi elementa integra eo ordine perlegere possunt, quo conscripta sunt. Usus Arithmetiæ per disciplinas reliquas omnes se diffundit. Ea igitur reliquis omnibus præmittenda fuit & ante eas cum curâ addiscenda est. Quantum Arithmetiæ in vitâ civili usus sit, experientia loquitur: quantum in *Physicis* & aliis *Philosophiæ* partibus, experientur quotquot, *Mathesi absolutâ*, solidam extra eam doctrinam quærere allaborabunt. Quantum denique in perficiendo intellectu possit, in ipsâ pertractatione hinc inde annotavimus, & si quis culturam convenientem studio Arithmetico non negaverit, experientia optima erit *Magistra*.

ELEMENTA ARITHMETICÆ.

CAPUT PRIMUM.

De Principiis Arithmetica.

DEFINITIO I.

I.



ARITHMETICA est numerorum scientia. Pars ejus *practica* est scientia computandi, hoc est, ex quibusdam numeris datis inveniendi alios, quorum ad cognitos relatio datur; ut si fuerit inveniendus numerus, qui duobus 6. & 8. junctim sumtis æqualis est.

ut si fuerit inveniendus numerus, qui duobus 6. & 8. junctim sumtis æqualis est.

SCHOLION.

2. Patet adeo, *Arithmeticam practicam esse methodum inveniendi specialem. Ab eâ igitur, si rite meditemur, regulas inveniendi generales abstrahere licet. Particularis enim methodus in applicatione regularum generalium consistit. Dederunt aliqua huc spectantia Cartesius cum in Tractatu de methodo, tum in iis, quæ de ingenii directione inter posthuma habentur, & R. P. Malebranchius in egregio opere de inquirenda veritate. Plura, quamvis paucis, nos damus infra (S. 125.).*

DEFINITIO II.

3. *Unum* est, quod ita est aliquid, ut aliud præterea idem esse nequeat. Illustris *Leibnitius* unum sic definit: Si A sit B, nec præterea D ponatur B, nisi A & D idem sint, ponetur B unum.

Wolffii Oper. Mathem Tom. I.

DEFINITIO III.

4. *Unitas* est abstractum, per quod dicimus unum.

DEFINITIO IV.

5. *Unitates eadem* sunt, quæ per eandem notionem agnoscuntur: *diversæ* sunt, quæ agnoscuntur per diversas.

SCHOLION.

6. *Ponamus e. gr. A esse globum lapideum, B similiter esse globum lapideum alium: erunt A & B unitates eadem. Sed si A fuerit globus lapideus, C plumbeus: erunt A & C unitates diversæ. Quodsi A, B & C tantum ut globos consideres, erit etiam C eadem unitas cum A & B.*

DEFINITIO V.

7. Si A sit unum, B sit unum, C sit unum, D sit unum &c. nec tamen B, C, D &c. sint idem cum A; erunt A, B, C, D &c. *Plura* seu *Multa*.

DEFINITIO VI.

8. *Multitudo* est abstractum, per quod dicuntur plura.

DEFINITIO VII.

9. Si A sit idem cum B, C & D simul sumtis, dicetur A *Totum*; B vero C & D dicentur ejus *Partes*, & intuitu partis B reliquas C & D &c. *Complementum ad Totum* vocabimus.

C DEF.

DEFINITIO VIII.

10. Quicquid refertur ad unitatem ut linea recta ad aliam rectam, Numerus dicitur.

SCHOLION I.

11. Nempe si pro unitate linea recta sumatur; numerus quoque exprimi potest per rectam: id quod infra in Geometria & Analyfi abunde patebit.

SCHOLION II.

12. Numerus autem adeo generaliter definiendus, ut sub eadem definitione numeros cum integros, tum fractos, tam rationales, quam irrationales comprehendere valeamus.

DEFINITIO IX.

13. Numerus determinatus est, qui refertur ad unitatem datam, ut ternarius. Indeterminatus est, qui refertur ad unitatem vagam, diciturque Quantitas.

SCHOLION.

14. In quantitatum numerum refertur latitudo fluvii. Quodsi quasiveris, quanta ea sit; quantitatem concepturus unitatem quandam ad arbitrium assumit & illius ad hanc relationem quærit, ac pro diversa unitate assumpta per diversum numerum determinatum latitudinem fluvii enunciat. Latitudo igitur fluvii inter quantitates collocatur, quatenus refertur ad unitatem vagam: qua determinata, per numerum determinatum distincte intelligitur.

DEFINITIO X.

15. Æqualia sunt, quorum unum alteri salva quantitate substitui potest. Inæqualia sunt, si pars unius alteri toti substitui potest.

COROLLARIUM I.

16. Quoniam pars unius inæqualium alteri toti substitui potest; quod vero alteri, salva nempe quantitate, substitui potest, al-

teri æquale est (S. 15.); pars unius inæqualium alteri toti æqualis est.

COROLLARIUM II.

17. Similiter cum unum inæqualium pro alterius parte substitui possit (S. 15.): erit idem alterius parti æquale.

HYPOTHESIS I.

18. Signum æqualitatis est $=$.

SCHOLION.

19. Hoc signo primus usus est Hariotus Anglus (a), & hodie plerique eodem utuntur. Nonnulli cum Cartesio adhibent Signum sequens \propto ; quidam etiam alia. Apud Auctores Harioto antiquiores nullum æqualitatis signum occurrit.

DEFINITIO XI.

20. Majus est, cujus pars alteri toti æqualis est: Minus vero, quod parti alterius æquale.

COROLLARIUM.

21. Cum pars unius inæqualium A alteri toti B æqualis sit (S. 16.) & vicissim B æquale parti ipsius A (S. 17.); inæqualium unum A majus, alterum B minus est (S. 20.).

HYPOTHESIS II.

22. Signum majoritatis est $>$; minoritatis $<$.

SCHOLION.

23. Signis his itidem primus usus est Hariotus (b). Eum secuti celeberrimus Wallisius (c) & R. P. Lamy (d). Aliis alia placent: plerisque nulla sunt.

DEFINITIO XII.

24. Similia sunt, in quibus ea eadem sunt, per quæ à se invicem discerni debebant. Dissimilia sunt, in quibus ea diversa sunt, per quæ à se invicem discerni debent. Atque adeo Similitudo

(a) In Artis Analyticæ praxi, Sect. 1. f. 19.

(b) Loc. cit. (c) Vide Arith. c. 35. f. 186. Vol. 1. Oper. Mathem. (d) Elementis Geometriæ lib. 3. sect. 5. p. 177. Edit. Par. 1710.

militudo est *identitas*; *Dissimilitudo* *diversitas* eorum, per quæ res à se invicem discerni debent.

COROLLARIUM I.

25. Nihil ergo in uno Similium deprehenditur, quod non æque deprehendatur in altero, modo sit istiusmodi ut sine alio assumpto intelligi possit.

COROLLARIUM II.

26. Cum quantitas sine alio assumpto per se non intelligi, sed tantum dari possit (S. 13. 14.); Similia, salva similitudine, quantitate differre possunt (S. 25.), atque adeo quantitas est discrimen internum similitum.

SCHOLION.

27. *Similitudinis notionem distinctam primus eruit Leibnitijs. Dixit nempe similia, quæ non possunt distingui, nisi per comparæntiam. Quoniam vero terminus comparæntiæ plerisque obscurus videtur; aliam definitionem intellectu planiorem substituere libuit. Ceterum res comparæntes fiunt duplici modo, nimirum vel immediate unum alteri, vel utrique idem aliquod tertium applicando: id quod intellectu facilius evadet, si in exemplum aliquod aciem ingenii intendamus. Ponamus itaque duo horologia portatilia prorsus inter se similia esse. Illorum unum possideat Grachus; alterum Cajus. Quodsi Cajus in præsentia Grachi horologium suum depromat, ne is attonitus sibi persuadet horologium suum esse, quod Cajus manu tenet; at diversum à suo agnoscat, ubi & suum depromit, hoc est horologium Caji à suo distinguit Grachus per comparæntiam, unum nempe alteri immediate applicando. Sed si locorum vel temporum intervallum inter duo ædificia similia interjectum menti una cum ipsis exhibetur; vel si dimensiones templorum aut statuarum similitum ad staturam nostram aut mensuram datam aliam referimus; similia animo comparæntiæ sistuntur idem tertium utrique eorum applicando.*

HYPOTHESIS III.

28. *Signum similitudinis est S.*

SCHOLION.

29. *Commendatur in Miscellaneis Berolinensibus (e). Communiter nullo utuntur.*

DEFINITIO XIII.

30. *Pars aliquota est, quæ aliquoties repetita integro fit æqualis. Pars vero aliquanta est, quæ repetita aliquoties semper vel major, vel minor est toto.*

DEFINITIO XIV.

31. *Commensurabilia sunt, quæ partem aliquotam communem habent, vel quorum unum est pars aliquota alterius. Incommensurabilia sunt, quorum nulla datur pars aliquota communis.*

DEFINITIO XV.

32. *Quantitates homogeneæ sunt, quarum una aliquoties sumpta alteram superare potest, seu quarum una ab altera vel semel, vel aliquoties ablata tandem vel nihil, vel se minus relinquit. Heterogeneæ vero sunt, quarum una aliquoties sumpta alteram superare nequit.*

DEFINITIO XVI.

33. *Numerus numerans est, cujus unitas denotat ens in genere: Numerus vero numeratus est, cujus unitas denotat certam quandam entis speciem, vel genus quoddam determinatum.*

SCHOLION.

34. *E. gr. Si quis simpliciter dicat, sex; is non determinat, quam sint illa entia, quæ numerantur, adeoque utitur numero numerante. Contra si quis dixerit cum addito, sex globi aurei; is speciem entium de-*

C 2 terminat,

terminat, quæ numerat, adeoque utitur numero numerato. Vocant nonnulli numerum numerantem abstractum; numeratum vero concretum.

DEFINITIO XVII.

35. Numeri inter se homogenei sunt, qui ad eandem; heterogenei, qui ad diversas unitates referuntur.

SCHOLIUM.

36. Hac divisio numerum numeratum potissimum respicit. Omnis nempe numerus determinatam quandam unitatem supponit (S. 10.). Determinatur ea per notionem, ad quam in numerando respicimus (S. 5.). E. gr. ea globi proprietas est, qua ab aliis corporibus distinguitur, quod singula puncta superficiæ à centro aqualiter distent. Quod si igitur hanc unitatis notam constituas; singula corpora, quibus eadem convenit, unitatis naturam induunt, suntque unitates eadem, quatenus sub hac notione continentur (S. cit.). Quod si vero globos porro distinguas e. gr. per materiam, ex qua constant, & alios ut aureos, alios ut plumbeos spectes; quæ antea eadem erant unitates, nunc diversa evadunt. Hinc tres globi aurei & sex globi aurei sunt numeri homogenei inter se; sed tres aurei & sex argentei sunt inter se heterogenei.

DEFINITIO XVIII.

37. Numerus integer est, qui refertur ad unitatem tanquam totum ad partem.

DEFINITIO XIX.

38. Numerus fractus est, qui refertur ad unitatem tanquam pars ad totum. Dicitur is etiam *Fractio*, itemque *Minutia*.

DEFINITIO XX.

39. Numerus rationalis est, qui unitati commensurabilis. Vocatur etiam *effabilis*.

DEFINITIO XXI.

40. Numerus rationalis integer est, cujus pars aliquota est unitas.

DEFINITIO XXII.

41. Numerus rationalis fractus est, qui unitatis parti aliquotæ aut aliquot partibus aliquotis æqualis est.

DEFINITIO XXIII.

42. Numerus rationalis mixtus est, qui constat ex integro & fracto, seu ex unitate & fracto.

DEFINITIO XXIV.

43. Numerus irrationalis sive surdus est, qui unitati incommensurabilis. Vocatur etiam *ineffabilis*, item *geometricus*.

HYPOTHESIS IV.

44. Si in numerando ad denarium pervenitur, initium numerandi repetatur, nisi quod denariorum numerus una exprimatur.

COROLLARIUM.

45. Decem ergo nominibus opus est ad decem numeros rationales primos indigandos & præterea aliis, quibus decadam multitudo denotetur & ita porro.

SCHOLIUM.

46. Lex numerandi, quam in hypothesis tradimus, ubi vis (quantum constat) gentium recepta, & cum a prima ætate eadem adsueverimus, indispensabilis necessitatis videtur. Enimvero non modo Erhardus Weigelius in *Arithmetica Tetractyca* ostendit, fieri quoque posse, ut in numerando non ultra quaternarium progrediamur; sed & Illustris Leibniti (f) *Arithmetica binariam* excogitavit, non nisi duobus notis 1 & 0 utentem ac numerorum proprietatibus investigandis aptam; cujus aliquod specimen dedit Cl. Dangi-

(f) Histoire de l'Academie Royale des Sciences An. 1703. p. 175. & seqq. Edit. Amstel.

Dangicourt circa progressionem arithmeticas (g). Nimirum quoniam Arithmetica Dyadica duabus tantum notis utitur, leges progressionum numerorum dyadice expressorum facillime omnium deteguntur. Et Carolus XII. Rex Sueciæ, calculum sexagenarium excogitavit, referente Emanuele Suedenborgio (h), novis characteribus & numeris novisque denominationibus adinventis. Arithmetica autem decadica, qua vulgo utimur, denario digitorum numero procul dubio originem debet; digitis enim in computando utimur, quamdiu in computo nondum satis versati.

DEFINITIO XXV.

47. Decem illa nomina, quibus in numerando utimur, sunt: *unum*, *duo*, *tria*, *quatuor*, *quinque*, *sex*, *septem*, *octo*, *novem*, *decem*. Idem numeri generali *Unitatum* nomine insigniri solent, nec opus est ut definiantur. Dicuntur etiam *Digiti*. Ex decem unitatibus componitur una *Decas*. Dux decades dicuntur *viginti*; tres *Triginta*; quatuor *Quadraginta*; quinque *Quinquaginta*; sex *Sexaginta*; septem *Septuaginta*; octo *Octoginta*; novem *Nonaginta*. Ex decem decadibus componitur *Centenarius*; ex decem centenariis *Millenarius*; ex mille millenariis *Millio*; ex mille millenariis millionum *Billio*; ex mille millenariis billionum *Trillio* &c. Denarius ejusque quævis multipla dicentur *Articuli*.

SCHOLION.

48. *Vocibus millionum, billionum, trillionum &c. utimur ad confusionem in numeris magnis evitandam, quorum distinctis notionibus formandis inserviunt.*

HYPOTHESIS V.

49. *Nota numerica constituentur no-*

(g) In Miscellaneis Berolinens. p. 336. & seqq.
(h) Observat. miscellan. part. 4. p. 1. & seqq.

tem sequentes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ut vero non solum unitates, sed & decades, centenarios, millenarios &c. indigitare possimus, valor ipsis tribuatur localis, ita ut solitarie vel in loco dextimo posita unitates sive digitos, in secundo decades, in tertio centenarios, in quarto millenarios &c. denotent. Loca vacua repleantur cyphra 0, qua scilicet sit Nullitatis nota.

COROLLARIUM I.

50. Numerorum igitur partes hoc ordine se invicem excipiunt:

Unitates	}	Simplices.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Millenariorum.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Millionum.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Millenariorum Millionum.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Billionum.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Millenariorum Billionum.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Trillionum.
Decades		
Centenarii		
Unitates	}	Millenariorum Trillionum &c.
Decades		
Centenarii		

SCHOLION I.

51. *Characterum arithmeticoꝝ electio arbitraria. Hinc apud varias gentes varii occurrunt; ut inter alios docent Georgius Henischius in libello de numeratione multiplici, vetere & recenti, atque Guil. Beveregius in Arithmetica chronologica libro primo*

integrò. Non tamen omnes æque commodi. Seligendi adeo sunt, per quos numerus quantumvis magnus facillime exprimi & computus optime absolvi potest. Quod autem notæ nunc usitata reliquis præsent, has cum illis conferentes experiuntur. Dicuntur subinde cyphræ, quamvis usitatius sit, ut hoc nomen soli notæ nullitatis imponatur: quem morem nos sequimur. Ab Arabibus inventa vulgo feruntur. Sed docuit celeberrimus Wallisius (i), quod Alsepadî Arabs in Commentario ad Tograi poemâ Lamiat'ol Ajam dictum, inventionis gloriam Indis tribuat. Idem refert (k), quod Saraceni eas in Hispaniam attulerint, & quod ex Hispania in Galliam pervenerint studio Gerberti, monachi Floriacensis in Gallia, qui a variis dignitatibus Ecclesiasticis tandem ad Pontificatum maximum nomine Sylvestri II. circa A. C. 999. eveltus, ex ipsis ejus epistolis A. 1636. Parisiis recufis probat. Joannes Fridericus Weidlerus, Mathematicum apud Wittebergenses Professor clarissimus, (l) ex MSC. Boëthii de Geometria, quod in Bibliotheca Academiae Altorfinae asservatur, & in quo Noster characteres numerorum Arabicis similes expressos vidit, probare nititur, eos jam Boëthio fuisse cognitos, quem A. C. 524. vitam finisse constat. Wallisius (m) non ignoravit, in Boëthii, Bedæ aliorumque antiquiorum editionibus figuras isriusmodi comparere; sed id in vetustioribus MSC. contigisse negat. Quamobrem cum Weidlerus MSC. cujus auctoritate nititur, seculo quarto non junius existimet; criticorum est statuere, num tanta illius antiquitas admittenda sit.

SCHOLIUM II.

52. Ex collatione diversarum figurarum numeralium discant velim, qui artem inveniendi cordi habent, quantum momenti in eo

(i) Arithmet. Oper. c. 9. f. 48. Vol. I. Oper. Math. (k) In Tract. de Algebr. c. 4. f. 11. & seqq. Vol. II. Oper. Mathem. (l) In Dissertatione de characteribus numerorum vulgaribus & eorum ætatibus A. 1727. publice ventilata §. 8. & seqq. p. 17. & seqq. (m) In Tract. de Algebr. loc. cit.

situm sit, ut ars characteristica perficiatur.

COROLLARIUM II.

53. Quodsi notis numericis substituantur literæ ad arbitrium electæ iisque idem tribuatur valor, qui illis tribui solet (§. 49.); numerum occulte scribere licet.

SCHOLIUM III.

54. E. gr. Denotent literæ infra scriptæ in secunda serie eosdem numeros, quos designant notæ superiores supra scriptæ in prima.

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.

p. s. a. c. e. h. o. i. n. g.

erit 3748 = aoci. Hoc artificio utuntur mercatores ad designanda mercium pretia in schedulis affixis.

PROBLEMA I.

55. Numerum scriptum enunciare; hoc est, cuilibet characteri valorem competentem assignare.

RESOLUTIO.

1. Numerus propositus per commata dividatur in classes, tres notas unicuique assignando, initio a dextris factò.
2. Nota dextima classis tertiæ notetur lineola transversa apici adscribenda; dextima classis quintæ duabus; dextima septimæ tribus &c.
3. Comma solitarium per millenarios, lineola transversa una per milliones, duæ per billiones, tres per trilliones, &c. nota vero sinistima classis uniuscujusque per centenarios, media per decades, dextima per unitates enuncietur (§. 50.). Sic factum est, quod ptebatur.

E. gr. Numerus sequens.

2^{''}, 125, 473^{''}, 613, 578['], 432, 597
ita enuncietur: Duæ trilliones, centum & viginti quinque millia billionum una cum quadrin-

quadringentis septuaginta tribus billionibus, sexcenta & tredecim millia millionum una cum quingentis septuaginta octo millionibus, quadringenta & triginta duo millia, quingenta & nonaginta septem.

SCHOLIION.

56. *Quantum conveniens terminorum usus in rebus distincte concipiendis, seu ex confusione extricandis vires intellectus humani extendat; abunde perspicient oculatiores. si ad presens problema fuerint satis attenti.*

HYPOTHESIS VI.

57. *Quantitates aut numeros indeterminatos litteris Alphabeti minoribus a, b, c &c. vel etiam majoribus A, B, C &c. indigitamus.*

SCHOLIION.

58. *Litteris majoribus usus est Vieta (n): minores introduxit Hariotus (o), quem mox imitatus est Cartesius (p) & nunc sequuntur plerumque omnes.*

HYPOTHESIS VII.

59. *Fractiones per duos numeros exprimuntur, quorum alter alteri interjecta lineola subscribitur. Eorum inferior, seu Denominator, indicat unitatem seu totum in partes divisum; superior vero, seu Numerator, numerat partes in casu proposito datas. E. gr. Duæ partes tertiæ unius lineæ ita scribuntur $\frac{2}{3}$: ubi denominator 3 indicat, lineam esse in tres partes æquales divisam; numerator 2 vero duas istiusmodi partes assignat.*

SCHOLIION.

60. *Neque vero mirentur tyrones, quod in numeris fractis numeratori denominator subscribatur, qualis in integris non occurrit. Additur enim, ut appareat, quamnam*

(n) In variis scriptis Analyticis, quæ inter Opera ejus habentur. (o) In Artis Analyticæ praxi. (p) In Geometria.

partem aliquotam cum unitate communem habeat fractus (S.41.).

DEFINITIO XXVI.

61. *Additio est inventio alicujus numeri ex duobus vel pluribus homogeneis datis, qui datis junctim sumtis æqualis est. Numeri dati dicuntur summandi; quæsitus autem summa vel aggregatum.*

COROLLARIUM.

62. *Iterata ergo ejusdem numeri additio est inventio numeri alteri cuidam aliquoties sumto æqualis & contra.*

HYPOTHESIS VIII.

63. *Signum additionis est +, quod per plus efferrî solet. Ita 3 + 4 denotat Summam ex 3 atque 4, & pronunciat: 3 plus 4.*

DEFINITIO. XXVII.

64. *Subtractio est inventio alicujus numeri ex duobus homogeneis datis, qui cum uno datorum alteri æqualis est. Numerus, qui subducitur, dicitur Subtrahendus; alter, a quo subtractio fit, Minuendus; qui denique invenitur, Differentia, a nonnullis Residuum.*

HYPOTHESIS IX.

65. *Signum subtractionis est -; quod per minus efferrî solet. E. gr. 7 - 3 denotat differentiam inter 3 & 7, pronunciat: 7 minus 3.*

DEFINITIO XXVIII.

66. *Multiplicatio est inventio alicujus numeri ex duobus datis, in quoties continetur datorum unus, quoties unitas in altero. Numeri dati dicuntur Factores, item efficientes; quæsitus Factum, item Productum. In specie, factorum alter, qui aliquoties sumitur,*

sumitur, vocatur *Multiplicandus*; alter vero, qui indicat, quoties ille sumatur, *Multiplicator*.

COROLLARIUM.

67. Quoniam itaque in multiplicatione numerus invenitur alteri cuidam aliquoties sumto æqualis (S. 66.), istiusmodi autem inventio non est nisi iterata additio (S. 62.); multiplicatio est iterata ejusdem numeri additio.

HYPOTHESIS X.

68. *Signum multiplicationis est punctum unicum (.) inter factores duos medio loco positum, quod per multiplicatum effertur.* E. gr. 4.3 denotat factum ex 4 in 3; item 7.5.9, factum, cujus factores sunt 7, 5 & 9. *Litteræ sine ullo signo junguntur.* E. gr. ab denotat factum ex a in b; b c d factum, cujus factores b, c & d.

DEFINITIO XXIX.

69. *Divisio est inventio alicujus numeri ex duobus datis, in quo toties continetur unitas, quoties datorum unus in altero.* Numerus, qui dividi debet, *Dividendus*; alter, per quem fit divisio, *Divisor*; qui denique indicat, quoties divisor in dividendo contineatur, *Quotus* dicitur.

SCHOLIUM.

70. *In multiplicatione & divisione opus non est, ut numeri dati sint homogenei, quemadmodum in additione & subtractione requirebatur (S. 61. 64.). Cum enim in additione ex duobus vel pluribus numeris componatur unus tanquam ex partibus totum (S. 61. 9); omnes omnino summandi ad eandem unitatem referri (S. 10.), consequenter homogenei inter se esse debent (S. 35.). Quoniam vero porro liquet, summam, qua fit ex numeris aggregandis, ad eandem cum ipsis unitatem referri; consequenter iisdem*

homogeneam esse (S. cit.); in subtractione vero numerus minuendus respondet summæ, subtrahendus & residuus aggregandis seu summandis (S. 61. 64.); ulterius patet, in subtractione etiam minuendum, subtrahendum & residuum numeros inter se homogeneos esse debere. In multiplicatione contra multiplicator ad unitatem exprimit rationem, quam habet factum ad multiplicandum, sicut in divisione divisor ad unitatem rationem dividendi ad quotum, adeoque opus non est, ut multiplicator multiplicando & facto, divisor dividendo & quoto sit homogeneus. Quodsi divisor consideretur tanquam pars dividendi, ex dictis constat, diviorem esse dividendo homogeneum: sed tum quotus, qui indicat, quoties pars ista ex suo toto auferri potest, nec dividendo, nec divisi homogeneus. Singula suo loco clarius patebunt.

HYPOTHESIS XI.

71. *Signum divisionis sunt duo puncta (:), quæ per divisum efferrî solent.* E. gr. 8:4 denotat quotum ex divisione 8 per 4 emergentem. Similiter a:b est quotus ex divisione a per b prodiens.

DEFINITIO XXX.

72. *Numerus par est, qui bifariam sive per 2 dividi potest; ut 4, 12, 16.*

DEFINITIO XXXI.

73. *Numerus impar est, qui a pari unitate differt, ut 3 differt unitate a 2, item a 4.*

DEFINITIO XXXII.

74. *Numerus A metiri, vel juxta alios numerare dicitur numerum B, si eum ita dividit, ut quotus sit numerus integer sine fractione, vel si fuerit pars ejus aliquota. Ita 2 metitur 8 per 4.*

DEFINITIO XXXIII.

75. Numerus primus in se est, quem sola unitas metitur, vel numerat, ut 5, 7, 11.

DEFINITIO XXXIV.

76. Numerus compositus est, quem præter unitatem alius numerus metitur. Ita 4 metitur 8 per 2, item 2 metitur 8 per 4.

DEFINITIO XXXV.

77. Mensura numeri est numerus, qui ipsum metitur. Ita 2 & 4 sunt mensuræ numeri 8. Mensura maxima numeri est numerus maximus, qui ipsum metitur. Ita 4 est mensura maxima numeri 8.

DEFINITIO XXXVI.

78. Mensura communis duorum pluriumve numerorum est numerus, qui singulos figillatim metitur. Ita 3 est communis mensura numerorum 12 & 24. Maxima dicitur, si fuerit numerus maximus, qui omnes metitur. Ita 12 est communis mensura maxima numerorum 12 & 24; 3 vero numerorum 9 & 12.

DEFINITIO XXXVII.

79. Numeri primi inter se sunt, qui nullam communem mensuram habent, præter unitatem. Ita 12 & 19 sunt numeri primi inter se.

DEFINITIO XXXVIII.

80. Numeri compositi inter se sunt, qui, præter unitatem, communem mensuram aliam habent. Ita 12 & 15 sunt compositi inter se.

AXIOMA I.

81. Idem est æquale sibi met ipsi. Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

SCHOLIÖN.

82. Hujus axiomatis amplissimus est in *Analysi* usus.

AXIOMA II.

83. Quantitates homogeneæ aut æquales sunt, aut inæquales (§. 15.).

THEOREMA I.

84. Totum est majus qualibet sua parte.

DEMONSTRATIO.

Cujus pars alteri toti æqualis est; id ipsum altero majus est (§. 20.). Sed quælibet pars totius parti totius, hoc est, sibi ipsi æqualis est (§. 81.). Ergo totum qualibet sua parte majus est.

SCHOLIÖN.

85. En exemplum *Analyseos perfectæ*! Continetur enim demonstratio syllogismo, cujus altera præmissa est definitio, altera vero propositio identica. Id vero *Analyseos perfectæ* indicium est (§. 45. de Meth.) Ne tyrones *Logicæ*, qui propositiones oblique universales ignorant, nec regulæ Logicorum de tribus syllogismi terminis vim atque efficaciam percipiunt, circa formam argumentandi hæreant, ad lineas demonstrationem applicare libet. Sit itaque linea AB totum, linea AC ejus pars; demonstrandum erit, lineam AB esse majorem lineæ AC: id quod fit sequentem in modum. Cujus lineæ pars alteri lineæ toti æqualis est, illa lineæ altera major est (§. 20.). Sed lineæ AB pars (nempe AC) alteri lineæ AC toti (nempe sibi met ipsi) æqualis est. Ergo lineæ AB lineæ AC major (nempe totum AB parte AC majus) est. Quod erat demonstrandum.

Fig. i.

THEOREMA II.

86. Totum est æquale omnibus suis partibus simul sumtis.

DEMONSTRATIO.

Cum idem sit æquale sibi met ipsi (§. 81.); quod idem est cum partibus totius simul sumtis, id iisdem æquale est.

D

Sed

Sed totum idem est cum omnibus partibus suis simul sumtis (§. 9.): ergo iisdem æquale est. *Q. e. d.*

THEOREMA III.

87. *Quæ equalia sunt eidem tertio, vel equalibus equalia; ea sunt equalia inter se.*

DEMONSTRATIO.

1. Sit $A = C$ & $B = C$; dico esse $A = B$. Quoniam enim $B = C$, per *hypothese*m, B salva quantitate substitui potest ipsi C (§. 15.). Substituatur adeo B ipsi C in casu priore, ubi $A = C$: habebimus $A = B$. *Quod erat primum.*

2. Si jam porro sit $A = B$ & præterea $C = A$, $D = B$; dico esse $C = D$. Quoniam enim $A = B$ & $C = A$, per *hypothese*m, erit $B = C$ per *cas.* 1. Quare cum porro sit $D = B$, per *hypothese*m, erit quoque $C = D$ per *cas.* 1. *Quod erat alterum.*

THEOREMA IV.

88. *Si equalibus (A & B) equalia (C & D) addas, aggregata (A+C & B+D) sunt equalia.*

DEMONSTRATIO.

$A + C = A + C$ (§. 81.). Sed quoniam $C = D$, per *hypothese*m, poterit D substitui pro C (§. 15.): quo factò, habemus $A + C = A + D$. Porro $B + D = B + D$ (§. 81.). Sed $A = B$, per *hypothese*m. Ergo A substitui potest pro B (§. 15.): quo factò, habemus $B + D = A + D$. Quare $B + D = A + C$ (§. 87). *Q. e. d.*

THEOREMA V.

89. *Quod uno equalium majus vel*

minus est, etiam altero equalium majus vel minus est.

DEMONSTRATIO.

1. Sit $A = B$ & $C > A$, dico esse $C > B$. Quoniam enim $C > A$, per *hypothese*m, A parti ipsius C æquale est (§. 20), quæ dicatur P. Porro cum sit $A = B$, per *hypothese*m. Erit etiam $P = B$ (§. 87). Ergo $C > B$ (§. 20). *Quod erat unum.*

2. Sit $A = B$, & $C < A$, dico esse $C < B$. Quia $C < A$, per *hypothese*m, parti hujus æquale est (§. 20), cujus complementum ad totum dicatur P. Cum adeo sit $P + C = A$ (§. 86) & $A = B$, per *hypothese*m erit quoque $P + C = B$ (§. 87). Est itaque C parti ipsius B æqualis (§. 9); consequenter $C < B$ (§. 20). *Quod erat alterum.*

THEOREMA VI.

90. *Si majori (B) & minori (A) idem (C) vel equalia addas, aggregatum prius (B+C) majus est, posterius vero (A+C) minus. Quod si majori (B) majus (C) & minori (A) minus (D) addas, aggregatum prius (B+C) majus est, posterius (A+D) minus.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam $A < B$, per *hypothese*m, parti hujus æquale est (§. 20). Componitur ergo B ex A & parte alia (§. 9), quæ dicatur P, estque adeo $B = P + A$ (§. 86). Quare cum etiam sit $B + C = P + A + C$ (§. 88.); erit $A + C$ pars ipsius $P + A + C$ (§. 9) & hinc $P + A + C > A + C$ (§. 84), consequenter $B + C > A + C$ (§. 89). *Quod erat unum.*

Quoniam $B > A$, per *hypothese*m, erit

B +

$B+C > A+C$, per demonstrata. Similiter quia $C > D$, per hypothese[m], erit $A+C > A+D$, per demonstrata. Ergo cum $A+D$ sit pars ipsius $A+C$ (§. 20.); erit multo magis $B+C > A+D$ (§. 84). Quod erat alterum.

THEOREMA VII.

91. Si equalia (A & B) ab equalibus (C & D) subtrahas, quæ relinquantur ($C-A$ & $D-B$) equalia sunt.

DEMONSTRATIO.

$C-A = C-A$ (§. 81). Sed quoniam $A=B$, per hypothese[m], salva quantitate B pro A substitui potest (§. 15). Quod si ergo substituatur, habebimus $C-A = C-B$. Similiter $D-B = D-B$ (§. 81). Sed quia $C=D$, per hypothese[m], salva quantitate C pro D substitui potest (§. 15). Quod si ergo substituatur, habebimus $D-B = C-B$. Quamobrem $C-A = D-B$ (§. 87).

THEOREMA VIII.

92. Si à majore (A) & minore (B) idem (C) vel equalia subtrahas; residuum prius ($A-C$) majus est, posterius ($B-C$) minus.

DEMONSTRATIO.

Quia $B < A$, parti hujus æquale est (§. 20). Componitur ergo A ex B & parte alia (§. 9), quæ dicatur P . Itaque $A = B + P$. (§. 86), consequenter $A - C = P + B - C$ (§. 91.). Sed $B - C$ est pars ipsius $P + B - C$ (§. 9), consequenter $P + B - C > B - C$ (§. 84.). Ergo & $A - C > B - C$ (§. 89.). Q. e. d.

THEOREMA IX.

93. Si equalia (A & B) per equalia (m & n) multiples; facta ($m A$ & $n B$) equalia sunt.

DEMONSTRATIO.

Quia $A=B$, per hypothese[m], erit etiam $A+A=B+B$, seu in genere $A+A+A+A&c. = B+B+B+B&c.$ (88). Jam cum multiplicatio sit iterata ejusdem numeri additio (§. 67), si m & n fuerint multiplicatores, erit $A+A+A+A&c. = m A$ (§. 67. 68). & $B+B+B+B = n B$ (§. §. cit.) Quare cum in eo casu, ubi $A+A+A+A&c. = B+B+B+B&c.$ sit $m = n$; erit etiam $m A = n B$ (§. 87.). Q. e. d.

THEOREMA X.

94. Si equalia (A & B) per equalia (C & D) dividas, quoti ($A:C$ & $B:D$) æquales sunt.

DEMONSTRATIO.

$A:C = A:C$ (§. 81). Sed quia $A=B$, per hypothese[m], salva quantitate B pro A substitui potest (§. 15). & sic $A:C = B:C$. Ob eandem rationem $B:D = B:C$. Quare $A:C = B:D$ (§. 87.). Q. e. d.

SCHOLIION.

95. Non dubito fore multos, quibus ridiculum videbitur aut minimum superfluum talia demonstrari, quorum casus singulares in numeris præsertim rationalibus per se evidentes videntur. Ego vero has demonstrationes maximi facio, tum quia prima & secunda (id quod supra §. 85. annotavimus) Analyseos perfectæ; tum quia reliquæ Calculi universalis ideam animo ingenerant, in talium substitutione consistentis, quæ relationes datas non mutant. Illa cavetur, ne laxius in demonstrando versemur (id quod hæcenus fecerunt plerique omnes, qui extra Mathese[m] demonstrationes mathematica certitudinis dare conati sunt:) hic, si tandem in apicem produceretur, maximum foret intellectus humani subsidium.

CAPUT II.

De speciebus Arithmetica in numeris integris.

PROBLEMA II.

96. **N**umeros quocunque datos addere.

RESOLUTIO.

1. Numeri homogenei sub homogeneis, hoc est, ita scribantur, ut unitates unitatibus, decades decadibus, centenarii centenariis, &c. respondeant.
 2. Sub iis ducatur linea recta, ne aggregatum cum aggregandis confundatur.
 3. Sigillatim addantur unitates & summa earum ipsis subscribatur.
 4. Quodsi in ea decades reperiantur, eas decadibus numerorum datorum addi oportet: decadem vero summa sub decadibus collocanda.
 5. Hac operatione per reliquas numerorum datorum series continuata, habebitur summa quaesita.
- E. gr. Si numeri A, B, C addendi; ita pro-
- | | | |
|-------|----|--|
| 3578 | A. | cedendum: 4 & 3 sunt 7, additis |
| 524 | B. | 8, prodeunt 15. Collocentur 5 sub |
| 63 | C. | unitatibus, & 1 decas connumerentur |
| 4165. | | decas) & 6 (decades) sunt 7 (decades): additis 2, prodeunt 9; additis porro 7, habentur 16 (decades). Collocentur 6 sub decadibus datis, & reliquæ 10, hoc est, 1 centenarius annumeretur centenariis datis. Sunt itaque 1 & 5: (centenarii) 6 &, additis adhuc 5, prodeunt 11 (centenarii). Collocetur 1 sub centenariis datis, & 10 centenarii reliqui, hoc est, 1 millenarius addatur 3 millenariis datis, summaque 4 sub |

iis scribatur. Ita prodit summa quaesita 4165.

DEMONSTRATIO.

Cum unitates, decades, centenarii, millenarii &c. numerorum datorum sint partes eorundem (§. 50); idem sunt cum omnibus numeris datis simul sumtis (§. 9). Liquet vero ex operatione, numerum inventum compositum esse ex omnibus unitatibus, decadibus, centenariis, millenariis &c. numerorum datorum. Compositus ergo est ex omnibus numeris datis simul sumtis; consequenter ipsis æqualis (§. 86), adeoque summa eorundem est (§. 59). Q. e. d.

SCHOLIUM.

97. Unitates numerorum singulae tamdiu per digitos representantur & eorum ope additio absolvitur, donec memoria infigatur, quinam numerus prodeat, si unitates quotlibet cuiusque numero addas, e. gr. quod $3 + 2 = 5$, $9 + 5 = 14$ &c. Hoc modo talia natura docet.

COROLLARIUM I.

98. Quoniam seriei sinisteriori tot unitates accedunt, quot decades ex summatione in proxime dexteriore emergunt (§. 96); additio minore tædio absolvetur, si ex qualibet numerorum serie tot decades deleantur, quot ex iis colligi possunt, residuum infra lineam scribatur, & numerus decadem abjectarum seriei proxime sinisteriori connumeretur.

E. gr.

E. gr. Si numeri addendi fuerint A, B, C, ita procedendum: cum 7 & 3 sint 8763 A 10; residuus numerus 5 scribatur 5247 B infra lineam & 1 connumeretur de 2125 C cadibus. Dic itaque 6 & 4 sunt 10; ——— 2 & 1 sunt 3. Scribe 3 infra lineam 16135 & 1 reponere in locum centenariorum. Quoniam vero 7 & 2 sunt 9, porro 9 & 1 sunt 10; adde 1 seriei millenariorum & residuum 1 scribe in loco centenariorum. Dic itaque 8 & 2 sunt 10 millenarii seu 1 decas millenariorum, 5 & 1 vero sunt 6. Scribe 6 in loco millenariorum & 1 in loco decadam millenariorum.

SCHOLIION II.

99. Modus hic addendi est maxime naturalis (§. 49): nec absimili artificio numeri heterogenei adduntur. Ex serie nimirum speciei minoris toties colligitur valor speciei proxime majoris, quoties fieri potest & pro unoquoque unitas reponitur in serie proxime majore. E. gr. sint expensa:

Januarii	45 thal.	16 gros.	9 num.
Februarii	60	12	3
Martii	72	13	6
Aprilis	180	19	9
Maji	55	15	6

erit summa 415 5 9
 Cum enim 12 nummi conficiant grossum, in serie nummorum additis 6 & 6, itemque 3 & 9 valor grossi bis colligitur & relinquuntur 9. Scribuntur itaque 9 infra lineam in loco nummorum & 2 adduntur seriei grossorum. Similiter quoniam thalerus 24 grossis constat, in serie grossorum ut ante valor thaleri ter colligitur, relictis 5. Quare de novo 5 in loco grossorum reponuntur & 3 thaleris connumerantur. Reliqua ut in corollario aut problemate peraguntur.

COROLLARIUM II.

100. Si omnes numeri dati unitatum

instar considerentur, evidens est inter summam tot novenarios omitti, quot unitates ex summa seriei dexterioris in sinisteriorem transferuntur. Sic in exemplo problematis loco *quindecim* sub unitatibus scribimus 5, sub decadibus 1, quorum numerorum instar unitatum consideratorum summa est 6. Unus itaque novenarius omittitur, cum ex loco unitatum in locum decadam una rejicitur decas. Similiter si summa unitatum *viginti septem*; sub unitatibus collocamus 7, sub decadibus 2. Duo igitur novenarii omittuntur, cum 2 decades ex loco monadium in locum decadam rejiciuntur. Hinc solvitur

PROBLEMA III.

101. *Examinare additionem, hoc est, explorare, utrum numerus inventus sit equalis omnibus datis simul sumtis, nec ne.*

RESOLUTIO.

1. Notentur a latere numeri, qui inter addendum ex serie qualibet dexteriore in proxime sinisteriorem rejiciuntur, & operatione absoluta addantur, ut numerus novenariorum inter summam omisso- rum innotescat (§. 100).
2. Abjiciatur præterea ex summa inventa novenarius, quoties fieri potest, abjectorumque novenariorum numerus addatur numero inter summam omisso- rum: quæ summa una cum numero residuo, si quis fuerit, probe notetur.
3. Tandem ex numeris summandis, qui omnes tanquam unitates spectantur, novenarius abjiciatur, quo-

ties fieri potest, & numerus novenariorum abjectorum una cum numero residuo, si quis fuerit, denuo notetur.

Quodsi enim uterque fuerit æqualis utrique ante reperto; numerus inventus æquatur omnibus datis simul sumtis (§. 91), consequenter additio rite peracta (§. 61). *Q. e. i. & d.*

E. gr. in exemplo problematis inter summandum 3 novenarii omittuntur & ex summa reperta unus adhuc deleri potest: quo facto, relinquuntur 7. Sed si ex numeris summandis 4 novenarii abjiciantur, 7 similiter relinquuntur. Quare additio rite peracta.

SCHOLIUM.

102. *Discrimen inter demonstrationem & examen haud obscurum est. Illa evincit per regulas præscriptas inveniri debere numerum quasitum; hoc docet, regulas ad casum singularem rite fuisse applicatas. Unde apparet examinis utilitas, frustra obnitente Ramo (a), qui demonstrationem cum examine confundit. Vulgo præcipiunt, ut tam ex summa, quam aggregandis, notis singulis instar digitorum consideratis, abjiciatur novenarius, & ex residui identitate operationis bonitatem colligunt. Sed cum examen tum fallere possit, quando error novenarium vel ejus multipulum adequat; ideo aliquantisper idem immutavi, ut hunc quoque excluderet errorem. Ceterum non inutilia sunt examina, etsi non omnes errores detegant, modo iisdem sese non subducant, qui frequentius admittuntur.*

PROBLEMA IV.

103. *Numerum minorem e majore subtrahere.*

RESOLUTIO.

I. Numerus minor ea lege majori subtribatur, ut homogenei homogeneis

(*) In Schol. Mathem. lib. 4. p. 114.

respondeant, quemadmodum in additione præcepimus (§. 96).

2. Sub numeris hisce ducatur linea recta.
3. Subtrahantur sigillatim unitates ab unitatibus, decades a decadibus, centenarii a centenariis &c. & residua singula loco conveniente infra lineam scribantur, nempe residuum unitatum sub unitatibus, decadum sub decadibus &c.
4. Quod si nota major e minore veniat subtrahenda, ex sinistro loco in dexterorem transferatur unitas, quæ (§. 50) hic 10 valebit, ut subtractio fieri queat. Numerus vero unitate multatus puncto notetur, ne ipsum multatum esse obliviscamur.
5. Si in loco sinistro cyphram reperiri contingat, unitas a numero proxime sequente mutuetur, puncto propterea notando, ut ipsum unitate minutum esse constet. Unitas vero illa in locum dexterorem translata decadis valorem tuebitur (§. 50). Quamobrem ubi plures cyphræ sese insequuntur, omnes hac ratione in novenarios mutantur, & numerus minor, a quo subtractio fieri debet, decade augeatur.

Juxta has regulas numerum quemcumque ex alio quocumque majore subtrahere licet.

E. gr.	Si ex	98.0.0.4.0.34.59
subtrahas		4743865263

Differentia est 5056538196
 Demtis enim 3 ex 9, relinquuntur 6 unitates

tates infra lineam scribendæ. Decades 6 ex 5 auferri nequeunt: a centenariis itaque 4 auferatur unus & ejus loco decem decades decadibus jungantur. Ablatis itaque 6 ex iis, remanent 9 decades infra lineam loco conveniente ponendæ. Centenarii 2 ex 3 subducti relinquunt 1. Millenarii 5 ex 3 auferri nequeunt: à centenariis itaque millenariorum 4 auferatur unus, qui in locum vacuum delatus cyphram in decem decades millenariorum vertet. Inde si 1 decadem in locum millenariorum transferas, habebis hic 13 millenarios, ibi 9 decades millenariorum. Subductis jam 5 ex 13, residui sunt millenarii 8. Dentis porro 6 millenariorum decadibus ex 9, relinquuntur 3. Jam si 8 ex 3 subtrahere debes, ab 8 sinisterioribus mutuetur unitas, cujus beneficio duæ cyphræ in 9 & 3 in 13 degenerabunt, ut tandem subtractio facillime absolvatur.

DEMONSTRATIO.

Numerus inventus prodit, si unitates, decades, centenarios &c. numeri minoris ex unitatibus, decadibus, centenariis &c. majoris subducas, *vi operationis*, hoc est, si singulas partes numeri minoris à singulis partibus majoris subtrahas (§. 50). Sed singulæ partes numeri minoris simul sumtæ sunt numero minori, & partes singulæ majoris simul sumtæ sunt majori æquales (§. 86). Ergo idem relinquere debet numerus, si totum numerum minorem e toto majore subtrahas (§. 91). *Q. e. d.*

SCHOLIUM I.

104. Si numeri heterogenei fuerint a se invicem subtrahendi; unitas mutuo petita non 10, sed tot unitates valet, quot unitates speciei minoris constituunt valorem unitatis speciei majoris.

E. gr. 45. thal. 16. gr. 6. num.

27 23 9

17 thal. 16 gr. 9 num.

Nimirum cum 9 nummi ex 6 subtrahi nequeant, ex 16 grossis unus convertitur in 12 nummos, ut loco 6 habeantur 18. Subductis adeo 9 nummis ex 18, relinquuntur 9. Similiter cum 23 grossi ex residuis 15 auferri nequeant, ex 45 thaleris unus ablati in 24 grossos convertitur: unde si subtrahantur 23, residuus est 1 grossus 15 addendus, ut residui loco ponantur 16 grossi. Denique 27 thaleri a 44 ablati relinquunt 17.

SCHOLIUM II.

105. Quodsi numerus major e minore subtrahi jubeatur, evidens est id fieri non posse. Subtrahitur itaque minor e majore, & defectus notatur signo —. E. gr. Si quis 8 thaleros solvere debet, atque 3 non nisi possidet: tribus solutis, 5 adhuc debet, qui per — 5 indigitantur.

PROBLEMA V.

106. Examinare subtractionem.

RESOLUTIO.

Residuo addatur subtrahendus (§. 96): Quodsi enim summa fuerit æqualis minuendo; subtractio rite peracta (§. 64).

E. gr.	9800403459	Minuendus.
	4743865263	Subtrahend.
	5056538196	} Differentia
	9800403459	

ALITER.

Quoniam in subtractione residuum cum subtrahendo æquatur minuendo (§. 64). Si minuendus sumatur pro aggregato, residuum cum subtrahendo pro aggregandis (§. 61); examen per novenarium succedet ut in additione (§. 101).

PROBLEMA VI.

107. Examinare additionem per subtractionem.

1. Describantur in continua serie multipla

pla Septenarii centenario inferiora, nempe 7. 14. 21. 28. 35. 42. 49. 56. 63. 70. 77. 84. 91. 98. continua Septenarii additione invenienda. Est enim $7+7=14$, $14+7=21$ &c.

2. In exemplo ad examinandum proposito, veluti

8259	566
	8259
	526
2687	2687
10946	3425
	10946

sumantur in aggregato binæ notæ sinistimæ 10 & cum multiplis septenarii conferantur.

3. Multiplum proxime inferius, aut ipse septenarius, veluti in nostro casu, ab istis notis subtrahatur & residuum 3 iisdem superscribatur.
4. Juncta huic residuo 3 nota proxime sequente 9, numerus inde resultans 39 conferatur ut ante cum septenarii multiplis &, proxime minori 35 inde subducto, residuum 4 supra scribatur.
5. Hæc operatio continetur, donec residuum ultimum 5 super nota dextima obtineatur.
6. Singulæ aggregandorum series 2687 & 8259 eodem modo tractentur.
7. Residua super notis dextimis 6 & 6 addantur & a summa 12 septenarius vel ejus multiplum proxime inferius abjiciatur.

Quodsi residuum fuerit idem cum residuo super nota dextima aggregati, velut in nostro exemplo 5; operatio rite peracta.

DEMONSTRATIO.

Ad operationem attento manifestum est, tum ex aggregato, tum ex aggregandis abjici omnia multipla septupli, c. gr. in nostro casu millenariorum, centenariorum, decadam, unitatum. Jam cum aggregatum sit aggregandis æquale (§. 61), omnia quoque ista multipla junctim sumta utrobique æqualia esse debent (§. 86. 87). Cum adeo ab æqualibus æqualia auferantur; residua omnino æqualia sint necesse est (§. 91). Quare si contingat, inæqualia residua fieri; id indicio erit, si examen rite institutum, errorem in operatione admissum fuisse. *Q. e. d.*

ALITER.

1. Colligantur sigillatim in unam summam singulæ series verticales, quibus constant numeri summam, initio factò a sinistra & progrediendo versus dextram, & quidem descendendo (§. 96).
2. Summæ partiales subtrahantur a notis summæ, quæ singulis seriis respondent (§. 103).
- Quodsi in loco dextimo, qui est unitatum, relinquatur cyphra, additio rite peracta.

E. gr. Sit exemplum additionis

A	B	C	D
3	5	7	9
8	4	6	2
5	3	7	6

1	7	4	1	7
1	2	1	0	

Collectis in unam summam notis in serie A, 16. subducatur ex 17. & residua 1 scribatur

batur sub 7. Similiter summa notarum in serie B 12 auferatur ex 14, residuo 2 sub 4 scripto. Summa notarum in serie C 20 tollatur ex 21 & residua 1 ponatur sub 1. Denique si summa seriei D 17 ex 17 subtrahatur, relinquitur 0: quod indicio est, numerum 17417 esse summam quaesitam.

DEMONSTRATIO.

Ex operatione patet, a millenariis summæ subtrahi omnes millenarios summandorum & a centenariis, decadibus, unitatibus summæ omnes centenarios, decades, unitates summandorum. Quodsi ergo operatione absoluta nihil relinquitur, summa tot præcise millenarios, centenarios, decades, unitates continet, quot numeri summandi simul sumti continent, atque adeo summa numeris summandis simul sumtis æqualis est (§. 87), consequenter additio rite peracta (§. 61).

SCHOLIUM.

108. Examen primum adhuc procedere, si loco septenarii numerus alius sumatur ipsa demonstratio insinuat. Solent etiam examinis loco additionem iterare, sed diversa ratione, ita ut una vice ascendendo, altera vero descendendo summatio perficiatur, factum tamen in utraque operatione initio a dextera & progrediendo versus sinistram.

PROBLEMA VII.

109. Abacum Pythagoricum, hoc est, Tabulam construere, in qua facta ex singulis digitis in singulos representantur.

RESOLUTIO.

I. Latera quadrati alicujus singula in 9 partes æquales dividantur & per lineas ipsi parallelas in arcolas quadratas area ejus resolvatur.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

2. In ferie horizontali summa & laterali sinistima scribantur novem notæ numericæ, seu singuli digiti.
3. Addantur 2 & 2; aggregatum 4 scribatur infra 2. Addantur porro 2 & 4; aggregatum 6 collocetur sub 4. Addantur 2 & 6, aggregatum 8 ponatur sub 6; & ita porro.
4. Quodsi hæc additio per reliquos digitos eadem lege continetur, Abacus Pythagoricus construatur. Q. e. f.

ABACUS PYTHAGORICUS.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

SCHOLIUM.

110. Abacum Pythagoricum memoriæ mandare tenetur multiplicationem ac divisionem expedite absoluturus. Quamdiu vero memoriæ infixus non est, ad manus esse debet, quoties multiplicas aut dividis.

PROBLEMA VIII.

III. Numerum quendam datum per alium datum multiplicare.

RESOLUTIO.

1. Multiplicator scribatur sub multiplicando, ut in additione (§. 96).
2. Ducatur sub iis linea recta.
3. Infra hanc ex abaco Pythagorico scribantur singula producta ex singulis

E

gulis

gulis multiplicandi notis in unitates multiplicatoris, similiter ex illis in reliquas hujus notas, ea quidem lege, ut decades cujuslibet producti annumerentur producto proxime finisteriori, & productum ex multiplicando in decades multiplicatoris in loco decadam, productum ex multiplicando in centenarios multiplicatoris in loco centenariorum &c. scribere incipiamus.

4. Producta partialia addantur (§. 96). Dico aggregatum esse factum quæsitum.

E. gr. Sint factores 38476 & 35. Multiplicatore sub multiplicando
 38476 scripto, duc 5 in 6, cum
 35 que factum vi abaci Pythagorici sit 30, scribe 0 sub
 192380 5 & 3 decades annumera
 115428 facto ex 5 in 7, quod est
 35. Additis itaque 3 ad 35,
 1346660 prodeunt 38. Pone 8 juxta
 0 versus sinistram & facto

ex 5 in 4, nempe 20, adde 3, ut prodeant 23 (scilicet centenarii). Scribe itaque 3 in loco centenariorum & 2 millenarios annumera facto 40 ex 5 in 8, ut habeatur summa 42 millenariorum. Scribe 2 in loco millenariorum; 4 vero decades millenariorum adde facto 15 ex 5 in 3, & summam 19 in loco conveniente repone. Ita habetur factum ex multiplicando in dexteram multiplicantis notam. Quodsi eadem ratione quæratum factum ex multiplicando in sinistram multiplicatoris notam 30 & producta partialia addantur; prodibit tandem factum ex 35 in 38476, nempe 1346660.

DEMONSTRATIO.

Vi operationis & Abaci Pythagorici primus numerus intra lineas scriptus singulas multiplicandi notas, hoc est, singulas ejusdem partes (§. 50), a-

deoque multiplicandum ipsum (§. 9), toties continet, quoties prima multiplicatoris nota unitatem. Eodem modo patet, quod numerus secundus intra lineas scriptus multiplicandum toties continet, quoties nota secunda multiplicantis unitatem &c. Sed cum numeri intra lineas scripti adduntur, summa iisdem æqualis est (§. 61), adeoque multiplicandum toties continet, quoties singulae multiplicatoris notæ, hoc est, partes (§. 50), consequenter totus multiplicator (§. 9) unitatem continet. Est igitur factum ex multiplicando in multiplicantem (§. 66).
Q. e. d.

SCHOLIUM.

112. Si factoribus cyphræ adhareant, producto invento eadem adjunguntur, ut ex sequentibus exemplis manifestum.

$$\begin{array}{r}
 3578 \qquad \qquad \qquad 4760 \\
 \hline
 \qquad \qquad \qquad 30 \qquad \qquad \qquad 2000 \\
 \hline
 107340 \qquad \qquad \qquad 9520000
 \end{array}$$

PROBLEMA IX.

113. Lamellas Neperianas parare, quarum ope multiplicationem ac divisionem facilius absolvere licet, quam per abacum Pythagoricum.

RESOLUTIO.

1. Ex orichalco, ligno aut charta compacta parentur lamellæ oblongæ in novem quadratula divisæ; quæ per Diagonales denuo in duo triangula singula resolvantur.
2. In illis quadratulis ea lege scribatur tabula Pythagorica, ut notæ solitariae aut dextræ triangulum dextrum, notæ autem sinistrae sinistrum cedat. Sic factum est, quod petebatur.

SCH 07

SCHOLIION.

114. *Has lamellas sub initium seculi superioris invenit Joannes Neperus, Baro Merchistonii, Scotus, & peculiari libello descripsit, cui Rhabdologia nomen imposuit.*

PROBLEMA X.

115. *Multiplicare numerum datum per datum alium, lamellarum Neperianarum ope.*

RESOLUTIO.

1. Lamellas ita dispone, ut in fronte exhibeant multiplicandum.
2. Eis ad sinistram junge lamellam unitatum.
3. In hac quære dextrimam multiplicatoris notam &
4. Ipsi respondententes numeros in quadratulis reliquarum lamellarum ita exscribe, ut in unam summam colligantur numeri in eodem rhombo obvii.
5. Eodem modo exscribe numeros reliquis multiplicatoris notis respondententes & decenter infra factores (§. III) scribe.
6. Tandem ut ante (§. III) facta hæc partialia in unam summam collige. *Sic f. e. q. p.*

E. gr. Sit multiplicandus 5978, multiplicator 937; ex triangulo dextimo, quod dextrimæ multiplicatoris notæ 7 respondet, exscribe 6 & pone infra lineam. Mox in rhombo versus sinistram proxime sequente 9 & 5 adde & summæ 14 notam dextram scribe juxta 6, sed 1 connumera 3 & 4 in rhombo ulteriore obviis. Aggrega-

Fig. 3.

5978	
937	
41846	
17934	
53802	
5601386	

tum 8 junge jam inventis 46. Similiter in rhombo ultimo adde 6 & 5. Summæ 11 notam dextram 1 pone, ut ante, infra lineam; sinistram vero itidem 1 adde notæ 3 in sinistro triangulo deprehensæ. Summam 4 si 1846 a sinistris jungas; habebis factum ex 7 in 5978. Eodem modo reperies facta ex 5978 in reliquis multiplicatoris notas 3 & 9.

PROBLEMA XI.

116. *Numerum quemlibet per alium quemcunque sine abaci Pythagorici subsidio multiplicare.*

RESOLUTIO.

Omne artificium huc redit, ut ex simplo, duplo & decuplo per additionem, subtractionem & mediationem, singula multipla inveniantur. Nimirum numerus quilibet sibi metipsum additus producit sui *duplum*. Addatur huic simplum, summa est numeri dati *triplum*. Duplum addatur sibi metipsum, aggregatum est numeri dati *quadruplum*. Medietur decuplum, hoc est, ipse numerus datus cyphra auctus (§. 112), prodibit *quintuplum*. Quintuplo addatur simplum vel duplum, habebitur *sextuplum* vel *septuplum*. Ex decuplo subtrahatur duplum vel simplum, residuum erit *octuplum* vel *noncuplum*. Sine abaci itaque Pythagorici subsidio multiplicatio familiaris sit sequens a *Jobo Ludolfo*, in Academia Erfordienfi nuper Mathematicum Professore, in Arithmetica primùm introducta

NOMENCLATURA.

- | | |
|----------------|--|
| 1. Simplum. | 1. <i>Simplum.</i> |
| 2. Duplum. | 1 + 1 <i>Simplum & simplum.</i> |
| 3. Triplum. | 2 + 1 <i>Duplum & simplum.</i> |
| 4. Quadruplum. | 2 + 2 <i>Dupli duplum.</i> |
| 5. Quintuplum. | $\frac{1}{2}$ <i>Decupli dimidium.</i> |
| 6. Sextuplum. | $\frac{1}{2}$ + 1 <i>Decupli dimidium & simplum.</i> |
| 7. Septuplum. | $\frac{1}{2}$ + 2 <i>Decupli dimidium & duplum.</i> |
| 8. Octuplum. | 10-2 <i>Decuplum sine duplo.</i> |
| 9. Noncuplum. | 10-1 <i>Decuplum sine simpla.</i> |

E. gr. 3894.

Simplum	Duplum	Triplum
3894	3894	3894
	3894	7788
	7788	11682
Quadruplum	Quintuplum	Sextuplum
7788	38940	3894
7788		19470
15576	19470	23364
Sextuplum	Octuplum	Noncuplum
7788	389.4.0	389.4.0
19470	7788	3894
27258	31152	35046

Si multiplicator ex pluribus notis constet, infra lineam scribatur multiplicandi duplum & decupli dimidium, ut beneficio *Nomenclaturæ* exinde multipla ejus erui possint, quæ desideran-

tur. Sub ducta igitur altera linea scribantur more consueto (§. III) multiplicandi multipla.

37896 A E. gr. Sit multiplicans
 (6874) 6874, multiplicandus A
 ----- 37896. Infra lineam scri-
 75792 B batur B ipsius A duplum
 189480 C & porro C decupli ipsius
 ----- A dimidium. Reperies er-
 151584 D go 1°. D ipsius A quadru-
 265272 E plum sumendo duplum ip-
 303168 F sius B; 2°. E septuplum
 227376 G ipsius A addendo B & C;
 ----- 3°. F octuplum ipsius A
 260497104 vel addendo C, B & A, vel
 B subducendo a decuplo ipsius A, hoc est ex A
 cyphra aucto; 4°. denique G addendo C & A.

Si multiplicator ex pluribus notis constet, sapius ex productis jam inventis per additionem vel subtractionem inveniri possunt, quæ adhuc desiderantur, nec tum *Nomenclaturæ* propositæ stricte inhærendum, ita ut non epus sit infra lineam demum scribi duplum multiplicandi & decupli ejusdem dimidium.

895765482 } E. gr. sit multiplicans
 743) ----- } 743. Factum facillime
 1791530964 }
 3583061928 }
 6270358574 }

 665553753126 }
 duplum, 2° dupli duplum, 3° summa ex simpla, duplo & dupli duplo, & tria hæc multipla multiplicando addantur.

Similiter si multiplicans fuerit 789, sub multiplicando scribitur decuplum sine bitur
 789) 89.576.5.482

 8.0.6.1889.3.38 noncuplum. Ex eo
 7.1.66.1.238.56 si denuo auferatur
 6270358374 simplum, relinquetur octuplum Quod
 706758965298 si & ab hoc simplum subducas, residuum erit septuplum.

PROBLEMA XII.

117. Numerum datum per alium minorem dividere.

RESOLUTIO.

Casus I. Si divisor unica fuerit nota,

1. Scribatur is sub nota dividendi sinistima, aut, si ea minor fuerit sub proxime sequente, ac ope *Abaci Pythagorici* investigetur, quoties in nota vel notis superscriptis contineatur. Numerus, qui hoc indicat, ponatur dexteram versus post lunulam loco quoti.
2. Quotus ducatur in divisorem & productum ex nota vel notis superscriptis dividendi subtrahatur, & his deletis, si quod fuerit residuum, superscribatur.
3. Divisor ad notam subsequentem versus dexteram promoveatur, & ope *Abaci Pythagorici* denuo investigetur, quoties is in notis superscriptis contineatur. Reliqua peragantur ut ante.
4. Quodsi hæc operatio per singulas dividendi notas continuetur, quotus invenietur. *Q. e. f.*

E. gr. Sit dividendus 7856, divisor 3.
 Ponantur 3 sub 7 & per *Abacum Pythagoricum* innotescit, 3 in 7 bis contineri. Scribantur ergo 2 post lunulam loco quoti & factum ex 2 in 3, hoc est 6, subtrahatur ex 7 lineola transversa delendis, residua unitas superscribatur. Promoveatur divisor 3 sub 8, cumque, vi *Abaci Pythagorici*, 3 in 18 sexies contineatur, scribantur 6 loco quoti & factum 18

$$\begin{array}{r} 22 \\ 7856 \quad (2618\frac{2}{3}) \\ 2322 \end{array}$$

ex 3 in 6 ex 18 subducatur: quo in casu nihil relinquitur. Quodsi eadem ratione pergatur, quotus tandem integer prodit 2618 & binarius 2 remanet: id, quod indicio est, numerum propositum in tres partes æquales exacte dividi non posse.

DEMONSTRATIO.

Ex ipsa operatione liquet, numerum inventum indicare, quoties divisor in millenariis, centenariis, decadibus, unitatibus dividendi, hoc est, in singulis ejus partibus (§. 50), adeoque in toto dividendo (§. 9) contineatur, consequenter unitatem toties continet, quoties dividendus divisorem. Est igitur quotus (§. 69). *Q. e. d.*

Casus II. Si divisor ex notis pluribus constet,

1. Sinistima ejus nota scribatur sub nota sinistima dividendi & reliquæ dexteriores sub proxime sequentibus versus dexteram.
2. Ope *abaci Pythagorici* investigetur, quoties prima divisoris nota in prima dividendi contineatur.
3. Numerus inventus ducatur in divisorem integrum & dispiciatur, utrum factum ex numeris superscriptis subtrahi possit, nec ne.
4. Si subtractio fieri queat, scribatur is loco quoti post lunulam & subtractio actu peragatur. Numeri, ex quibus subtractio fit, lineola transversa deleantur, & qui residui fuerint, superscribantur. Quodsi vero subtractio non succedat, loco quoti sumatur numerus unitate vel aliquot unitatibus minor, donec fac-

tum ex eo in divisorem ad notas dividendi quam proxime accedat & ex iis auferri queat.

5. Divisor loco uno versus dexteram promoveatur & reliqua ut ante peragantur.

6. Hæc operatio continuetur, donec divisor ulterius promoveri nequeat.

Sic f. e. q. p.

E. gr. Sit dividendus 7856, divisor 32. Scribantur 32 sub 78 & inquiretur, quoties 3 in 7 contineantur. Cum itaque bis in eo contineantur; ducantur 2 in 32 &, quia factum 64 ex 78 subtrahi potest, 2 scribantur post lunulam &, subtractione peracta residuisque 14 superscriptis, divisor loco uno promoveatur. Quo facto investigetur, quoties 3 in 14 contineantur & factum ex 4 in 32, hoc est 128, subducatur ex 145, residuo 17 superscripto & 4 in loco quoti post lunulam repositis. Promoveatur divisor denuo loco uno & quaratur, quoties 3 in 17 contineantur. Numerus 5, qui hoc indicat, jungatur quoti jam invento, & factum ex eo in divisorem 32, nempe 160 subtrahatur ex 176, residuo 16 ut ante superscripto. Dico numerum inventum $245\frac{16}{32}$ esse quotum quæsitum.

Si divisor ex pluribus præsertim constet notis, præstat multipla quoti subtrahenda sub notis dividendi, ex quibus subtractio fieri debet, immediate scribi & sub subtrahendo residuum, cui continuandæ divisionis gratia, jungitur nota dividendi sequens, donec nulla superfuerit, adeoque divisio absoluta.

E. gr. Sit dividendus 385797, divisor 8672, quem tibi sub loco quoti notabis. Jam cum 8 in 38 quater contineatur, scribe divisoris 8672 quadruplum sub notis dividendi 38579, & residuum 3891 sub eodem, juncta eidem nota sequente 7, ut divisio continuari possit. Quoniam itaque divisor in notis 38917 denuo 4 continetur, quadruplum divisoris ut ante sub iisdem ponitur & ex ipsis auferitur. Erit $44\frac{219}{8672}$ quotus.

continuari possit. Quoniam itaque divisor in notis 38917 denuo 4 continetur, quadruplum divisoris ut ante sub iisdem ponitur & ex ipsis auferitur. Erit $44\frac{219}{8672}$ quotus.

DEMONSTRATIO.

Eadem fere est demonstratio, quæ in casu primo, hoc unice notato, quod, cum ex *abaco Pythagorico* constare nequeat, quoties divisor integer in notis dividendi superscriptis contineatur, interea supponatur toties illum in his contineri, quoties sinistra divisoris nota continetur in sinistra aut duabus sinistimis dividendi notis. Licet enim hæc suppositio subinde fallat, in errorem tamen inducere nequit, quia examen mox instituitur, cum factum ex divisore in quotum juxta eam inventum cum dividendo comparatur, & pseudoquotus unitate tamdiu minuitur, donec in verum abeat.

SCHOLIUM.

118. Equidem hæc methodus radiosâ videtur, quod raro verus quotus prima statim vice per eam eliciatur. Enimvero experientia comprobatur, examen, quod instituendum, cogitationum celeritati parere in exercitatis.

PROBLEMA XIII.

119. Divisionem per lamellas Neperianas absolvère.

RE

RESOLUTIO.

1. Lamellas ita dispone, ut in fronte referant divisorem.
2. Eis ad sinistram junge lamellam unitatum.
3. Sub divisore descende, donec occurrant notæ dividendi, in quibus quoties contineatur, disquiritur, aut numerus ipsis proxime minor ex dividendo subtrahendus.
4. Numerus in lamella unitatum respondens scribatur loco quoti.
5. Quodsi eadem ratione partes quoti reliquas investiges, divisio tota absolvetur.

E. G. Sit dividendus 5601386, divisor 5978. Quoniam queritur, quoties in 56013 contineatur 5978; sub divisore descendendo in

$$\begin{array}{r}
 5601386 \quad (937 \\
 \underline{53802.} \\
 2211386 \\
 \underline{221138.} \\
 179346 \\
 \underline{17934.} \\
 41846 \\
 \underline{41846} \\
 \hline
 00000
 \end{array}$$

infima serie reperitur numerus 53802 quam proxime ad 56013 accedens, quorum ille ex hoc subtrahitur & in lamella unitatum respondens 9 loco quoti scribitur. Residuo 2211 jungitur nota dividendi se-

quens 8, cumque ut ante per lamellas referriatur huic convenire quam proxime numerus 17934, ipsi in lamella unitatum respondens 3 scribatur loco quoti, & subtractio ut ante peragatur. Eodem modo pars tertia quoti 7 reperitur.

PROBLEMA XIV.

120. Sine abaci Pythagorici subsidio numerum datum dividere per alium datum.

RESOLUTIO.

1. Dividendo ad dexteram more con-

sueto jungatur lunula & infra locum quoti ducatur linea recta.

2. Infra hanc lineam scribatur divisor, ejus duplum & decupli dimidium sive quintuplum; quibus numeris a dextris 1. 2 & 5 adscribi oportet. Inde nimirum quodcumque divisoris multipulum (§. 116) elicitur.
3. Tot dividendi notæ, quot divisor habuerit, comparentur cum illius multiplis modo inventis; ita enim quotus innotescet.
4. Is more solito post lunulam scribatur, ipsi vero respondens multipulum divisoris sub notis dividendi, quas modo diximus, atque ex his subducatur.
5. Residuo adjungatur nota dividendi proxime sequens; reliqua ut ante peragantur.

Quodsi hæc operatio continuetur, sine abaci Pythagorici subsidio quotus eruetur. Q. e. f.

E. gr. Sit dividendus 385724615, divisor 175. Scribantur numeri dati cum 385724615 (2204140 divisoris multiplis, ut hic

175	1.	factum est
350	2	se apparet.
875	5	Cum multiplis divisoris comparata 385 & quoniam illius duplum 350 quam proxime convenit; scribe 2 loco quoti & 350 subduc ex 385. Residuo

$$\begin{array}{r}
 385724615 \\
 \underline{350} \\
 357 \\
 \underline{350} \\
 724 \\
 \underline{700} \\
 246 \\
 \underline{175} \\
 711 \\
 \underline{700} \\
 115
 \end{array}$$

siduo 35 junge notam dividendi proxime sequentem 7 & 357 denuo compara cum divisoris multiplis. Quoniam vero denuo duplum 350 quam proxime accedit, idem ex 357 subtrahere & quoti loco rursus scribe 2. Residuo 7 junge notam subsequenter 2. Quia dividendus 72 est divisore 175 minor, quotus erit 0. Junge numero 72 notam dividendi 4, & cum 724 inter duplum 350 atque quintuplum 875 cadant, ipsisque dupli duplum, hoc est quadruplum divisoris, 700 quam proxime conveniat, quotus erit hoc in casu 4. Quodsi hac ratione operationem continuare libuerit, reperietur quotus integer 2204140 & residuum erit 115.

SICHO L I O N.

121. *Hæc dividendi methodus & meditando difficultatem & errandi facilitatem tollit, cui obnoxia est altera in problemate undecimo exposita. Quamvis igitur eam serio commendem, nolim tamen ut abacus Pythagoricus prorsus rejiciatur, quoniam subinde casus occurrunt, in quibus eodem minus commode caremus. Fractionum reductio ad minores terminos inter alia assertum nostrum confirmabit.*

PROBLEMA XV.

122. *Examinare multiplicationem.*

RESOLUTIO.

Dividatur factum per multiplicandum, quotus erit multiplicans; aut factum dividatur per multiplicantem, quotus erit multiplicandus, si multiplicatio rite fuerit peracta.

38476)	1346660	(35	E. gr. Si
		115428			multiplicandus
		192380			38476, multipli-
		192380			cator 35; factum
		000000			est 1346660 (§.
					111). Si vero
					1346660 per
					38476 dividas, quotus est 35.

A L I T E R.

1. Abjiciatur ex multiplicando 857 novenarius, quoties fieri potest.
2. Residuum 2 ducatur in multiplicatorem 4, si novenario minor fuerit, & ex facto, ubi novenarium superaverit, abjiciatur itidem novenarius, quoties fieri potest, noteturque residuum.
3. Ex facto 3428 exterminetur etiam novenarius, quoties datur. Quodsi residuum 8 idem fuerit cum facto anteriore, aut ejus residuo; operatio rite peracta.
4. Si multiplicator fuerit novenario major, residuum in multiplicando ducatur non in ipsum multiplicatorem, sed in id, quod abjectis novenariis relinquitur.

E. gr. Si multiplicandus 857, multiplicator 65; factum erit 55705. Abjectis novenariis, in facto relinquitur 4, in multiplicando 2, in multiplicatore itidem 2: quorum residuorum factum cum sit 4, id indicio est multiplicationem rite fuisse peractam.

DEMONSTRATIO.

Cum multiplicatio sit iterata ejusdem numeri additio (§. 67), & factum quidem summæ, multiplicandus toties iteratus, quot multiplicator unitates habet, numeris aggregandis respondeat (§. 61. 66); ex facto & multiplicando iterato abjiciendus est novenarius, quoties fieri potest (§. 101). Quoniam itaque novenario ex multiplicando abjecto, quoties datur, residuum toties relinquitur, quot multiplicator unitates

unitates habet ; evidens est , istud in multiplicatorem duci atque ex facto novenarium denuo exterminari debere , quoties licet , ut habeatur residuum numeris aggregandis respondens.

Quod erat unum.

Quoniam vero perinde est , sive residuum in multiplicatorem , sive multiplicator in residuum ducatur , quemadmodum inferius (§. 207), independenter ab his , demonstrabitur , per primum patet , etiam ex multiplicatore , si novenario major fuerit , novenarium toties exterminari debere , quoties fieri potest , & residuum hoc ducendum esse in residuum ex multiplicando , ut habeatur residuum numeris aggregandis respondens. *Quod erat alterum.*

SCHOLIION.

123. Demonstratio majorem evidentiam nanciscitur , ubi ad exemplum applicatur : id quod etiam de quacunque alia intelligendum.

PROBLEMA XVI.

124. Examinare divisionem.

RESOLUTIO.

1. Quotus ducatur in divisorem , aut divisor in quotum.
2. Facto addatur , si quod a divisione fuerit residuum.

Quodsi hac ratione prodeat dividendus , divisio legitime peracta. (§. 212).

245	E. gr. Si 7856 dividas per 32 ,
32	quotus est 245 , residuum 16.
490	Duc 245 in 32 & facto 7840
735	adde 16 ; habebis dividendum
7840	7856. Constat igitur divisio-
16	nem legitime fuisse peractam.
7856	

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

ALITER.

Cum vi examinis prioris dividendus sit factum ex divisore in quotum ; examen quoque instituetur , abjiciendo ex dividendo , itidemque ex divisore & quoto novenarium , quoties datur , atque residuum in divisore multiplicando per residuum in quoto , & facto , quod inde emergit , addendo residuum ex divisione.

E. gr. In exemplo antecedente exterminato in dividendo 7856 novenario , relinquitur 8. Idem si tentetur in divisore 32 & quoto 245 ; ibi 5 , hic 2 residuum erit. Quodsi ulterius facto 10 ex 5 in 2 addatur residuum ex divisione 16 , & ex aggregato 26 tentetur more communi abjectio novenarii ; habebitur ut in dividendo residuum 8.

SCHOLIION GENERALE.

125. Superest ut videamus , juxta quasnam regulas intellectus in hactenus expositis operationibus arithmetiis dirigatur. Meditaturi regulas duplicis generis offendemus , quarum alia imaginationem , alia intellectum purum dirigunt. Priores in numerorum scriptione , linearum ac lunulæ ductu , notarum in divisione a subtractione peracta deletionem &c. continentur. Scriptio numerorum varias suppeditat regulas , quibus vires imaginationis extenduntur. Numeros enim quosvis , quantumvis magnos & una varios , menti presentes exhibet , quamdiu libuerit , qui alias disparent , cum vix eam subierint : quo ipso cogitationes a meditationibus alienæ arcentur , domesticæ autem quantolibet temporis intervallo in nota qualibet numerorum datorum desiguntur. Hinc discimus :

1. Intellectum uti debere in meditando subsidiis imaginationis , objecto meditationis convenientibus , ex ejus adeo indole in dato quolibet casu particulari derivandis.

2. Quæ intellectus meditatur, ea, quantum fieri potest, imaginationi præsentia sistenda esse: quod observasse in tyronibus quoque instituendis plurimum prodest, cum ad disciplinas animum appellentes operationibus intellectus puri parum sint adfueti, operationes vero imaginationis a primis (quod Græci aiunt) unguiculis familiarissimæ ipsis existant.

Ipsa vero hæc numerorum scriptio præstat, ut intellectus tum singula sigillatim meditari, tum singula cum singulis, prout commodum visum fuerit, conferre possit. Vide imprimis cor. 1. probl. 2. (S. 98), probl. 4. (S. 103), probl. 11. (S. 116), & probl. 14. (S. 120). Utrumque difficultates partim ex rerum meditando seric nimis longa enasci solitas, partim ordini, quo cogitationes promoventur, parum convenienti debitas tollit. Unde liquet

3. Ad minuendam in meditando difficultatem singula distincte imaginationi repræsentanda esse, ita ut objectum meditationis repræsentetur secundum omnes relationes datas & tota totius repræsentatio ex partialibus singularum relationum componatur. Hanc regulam in *Arte characteristicâ* perficienda magni momenti esse, inferius in *Analyâ* patebit. Eadem secundæ junctæ tyronum institutioni egregia supeditat adjuncta. Inservit etiam confusæ cognitioni eorum, quæ sigillatim distincte cognita fuerunt: cujus usum demonstrationes *Geometricæ* inferius concipiendæ loquentur.

Linearum & lunula ductus, notarum deletio, punctum notis unitate multatis adjectum impediunt, ne eadem pro diversis aut diversa pro iisdem habentes in errorem incidamus: quo ipso docemur

4. Quæ sunt eadem in intellectu, ut eadem repræsentari debere imaginationi; quæ vero diversa sunt in intellectu, ut di-

versa quoque repræsentanda esse. Sunt eadem in intellectu, quæ sub notione communi continentur. Hæc vero regula errori potissimum discavet.

Progrediendum nunc ad alterum regularum genus, quibus intellectus purus juvatur. Numeri dati distinguuntur in varias classes, nempe in unitates, decades, centenarios, &c. & in hisce classibus singuli numeri singulis characteribus discernuntur. Satisfit igitur huic regulæ generali:

1. Quæstio proposita in tot partes resolvenda, quot res diversæ naturæ in eadem involvuntur.

Additio & subtractio in singulis numerorum classibus sigillatim peragitur: nec minus in multiplicatione ac divisione facta & quoti particularia quærentur, ut inde componatur numerus quæsitus. Discimus adeo

2. Singula quæ in quæstione proposita involvuntur, esse sigillatim expendenda, & quæ inde deducta sunt, inter se conferenda.

In operationibus arithmetiis, vel ad notions numerorum respicimus, vel eorum proprietates, e. gr. ex abaco Pythagorico, in memoriam nobis revocamus. Unde patet:

3. Dum singula in se considerantur, vel notions eorundem evolvendas, vel proprietates & relationes ad alias alio tempore cognitæ in memoriam revocandas esse.

Si divisor ex pluribus notis constet, ad facilitandum laborem assumitur, integrum divisorem in omnibus dividendi notis superscriptis toties contineri, quoties nota divisoris prima in nota dividendi continetur. Sed cum hypothesis fallere queat, utrum quotus inventus sit verus nec ne, probatur. In his vero continetur regulæ generalis hujusmodi:

4. Si datorum numerus de re eadem sit ingens, e. gr. si in *Astronomia* multa admodum phænomena motus siderum dentur, qualis

qualis esse debeat rei natura, e. gr. structura systematis mundani, ut quibusdam phaenomenis satisfiat, primo investigandum; dein ulterius disquirendum, utrum phaenomenis quoque reliquis satisfiat nec ne. Ita si contingat, nos in hypothesin falsam incidere, eam facilius emendare, quam ex simultanea omnium consideratione, prima statim vice, verum elicere licebit. Hæc regula in scientia naturali multum habet usum non minus in inveniendis, quam in aliorum hypothesibus dijudicandis.

Licet abunde constet per demonstrationes, regularum, quibus utimur, ope numerum quaesitum inveniri; examina tamen non negliguntur, quibus convincimur nos in regularum applicatione non aberrasse. Docemur ergo

5. Consultum esse, ut dispiciamus, an veritates a priori deductæ experientiæ respondeant.

Plura non addimus, cum hæc speciminis tantum loco in medium proferantur.

CAPUT III.

De Ratione ac Proportione Quantitatum.

DEFINITIO XXXIX.

126. **R**atio est ea homogeneorum relatio, quæ quantitatem unius determinat ex quantitate alterius, sine tertio homogeneo assumpto. Homogenea, quæ comparantur, dicuntur *Termini Rationis* & in specie *antecedens* vocatur, qui ad alterum refertur; *consequens* vero, ad quem alter refertur.

SCHOLIUM I.

127. Euclides *rationem definit per habitudinem magnitudinum ejusdem generis secundum quantitatem. Sed hæc definitio incompleta: dantur enim & alia magnitudinum relationes, quæ sunt constantes, nec tamen in rationum numero continentur. Talis est sinus recti ad sinum complementi in Trigonometria. Completam reddidit vir summus Leibnitijs. Equidem & Hobbesius definitionis Euclidæ correctionem tentavit (a); sed infeliciter. Cum enim rationem definiat per magnitudinis ad magnitudinem relationem; de-*

(a) In Tractatu de principiis & ratiocinatione Geometrarum c. XI. p. 22.

finio ejus non modo id vitii habet, quod Euclidea, quod scilicet relationis speciem non determinet; verum etiam in eo peccat, quod speciem magnitudinum non exprimat, quæ rationem inter se habere possunt.

SCHOLIUM II.

128. *Ceterum hic de ratione quantitatum in genere, non tantum de ratione numerorum agimus, quia hæc doctrina non modo ad commensurabilia, sed etiam ad incommensurabilia, hoc est ad quantitatum quodvis genus applicari debet.*

COROLLARIUM I.

129. Cum in fractionibus relatio numeratoris ad denominatorem sine tertio homogeneo assumpto intelligatur (§. 59); crit ea ratio.

COROLLARIUM II.

130. Si duæ quantitates inter se comparantur sine tertia homogenea assumpta, aut una alteri æqualis, aut inæqualis apprehenditur (§. 83). Ratio itaque vel æqualitatis, vel inæqualitatis.

COROLLARIUM III.

131. Si termini rationis fuerint inæquales,

les, vel minor refertur ad majorem, vel major ad minorem (§. 21); minor nempe ad majorem tanquam pars ad totum, major vero ad minorem tanquam totum ad partem (§. 20): Ratio itaque determinat, quoties minus in majore contineatur, vel quoties majus minus contineat, hoc est, quantæ majoris parti minus æquetur: id quod divisio prodit (§. 69).

COROLLARIUM IV.

132. Ceterum quia ratio per se intelligibilis (§. 126), iis discernendis inservire potest, quæ præsentia non sunt (§. 27).

DEFINITIO XL.

133. *Ratio majoris inæqualitatis* est, quam habet majus ad minus, e. gr. 6 ad 3. *Ratio vero minoris inæqualitatis* est, quam habet minus ad majus, e. gr. 3 ad 6.

DEFINITIO XLI.

134. *Ratio rationalis* dicitur, quæ est ut unitas vel numerus rationalis ad numerum rationalem, e. gr. ut 3 ad 4. *Irrationalis* vocatur, quæ numeris rationalibus exprimi nequit.

SCHOLIUM.

135. *Sint duæ quantitates A & B, sitque A < B. Si A ex B toties subtrahas, quoties fieri poterit, e. gr. quinquies, relinquetur vel nihil, vel aliquid. In priori ergo casu A erit ad B ut 1 ad 5, hoc est, A in B quinquies continetur, seu $A = \frac{1}{5} B$. Ratio ergo est rationalis. In casu posteriori aut dabitur pars aliqua, quæ aliquoties ex A, e. gr. ter, itidemque ex B, e. gr. septies subducta nihil relinquit, aut nulla dabitur istiusmodi pars. Si prius: erit A ad B ut 3 ad 7, seu $A = \frac{3}{7} B$, adeoque ratio denuo rationalis. Si posterius: ratio ipsius A ad B numeris exprimi nequit rationalibus, hoc est, di-*

ci nequit, quanta pars ipsius B sit A. Suo autem loco ostendetur, quomodo pars illa aliquota communis inveniri possit, nec minus demonstrabitur, dari quantitates, quæ rationem irrationalem habent. Hinc simul lumen affunditur definitioni rationis, dum ostendimus, quomodo ex comparatione duorum homogeneorum, sine tertio homogeneo assumpto, ratio intelligi possit. Nimirum aut minus majoris, aut pars, quæ utrique inest, utriusque mensura constituitur, vel, quod perinde est, minus aut prædicta pars pro unitate assumitur & in casu priore majus, in posteriore majus & minus per numeros exprimentur: quos in ratione irrationali irrationales esse suo loco constabit.

DEFINITIO XLII.

136. *Exponentem rationis* dico Quotum, qui ex divisione antecedentis per consequentem emergit. E. gr. rationis 3 ad 2 exponens est $1\frac{1}{2}$; sed rationis 2 ad 3 est $\frac{2}{3}$. Vocatur is etiam *Denominator*, nec non *Nomen rationis*.

SCHOLIUM.

137. *In Geometria demonstrabitur, quod exponens rationis datæ exprimi possit linea, licet in numeris vel rationalibus, vel irrationalibus eundem exhibere non valeamus.*

COROLLARIUM I.

138. Si consequens est unitas, antecedens ipse est exponens rationis, e. gr. rationis 4 ad 1 exponens est 4.

COROLLARIUM II.

139. Numerus ergo quilibet integer exprimit rationem multi ad unum, seu multitudinis ad unitatem.

COROLLARIUM III.

140. Exponens rationis est ad unitatem ut antecedens ad consequentem (§. 69).

COROLLARIUM IV.

141. Rationes per exponentes discernuntur (§. 131. 136), atque adeo, si antecedens A, consequens B, ratio ipsius A ad B commode exprimitur per A:B (§. 71).

DEFINITIO XLIII.

142. Si terminus minor est pars aliquota majoris, Ratio majoris inæqualitatis vocatur *multiplex*; ratio vero minoris inæqualitatis *submultiplex*. Speciatim in casu primo *dupla*, si exponens 2; *tripla*, si 3 &c. in altero *subdupla*, si exponens $\frac{1}{2}$; *subtripla*, si $\frac{1}{3}$ &c. E. gr. 6 ad 2 habet rationem triplam, continet enim senarius binarium ter; contra 2 ad 6 est in ratione subtripla, continet enim binarius tertiam senarii partem.

DEFINITIO XLIV.

143. Si terminus major minorem semel continet ac insuper partem ipsius aliquotam; ratio majoris inæqualitatis dicitur *superparticularis*, ratio minoris inæqualitatis *subsuperparticularis*. Speciatim in casu primo vocatur *sesquialtera*, si exponens $1\frac{1}{2}$; *sesquitertia*, si $1\frac{1}{3}$ &c. in altero *subsesquialtera*, si exponens $\frac{2}{3}$; *subsesquitertia*, si $\frac{3}{4}$ &c. E. gr. 3 ad 2 est in ratione sesquialtera; 2 ad 3 in subsesquialtera.

DEFINITIO XLV.

144. Si terminus major minorem semel continet ac insuper partes ipsius aliquot aliquotas; ratio majoris inæqualitatis vocatur *superpartiens*; ratio minoris inæqualitatis *subsuperpartiens*. Speciatim in casu priore dicitur *superbipartiens tertias*, si exponens $1\frac{2}{3}$; *supertripartiens quartas*, si $1\frac{3}{4}$; *superquadrupartiens septimas*, si $1\frac{4}{7}$ &c. in poste-

riore *subsuperbipartiens tertias*, si exponens $\frac{5}{3}$; *subsupertripartiens quartas*, si $\frac{4}{3}$; *subsuperquadrupartiens septimas*, si $\frac{7}{7}$ &c. E. gr. 5 ad 3 est ratio superbipartiens tertias; sed 3 ad 5 ratio subsuperbipartiens tertias.

DEFINITIO XLVI.

145. Si terminus major minorem aliquoties continet & insuper partem ipsius aliquotam; ratio majoris inæqualitatis vocatur *multiplex superparticularis*; ratio minoris inæqualitatis *submultiplex subsuperparticularis*. Speciatim in casu primo dicitur *dupla sesquialtera*, si exponens $2\frac{1}{2}$; *tripla sesquiquarta*, si $3\frac{3}{4}$ &c. in altero *subdupla subsesquialtera*, si exponens $\frac{2}{3}$; *subtripla subsesquiquarta*, si $\frac{4}{3}$ &c. E. gr. 16 ad 5 habet rationem triplam sesquiquintam; 4 ad 9 rationem subduplam subsesquiquartam.

DEFINITIO XLVII.

146. Denique si terminus major minorem aliquoties continet ac insuper aliquot partes ipsius aliquotas, ratio majoris inæqualitatis dicitur *multiplex superpartiens*; ratio minoris inæqualitatis *submultiplex subsuperpartiens*. Speciatim in casu primo vocatur *dupla superbipartiens tertias*, si exponens $2\frac{2}{3}$; *tripla superquadrupartiens septimas*, si $3\frac{4}{7}$ &c. in altero *subdupla subsuperbipartiens tertias*, si exponens $\frac{3}{8}$; *subtripla subsuperquadrupartiens septimas*, si $\frac{7}{5}$ &c. E. gr. Ratio 25 ad 7 est tripla superquadrupartiens septimas; 3 ad 8 subdupla subsuperbipartiens tertias.

SCHOLIION I.

147. *En genera & species rationum rationalium, quarum quidem nomina apud recentiores rarius occurrunt (eorum enim loco terminis rationum minimis utuntur, c. gr. pro dupla 2: 1, pro sesquialtera 3: 2;) non tamen ab eo ignorari possunt, qui scripta Mathematicorum evoluit. Ceterum jam Clavius annotavit (a) exponentes rationis majoris inæqualitatis & re, & nomine; rationes vero minoris inæqualitatis re tantum, non autem nomine denominare. Facile vero in his nomen invenes, si denominatorem exponentis divides per numeratorem. E. gr. si exponens fuerit $\frac{7}{8}$; erit 8: 5 = $1\frac{3}{8}$. Unde innotescit, rationem vocari subsupertripartientem quintas. De nominibus rationum irrationalium nemo hactenus cogitavit.*

SCHOLIION II.

148. *Nomina rationum rationalium facile memoriae mandaturus, idemque perspecturus speciebus recensitis plures non dari, considerare debet, quotum ex divisione termini majoris per minorem emergentem, seu exponentem rationum majoris inæqualitatis, vel esse 1^o. Numerum integrum, vel mixtum, hunc vero vel 2^o. ex unitate & fractione, cujus numerator est unitas, vel 3^o. ex unitate & fractione, cujus numerator est numerus, vel 4^o. ex numero & fractione, cujus numerator est unitas, vel denique 5^o. ex numero & fractione, cujus numerator numerus est, constare. Habemus ergo in casu primo rationes multiplices & submultiplices, in secundo superparticulares & subsuperparticulares, in tertio superpartientes & subsuperpartientes, in quarto multiplices superparticulares & submultiplices subsuperparticulares, in quinto denique multiplices superpartientes & submultiplices subsuperpartientes. Rationes minoris inæqualitatis per proprios quoque exponentes determinari possunt. Aut enim exponens 1^o. est fractio, cujus numerator*

(a) In Comment. ad Elem. V. Euclidis. f. 179. Tom. 1. Oper.

unitas; aut fractio, cujus numerator unitate major, tumque vel simplum numeratoris, vel ejus multipulum denominatore minus. Si simplum numeratoris denominatore minus, ejus differentia a denominatore vel 2^o. unitas est, vel 3^o. unitate major. Similiter si multipulum numeratoris denominatore minus, differentia vel 4^o. unitas est, vel 5^o. unitate major. In casu primo ratio est submultiplex; in secundo subsuperparticularis; in tertio subsuperpartiens; in quarto submultiplex subsuperparticularis; in quinto submultiplex subsuperpartiens.

DEFINITIO XLVIII.

149. *Rationes eadem sunt, quarum antecedentes ad suos consequentes eodem modo referuntur, hoc est, quarum antecedentes per suos consequentes divisi dant exponentes æquales.*

SCHOLIION I.

150. *Per hanc definitionem agnosci posse etiam identitatem rationum irrationalium patet ex schol. def. 42. (S. 137).*

COROLLARIUM I.

151. *Quoties ergo antecedens unius rationis suum consequentem, vel quantam consequentis partem continet; toties antecedens alterius suum consequentem, vel tantam consequentis partem continet: vel etiam quoties antecedens unius in consequente suo continetur, toties antecedens alterius continetur in suo consequente (S. 131).*

COROLLARIUM II.

152. *Si fuerit A ad B ut C ad D; erit A: B = C: D, seu in exemplo singulari 8: 4 = 30: 15. Et hoc modo identitatem rationum in posterum designabimus (S. 141).*

SCHO-

SCHOLIION. II.

153. Alii signis aliis utuntur. Communiter $A. B :: C. D.$ scribere solent. Sed secundum leges Artis characteristica signa scientifica non-scientificis praeferri debent. Sunt autem signa scientifica, seu ad inveniendum apta, quae per characteres derivativos expriment, quorum notiones ex aliis simplicioribus componuntur.

COROLLARIUM. III.

154. Cum rationes non discernantur nisi per exponentes (S. 141), in rationibus autem iisdem exponentes iisdem sint (S. 149), rationes eadem sunt etiam similes (S. 24), & contra.

DEFINITIO XLIX.

155. Rationum duarum identitas vel similitudo dicitur *Proportio*. Et hinc quantitates eandem rationem habentes dicuntur *proportionales*. E. gr. Si $A : B = C : D$, dicuntur A, B, C & D , seu 8, 4, 30 & 15 proportionales.

DEFINITIO L.

156. *Proportio continua* est, si consequens primae rationis idem cum antecedente secundae, ut si $3 : 6 = 6 : 12$; *Discreta* vero, si consequens primae diversus ab antecedente secundae, ut si $3 : 6 = 4 : 8$. In proportione continua *terminus*, qui consequentis primae & antecedentis secundae vicem tuetur, *Medius proportionalis* appellatur. Ita numerus 6 est medius proportionalis inter 3 & 12.

SCHOLIION.

157. Gregorius a S. Vincentio (a) considerat quoque rationes, quas habent rationum exponentes, & Proportionalitatem vocat proportionem, quae inter exponentes quatuor rationum intercedit, ut modos argu-

mentandi in Geometria etiam a rationibus dissimilibus desumere liceat. Sed nos hac doctrina non utemur.

DEFINITIO LI.

158. Rationum diversarum $A : B$ & $F : G$ major dicitur $A : B$, si fuerit $A : B > F : G$; contra minor $F : G$, si $F : G < A : B$. Unde & rationem majorem ac minorem hoc modo designabimus. E. gr. 6 ad 3 majorem habet rationem quam 5 ad 4, nam $6 : 3 (= 2) > 5 : 4 (= 1\frac{1}{4})$; sed 3 ad 6 minorem habet, quam 4 ad 5, nam $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} < \frac{4}{5}$.

DEFINITIO LII.

159. *Ratio* ex duabus vel pluribus aliis *composita* dicitur, quam habet factum ex duarum vel plurium rationum antecedentibus ad factum ex earundem consequentibus. Ita 6 ad 96 est, in ratione composita 2 ad 8 & 3 ad 12. In specie *duplicata* vocatur, quae ex duabus; *triplicata*, quae ex tribus; *quadruplicata*, quae ex quatuor &c. & in genere *multiplicata*, quae ex pluribus rationibus similibus componitur, multiplicata nempe uniuscujusque rationum similibus. Ita 48 : 3 seu 16 : 1 est ratio duplicata ipsarum 4 : 1 & 12 : 3. Unde simul intelligitur, quanam *ratio* dicenda sit *subduplicata*, *subtriplicata*, *subquadruplicata* &c. & in genere *submultiplicata*. Nempe 4 : 1 est ratio subduplicata ipsius 16 : 1 vel 48 : 3.

THEOREMA XI.

160. *Quae sunt ut numerus rationalis ad numerum rationalem, commensurabilia sunt.*

(a) Quadraturæ Circuli lib. 8. f. 365.

DEMONSTRATIO.

Numeri rationalis integri pars aliquota est unitas (§. 40); fractus vero cum unitate partem aliquotam communem habet (§. 41). Quæ igitur sunt ut numerus rationalis ad numerum rationalem; eorum unum vel est pars aliquota alterius, vel utriusque pars aliquota communis datur. Quare commensurabilia sunt (§. 31). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

161. Cum in divisione sit ut divisor ad dividendum, ita unitas ad quotum (§. 69); si numerus rationalis per rationalem dividitur, unitas est ad quotum ut numerus rationalis ad numerum rationalem, atque hinc quotus commensurabilis unitati, (§. 160), adeoque numerus rationalis (§. 39).

COROLLARIUM II.

162. Quoniam ergo in ratione rationali exponens rationis prodit, numero rationali per rationalem diviso (§. 134. 136); rationis rationalis exponens est numerus rationalis (§. 161).

THEOREMA XII.

163. *Commensurabilia sunt inter se, vel ut unitas ad numerum rationalem integrum, vel ut numerus rationalis integer ad alium rationalem integrum: incommensurabilia non item.*

DEMONSTRATIO.

Commensurabilium aut unum est pars aliquota alterius, aut utriusque datur pars aliquota communis (§. 31). Quodsi adeo in casu priore quantitas minor, in posteriore pars aliquota communis pro unitate assumatur; respondebit in priore quantitati majori, in

posteriore utrique numerus rationalis integer (§. 40). Ergo in casu priore quantitates sunt inter se ut unitas, in posteriore ut numerus rationalis integer ad numerum rationalem integrum. *Quod erat primum.*

Incommensurabilium nulla datur pars aliquota communis (§. 31); Nulla ergo datur unitas, cui commensurabilia existant. Quare cum omnis numerus rationalis unitati commensurabilis existat (§. 39); ipsa non sunt ut numerus rationalis ad numerum rationalem. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM I.

164. Commensurabilium ratio est rationalis; incommensurabilium irrationalis (§. 134).

SCHOLIUM.

165. *Dari quantitates incommensurabiles, in Geometria demonstrabitur.*

COROLLARIUM II.

166. Rationis commensurabilium exponens est numerus rationalis (§. 162).

THEOREMA XIII.

167. *Rationes A : B & F : G similes eidem tertiæ C : D sunt etiam similes inter se: & similibus similes sunt inter se similes.*

DEMONSTRATIO.

Rationes similes eidem tertiæ sunt

$6 : 3 = 8 : 4$ etiam eadem eidem

$10 : 5 = 8 : 4$ tertiæ (§. 154).

Ergo $6 : 3 = 10 : 5$ Quare cum sit $A : B = F : G$ & $C : D = F : G$ (§. 152); erit $A : B = C : D$ (§. 87), consequenter A ad B ut C ad D (§. 152). *Quod erat unum.*

Porro

Porro $A:B=C:D$, & $F:G=H:E$, itemque $C:D=H:E$, per *hypoth.* Sed $A:B=H:E$, per *demonstr.* Ergo etiam $A:B=F:G$, per *demonstr.* Quod erat alterum.

THEOREMA XIV.

168. Idem C ad equalia A & B ; & equalia A & B ad idem C vel etiam equalia C & D , eandem rationem habent.

DEMONSTRATIO.

$A=B$, per *hypoth.* Ergo $C:A=C:B$ (§. 71. 94); consequenter C ad A & B eandem rationem habet (§. 152). Quod erat primum.

Similiter quia $A=B$, per *hypoth.* erit $A:C=B:C$ (§. 71. 94), consequenter A & B ad C eandem rationem habent (§. 152). Quod erat secundum.

Sit denique $A=C$ & $B=D$, erit $A:B=C:D$ (§. 71. 94), consequenter ratio utrobique eadem (§. 152). Quod erat tertium.

THEOREMA XV.

169. Si fuerit $A:B=C:D$, erit etiam invertendo $B:A=D:C$.

DEMONSTRATIO.

Sit quotus ex divisione ipsius A per B emergens E , & quotus ex divisione ipsius C per D emergens G ; erit B ad A ut unitas ad E , & D ad C ut eadem unitas ad G (§. 69); consequenter $B:A=I:E$ & $B:C=I:G$ (§. 152). Sed $A:B=C:D$, per *hypoth.* seu $E=G$. (§. 15). Ergo unitas eadem ad E & G eandem rationem habet (§. 168), consequenter $B:A=D:C$ (§. 167). Q. e. d.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

THEOREMA XVI.

170. Partes similes P & p eandem rationem habent ad tota T & t : si tota ad partes eandem rationem habent, partes sunt similes: & tota ad partes similes eandem rationem habent.

DEMONSTRATIO.

Habeat enim, si fieri potest, P ad T aliam rationem quam p ad t ; partes p & P per diversitatem rationis ad tota a se invicem distingui poterunt (§. 132). Erunt adeo dissimiles (§. 24): Quod cum sit absurdum, utpote contra hypothesis; erit P ad T ut p ad t . Quod erat unum.

Si $t:p=T:P$, per *hypoth.* erit $p:t=P:T$ (§. 169). Ergo, per demonstrata, P & p sunt partes similes. Quod erat alterum.

Si P & p sunt partes similes totorum T & t , erit $P:T=p:t$, per *num.* I. adeoque $T:P=t:p$ (§. 169), hoc est, tota ad partes similes eandem rationem habent.

THEOREMA XVII.

171. Partes similes P & p sunt inter se ut tota T & t .

DEMONSTRATIO.

Cum totum sit idem cum partibus suis simul sumtis (§. 9); quoties sumitur totum, toties etiam sumitur pars ejus quantalibet, e. gr. quarta, vigesima, millesima, millionesima aut quæ rationem aliam quamcunque ad totum habet. Quare si ponamus totum minus t toties sumi, donec toti T æquale fiat; quoties ipsum sumitur, toties etiam sumenda ejus pars p , donec parti ipsius T simili, quæ est

G P, æqua-

P, æqualis fiat. Toties itaque P continet p , quoties T ipsum t . Sunt ergo partes similes ut tota (§. 151). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

172. Notandum est, numerum, qui indicat, quoties sumatur totum minus, ut majori æquale fiat, non semper esse rationalem; sed irrationalem quoque esse posse: quo in casu tota ad se invicem rationem irrationalem habent. E. gr. In Geometria demonstrabimus latus quadrati, ut diagonali æquale fiat, toties sumi debere, quoties unitas continetur in radice ex binario. Evidens vero est, si latus quadrati sit divisum in duas partes, quarum una est pars quarta totius, altera continet tres quartas; partem quoque quartam toties sumi quoties unitas continetur in radice ex binario, donec parti quartæ diagonalis æqualis fiat.

THEOREMA XVIII.

173. Si $A : B = C : D$; erit etiam alternando seu permutando $A : C = B : D$.

DEMONSTRATIO.

- I. Si antecedentes A & C consequentibus B & D fuerint minores; eorum partes (§. 20), eæque similes (§. 170) haberi possunt. Sunt igitur ut tota, hoc est antecedentes A & C eam inter se rationem habent quam consequentes B & D. (§. 171).
- II. Si antecedentes A & C consequentibus B & D majores; tum quia $A : B = C : D$, per hypoth. erit $B : A = D : C$ (§. 169), consequenter $B : D = A : C$ per cas. I. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

174. Ergo in divisione unitas ad divisorem ut quotus ad dividendum (§. 69).

COROLLARIUM II.

175. Si fuerit $A : B = C : D$ & $B = D$, erit etiam $A = C$. Est enim $A : C = B : D$ (§. 173). Sed $B = D$, per hypoth. Ergo $A = C$ (§. 149).

COROLLARIUM III.

176. Si fuerit $B : A = D : C$ & $B = D$; erit etiam $A = C$. Cum enim fit $A : B = C : D$ (§. 169); erit etiam $A = C$ (§. 175).

THEOREMA XIX.

177. *Quæ ad idem vel æqualia eandem habent rationem, æqualia sunt: & ad quæ idem vel æqualia eandem habent rationem, ea itidem æqualia sunt.*

DEMONSTRATIO.

$A : B = D : B$, per hypoth. Ergo $A : D = B : B$ (§. 173). Sed $B = B$ (§. 81). Quare $A = D$ (§. 149). Et idem eodem modo ostenditur, si $A : B = D : C$ & $B = C$. *Quod erat unum.*

Similiter $C : A = C : B$, per hypoth. Ergo $C : C = A : B$ (§. 173). Sed $C = C$ (§. 81). Quare $A = B$ (§. 149). Et idem eodem modo patet, si $C : A = D : B$ & $C = D$. *Quod erat alterum.*

THEOREMA XX.

178. *Si quantitates quascunque A & B per eandem tertiam C multiplicet; facta D & E sunt inter se ut A & B.*

DE-

DEMONSTRATIO.

6 12 Cum sit $I : C = A :$
 3 3 $D \& I : C = B : E$ (§.
 66); crit $A : D = B :$
 18 36 E (§. 167), consequen-
 6 : 12 = 18 : 36. ter $A : B = D : E$ (§.
 173). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

179. Cum C sit eadem quantitas in utroque casu, (per hypoth.) unitas quoque in utroque eadem est (§. 13), consequenter $I : C$ eadem Ratio.

COROLLARIUM.

180. Ergo si $A > B$, etiam $AC > BC$ (§. 149), hoc est, si majus & minus per idem vel æqualia multiplices, factum prius est majus altero.

THEOREMA XXI.

181. Si quantitates quascunque A & B per eandem tertiam C divides; quoti F & G sunt inter se ut A & B .

DEMONSTRATIO.

24 : 12 Cum sit $I : C = F :$
 3) ————— $A \& I : C = G : B$
 8 : 4 (§. 174); crit $F : A = G :$
 8 : 4 = 24 : 12 B (§. 167), consequen-
 ter $F : G = A : B$ (§. 173). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

182. Si $A > B$, etiam $F > G$ (§. 149), hoc est, si majus & minus per idem vel æqualia divides, quotus prior posteriore major est.

THEOREMA XXII.

183. Si rationum similium $A : B$ & $C : D$ antecedentes vel consequentes per idem E divides; in casu priore quoti F & G ad consequentes B & D ; in posteriore antecedentes A & C ad quotos H & K eandem rationem habent.

DEMONSTRATIO.

3 : 6 = 12 : 24 Quoniam $A : B$
 3 3 = $C : D$, per hypoth.
 ————— crit $A : C = B : D$
 1 : 6 = 4 : 24 (§. 173). Sed $A : E$
 = $F \& C : E = G$, per hypoth. Ergo
 $F : G = A : C$ (§. 181) = $B : D$
 (§. 167), consequenter $F : B = G : D$
 (§. 173). *Quod erat unum.*

Similiter quoniam $A : B = C : D$ per hypoth. erit $A : C = B : D$ (§. 173). Sed $B : E = H \& D : E = K$ per hypoth. Ergo $B : D = H : K$ (§. 181), consequenter $A : C = H : K$ (§. 167) & hinc tandem $A : H = C : K$ (§. 173). *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXIII.

184. Si rationum similium $A : B$ & $C : D$ antecedentes vel consequentes per eandem quantitatem E multiplices; in casu priore facta AE & CE ad consequentes B & D , in posteriore antecedentes A & C ad facta BE & DE eandem rationem habent.

DEMONSTRATIO.

2 : 6 = 3 : 9 Quia $A : B = C : D$;
 6 6 per hypoth. $A : C =$
 ————— $B : D$ (§. 173). Sed
 12 : 6 = 18 : 9 $EA : EC = A : C$ (§. 178).
 Ergo $EA : EC = B : D$ (§. 167), consequenter
 $EA : B = EC : D$ (§. 173). *Quod erat unum.*

Eodem modo ostenditur, esse $A : BE = C : DE$, *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXIV.

185. Si rationum similium $A : B$ & $C : D$ antecedentes per idem E & consequentes per idem F multiplices aut divides; in casu priore facta, in posteriore

quoti eandem inter se rationem habent.

DEMONSTRATIO.

$3:6 = 12:24$ $A:B = C:D$, per
 $\frac{2}{3} \quad \frac{2}{3}$ *hypoth.* Ergo $E:A:$
 $\frac{6}{2} = \frac{18}{2} = 24:72$ $B = EC:D$ (§. 184),
 consequenter $E:A:$
 $FB = EC:FD$ (§. cit.). *Quod erat*
unum.

$3:6 = 12:24$ Sit $A:E = G, B:F$
 $\frac{3}{2} \quad \frac{3}{2}$ $= H, C:E = K & D:$
 $\frac{1}{1} = \frac{3}{4} = 12$ $F = L$. Quoniam $A:B$
 $= C:D$, per *hypoth.*
 $G:B = K:D$ (§. 183). Ergo & $G:$
 $H = K:L$ (§. cit.). *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXV.

186. Pars antecedentis in ratione majore ad consequentem eandem rationem habet, quam antecedens minoris ad consequentem suam. Et majus antecedente rationis minoris ad consequentem eandem rationem habet, quam antecedens majoris ad suam consequentem.

DEMONSTRATIO.

Si A ad B rationem majorem habet quam C ad D; erit $A:B > C:D$ (§. 158). Ut igitur ratio prior alteri æqualis evadat, necesse est ut minus quam A, hoc est, pars ipsius (§. 20), per B dividatur (§. 182): quæ pars si dicatur F, erit $F:B = C:D$, hoc est, in majore ratione antecedentis pars eandem rationem habet ad consequentem, quam minoris antecedens ad suam (§. 152). *Quod erat unum.*

Similiter si A ad B minorem habet rationem, quam C ad D; erit $A:B < C:D$ (§. 158). Ut igitur ratio

prior alteri æqualis evadat, necesse est ut majus quam A, cujus adeo pars est A (§. 20), per B dividatur (§. 182): quod si dicatur F, erit $F:B = C:D$, hoc est, in ratione minore majus antecedente rationem eandem habet ad consequentem, quam majoris antecedens ad suam consequentem (§. 152). *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXVI.

187. Si fuerint quotcumque rationes similes $A:B, C:D, E:F, G:H$ &c. summa omnium antecedentium $A+C+E+G$ &c. est ad summam omnium consequentium $B+D+F+H$ &c. ut antecedens unius rationis A ad suam consequentem B.

DEMONSTRATIO.

Ponamus e. gr. esse $A = \frac{1}{2}B, C = \frac{1}{2}D, E = \frac{1}{2}F, G = \frac{1}{2}H$; erit $A+C+E+G = \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}D + \frac{1}{2}F + \frac{1}{2}H$ (§. 88), hoc est summa omnium antecedentium est subdupla summæ omnium consequentium, consequenter ut antecedens unius rationis ad suam consequentem. Eodem modo cum argumentatio procedat, si alia quæcumque ratio antecedentium ad consequentes ponatur vel etiam antecedentes sint consequentibus majores: patet propositum. *Q. e. d.*

THEOREMA XXVII.

188. Si fuerit ut totum $A+C$ ad totum $B+D$, ita ablatum C ad ablatum D; erit etiam reliquum A ad reliquum B ut totum $A+C$ ad totum $B+D$, vel ut ablatum C ad ablatum D.

DEMONSTRATIO.

24: 12 Aut $A : B = C : D$, aut
6: 3 $A : B > C : D$, aut deni-
que $A : B < C : D$ (§. 21).

18: 9 Ponamus $A : B > C : D$.
Ergo pars ipsius A , quæ dicatur F , erit
ad B ut C ad D (186), hoc est, $F : B = C : D$ (§. 152), consequenter $F + C : B + D = C : D$ (§. 187). Quare cum etiam
fit $A + C : B + D = C : D$, per hypoth. erit
 $F + C = A + C$ (§. 177), adeoque
 $F = A$ (§. 91). Sed F est pars ipsius
 A per demonstrata: Pars igitur toti æ-
qualis: quod cum sit absurdum (§. 84),
ut sit $A : B > C : D$, fieri nequit.

Sit jam $A : B < C : D$. Ergo ma-
jus ipso A , quod dicatur G , ad B ean-
dem rationem habet, quam C ad D
(§. 186), hoc est, $G : B = C : D$
(§. 152), consequenter $G + C : B + D = C : D$ (§. 187). Quare cum et-
iam fit $A + C : B + D = C : D$ per
hypoth. erit $G + C = A + C$ (§. 177),
adeoque $G = A$ (§. 91). Sed A est pars
ipsius G per demonstrata. Ergo pars
toti æqualis: quod cum sit absurdum,
ut sit $A : B < C : D$ fieri nequit. Quo-
niam itaque nec $A : B > C : D$, nec
 $A : B < C : D$ per demonstrata: erit
utique $A : B = C : D$. Q. e. d.

THEOREMA XXVIII.

189. In rationibus similibus $A : B$
& $C : D$, differentia antecedentium $A - C$
est ad differentiam consequentium $B - D$,
ut antecedens rationis utriuslibet
ad suum consequentem.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $A : B = C : D$ per hypoth.

erit $A : C = B : D$ (§. 173). Ponamus
 $A > C$ & $B > D$; erunt A & B to-
ta, C & D eorum partes (§. 9. 20).
Quamobrem cum sit $A : B = C : D$ per
hypoth. erit $A - C : B - D = A : B$
(§. 188). Q. e. d.

THEOREMA XXIX.

190. Si fuerit ut antecedens prima
rationis ad suum consequentem, ita an-
tecedens alterius ad consequentem suum;
erit etiam componendo, ut summa an-
tecedentis & consequentis primæ ratio-
nis ad antecedentem vel consequentem
primæ, ita summa antecedentis & con-
sequentis secundæ ad antecedentem vel
consequentem secundæ.

DEMONSTRATIO.

4: 2 = 10: 5 Si $A : B = C : D$
per hypoth. erit $A : C = B : D$ (§. 183).
6: 4 = 15: 10
vel 6: 2 = 15: 5 Sed $A + B : C + D = A : C = B : D$ (§. 187). Ergo $A + B : A + C + D : C$, item $A + B : B = C + D : D$ (§. 173). Q. e. d.

THEOREMA XXX.

191. Si fuerit $A : B = a : b$ & $A : C = a : c$ & c. erit $A : A + B + C = a : a + b + c$.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $A : B = a : b$ & $A : C = a : c$ per hypoth. erit $A : a = B : b = C : c$ (§. 173. 167). Quare $A : a = A + B + C : a + b + c$ (§. 187). & hinc $A : A + B + C = a : a + b + c$ (§. 173). Q. e. d.

THEOREMA XXXI.

192. Si fuerint proportionales quot-
cunque similes $A : B = C : D = E : F = G : H = I : K = L : M$ & c. erit summa

omnium antecedentium primarum rationum $A + E + I$ &c. ad summam omnium consequentium $B + F + K$ &c. ut summa omnium antecedentium secundarum rationum $C + G + L$ &c. ad summam omnium consequentium $D + H + M$ &c.

DEMONSTRATIO.

Cum $A : B, E : F, I : K$ &c. itemque $C : D, G : H, L : M$ &c. sint rationes similes, per *hypoth.* erit $A + E + I$ &c. : $B + F + K$ &c. = $A : B$ & $C + G + L$ &c. : $D + H + M$ &c. = $C : D$ (§. 187). Est vero $A : B = C : D$ per *hypoth.* Ergo $A + E + I$ &c. : $B + F + K$ &c. = $C + G + L$ &c. : $D + H + M$ &c. (§. 167). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXII.

193. Si fuerit ut antecedens primæ rationis ad suum consequentem, ita antecedens alterius ad consequentem suum; erit etiam dividendo ut differentia terminorum primæ rationis ad ejus consequentem, ita differentia terminorum secundæ ad ejus consequentem, itemque convertendo ut differentia terminorum primæ rationis ad ejus antecedentem ita differentia terminorum secundæ ad ejus antecedentem.

DEMONSTRATIO.

$6 : 4 = 15 : 10$ Si fuerit $A : B =$
 $C : D$ per *hypoth.* erit
 $2 : 4 = 5 : 10$ $A : C = B : D$ (§. 173),
 $2 : 6 = 5 : 15$ consequenter $A - B :$
 $C - D = B : D = A : C$ (§. 189). Ergo
 $A - B : B = C - D : D$ & $A - B :$
 $B = C - D : C$ (§. 173). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXIII.

194. Si fuerit ordinate ut antecedens primæ rationis A ad suum consequentem B , ita antecedens secundæ D ad consequentem suum E ; & ut consequens primæ B ad aliud quidpiam C , ita consequens secundæ E ad aliud quidpiam F : erit ex æquo antecedens primæ A ad C ut antecedens secundæ D ad F .

DEMONSTRATIO.

$4 : 2 = 6 : 3$ Quoniam $A : B$
 $2 : 8 = 3 : 12$ = $D : E$ & $B : C =$
 $E : F$, per *hypoth.* erit
 $4 : 8 = 6 : 12$ $A : D = B : E$ & $B :$
 $E = C : F$ (§. 173), consequenter
 $A : D = C : F$ (§. 167). Quare $A :$
 $C = D : F$ (§. 173). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

195. Quodsi fuerit $A : B = D : E$ & $C :$
 $B = F : E$; cum etiam sit $B : C = E : F$
 (§. 169), erit $A : C = D : F$ (§. 194).

COROLLARIUM II.

196. Similiter si fuerit $A : B = C : D$ &
 $A : F = C : G$; cum etiam sit $B : A = D : C$
 (§. 169), erit $B : F = D : G$ (§. 194).

COROLLARIUM III.

197. Si denique fuerit $A : B = C : D$ &
 $F : A = G : C$, cum etiam sit $A : F = C : G$
 (§. 169), erit $B : F = D : G$ (§. 196).

THEOREMA XXXIV.

198. Si fuerit perturbate ut antecedens primæ rationis A ad suum consequentem B , ita antecedens secundæ E ad suum consequentem F ; & ut consequens primæ B ad aliud quidpiam C , ita aliud quidpiam D ad antecedentem secundæ E ; erit etiam ex æquo antecedens primæ A ad C ut D ad consequentem secundæ F .

DE-

DEMONSTRATIO.

8 : 4 = 12 : 6 Quoniam A : B
 4 : 16 = 3 : 12 = E : F, per hypoth.
 ————— si ponatur B : C =
 8 : 16 = 3 : 6 F : G, erit A : C =
 E : G (§. 194). Est vero etiam B : C
 = D : E, per hypoth. Ergo D : E =
 F : G (§. 167), & D : F = E : G (§. 173),
 consequenter A : C = D : F (§. 167).
Q. e. d.

COROLLARIUM I.

199. Quodsi fuerit A : B = E : F & C : B
 = E : D, cum etiam sit B : C = D : E
 (§. 169), erit A : C = D : F (§. 198).

COROLLARIUM II.

200. Similiter si fuerit B : A = F : E &
 B : C = D : E, cum etiam sit A : B = E : F
 (§. 169), erit A : C = D : F (§. 198).

COROLLARIUM III.

201. Si porro fuerit B : A = F : E &
 C : B = E : D, cum etiam sit B : C = D : E
 (§. 169), erit A : C = D : F (§. 200).

COROLLARIUM IV.

202. Si idem C vel æqualia per majus
 A & minus B dividas, quotus prior F
 erit minor posteriore G. Est enim A :
 C = 1 : F & B : C = 1 : G (§. 174), adeo-
 que C : B = G : 1 (§. 169). Ergo A : B =
 G : F (§. 198). Sed A > B, per hypoth.
 Ergo G > F (§. 149).

THEOREMA XXXV.

203. *Majus A ad idem C majo-
 rem rationem habet, quam minus B.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam A > B, per hypoth. erit
 A : C > B : C (§. 202), hoc est, A ad
 C majorem rationem habet, quam
 B ad C (§. 158). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXVI.

204. *Quod ad idem majorem ha-
 bet rationem quam alterum, id altero
 majus est.*

DEMONSTRATIO.

Habeat A ad C rationem majorem
 quam B ad idem C, per hypoth. Ergo
 pars ipsius A eandem ad C rationem
 habet quam B ad idem C (§. 186),
 adeoque ipsi B æqualis est (§. 177).
 Quare A > B (§. 20). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXVII.

205. *Idem C ad majus A minorem
 habet rationem quam ad minus B.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam A > B per hypoth. erit
 C : A < C : B (§. 202). Ergo C ad
 A minorem habet rationem quam ad
 B (§. 158). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXVIII.

206. *Ad quod idem majorem ra-
 tionem habet quam ad alterum, id
 altera minus est.*

DEMONSTRATIO.

Habeat C ad A rationem majo-
 rem, quam ad B, per hypoth. Ergo
 pars ipsius C, quæ dicatur D, ad A
 eandem rationem habet, quam ad B
 (§. 186), hoc est, D : A = C : B
 (§. 152), & hinc D : C = A : B (§. 173).
 Sed D < C (§. 20). Ergo A < B (§. 140).
Q. e. d.

THEOREMA XXXIX.

207. *Due quantitates se mutuo
 multiplicantes idem factum gignunt.*

DEMONS-

DEMONSTRATIO.

4 2 Sint duo factores A &
 2 4 B, erit $1 : A = B : AB$ &

 8 = 8 $1 : B = A : BA$ (§. 66). Est
 vero etiam $1 : A = B : BA$
 (§. 173), adeoque ob uni-
 tatem eandem, *per hypoth.* $B : AB$
 $= B : BA$ (§. 167). Ergo $AB =$
 BA (§. 177).

COROLLARIUM.

208. Sint tres factores A, B & C. Quo-
 niam $AB = BA$ (§. 207); erit $CAB = CBA$
 (§. 93), adeoque & $ABC = BAC$ (§. 207).
 Similiter quia $CB = BC$ (§. 207); erit ACB
 $= ABC$ (§. 93), adeoque & $CBA = BCA$
 (§. 207). Quare $CAB = CBA = ABC =$
 $BAC = ACB = BCA$ (§. 87), hoc est, fac-
 tum idem producitur, quocunque ordine
 efficientes in se invicem ducantur.

SCHOLIUM.

209. *Idem eodem modo ostenditur, si plu-
 res fuerint factores: sed demonstratio proli-
 xior evadit, si plures tribus fuerint termini.*

THEOREMA XL.

210. *Si factum per multiplicandum
 dividitur, quotus est multiplicans: si
 per multiplicantem, quotus est multi-
 plicandus.*

DEMONSTRATIO.

Est enim multiplicandus ad factum
 ut unitas ad multiplicantem (§. 66).
 Est etiam multiplicandus ad factum
 (si hoc per illud dividi concipimus) ut
 unitas ad quotum (§. 69). Ergo quo-
 tus æqualis est multiplicanti (§. 177).
Quod erat unum.

Quoniam unitas est ad multiplican-
 tem ut multiplicandus ad factum
 (§. 66); eadem unitas ad multiplican-
 dum ut multiplicans ad factum (§. 173).

Sed si factum per multiplicantem divi-
 dis; multiplicans est ad factum ut uni-
 tas ad quotum (§. 69). Ergo quotus
 est æqualis multiplicando (§. 177).
Quod erat alterum.

COROLLARIUM.

211. Omnia igitur facta sunt numeri com-
 positi (§. 76).

THEOREMA XLI.

212. *Si quotus per divisorem multi-
 plicatur, aut contra; factum est divi-
 dendus.*

DEMONSTRATIO.

Est enim ut unitas ad divisorem ita
 quotus ad dividendum (§. 174). Sed
 si quotus per divisorem multiplicatur,
 erit ut unitas ad divisorem, ita quo-
 tus ad factum (§. 66). Ergo factum
 æquale est dividendo (§. 177). *Quod
 erat unum.*

Idem vero cum sit factum, si divi-
 sor per quotum multiplicetur (§. 207);
 erit quoque in hoc casu factum æquale
 dividendo. *Quod erat alterum.*

THEOREMA XLII.

213. *Sint quatuor quæcunque quan-
 titates proportionales $A : B = C : D$, sint
 totidem alie inter se quoque proportio-
 nales $E : F = G : H$, si posteriores sin-
 gulas in singulas priores ducas, facta
 inter se proportionalia sunt, nempe $AE :$
 $FB = GC : DH$.*

DEMONSTRATIO

DEMONSTRATIO.

Cum sit per hypoth.

$$A : B = C : D \quad \& \quad E : F = G : H$$

$$E \quad F \quad E \quad F \quad C \quad D \quad C \quad D$$

erit $EA : FB = EC : FD$ & $CE : DF = CG : DH$. (§. 185). Sed $EC = CE$ & $FD = DF$ (§. 207). Ergo $EA : FB = CG : DH$ (§. 167) = $GC : HD$ (§. 207). *Q. e. d.*

THEOREMA XLIII.

214. *Rationis compositæ exponens est æqualis factò, quod producunt exponentes simplicium.*

DEMONSTRATIO.

Si rationis primæ $A : B$ exponens = m ; secundæ $C : D$ exponens sit = n . Erit $m : 1 = A : B$ & $n : 1 = C : D$ (§. 140). Ergo $mn : 1 = AC : BD$ (§. 213), consequenter mn est exponens rationis $AC : BD$ (§. 140), hoc est compositæ ex $A : B$ & $C : D$ (§. 159). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

215. *Sint rationes 8 : 4 & 24 : 6. Illius exponens est 2, hujus 4. Rationem compositam datarum habent 192 & 24. Sed 192 : 24 = 8, quod est factum ex 2 in 4. Ceterum eadem demonstratio locum habet, si plures fuerint rationes.*

THEOREMA XLIV.

216. *Si plures fuerint quantitates continue proportionales A, B, C, D &c. prima A ad tertiam C est in ratione duplicata; ad quartam D in ratione triplicata &c. primæ A ad secundam B.*

DEMONSTRATIO.

1. Quoniam $A : B = B : C$, per hypoth. AB ad BC habet rationem dupli-

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

catam ipsius A ad B (§. 159). Sed $AB : BC = A : C$ (§. 181). Ergo etiam A ad C rationem duplicatam habet ipsius A ad B (§. 167). *Quod erat unum.*

2. Quoniam $A : B = B : C = C : D$. per hypoth. ABC est ad BCD in ratione triplicata ipsius A ad B (§. 159). Sed $ABC : BCD = A : D$ (§. 178). Ergo etiam A ad D est in ratione triplicata ipsius A ad B (§. 167). *Quod erat secundum.*

3. Facile apparet, quod eodem modo demonstrari possit, primum terminum habere ad quintum rationem quadruplicatam; ad sextum quintuplicatam &c. primi ad secundum. *Quod erat tertium.*

THEOREMA XLV.

217. *Si fuerit quæcunque quantitas A, B, C, D, E, F &c. series; ratio primæ A ad ultimam F componitur ex rationibus quantitatum extremis interjacentium A : B, B : C, C : D, D : E, E : F &c.*

DEMONSTRATIO.

Si enim omnes antecedentes, itidemque omnes consequentes in se invicem multiples, facta ABCDE & BCDEF sunt in ratione composita rationum A : B, B : C, C : D, D : E, E : F &c. (§. 159). Sed $ABCDE : BCDEF = A : F$ (§. 178). Ergo etiam A ad F est in ratione composita omnium modo recensitarum (§. 167). *Q. e. d.*

THEOREMA XLVI.

218. *Rationes compositæ ex rationibus, quarum singule singulis æquales sunt, inter se æquales sunt.*

DEMONSTRATIO.

$$6 : 3 = 4 : 2 \quad \text{Sit } A : B = C :$$

$$3 : 1 = 2 : 4 \quad D, E : F = G : H,$$

$$5 : 1 = 20 : 4 \quad I : K = L : M, \text{ per}$$

$$90 : 3 = 960 : 32 \quad \text{FB} = \text{CG} : \text{DH}$$

$$= 30 \quad (\S. 213), \text{ adeoque}$$

$$\quad \quad \quad \text{\& AEI} : \text{FBK} =$$

CGL : MHD (§. cit.). Ratio vero AEI : FBK componitur ex rationibus A : B, E : F & I : K; ratio CGL : DHM ex rationibus C : D, G : H, L : M (§. 159). Ergo constat propositum. *Q. e. d.*

THEOREMA XLVII.

219. Si fuerint quatuor quantitates proportionales A, B, C & D; æquemultiplices primæ atque tertiæ A & C, itemque secundæ ac quartæ B & D, juxta quamlibet multiplicationem, utra-

que utramque vel una superant, vel una æquales sunt, vel una deficiunt, inter se comparata.

DEMONSTRATIO.

Denotentur æquemultiplices ipsarum A & C per mA & mC, itemque æquemultiplices ipsarum B & D. per nB & nD. Cum sit A : B = C : D, per hypoth. erit etiam mA : nB = mC : nD (§. 185), consequenter mA : mC = nB : nD (§. 173). Quamobrem si mA = mC, erit nB = nD; si mA > mC, etiam nB > nD; si mA < mC, etiam nB < nD (§. 151). *Q. e. d.*

SCHOLION.

220. Hac proprietate proportionalium utitur Euclides (a) in iis definiendis, ac inde ceteras demonstrat.

(a) Elem. V. def. 5.

CAPUT IV.

De speciebus Arithmetica in numeris fractis.

THEOREMA XLVIII.

221. **S**I numerator est æqualis denominatori, fractio $\frac{a}{a}$ æquivallet integro; si minor, fractio $\frac{a}{a}$ minor est integro; si major, fractio $\frac{a}{a}$ integro seu unitate major est.

DEMONSTRATIO.

Denominator enim indicat unitatem seu integrum in partes æquales (e. gr. in nostro casu in 4) divisum, & numerator numerat partes istiusmo-

di in casu aliquo datas (§. 59). Quod si ergo numerator denominatori æqualis; per hypoth. tot dantur partes, quot habet integrum. Ergo fractio integro æqualis (§. 86). *Quod erat primum.*

Si numerator denominatore minor; per hypoth. aliquot saltem dantur partes integri, non omnes. Ergo fractio tantum aliquot partibus integri æqualis, consequenter eadem minor (§. 20). *Quod erat secundum.*

Si

Si denique numerator major est denominatore; *per hypoth.* plures dantur partes, quam habet integrum. Sed tot partes, quot habet integrum, integro æquales sunt (§. 86). Ergo integrum parti fractionis æquale est, consequenter ipsa integro major (§. 20). *Quod erat tertium.*

SCHOLIION.

222. Fractiones integro æquales vel eodem majores dicuntur vulgo spurix, quia proprie loquendo fractiones non sunt nisi qua integro minores. (§. 38).

PROBLEMA XVII.

223. Invenire, quot integra fractio ($\frac{8}{4}$), qua integro major, contineat.

RESOLUTIO.

Numerator 8 per denominatorem 4 dividatur: dico, quotum 2 indicare, quod petebatur.

DEMONSTRATIO.

Quotus enim 2 indicat, quoties denominator 4 in numeratore 8 contineatur (§. 69). Sed denominator idem est cum integro (§. 59). Ergo quotus indicat, quoties integrum in fractione contineatur. *Q. e. d.*

PROBLEMA XVIII.

224. Integros numeros reducere ad fractionem denominatoris dati.

RESOLUTIO.

1. Multiplicetur numerus integer per denominatorem datum.
2. Factum scribatur loco numeratoris. Ita reperies $3 = \frac{24}{8}$, $5 = \frac{30}{6}$, $7 = \frac{28}{4}$.

DEMONSTRATIO.

Est nempe factum ad denominatorem datum, ut numerus integer ad unitatem (§. 66. 169). Sed unitas & denominator datus sunt idem integrum (§. 59). Ergo fractio & numerus integer æquales sunt (§. 177). *Q. e. d.*

THEOREMA XLIX.

225. Fractiones homogeneæ æquales sunt, quarum numeratores ad suos denominatores eandem rationem habent; major est, cujus numerator habet rationem majorem; minor vero, cujus numerator habet minorem.

DEMONSTRATIO.

Cum fractiones inter se sint homogeneæ, *ex hypoth.* ad eandem unitatem referuntur (§. 35), adeoque ipsarum denominatores idem totum referunt (§. 59). Quare si numeratores ad suos denominatores eandem rationem habent, fractiones æquales sunt (§. 177): cujus vero fractionis numerator ad denominatorem suum rationem majorem habet, ea major est; cujus numerator minorem habet, ea minor est (§. 204). *Q. e. d.*

E. gr. $\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$. Sed $\frac{3}{24} < \frac{2}{6}$.

SCHOLIION.

226. Intelligitur adeo identitas fractionum, si numerator unius toties contineatur in denominatore suo, quoties numerator alterius in suo continetur. Fractio minor esse intelligitur, si numerator ipsius pluries continetur in suo denominatore, quam numerator alterius in denominatore suo: id quod divisio denominatoris per numeratorem prodit.

COROLLARIUM.

227. Quodsi ergo tam numerator, quam denominator alicujus fractionis ($\frac{4}{6}$) per eundem numerum (2) multiplicetur vel dividatur; in casu priore facta ($\frac{8}{12}$), in posteriore quoti ($\frac{2}{3}$) constituunt fractionem datæ ($\frac{4}{6}$) æquivalentem (§. 178. 181).

PROBLEMA XIX.

228. *Invenire communem mensuram maximam duorum numerorum.*

RESOLUTIO.

- I. Dividatur numerus major per minorem.
2. Divisor primæ divisionis seu numerus datus minor denuo dividatur per residuum primæ divisionis.
3. Similiter divisor secundæ divisionis dividatur per residuum secundæ & ita porro, donec nihil remaneat.

Dico, divisorem ultimum esse communem mensuram maximam numerorum datorum.

E. gr. Sint numeri dati 168 & 240, reperietur eorum communis mensura maxima 24 hunc in modum:

$$\begin{array}{r} 7 \\ 24 \overline{) 168} \\ \underline{168} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 \\ 72 \overline{) 168} \\ \underline{168} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 72 \overline{) 240} \\ \underline{216} \\ 24 \end{array}$$

Similiter communis mensura maxima numerorum 95 & 47 reperitur 1.

DEMONSTRATIO.

Divisor ultimus 24 metitur divisorem antecedentis (in nostro quidem casu secundæ) divisionis 72, (*per hypoth.* & §. 74). Ergo & metitur dividendum antecedentis (hoc est, in nostro casu secundæ) divisionis 168, quippe ex

dividendo ultimæ divisionis 72, aliquoties (hic quidem bis) sumto & ejus divisore 24 compositum. Metitur adeo numerum unum datorum 168 & residuum primæ divisionis 72, adeoque & numerum alterum datorum 240, quippe ex minore 168 aliquoties (in nostro casu semel) sumto & residuo primæ divisionis 72 compositum. Est itaque communis numerorum datorum mensura (§. 78).

Esse vero communem mensuram maximam ordine retrogado per indirectum demonstratur. Ponamus enim numero invento 24 majorem esse mensuram numerorum datorum 240 & 168 communem. Patet igitur ex antecedentibus, quod etiam metiri debeat residuum primæ seu divisorem secundæ divisionis 72, adeoque & residuum secundæ divisionis seu divisorem tertiam, hoc est, in nostro casu inventam communem mensuram 24. Sed numerus is eadem major est, *ex hyp.* Ergo communem mensuram inventam 24 metietur numerus major, quam 24: Quod cum sit absurdum (§. 74), major communis mensura non datur. Est igitur ea, quam invenimus, maxima. *Q. e. d.*

SCHOLIUM I.

229. *Qui demonstrationem uno quasi obtutu comprehendere cupiunt; illos hæc numerorum datorum resolutio juvabit.*

I. $72 = 3 \cdot 24$, per divis. tert.

II. $168 = 2 \cdot 72 + 24$, per divis. sec. =
 $2 \cdot 3 \cdot 24 + 24$, per num. I. = $7 \cdot 24$.

III. $240 = 1 \cdot 168 + 72$ per divis. prim.
= $7 \cdot 24 + 3 \cdot 24$ per num. I & II =
 $10 \cdot 24$.

SCHO-

SCHOLIION II.

230. In lineis communis mensura maxima invenitur per mutuum earundem a se invicem subtractionem. In numeris autem compendii gratia divisio subtractioni substituitur: ut exemplum ostendit.

240	96	48	
168	72	24	
<hr/>			
72	24	24	
<hr/>			
96	48	0	

PROBLEMA XX.

231. Fractionem datam ad minores terminos reducere, h. e. invenire fractionem datam ($\frac{20}{48}$) æquivalentem, sed minoribus numeris expressam.

RESOLUTIO.

Dividatur tam numerator 20, quam denominator 48 per eundem numerum 4, qui utrumque metitur: quoti 5 & 12 componunt fractionem quaesitam $\frac{5}{12}$ (§. 227).

COROLLARIUM I.

232. Si ergo divisio fit per communem mensuram maximam numeratoris ac denominatoris (§. 228); fractio ad terminos minimos reducitur.

COROLLARIUM II.

233. Si numeratorem ac denominatorem fractionis datæ sola unitas metitur; ad minores terminos reduci nequit.

SCHOLIION.

234. Molestius accidit inexercitatis communem mensuram maximam querere, quam iterata per mensuras minores sponte animadversas divisione fractiones reducere.

PROBLEMA XXI.

235. Duas vel plures fractiones datas ad eandem denominationem reducere, h. e. invenire fractiones, quæ datis æquales sunt & communi denominatore gaudent.

RESOLUTIO.

Casus I. Si fractiones duæ dentur, quælibet integra multiplicetur per denominatorem alterius.

E. gr. $\frac{2}{3}, \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5}, \frac{4 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{10}{15}, \frac{12}{15}$.

Casus II. Si plures dentur, tam numerator, quam denominator uniuscujusque ducatur in factum ex denominatoribus reliquarum.

E. gr. $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 4}{3 \cdot 6 \cdot 4}, \frac{1 \cdot 3 \cdot 4}{6 \cdot 3 \cdot 4}, \frac{3 \cdot 3 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 6} = \frac{48}{72}, \frac{12}{72}, \frac{54}{72}$.

DEMONSTRATIO.

Fractiones communem habere denominatorem, patet per §. 93 & §. 207. 208. Quod vero æquivalentia primarum propositis, manifestum est per §. 227. Constat ergo propositum. Q. e. d.

PROBLEMA XXII.

236. Fractiones addere.

RESOLUTIO.

1. Si fractiones datæ diversos denominatores habuerint, reducantur ad eundem (§. 235).
2. Addantur numeratores (§. 96) & summæ subscribatur denominator communis.

E. gr. $\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = \frac{10}{15} + \frac{12}{15}$ (§. 235) $= \frac{22}{15}$
 $= 1\frac{7}{15}$ (§. 223). $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{48}{72} + \frac{12}{72} + \frac{54}{72}$ (§. 235) $= \frac{114}{72} = 1\frac{42}{72}$ (§. 223) $= 1\frac{7}{12}$ (§. 231).

DEMONSTRATIO.

Cum denominatores sint nominæ unitatum, ex quibus numeratores componuntur (§. 59); numeratores tantum adduntur. Quoniam vero

addi nequeunt, nisi fuerint homogenei (§. 61); ad eandem denominationem sunt reducendi (§. 35). *Q. e. d.*

PROBLEMA XXIII.

237. *Fractionem datam ex alia data subtrahere.*

RESOLUTIO.

1. Si fractiones datæ diversos habent denominatores, reducantur ad eandem denominationem (§. 235).

2. Numerator unius ex numeratore alterius subducatur (§. 103) & residuo denominator communis subscribatur.

E. gr. $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (§. 231) & $\frac{2}{7} - \frac{1}{2} = \frac{6}{10} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}$ (§. 235) = $\frac{1}{10}$.

THEOREMA L.

238. *Fraçtio æquatur Numeratori per denominatorem diviso, hoc est, $\frac{3}{4} = 3 : 4$.*

DEMONSTRATIO.

Est enim fractio $\frac{3}{4}$ ad unitatem seu integrum ut numerator 3 ad denominatorem 4 (§. 38. 59). Quare cum sit ut antecedens ad consequentem ita exponens rationis ad unitatem (§. 140), si antecedens sumatur numerator 3, consequens denominator 4, erit fractio $\frac{3}{4}$ exponens rationis (§. 177). Æquatur ergo fractio numeratori per denominatorem diviso (§. 136). *Q. e. d.*

PROBLEMA XXIV.

239. *Fractionem per fractionem multiplicare.*

RESOLUTIO.

Ducatur numerator unius fractionis in numeratorem, & denominator unius

in denominatorem alterius; facta constituunt fractionem quæsitam.

E. gr. $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (§. 231).

DEMONSTRATIO.

Sit $\frac{A}{B} (\frac{2}{3}) = A : B$ (§. 238) = F, & $\frac{C}{D} (\frac{1}{2}) = C : D$ (§. cit.) = G. erit B : A = I : F & D : C = I : G (§. 69). Ergo BD : AC = I : FG (§. 213), hoc est, $\frac{AC}{BD} (\frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 2}) = \frac{FG}{I}$ (§. 169) = FG ($\frac{2}{6}$). *Q. e. d.*

SCHOLIION I.

240. *Non mirum, quod factum factoribus minus, cum revera divisio sit, quæ multiplicatio vocatur. E. gr. $\frac{2}{3}$ multiplicare per $\frac{1}{2}$ idem est ac invenire dimidium duarum partium tertiarum.*

SCHOLIION II.

241. *Hinc fractionum multiplicatio sequente modo facilius demonstratur. Si fractio $\frac{4}{5}$ multiplicanda per $\frac{2}{3}$, duæ partes tertiæ quatuor quintarum inveniendæ. Data igitur fractio $\frac{4}{5}$ instar totius considerata dividenda est in tot partes æquales, quot multiplicatoris denominator 3 habet unitates, scilicet in nostro casu in tres, & pars ista multiplicanda per numeratorem multiplicatoris, nempe hic per 2 (§. 59).*

SCHOLIION III.

242. *Vix autem opus est ut annotemus, si fractio per numerum integrum multiplicanda, ducendum esse solum numeratorem in integrum numerum datum. E. gr. factum ex $\frac{3}{7}$ in 2 est $\frac{6}{7}$.*

PROBLEMA XXV.

243. *Fractionem $\frac{4}{5}$ per aliam fractionem $\frac{2}{3}$ dividere.*

RESOLUTIO.

1. Divisor invertatur. E. gr. loco $\frac{2}{3}$ scribe $\frac{3}{2}$.
2. Divisor inversus ducatur in dividendum

dum (§. 239): quod prodit $\frac{12}{10}$ feu $1\frac{1}{5}$ (§. 223) est quotus quæsitus.

DEMONSTRATIO.

Quoniam divisor ad dividendum ut unitas ad quotum (§. 69); erit etiam dividendus ad divisorem ut quotus ad unitatem (§. 169). Quodsi fractiones ad eandem denominationem reducantur (§. 235), cum eadem sint æquales quotus ex divisione numeratorum per denominatorem communem (§. 238); erit Numerator fractionis dividendæ ad Numeratorem dividendæ ut fractio dividenda ad fractionem dividendam (§. 181), consequenter in hoc casu numerator dividendæ ad Numeratorem dividendæ ut quotus ad unitatem (§. 167). Quare fractiones datæ ad communem denominatorem reducendæ sunt & numerator dividendæ per numeratorem dividendæ dividi debet, ut habeatur quotus ex divisione fractionis dividendæ per dividendam emergens (§. 177). Enimvero dum fractiones duæ ad eandem denominationem reducuntur, numerator primæ enascitur ex numeratore ipsius dato in denominatorem secundæ, numerator vero secundæ ex

ipsius numeratore dato in denominatorem primæ ducto (§. 235). Obtinemus adeo numeros, ex quorum divisione quotus quæsitus emergit, si divisor inversus (*juxta*) §. 239 in fractionem dividendam ducatur. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

244. *Neque vero mirum est, quod quoti numeri integri esse possint. Una enim fractio alteram ter, quater, millies &c. continere potest. Apparet adeo, cum fractiones sint rationes (§. 141), eas dividere idem esse ac rationum rationes investigare.*

PROBLEMA XXVI.

245. *Integrum 3 per fractionem $\frac{4}{7}$ dividere.*

RESOLUTIO.

1. Divisor invertatur, ut in problemate præcedente (§. 243). E. gr. loco $\frac{4}{7}$ scribe $\frac{7}{4}$.
2. Numerus integer datus 3 ducatur in Numeratorem 7 divisoris inversi.
3. Facto subscribatur ejusdem denominator 4: quod prodit $\frac{21}{4}$ sive $5\frac{1}{4}$ est quotus quæsitus.

DEMONSTRATIO.

Eadem est cum demonstratione problematis præcedentis (§. 243).

CAPUT V.

De Potentiis numerorum, Genesi præsertim ac Analyti numerorum quadratorum & cubicorum.

DEFINITIO LIII.

246. **S**I numerus quicumque 2 in se ipsum ducatur; factum 4 Numerus quadratus, ipse autem hujus intuitu Radix quadrata appellatur.

COROLLARIUM.

247. Cum sit ut unitas ad radicem quadratam, ita radix ad ipsum quadratum (§. 66. 246); erit radix media proportionalis inter unitatem & quadratum (§. 156).

DEFINITIO LIV.

248. Si numerus quadratus 4 porro per radicem 2 multiplicetur; factum 8 dicitur Numerus Cubicus seu cubus, & radix 2 ejus intuitu Radix cubica.

COROLLARIUM.

249. Cum sit ut unitas ad radicem, ita radix ad quadratum (§. 66. 246) & ut unitas ad radicem ita quadratum ad cubum (66. 248); erit etiam radix ad quadratum ut quadratum ad cubum (§. 167), hoc est, unitas, radix, quadratum & cubus in continua proportione progrediuntur (§. 156) & radix cubica est primus ex duobus numeris mediis continue proportionalibus inter unitatem & cubum.

DEFINITIO LV.

250. Cum istiusmodi multiplicatio in infinitum continuari possit; facta inde genita generali *potestatum, potentiarum, dignitatum* nomine appellari so-

lent. *Vieta* eadem Magnitudines scalares vocat.

DEFINITIO LVI.

251. *Exponens dignitatis* est numerus, qui indicat, quoties dignitas data per radicem dividenda, antequam ad unitatem perveniatur. Ita exponens quadrati est 2, cubi 3 (§. 246. 248).

DEFINITIO LVII.

252. Hodie tantum non omnes dignitates optime distinguunt per exponentes, ita ut radix dicatur *dignitas prima*, quadratum *secunda*, cubus *tertia* &c. Qui Arabes sequuntur, singulis potentiis peculiaria imponunt nomina, diversa tamen ab iis, quibus cum *Diophanto* (a) utuntur *Vieta* (b) & *Oughtredus* (c). Nomina Arabum sunt: *Radix*, *Quadratum*, *Cubus*, *Quadratoquadratum*, seu *biquadratum*, *Surdesolidum*, *Quadratum Cubi*, *Surdesolidum secundum*, *Quadrati quadrati quadratum*, *Cubus cubi*, *Quadratum Surdesolidi*, *Surdesolidum tertium* &c. Nomina *Diophanti* sunt: *Latus* seu *Radix*, *Quadratum*, *Cubus*, *Quadratoquadratum*, *Quadratocubus*, *Cubocubus*, *Quadratoquadratocubus*, *Quadratocubocubus*, *Cubocubocubus* &c.

SCHO-

(a) In *Libris Arithmetiæ*.(b) In *Isagoge in Artem Analyt.* c. 3. f. m. 3.(c) In *Clave Mathem.* c. 12. p. m. 34.

SCHOLIION.

253. Multi quadratum vocant Zensum. Hinc composita: Zensuzensus, Zensicubus, Zensuzensus, Zensurdefolidus &c.

HYPOTHESIS XII.

254. Qui Arabum denominationibus usi, potentiarum signis sequentibus utuntur: 1. R, 2. Z, 3. C, 4. ZZ, 5. B, 6. ZC, 7. BB, 8. ZZZ, 9. CC, 10. ZZB, 11. CB &c. Multo commodius Cartesius (a) monito Kepleri (b) obsecutus radici superius a dextris jungit exponentem, e. gr. si a fuerit radix, erunt potentie ipsam sequentes a^2 , a^3 , a^4 , a^5 , a^6 &c. vel, si $a=2$, 2^2 , 2^3 , 2^4 , 2^5 , 2^6 &c. ita ut sit $2^2=4$, $2^3=8$, $2^4=16$ &c.

DEFINITIO LVIII.

255. Quantitatem ad dignitatem desideratam evehere idem est ac invenire factum ex ipsa aliquoties in se ducta emergens. E. gr. 2 evehere ad dignitatem tertiam idem est ac invenire factum 8, cujus factores 2. 2. 2.

DEFINITIO LIX.

256. Ex dignitate data radicem extrahere, vel latus educere idem est ac invenire numerum 2, qui aliquoties in se ipsum ductus datam potentiam (ex. gr. tertiam) 8 producit.

SCHOLIION.

257. Cum dignitates superiores non nisi in Analyfi usum habeant; in presenti genesi & analysi quadratorum & cuborum tantum tradimus. Radices vero quadratas ac cubicas extracturus omnium digitorum nu-

meros quadratos & cubicos nosse debet, quos sequens tabula exhibet:

Radices.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quadrati	1	4	9	16	25	36	49	64	81
Cubici	1	8	27	64	125	216	343	512	729

DEFINITIO LX.

258. Radix tam quadrata, quam cubica, aut dignitatis superioris cujuscunque dicitur binomia, si ex duabus; trinomia, si ex tribus, multinomia sive polynomia, si ex pluribus, quam duabus partibus constat.

THEOREMA LI.

259. Potentie ejusdem gradus sunt in ratione tantuplicata laterum, quot unitates habet exponens earundem, hoc est, quadrata habent rationem duplicatam, cubi triplicatam, quadrato-quadrata quadruplicatam &c. rationem suarum radicum.

DEMONSTRATIO.

Potentie oriuntur, si radices A & B aliquoties in seipsas ducas (§. 250). Quare cum eadem radix A ad eandem radicem B eandem habeat rationem; ratio quadratorum componitur ex duabus, cuborum ex tribus, quadrato-quadratorum ex quatuor &c. reliquarum potentiarum ex tot rationibus similibus, quot exponens earundem habet unitates. Ergo quadrata habent rationem duplicatam, cubi triplicatam &c. ceterae potentie rationem tantuplicatam suarum radicum, quot unitates habet exponens earundem (§. 159).

(a) In Geometria.
 (b) Harmonices mundidib. I. f. 35. 36.
 Wolfi Oper. Mathem. Tom. I.

THEOREMA LII.

260. *Quantitatum proportionalium potentia eadem sunt etiam proportionales.*

DEMONSTRATIO.

Habent enim potentia eadem rationem multiplicatam ipsarum $A:B$, $B:C$, $C:D$, $D:E$ &c. vel $A:B$, $C:D$, $E:F$ &c. (§. 259). Sed hæ rationes omnes inter se eadem sunt *per hypoth.* Ergo potentia ista v. gr. A^3 , B^3 , C^3 , D^3 , E^3 , &c. constituunt rationes compositas ex rationibus, quarum singulae singulis æquales sunt (§. 250), consequenter easdem (§. 218), atque adeo proportionales sunt (§. 155). *Q. e. d.*

THEOREMA LIII.

261. *Numerus quadratus radice binomia, componitur ex quadrato partis primæ, ex facto dupli primæ in alteram & ex quadrato partis alterius.*

DEMONSTRATIO.

Prodit enim numerus quadratus, si radix in seipsam ducitur (§. 246). Utraque vero pars radice sigillatim ducitur in utramque simul (§. 111). Quare productum componi debet 1°. ex facto partis primæ in seipsam, hoc est, ex quadrato partis primæ (§. 246), 2°. ex facto partis primæ in secundam & ex facto secundæ in primam, hoc est, ex duplo facto primæ in secundam, seu ex facto dupli primæ in secundam (§. 207. 208), 3°. ex facto partis secundæ in seipsam, hoc est, ex quadrato partis secundæ (§. 246). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

262. *Demonstratio ocularis, si in quocunque exemplo singulari multiplicatio non actu peragitur, sed saltem indicatur; quo in casu exempli universalis vices tuetur; id nimirum non infelicius quam figura in Geometria representant, quod singularia in universum omnia commune habent. E. gr. sit radix binomia 34 aut 30 + 4; erit*

$$30 + 4 \text{ Radix binomia.}$$

$$30 + 4$$

$$\begin{array}{r} 16 \text{ Quadratum partis II.} \\ 120 \\ 120 \\ 900 \text{ Quadratum partis I.} \\ \hline 1156 \text{ Quadratum totius.} \end{array}$$

$$120 \text{ Facta ex I in II.}$$

$$900 \text{ Quadratum partis I.}$$

$$1156 \text{ Quadratum totius.}$$

Egregium hoc artificium vires imaginationis mire extendit & intellectum juvat tam in demonstrationibus concipiendis, quam in propositionibus inveniendis.

COROLLARIUM I.

263. Cum pars dextra five secunda inter unitates, sinistra five prima inter decades locum obtineat (§. 50); quadratum illius in loco dextimo, factum ex unius duplo in alteram in secundo, quadratum denique alterum in tertio a dextimo terminari debet (§. 49).

SCHOLIUM II.

264. *Scilicet quadratum partis dextimæ nullam adjunctam habet cyphram; duplo facto ex parte una in alteram cyphra una, quadrato autem partis sinistrae duæ adjunguntur, ut numeri solitarie positi justum locum nanciscantur (§. 49).*

COROLLARIUM II.

265. Si radix multinomia fuerit; partes duæ aut plures sinistimæ habeantur pro una, & extemplo patebit, quadratum numeri cujuscunque componi ex quadratis singularum partium & factis ex duplo partis cujus-

cujuslibet in omnes ipsa sinisteriores : ut adeo theorema unum compositioni omnium numerorum quadratorum sufficiat.

SCHOLIUM III.

266. Sit radix 346 : sumatur 340 pro parte una & 6 pro altera ; erit (§. 261)

340	+	6	
340	+	6	
36			<i>Quadratum partis III.</i>
2040	}		<i>Facta ex parte III in I & II simul.</i>
2040	}		
1600			<i>Quadratum partis II.</i>
12000	}		<i>Facta ex I in II.</i>
12000	}		
90000			<i>Quadratum partis I.</i>
119716			<i>Quadratum totius.</i>

COROLLARIUM III.

267. Quoniam in loco singula producta terminentur, ex corollario primo & ejus scholio intelligitur (§. 263. 264). Habenda nimirum est ratio cyphrarum numeris in se invicem ductis adjungendarum, si solitarii ponantur, ut justum nanciscantur locum (§. 49).

SCHOLIUM IV.

268. Extractio radice quadrata, alias tædii plena, facillima evadit, ubi quadratis per theorema præsens componendis operam prius impenderit.

PROBLEMA XXVII.

269. Ex numero quocunque dato radicem quadratam extrahere.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

I. Numerus propositus distinguatur in classes, binas notas classi unicuique assignando, initio a dextra factò. Tot enim erunt partes radice, quot classes habentur (§. 265. 267). Notandum vero, quod classi sinistimæ interdum nonnisi nota unica relinquantur.

2. Jam cum in classe sinistima reperitur quadratum notæ sinistimæ radice (§. cit.); in Tabula radicum (§. 275) quæretur numerus quadratus ei, qui classem sinistimam occupat, vel æqualis, vel eodem proxime minor, & ex ipso subtrahatur; radix vero ejus post lunulam scribatur.
3. Quoti inventi duplum ponatur sub nota sinistima classis subsequente & inde porro sinistrorsum, si ex notis pluribus constiterit. Investigetur novus quotus per abacum Pythagoricum (§. 109), inventusque post lunulam scribatur: est enim pars secunda radice (§. 261. 210).
4. Idem quotus ponatur sub nota dextima illius classis & factum ex numero subscripto integro in divisorem (§. 263) subducatur, ut in divisione moris est.
5. Quodsi operatio juxta regulam tertiam & quartam in reliquis classibus iteretur; prodibit radix quæsitæ (§. 265. 267).

E.gr.

11	56	(34	11	97	16	(346
9	::	\	9	::	::	
2	56		2	97	::	
	<i>6*</i>			<i>6*</i>	<i>::</i>	
2	56		2	56	::	
	0			41	16	
				6	86	
				41	16	
					0	

PROBLEMA XXVIII.

270. Radicem quadratam ex fractione data extrahere, cujus numerator & denominator est numerus quadratus.

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

Quoniam numerum fractum per fractum multiplicans unius numeratorem in numeratorem alterius & denominatorem pariter in denominatorem alterius ducit (§. 239); quadratum autem ex ductu ejusdem numeri in seipsum enascitur (§. 246); radicem quadratam extracturus eam sigillatim ex numeratore ac denominatore extrahere tenetur.

Ita radix quadrata ex $\frac{4}{9}$ est $\frac{2}{3}$, ex $\frac{49}{144}$ vero $\frac{7}{12}$

COROLLARIUM I.

271. Cum numeri integri ad fractionem denominatoris dati reducantur, si per hunc multiplicentur & facto tanquam numeratori denominator datus subscribatur (§. 224); si numerus datus, qui quadratus non est, ad fractionem reducatur, cujus denominator est quadratus & ex fractione extrahatur radix (§. 270): quæ prodit fractio radicem prope veram exhibet in istiusmodi partibus, quas denominatoris quadrati radix indicat.

SCHOLION I.

272. E. gr. Si ex 2, extrahenda radix prope vera, quæ non deficiat in partibus sextis; duc 2 in 36, ut prodeat fractio $\frac{72}{36}$, cujus radix $\frac{6}{6}$ sive $1\frac{2}{6}$ exhibet radicem a vera

magnitudine parte sexta non differentem, seu cujus defectus minor est quam $\frac{1}{6}$.

COROLLARIUM II.

273. Quoniam numerum per articulum primarium, veluti 10, 100, 1000 &c. multiplicaturus eidem non nisi cyphas 0, 00, 000 &c. unitati adhaerentes adjungere teneris (§. 112); radicem prope veram in fractionibus decimalibus desiderans numero, qui quadratus non est, 2, 4, 6 &c. cyphas junge dextrorsum & operationem continua: ita enim prodibit radix prope vera in partibus decimis, centesimis, millesimis &c.

SCHOLION II.

274. E. gr. Sit extrahenda radix quadrata ex 345; prodibit $\frac{1857}{100}$.

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 45} \quad (18 \frac{57}{100} \\
 \underline{6} \\
 214 \\
 \underline{214} \\
 \\
 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 0 \\
 (3 \overline{) 85} \\
 \underline{6} \\
 1 \\
 \hline
 27 \cdot 5 \cdot | 00 \\
 (37 \overline{) 87} \\
 \underline{259} \\
 \hline
 1551
 \end{array}$$

SCHOLION III.

275. Si tabulis numerorum quadratorum pro radicibus ab 1 usque ad 1000 utaris; in iis evolvi potest numerus quadratus proxime minor eo, qui tres classes sinisteriores

$$\begin{array}{r}
 86975 \\
 86436 \\
 \hline
 539 \mid 0.0 \\
 (58 \mid 89) \\
 530 \mid 01 \\
 \hline
 899
 \end{array}$$

occupat. Ita si-
ne ullo labore ha-
bentur tres nota
prioris, e. gr. in
nostro casu 294.
Plures notæ una
inveniuntur, si ta-
bula longius ex-
tendantur.

THEOREMA LIV.

276. Numerus cubicus radice binomia componitur ex numeris cubicis duarum partium, ex facto tripli quadrati partis primæ in secundam & ex facto tripli quadrati partis secundæ in primam.

DEMONSTRATIO.

Numerus cubicus prodit, si quadratum per radicem multiplicetur (§. 248). Sed quadratum radice binomiæ componitur ex quadratis partium & facto duplo ex parte una in alteram (§. 261). Quare cubus componitur ex cubo partis primæ, ex triplo facto quadrati partis primæ in secundam, ex triplo facto quadrati partis secundæ in primam, hoc est, ex facto tripli quadrati partis primæ in secundam, & facto tripli quadrati partis secundæ in primam (§. 207) atque ex cubo partis secundæ (§. 246. 248). Q. e. d.

SCHOLIUM I.

277. Demonstrationem ocularem denovo sistit exemplum singulare, in quo multiplicatio tantum indicatur. Sit e. gr. radix 34 seu $30 + 4$, erit

$$\begin{array}{r}
 30 + 4 \text{ Radix} \\
 \hline
 16 \text{ Quadrat. part. II.} \\
 120 \text{ Facta ex 1 in II.} \\
 120 \text{ } \\
 900 \text{ Quadrat. part. I.} \\
 \hline
 64 \text{ Cubus part. II.} \\
 480 \text{ Facta ex quadrat. II. in I.} \\
 480 \text{ } \\
 3600 \text{ Factum ex quadrat. I. in II.} \\
 480 \text{ Fact. ex quadrat. II. in I.} \\
 3600 \text{ Facta ex quadrat. I. in II.} \\
 3600 \text{ } \\
 27000 \text{ Cubus part. I.} \\
 \hline
 39304 \text{ Cubus totius.}
 \end{array}$$

COROLLARIUM I.

278. Cum pars dextra inter unitates, sinistra inter decades locum obtineat (§. 50); numerus cubicus dextræ in loco dextimo, factum ex triplo quadrato ejus in sinistram in secundo, factum ex triplo quadrato sinistræ in dexteram in tertio, cubus denique partis sinistræ in quarto loco terminatur (§. 49).

COROLLARIUM II.

279. Si radix multinomia fuerit, duæ vel plures notæ dextimæ pro una habentur, ut binomiæ formam mentiat; extemplo patet, quod cubus quicumque componatur ex cubis singularum partium radice & ex factis tripli quadrati quarumlibet sinisteriorum in proxime dexteriores, itemque ex factis tripli quadrati cujuslibet dexteriores in omnes sinisteriores.

SCHOLIUM II.

280. Sit radix 346. Sume 340 pro parte una radice, erit 6 pars altera, consequenter (§. 276)

I 3

346

346	
346	
90000	<i>Quadrat. part. I.</i>
12000	}
12000	
1600	<i>Quadrat. part. II.</i>
115600	<i>Quadrat. I & II simul.</i>
2040	}
2040	
36	<i>Quadrat. part. III.</i>
27000000	<i>Cubus part. I.</i>
3600000	}
3600000	
480000	<i>Fact. ex quadr. II in I.</i>
3600000	<i>Fact. ex quadr. I in II.</i>
480000	}
480000	
64000	<i>Cubus part. II.</i>
693600	}
693600	
12240	<i>F. ex quad. III in I & II sim.</i>
693600	<i>F. ex quadr. I & II sim. in III.</i>
12240	}
12240	
216	<i>Cubus part. III.</i>
41421736	<i>Cubus totius.</i>

Notandum scilicet, sectionem numeri in duas partes arbitrariam esse, cumque theorema generaliter de radice utcumque in duas partes divise loquatur, idem quoque ad quamlibet sectionem applicari posse. E. gr. numerus 346 non modo stante theoremate in 340 & 6, vel in 300 & 46, verum etiam in 195 & 151, in 89 & 257, & in duas quascunque alias partes dividi potest: id quod etiam tentanti palam fit. Ceterum idem valere in numeris quadratis, immo in genere in potentiis quibuscunque, me tacente intelligitur.

COROLLARIUM III.

281. In quibus autem locis singula terminentur facta, ex corollario primo (§. 278) colligitur: habenda nimirum & hic est ratio cyphrarum numeris in se invicem ductis adjungendarum, si solitarii ponantur. Vide exemplum in schol. præc. (§. 280).

PROBLEMA XXIX.

282. Ex numero dato radicem cubicam extrahere.

RESOLUTIO ET DEMONSTRATIO.

1. Numerus datus distinguatur in classes, tres notas unicuique assignando, initio a dextris facto. Etenim ex tot notis radix componitur, quot classes emergunt (§. 278. 281). Notandum vero, non repugnare, ut classi finitimæ una, vel duæ notæ cedant.
2. In Tabula radicum (§. 257) quaeratur numerus cubicus eo proxime minor numero, qui in classe finitima continetur, nisi ipse in eadem inveniat, atque ab hoc subtrahatur; ejus vero radix post lunulam scribatur: est enim pars prima radices (§. 274).
3. Quoti inventi quadratum triplum (§. 278. 281) scribatur sub nota finitima classis subsequenter & inde porro sinistrorsum si ex pluribus notis constiterit: quo facto quaeratur quotus, qui erit pars secunda radices (§. cit. & §. 210).
4. Divisor ducatur in novum quotum & productum sub eo deleto scribatur, sub nota vero media classis ejusdem terminetur factum ex triplo

triplo quadrato novi Quoti in præcedentem; sub dextima denique cubus novi quoti. Hæc tria facta in unam summam collecta ex notis numeri cubici superscriptis subtrahantur (§. cit.).

5. Quodsi operatio per reliquas classes juxta regulam tertiam & quartam continuetur; prodibit radix quaesita (§. 275).

E. gr.	47	437	928 (362
	27		
	20	*37	
Divisor	(2	7).	
Fact. ex D. in Q.	16	2..	
Fac. ex 3 □N. Q. in pr.	3	24.	
Cubus N. Q.		216	

Summa factor. 47 | 656

	784	928
Divisor	(388	8)..
Fact. ex Div. in Q. N.	777	6..
Fact. ex 3 □N. Q. in pr.	4	32.
Cubus N. Q.		8

Summa factorum 784 | 928

oooooo

PROBLEMA XXX

283. Radicem cubicam ex fractione extrahere, cujus numerator & denominator cubus est.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Eodem, quo supra (§. 270), modo patet, radicem sigillatim ex numeratore ac denominatore extrahendam esse.

Ita radix ex $\frac{27}{343}$ est $\frac{3}{7}$; ex $\frac{64}{729}$ vero $\frac{4}{9}$.

COROLLARIUM I.

284. Hinc porro eodem, quo supra, (§. 271), modo consequitur, radicem prope veram in fractione dati denominatoris inveniri, si numerus, qui cubus non est, per hujus denominatoris cubum multiplicetur & radici cubicæ ex facto extractæ tanquam numeratori denominator datus subjiciatur.

SCHOLIUM I.

285. E. gr. Si ex 12 extrahenda radix cubica prope vera, defectu minore quam $\frac{1}{8}$; ducatur 12 in 512 cubum ipsius 8 & ex facto 6144 extrahatur radix cubica 18, erit $\frac{18}{8}$ seu $2\frac{3}{8}$ radix prope vera, cujus defectus est minor quam $\frac{1}{8}$.

COROLLARIUM II.

286. Immo inde ulterius eodem, quo supra (§. 273), modo fuit, radicem prope veram in fractionibus decimalibus inveniri, si 3, 6, 9 &c. cyphræ numero non cubo dextrorsum pro decimis, centesimis, millesimis &c. partibus jungantur & operatio (§. 282) continuetur.

SCHOLIUM II.

287. E. gr. Sit extrahenda radix cubica ex 33 eam reperies $1\frac{44}{100}$.

$$3 \left(1\frac{44}{100} \right)$$

2.	0.0.0
	3 . .
1	2 . .
	4 8 .
	6 4

1	7 4 4
2 5 6.	0.0.0
5 8	8 . .
2 3 5	2 . .
6	7 2 .
	6 4

2 4 1 | 9 8 4

1.4 0 1 6.

SCHOLIION II.

288. Si tabulis numerorum cubicorum utaris, idem opere compendium facere licet, quod supra (§. 275) in extrahenda radice quadrata commendavimus.

PROBLEMA XXXI.

289. Examinare extractionem radice quadrata ac cubica.

RESOLUTIO.

I. Radix quadrata inventa ducatur in se ipsam & factum residuum, si quod fuerit, addatur. Quodsi numerus prodeat, ex quo radix extracta; erit numerus inventus radix quadrata dati vel exacta, vel (si talem non habeat) prope vera (§. 246).

18.57	E. gr. Radicem quadratam prope veram ex 345 supra (§. 274) reperimus
18.57	
12999	18 $\frac{57}{100}$. Duc radicem 18.
9285	57 in seipsam & factum
14856	3448449 adde residuum
1857	1551 : prodibit numerus
3448449	345, ex quo extractio fieri debebat, quatuor cyphris auctus: ut in extractione ad inveniendas centesimas factum fuerat.
1551	
3450000	

II. Radix cubica inventa ducatur in seipsam, & factum denuo in eandem. Productum posteriori addatur, si quod fuerit, residuum. Quodsi numerus prodeat, ex quo extractio facta, operatio rite peracta (§. 248).

1.44	E. gr. Superius (§. 287)
1.44	ex 3 extracta radix est $1 \frac{44}{100}$.
576	Duc hanc radicem 1.44 in seipsam & factum 20736
576	denuo in 1.44. Productum alteri 2985984 adde, quod supra residuum erat, 14016.
144	Aggregatum est radix 3 sex cyphris aucta, ut in operatione factum fuerat.
20736	
144	
82944	
82944	
20736	
2985984	
14016	
3000000	

THEOREMA LV.

290. Exponens rationis quadratorum est quadratum, cuborum cubus & in genere potentiarum cujuscunque gradus potentia ejusdem gradus exponentis radicem.

DEMONSTRATIO.

Quadrata enim habent rationem duplicatam, cubi triplicatam & in genere potentia cujuscunque gradus rationem multiplicatam suarum radicum (§. 259). Quare cum exponens rationis composita sit æqualis factum, quod producant exponentes simplicium (§. 214), exponens vero rationum simplicium, ex quibus componuntur duplicata, triplicata & in genere multiplicata quacunque, idem sit (§. 159); exponens rationis duplicatae erit quadratum (§. 246), triplicatae cubus (§. 248) & in genere multiplicatae cujuscunque potentia exponentis radicem (§. 250).
Q. e. d.

THEO-

THEOREMA LVI.

291. Si ex divisione numeri quadrati per quadratum, cubi per cubum & in genere potentia cujuscunque per aliam similem, numerus integer prodit; etiam ex divisione radice per radicem integer prodire debet.

DEMONSTRATIO.

Quotus ex divisione numeri quadrati per quadratum, cubi per cubum & in genere potentia cujuscunque per aliam similem emergens est exponens rationis quadratorum, cuborum, vel in genere potentiarum similium se mutuo dividendum (§. 136), adeoque quadratum, cubus & in genere potentia exponentis rationis radicem (§. 290). Quare cum idem sit numerus rationalis integer, per hypoth. erit idem numerus rationalis integer quadratus, cubus vel potentia alterius gradus: cujus quoniam radix itidem rationalis integer esse debet (§. 250); etiam exponens radicem numerus rationalis integer erit. Q. e. d.

COROLLARIUM.

292. Quare si radix radicem non metitur, nec quadratum quadratum, nec cubus cubum, nec potentia quæcunque aliam similem metitur (§. 74), consequenter fractio integro major ex istiusmodi quadratis, cubis vel potentiis quibuscunque similibus composita ad numerum integrum irreducibilis (§. 223).

THEOREMA LVII.

293. Si numeri integri non datur radix in integris, nec dabitur per fractos.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

DEMONSTRATIO.

Ponamus dari numerum fractum, qui sit radix. Ex ejus itaque iterata multiplicatione per seipsum produci debet numerus datus (§. 250). Sed quotiescunque fractum per seipsum multiplicas productum semper est fractus (§. 239) isque in præsentem casum ad integrum irreducibilis (§. 292). Quare cum numerus datus sit integer, ex hypoth. fractus ejus radix esse nequit. Q. e. d.

COROLLARIUM.

294. Jam cum numeri primi in se ex nullo alio numero in se aliquoties ducto orientur (§. 75); ex numeris primis in se nulla perfecta radix extrahi potest in integris (§. 256), adeoque nec per fractos dari potest (§. 293).

HYPOTHESIS XIII.

295. Interdum utile est, extractionem radice tantum indicari, præsertim si perfecta haberi nequit. Est autem signum radicale sequens $\sqrt{\quad}$: cui in vertice jungitur exponens dignitatis, si altioris gradus, quam quadrata. E. gr. \sqrt{x} denotat radicem ex 2; $\sqrt[3]{5}$ denotat radicem cubicam ex 5.

SCHOLIUM.

296. In Geometria & Analyti demonstrabitur, tales radices, quæ actu dari non possunt, esse ad unitatem ut rectam lineam ad rectam aliam, consequenter numeros (§. 10) eosque irracionales, cum ex hypothese racionales non sint. Dicuntur vulgo numeri surdi: quamvis olim hujus vocis significatus strictior fuerit (b). Et olim, & nunc interdum radicales nuncupari suserunt.

K CAPUT

(b) Vid. Siseflius in Arithm. integra lib. 2 c. 12. p. 134.

CAPUT VI.

De Regulis Proportionum.

THEOREMA LVIII.

297. **S**I fuerint quatuor quantitates proportionales; factum extremarum æquatur factò mediarum.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{r} 6 : 3 = 8 : 4 \\ \hline 4 \quad 3 \\ \hline 24 = 24 \end{array}$$
 $A : B = C : D$ (per hypoth. & §. 152). Ergo $AD : BC = CD : DC$ (§. 185.) Sed $CD = DC$ (§. 207). Igitur $AD = BC$ (§. 149). *Q. e. d.*

THEOREMA LIX.

298. Si fuerint tres quantitates continue proportionales; factum extremarum est æquale mediæ quadrato.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{r} 6 : 12 = 12 : 24 \\ \hline 12 \quad 6 \\ \hline 144 = 144 \end{array}$$
 Quoniam enim $A : B = B : C$ (per hypoth. & §. 156. 152); erit $AC = BB$ (§. 297). Sed BB est quadratum ipsius B (§. 250). Ergo factum extremarum AC æquatur quadrato mediæ. *Q. e. d.*

THEOREMA LX.

299. Si quantitas AD producta ex duabus aliis se mutuo multiplicanti- bus A & D fuerit æqualis alteri BC ex duabus aliis B & C eodem modo productæ; erit $A : B = C : D$.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{r} 6 \quad 8 \\ 4 \quad 3 \\ \hline 24 = 24 \\ 4 : 8 = 3 : 6 \end{array}$$
 $AC : AD = C : D$ (§. 178). Sed $AD = BC$, per hypoth. Ergo $AC : BC = C : D$ (§. 168), consequenter $A : B = C : D$ (§. 181). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

300. Si ergo in serie quatuor quantitarum factum ex secunda in tertiam æquale sit factò ex prima in quartam; erunt quantitates istæ proportionales.

PROBLEMA XXXII.

301. Inter duos numeros (8 & 72) medium proportionalem invenire.

RESOLUTIO.

1. Datorum unus 72 multiplicetur per alterum 8 (§. III).
2. Ex factò 576 extrahatur radix quadrata 24 (§. 269): quæ erit numerus quæsitus (§. 298).

PROBLEMA XXXIII.

302. Datis tribus numeris 3, 12, 5 quartum; aut duobus, tertium proportionalem invenire.

RESOLUTIO.

1. Secundus 12 ducatur in tertium 5, aut in altero casu secundus in seipsum.
2. Factum 60 dividatur per primum 3. Quotus 20 est quartus, in altero casu tertius quæsitus.

DEMONSTRATIO.

Si enim terminum secundum per tertium, aut in altero casu secundum per seipsum multiplicas; factum ex primo in quartum, in casu altero ex primo in tertium prodit (§.297.298). Quodsi ergo hoc per primum dividis; quotus est terminus quartus, in casu altero tertius (§. 210). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

303. Data qualibet fractio converti potest in aliam æqualem datæ denominationis. Quodsi enim per *probl. præf.* ad denominatorem & numeratorem fractionis datæ atque denominatorem desideratæ quæratu numerus quartus proportionalis; erit is numerator fractionis quæsitæ (§. 223).

E. gr. sit fractio $\frac{2}{3}$ convertenda in aliam — 2 — 24 am cujus denominatorem 24, reperietur ea — $\frac{16}{24}$.

48
48 (16
24

COROLLARIUM II.

304. Quodsi numerus partium, in quas integrum aliquod communi more dividitur, pro denominatore assumitur; valor fractionis datæ in mensura vulgari reperitur. E. gr. Cum apud nos thalerus in 24 grossos dividatur, ex ante allato exemplo apparet, 16 grossos æquivalere duabus tertiis unius thaleri.

COROLLARIUM III.

305. Si vero denominator assumitur 10, 100, 1000 &c. fractiones datæ in decimales convertuntur. Ita reperiemus $\frac{2}{3} = \frac{666666}{1000000}$ &c. in infinitum; $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$; $\frac{3}{7} = \frac{42857}{100000}$ fere.

SCHOLIUM I.

306. In fractionibus decimalibus denominator omitti solet, quia ex micris cyphris & præfixa unitate constat. Ejus vero loco punctum (.) numeratori præfigitur & loca vacua replentur cyphra, ita ut e. gr. duæ cyphræ præponantur, si fractio millesimis incipiat. Ita loco $\frac{23}{100}$ scribimus 0. 23; loco $5\frac{47}{10000}$ scribimus 5. 0047. Est vero harum fractionum non exiguus in Mathesi usus, quas primus in condendis Tabulis sinuum adhibuit Johannes Regiomontanus.

SCHOLIUM II.

307. Resolutio hujus problematis vulgo Regula trium appellatur, quia ex tribus numeris invenitur quartus. Usus ejus amplissimus tam in vita communi, quam in scientiis. Hinc Regula aurea vocatur. Facile autem apparet, hac regula nullibi esse utendum, nisi ubi de numerorum datorum proportionem constiterit. E. gr. Sit vas ingens aqua repletum per exiguum in fundo foramen effluxura, si aperiatur. Ponamus, intra 2 minuta prima effluere 3 congios. Inveniri debet, quanto tempore 100 congii effluant. Tres in hoc casu dantur numeri, quartus inveniendus. Enimvero vel ipsa experientia docet, aquam sub initium celerius, postea tardius effluere, consequenter quantitatem aquæ effluentis non esse tempori proportionalem. Quamobrem hæc questio per Regulam trium solvi nequit.

SCHOLIUM III.

308. Quæ in commercium veniunt, pretiis suis proportionalia sunt. Qui enim duplum mercis accipit, duplum; qui triplum accipit, triplum pretium solvit. Dato igitur pretio quantitatis cujusdam determinatæ mercis, per Regulam trium invenitur pretium quantitatis cujuscumque alterius datæ, aut quantitas mercis dato cuicunque alteri pretio respondens. E. gr. pretium 3 librarum sunt 4 thaleri, quantum est

pretium 17 librarum? Cum sit, ut 3 libræ ad 17 libras, ita illarum pretium (quod est 4 thalerorum) ad pretium harum; hoc quidem ita invenitur:

$$\begin{array}{r} 3 \text{ L.} \text{ --- } 17 \text{ L.} \text{ --- } 4 \text{ Th.} \\ \quad \quad \quad 4 \quad \quad \quad 2 \\ \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \\ \quad \quad \quad 68 \quad \quad \quad 33 \quad \quad \quad \left(22\frac{2}{3} \text{ th.} \right) \end{array}$$

Item: 3 libræ veniunt 4 thaleris, quot 22 $\frac{2}{3}$ thaleris? Cum sint ut 4 thaleri ad 22 $\frac{2}{3}$, ita 3 libræ ad quæsitas; harum numerus ita innotescit:

$$\begin{array}{r} 4 \text{ Th.} \text{ --- } 22\frac{2}{3} \text{ Th.} \text{ --- } 3 \text{ L.} \\ \quad \quad \quad 3 \quad \quad \quad 2 \\ \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \\ \quad \quad \quad 68 \quad \quad \quad ** \quad \quad \quad \left(17 \text{ L.} \right) \end{array}$$

Hinc simul patet, quomodo Regula trium examinetur, hoc est, inveniatur, utrum operatio per eam rite perfecta, nec ne.

SCHOLIION IV.

309. Similiter merces operariorum est tempori proportionalis, quo labore defunguntur; etiam quantitas laboris eidem tempori proportionalis, si aequalibus articulis aequalia pensa absolvuntur; eadem numero operariorum pensa proportionalis, si pensa aequalia singuli absolvunt. E. gr. Intra 2 horas 6 libri folia perleguntur: Quanto horarum spatio 360 perlegi poterunt?

$$\begin{array}{r} 6 \text{ F.} \text{ --- } 360 \text{ F.} \text{ --- } 2 \text{ H.} \\ \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad 2 \\ \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \\ \quad \quad \quad 720 \quad \quad \quad 666 \quad \quad \quad \left(120 \text{ H.} \right) \end{array}$$

SCHOLIION V.

310. Si numeri dati fuerint heterogenei, non eandem proportionem habent, quam res ipsis respondentes: ad homogeneos igitur reducendi. Ita thaleri in grossos, grossi in nummos, libræ in semuncias, horæ in

minuta &c. convertuntur. E. gr. 3 libræ & 4 semuncia veniunt 2 thaleris & 4 grossis, quanti libræ 2? Calculus talis est

$$\begin{array}{r} 3 \text{ L.} \text{ 4 S.} \text{ --- } 2 \text{ L.} \text{ --- } 2 \text{ Th.} \text{ 4 gr.} \\ 32 \quad \quad \quad 32 \quad \quad \quad 24 \\ \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \end{array}$$

$$100 \text{ S.} \text{ --- } 64 \text{ S.} \text{ --- } 52 \text{ gr.}$$

$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad 128 \\ 320 \quad \quad \quad 3328 \\ \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \\ 3328 \quad \quad \quad 3328 \quad \quad \quad \left(33\frac{28}{100} \text{ seu } \frac{7}{25} \text{ gr.} \right) \end{array}$$

Quodsi nosse cupias, quot nummis conveniunt $\frac{7}{25}$ grossi, ita reperies (S. 304)

$$25 \text{ --- } 7 \text{ --- } 12$$

$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad 7 \quad 29 \\ \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \quad \text{---} \\ \quad \quad \quad 84 \quad 28 \quad \quad \quad \left(3\frac{29}{25} \text{ num.} \right) \end{array}$$

Si nummus ulterius divideretur, poterat quæque valor $\frac{29}{25}$ unius nummi eodem modo reperiri: sed cum tanti non sit, ut inveniatur, fractio illa tuto negligitur.

SCHOLIION VI.

311. In scriptis Arithmeticoꝝ Regula trium inversa occurrit, qua terminus datorum primus duci jubetur in secundum & factum dividi per tertium, contraria nimirum ratione, qua in Regula trium directa usi sumus (S. 302), quia scilicet termini contra naturam proportionis ordinantur. Sed ea opus non est, si numeri dati, prout proportio exigit, ordinentur. E. gr. 125 milites operi exstruendo 6 menses impendunt: quantus requiritur militum numerus, ut intra 2 absolvatur. Evidens est, quod sit, ut spatium 2 mensium ad spatium 6 mensium, ita numerus militum, qui opus intra sex menses absolvunt, ad numerum militum, qui intra duos idem exstruunt. Quo minore enim temporis intervallo exstrui-

zur, eo major militum numerus requiritur.
En calculi typum :

$$\begin{array}{r}
 2\text{ M.} \text{ --- } 6\text{ M.} \text{ --- } 125\text{ Mil.} \\
 \phantom{2\text{ M.} \text{ --- } 6\text{ M.} \text{ --- }} \phantom{2\text{ M.} \text{ --- } 6\text{ M.} \text{ --- }} \phantom{2\text{ M.} \text{ --- } 6\text{ M.} \text{ --- }} 6 \\
 \hline
 \text{††} \phantom{2\text{ M.} \text{ --- } 6\text{ M.} \text{ --- }} \phantom{2\text{ M.} \text{ --- } 6\text{ M.} \text{ --- }} 750 \\
 750 \text{ (} 375\text{ Mil.} \\
 222 \text{)}
 \end{array}$$

SCHOLION VII.

312. Interdum gemina Regula trium applicatione opus est, antequam numerus quaesitus innotescat. Ea vulgo pro peculiari Regula venditur & ab aliis Regula de quinque, ab aliis Regula composita appellatur. E. gr. 300 thaleri dant intra 2 annos usuram 36 thalerorum, quantam dabunt 20000 thaleri intra 12 annos. Hic per Regulam trium primum invenitur, quanta sit usura a 20000 expectanda intra 2 annos. Dein per eandem investigatur, quanta eadem intra 12 annos existat :

$$\begin{array}{r}
 300\text{ Th.} \text{ --- } 20000\text{ Th.} \text{ --- } 36\text{ Uf.} \\
 \phantom{300\text{ Th.} \text{ --- } 20000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{300\text{ Th.} \text{ --- } 20000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{300\text{ Th.} \text{ --- } 20000\text{ Th.} \text{ --- }} 36 \\
 \hline
 \phantom{300\text{ Th.} \text{ --- } 20000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{300\text{ Th.} \text{ --- } 20000\text{ Th.} \text{ --- }} \text{†} \\
 720000 \text{ } 720000 \text{ (} 2400\text{ Uf.} \\
 222200 \text{)} \\
 2\text{ A.} \text{ --- } 12\text{ A.} \text{ --- } 2400\text{ Uf.} \\
 \phantom{2\text{ A.} \text{ --- } 12\text{ A.} \text{ --- }} \phantom{2\text{ A.} \text{ --- } 12\text{ A.} \text{ --- }} \phantom{2\text{ A.} \text{ --- } 12\text{ A.} \text{ --- }} 12 \\
 \hline
 28800 \text{ (} 14400\text{ Uf.} 4800 \\
 222 \text{)} 24 \\
 \hline
 28800
 \end{array}$$

SCHOLION VIII.

313. Exemplis istiusmodi Regula trium semel applicata satisfacere pot. Cum enim in nostro casu bis 300 thaleri eandem dent usuram intra 1 annum, quam 300 intra 2, & duodecies 20000 tantam intra 1 annum,

quanta 20000 intra 12; omiffis temporis circumstantiis ita inferatur: bis 300, id est 600 thaleri dant usuram (intra annum scilicet) 36, quantam dabunt duodecies 20000, id est 240000 thaleri (itidem intra annum?)

$$\begin{array}{r}
 600\text{ Th.} \text{ --- } 240000\text{ Th.} \text{ --- } 36\text{ uf.} \\
 \phantom{600\text{ Th.} \text{ --- } 240000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{600\text{ Th.} \text{ --- } 240000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{600\text{ Th.} \text{ --- } 240000\text{ Th.} \text{ --- }} 36 \\
 \hline
 1440000 \text{ } 22 \\
 72 8640000 \text{ (} 14400 \\
 6666600 \text{)} \\
 8640000
 \end{array}$$

Posterior hac methodus priori praefertur; quod in illa ad fractionum tadia saepe prolabimur.

SCHOLION IX.

314. Dantur & alii casus, in quibus iterata Regula trium applicationi supersedere non licet. Ita, si commune sociorum lucrum vel damnum inter eos distribuendum, toties applicatur, quot sunt socii. Est enim ut summa collatorum ad lucrum vel damnum commune, ita collatum quodlibet partiale ad lucrum vel damnum partiale ipsi respondens. E. gr. Lucrum commune trium personarum est 2000 thalerorum, collatum primi 1000, secundi 500, tertii 300: inveniri debent lucra partialia singulis convenientia. En typum calculi:

$$\begin{array}{r}
 \text{Collatum primi } 1000\text{ Th.} \\
 \text{secundi } 500 \\
 \text{tertii } 300 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Summa Collatorum } 1800\text{ Th.} \\
 1800\text{ Th.} \text{ --- } 1000\text{ Th.} \text{ --- } 2000\text{ Th.} \\
 \phantom{1800\text{ Th.} \text{ --- } 1000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{1800\text{ Th.} \text{ --- } 1000\text{ Th.} \text{ --- }} \phantom{1800\text{ Th.} \text{ --- } 1000\text{ Th.} \text{ --- }} 2 \phantom{1800\text{ Th.} \text{ --- } 1000\text{ Th.} \text{ --- }} 000 \\
 \hline
 2000000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{†††} \\
 \text{†††††} \\
 \text{2000000} \left(\text{IIII} \frac{2}{18} \text{ Lucrum primi,} \right. \\
 \text{†88800} \\
 \text{†††} \\
 1800 \text{ Th. — } 500 \text{ Th. — } 2000 \text{ Th.} \\
 \underline{\quad 2 \quad 000} \\
 \hline
 100000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{†††} \\
 \text{†††} \\
 \text{†000000} \left(555 \frac{10}{18} \text{ Lucrum secundi.} \right. \\
 \text{†88800} \\
 \text{††} \\
 1800 \text{ Th. — } 300 \text{ Th. — } 2000 \text{ Th.} \\
 \underline{\quad 2 \quad 000} \\
 \hline
 600000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{33} \\
 \text{3666} \\
 \text{600000} \left(333 \frac{6}{81} \text{ Lucrum tertii.} \right. \\
 \text{†88800} \\
 \text{††}
 \end{array}$$

EXAMEN.

$$\begin{array}{r}
 \text{IIII} \frac{2}{18} \text{ Lucrum primi} \\
 555 \frac{10}{18} \text{ secundi} \\
 333 \frac{6}{81} \text{ tertii} \\
 \hline
 2000 \text{ Th. Lucrum commune.}
 \end{array}$$

SCHOLIION X.

315. Non desunt alia exempla, quæ calculum eundem requirunt, ut cum in Medicina aut artibus aliis ex data ratione, quam pondera miscibilium inter se habent, inveniuntur pondera miscibilium requisita, ut mixtum integrum sit ponderis dati. E. gr. Tria simplicia compositionem alicujus medicamenti ingrediuntur, dosis unius est 4, alterius 5, tertii 2 unciarum: inveniri debent doses singulorum requisitæ, ut pondus compositi sit 8 librarum. En calculi typum:

$$\begin{array}{r}
 \text{Pondus} \left\{ \begin{array}{l} \text{primi} \\ \text{secundi} \\ \text{tertii} \end{array} \right\} \text{ simplicis} \begin{array}{l} 4 \text{ Unc.} \\ 5 \\ 2 \end{array} \\
 \hline
 \text{Summa } 11 \text{ Unc.} \\
 11 \text{ Unc. — } 8 \text{ L. — } 4 \text{ Unc.} \\
 \underline{\quad 16} \\
 \hline
 128 \text{ Unc. } † \\
 \quad 4 \quad †76 \\
 \hline
 512 \quad ††† \left(46 \frac{6}{11} \text{ Pond.} \right. \\
 \quad \quad \quad \left. \text{simp. primi} \right. \\
 \quad \quad \quad † \\
 11 \text{ Unc. — } 128 \text{ Unc. — } 5 \text{ Unc.} \\
 \quad 5 \quad † \\
 \hline
 \quad \quad \quad †92 \\
 640 \quad 640 \left(58 \frac{2}{11} \text{ pond. simp.} \right. \\
 \quad \quad \quad ††† \quad \quad \quad \left. \text{secund.} \right. \\
 \quad \quad \quad † \\
 11 \text{ Unc. — } 128 \text{ Unc. — } 2 \text{ Unc.} \\
 \quad 2 \quad 33 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 256 \quad ††† \left(23 \frac{2}{11} \text{ Pond. simp.} \right. \\
 \quad \quad \quad 256 \quad ††† \quad \quad \quad \left. \text{tertii.} \right. \\
 \quad \quad \quad †
 \end{array}$$

EXAMEN.

$$\begin{array}{r}
 \text{Pondus simplicis primi } 46 \frac{6}{11} \text{ Unc.} \\
 \text{secundi } 58 \frac{2}{11} \\
 \text{tertii } 23 \frac{2}{11} \\
 \hline
 \text{Pondus mixti } 128 \text{ Unc.} = 8 \text{ lib.}
 \end{array}$$

SCHOLIION XI.

316. Subinde compendiis locus datur, quæ Practicæ Italicæ nomen ferunt. Ex iis utilissima commemoramus. Nimirum quoniam per Regulam trium ad tres numeros datos invenitur quartus proportionalis (S. 302), primus & secundus (S. 181) vel etiam primus & tertius (S. 183) per eundem, si fieri potest, numerum exacte dividantur & quoti in ipsorum loca surrogentur: ceu ex subsequente apparet exemplo.

Pre-

Pretium 3 Lib. est 9 Thal. quantum 7 libr.
 3) 1 3

Fac. 21 Thal.

Pretium 14 Lib. est 26 Thal. quant. 7 libr.
 7) 2 2)--- 1
 Fac. 13 Thal.

SCHOLIION XII.

317. Si numerus primus vel tertius fuerit
 1 & alter eorum non nimis magnus, medius
 autem heterogeneus, absque reductione in
 Schol. 5 (S. 310) praescripta calculus ini-
 tur; ut sequens exemplum docet.
 Pret. 1 Lib. est 3 th. 8 gr. 6 num. quant. 5 L.

$$\frac{5}{16 \text{ th. } 18 \text{ gr. } 6 \text{ num.}}$$

Manifestum scilicet est, bis 6 nummos con-
 ficere grossum unum, adeoque quinqies 6,
 grossos 2 & nummos 6. Similiter ter 8 gros-
 si thalerum 1. & insuper bis 8 grossos 16
 efficiunt. Quod si ergo thalerus iste 15 reli-
 quis, & 2 priores grossi 16 reliquis addan-
 tur; prodibit pretium quaesitum 16 th. 18
 gr. 6. num.

SCHOLIION XIII.

318. Si terminus primus vel secundus fue-
 rit 1, & in priore casu secundus aut tertius,
 in posteriore primus in factores resolvi po-
 test; integram saepe operationem sine scrip-
 tionis subsidio mens absolvit: id quod exem-
 pla, quae sequuntur, docent.

Pretium 1 Libr. est 24 th. quantum 20 libr.
 4 4
 6

$$\frac{80}{6}$$

Fac. 480 th.

Pretium 12 libr. est 18 th. quantum 1 libr.
 3 2
 4 18 (6 (1 1/2 th.
 2 *

Potest etiam numerus datus resolvi partim
 in factores, partim in partes componentes. E.
 gr. 1. libra constat 9 grossis, quodnam est pre-
 tium 35. librarum?

Quoniam 1 libra constat 9 grossis

constabunt	3 lib.	1 thal.	3 gr.
	30 lib.	11 thal.	6 gr.
	5 lib.	1 thal.	21 gr.
	35 lib.	13 thal.	9 gr.

Hic nempe numerus 35, per quem multipli-
 catio fieri debet, resolvitur in partes 30 &
 5, pars vero altera 30 in factores 3 & 10.

SCHOLIION XIV.

319. Si numerorum datorum unus fuerit
 1, multa compendia similia multiplicatio &
 divisio sine abaci Pythagorici subsidio pera-
 genia (S. 116. 120), suppeditat. E. gr.
 pretium 9 librarum est 20 thalerorum, quan-
 tum est pretium unius? Statim hic apparet,
 haberi pretium desideratum, si parti decima
 illius, id est 2 thaleris, addatur pars nona
 huius decimae, id est, 2/5 unius thaleri, ut
 adeo niveniatur 2 2/5 thal. Item: Pretium 5
 librarum est 54 thalerorum, quantum erit
 pretium 1 librae? R. Quoniam pretium qua-
 situm est quinta pars dati, duplum partis de-
 cima pretii dati 10 4/5 thal. erit quaesitum.
 Item: Pretium 1 librae est 18 grossorum;
 quantum erit librarum 19? R. Quoniam
 19 = 20 - 1, a duplo pretii dati cyphra
 aucti 360 subducatur simplum 18, resi-
 duum erit pretium 342 grossorum quaesitum.

SCHOLIION XV.

320. Si duo termini ejusdem denominatio-
 nis unitate differant, singulari quodam com-
 pendio utimur, quod ex subjunctis exem-
 plis manifestum. E. gr. Pretium 5 libra-
 rum est 30 thalerorum, quantum erit 4 li-
 brarum? R. Quoniam pretium 4 librarum
 una parte quinta deficere debet a pretio 5
 librarum; pretium datum 30 dividatur per
 5

5 & quotus 6 ab eodem subtrahatur, relinquitur questum 24. Item: pretium 8 librarum est 24 thalerorum, quantum erit librarum 9? R. Quia pretium 9 librarum una parte octava excedit pretium 8 librarum, pretium datum 24 dividatur per 8 & quotus 3 eidem addatur, summa 27 erit questum.

SCHOLIUM XVI.

321. Nonnunquam compendiis pluribus una uti datur. E. gr.

Pret. 100 libr. est 30 th. 4 gr. quant. 50 lib.

$$\begin{array}{r} 50) 2. \\ \text{Fac. } 2) \quad \text{---} \\ 15 \text{ th. } 2 \text{ gr.} \end{array}$$

It: Pret. 60 libr. est 80 th. quant. 2520 lib.

$$\begin{array}{r} 60) \quad 1 \quad 6 \quad 42 \\ \quad \text{---} \quad \text{---} \\ \quad 480 \quad 6 \\ \quad \quad 7 \quad 7 \\ \quad \quad \text{---} \quad \text{---} \end{array}$$

Fac, 3360 thal.

CAPUT VII.

De Quantitatibus Æquidifferentibus.

DEFINITIO LXI.

322. SI in serie trium quantitatum eadem fuerit differentia primæ & secundæ, quæ secundæ ac tertiæ; eas continue æquidifferentes voco. Si vero in serie quatuor eadem fuerit differentia primæ & secundæ, quæ tertiæ ac quartæ, discretim æquidifferentes appello. Ita 3, 6, 7 & 10 sunt numeri discretim æquidifferentes: 3, 6, & 9 numeri continue æquidifferentes.

SCHOLIUM.

323. Dicuntur hæ quantitates vulgo Arithmetice proportionales, (& vere proportionales, de quibus ante, Geometricæ proportionales appellari solent, ut ab iis distinguantur:) sed minus proprie, nec ad mentem veterum.

COROLLARIUM I.

324. Si termini semper crescunt, in continue æquidifferentibus terminus secun-

us est aggregatum ex primo & differentia; tertius summa ex secundo & differentia: si decrescunt, primus est aggregatum ex secundo & differentia; secundus aggregatum ex tertio & differentia (§. 106).

COROLLARIUM II.

325. Similiter in discretim æquidifferentibus si termini crescunt, secundus est aggregatum ex primo & differentia, quartus ex tertio & differentia: si vero decrescunt, primus est aggregatum ex secundo & differentia; tertius ex quarto & differentia (§. 106).

THEOREMA LXI.

326. Si fuerint tres quantitates continue æquidifferentes, summa primi & tertii est medii dupla.

DEMONSTRATIO.

4. 7. 10 Si enim termini
7 4 crescunt, secundus
componitur ex primo & differentia,
tertius ex secundo &

differentia (§. 324), adeoque ex primo

mo

mo & differentia dupla. Quare si tertio addatur primus ; summa primi & tertii constabit ex primo duplo & differentia dupla. Erit adeo secundi dupla. *Q. e. d.*

Eodem modo demonstratio procedit, si termini decrefcunt.

SCHOLI ON.

327. Si terminus primus sit I, secundus II, tertius III, differentia D ; demonstratio ocularis erit istiusmodi :

$$\begin{array}{l} \text{II} = \text{I} + \text{D} \\ \text{III} = \text{II} + \text{D} \end{array}$$

Ergo $\text{III} = \text{I} + 2\text{D}$

Hinc $\text{III} + \text{I} = 2\text{I} + 2\text{D}$
 $= 2\text{II}.$

THEOREMA LXII.

328. Si fuerint quatuor quantitates æquidifferentes, summa primi & quarti æqualis est summæ secundi & tertii.

DEMONSTRATIO.

$$\begin{array}{r} 3-5 = 8-10 \\ 8 \quad 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Si termini crescunt,} \\ \text{secundus componitur} \\ \text{ex primo \& differentia} \\ \text{ex primo \& differentia} \\ \text{quartus ex tertio} \\ \text{\& differentia (\S. 325).} \end{array}$$

Quare si primus quarto addatur, aggregatum ex primo, tertio & differentia constat : Si vero secundum tertio addas, aggregatum ex primo, differen-

tia & tertio componitur. Sunt ergo aggregata inter se æqualia (§. 88).
Q. e. d.

Eodem modo demonstratio procedit, si consequentes termini fuerint antecedentibus minores.

SCHOLI ON.

329. Si terminus primus sit I, secundus II, tertius III, quartus IV, differentia D ; demonstratio ocularis erit istiusmodi :

$$\begin{array}{ll} \text{II} = \text{I} + \text{D} & \text{IV} = \text{III} + \text{D} \\ \text{III} \quad \text{III} & \text{I} \quad \text{I} \end{array}$$

$$\text{II} + \text{III} = \text{III} + \text{I} + \text{D} \quad \text{IV} + \text{I} = \text{I} + \text{III} + \text{D}$$

PROBLEMA XXXIV.

330. Inter duos numeros 9 & 13 medium æquidifferentem invenire.

RESOLUTIO.

1. Addantur numeri dati 9 & 13.
2. Summa 22 dividatur bifariam sive per 2. Quotus 11 erit numerus quæsitus (§. 326).

PROBLEMA XXXV.

331. Datis tribus numeris 8, 5, 9, quartum æquidifferentem invenire.

RESOLUTIO.

1. Numerus secundus 5 addatur tertio 9.
2. A summa 14 subtrahatur primus 8. Residuus 6 est quartus quæsitus. (§. 328).

CAPUT VIII.

De Logarithmis.

DEFINITIO LXII.

332. **S**eries quantitatum juxta eandem rationem crescentium vel decrescentium vocatur *Progressio Geometrica*. E. gr. 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128, vel 729. 243. 81. 27. 9. 3. 1.

DEFINITIO LXIII.

333. Series quantitatum secundum eandem differentiam crescentium vel decrescentium dicitur *Progressio Arithmetica*. E. gr. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30 vel 32. 28. 24. 20. 16. 12. 8. 4.

DEFINITIO LXIV.

334. Si numeris in ratione Geometrica progredientibus subscribantur totidem alii æquidifferentes; dicuntur hi illorum *Logarithmi*: *Stifelius* in Arithmetica sua (a) *Exponentes* vocat. E. gr. sint duæ progressiones: Geom. 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. Arith. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. erit 0 logarithmus termini primi 1; 5 logarithmus sexti 32; 7 logarithmus octavi 128 &c.

COROLLARIUM I.

335. Si progressio arithmetica fuerit series numerorum naturalium & a cyphra incipiat, ut in exemplo allato; logarithmi designant distantias numerorum proportionalem ab unitate.

(a) Lib. 3. c. 5. p. 249. b.

COROLLARIUM II.

336. Cumque in progressionem geometricam ab unitate incipiente termini sint dignitates ordine naturali se mutuo excipientes (§. 250. 332), si progressio arithmetica eadem sit, quæ in exemplo allato, logarithmi sunt exponentes dignitatum (§. 251). E. gr. 2 est dignitas prima, ejusque exponens 1; 64 dignitas sexta, ejusque exponens 6.

THEOREMA LXIII.

337. Si *Logarithmus unitatis* sit 0; erit *logarithmus facti æqualis aggregato ex logarithmis efficientium*.

DEMONSTRATIO.

Est enim ut unitas ad factorem unum ita, factor alter ad factum (§. 66). Quare logarithmus facti est æquidifferentium quartus ad logarithmum unitatis & logarithmos efficientium (§. 334), adeoque differentia inter logarithmum unitatis & summam logarithmorum efficientium (§. 331). Sed logarithmus unitatis est 0, *per hypoth.* Ergo summa ex logarithmis efficientium est logarithmus facti. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

338. Cum factores quadrati sint inter se æquales, hoc est, quadratum sit factum ex radice in seipsam (§. 246); logarithmus quadrati est duplus logarithmi radicis.

COROL-

COROLLARIUM II.

339. Eodem modo patet, logarithmum cubi esse triplum (§. 248); biquadrati quadruplum; potentiae quintae quintuplum; sextae sextuplum &c. logarithmi radiceis (§. 250).

COROLLARIUM III.

340. Est ergo unitas ad exponentem dignitatis, ut logarithmus radiceis ad logarithmum potentiae seu ipsius dignitatis (§. 251. 255).

COROLLARIUM IV.

341. Quare logarithmus potentiae prodit, si logarithmum radiceis multiplices per exponentem ejus (§. 65); adeoque logarithmus radiceis habetur, si logarithmus dignitatis per ejus exponentem dividatur (§. 210).

SCHOLION.

342. E. gr. 3 summa logarithmorum 1 & 2 est logarithmus producti 8 ex 2 in 4. Similiter 7 summa logarithmorum 2 & 5 est logarithmus producti 128 ex 4 in 32. Porro 3 logarithmus radiceis quadratae 8 est dimidius logarithmi 6 quadrati 64, & 2 logarithmus radiceis cubicae 4 est subtriplex logarithmi 6 cubi 64.

THEOREMA LXIV.

243. Si logarithmus unitatis est 0, erit logarithmus quoti aequalis differentiae logarithmorum divisoris & dividendi.

DEMONSTRATIO.

Est enim ut divisor ad dividendum ita unitas ad quocum (§. 69). Quare logarithmus quoti est æquidifferentium quartus ad logarithmos divisoris & dividendi atque logarithmum unitatis (§. 334) adeoque differentia inter logarithmum divisoris & summam logarithmorum dividendi & unitatis (§. 331). Sed logarithmus unitatis est 0, per *Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.*

hypoth. Ergo differentia logarithmi divisoris a logarithmo dividendi est logarithmus quoti. *Q. e. d.*

SCHOLION I.

344. E. gr. 2 differentia inter 7 & 5 est logarithmus quoti 4 ex 128 per 32. Similiter 5 differentia inter 8 & 3 est logarithmus quoti 32 ex 256 per 8.

SCHOLION II.

345. Progressiones arithmeticas cum geometricis confert, logarithmorum proprietates hactenus recensitas recenset, atque varios eorum usus monstrat Stifelius (a): qui tamen longe cedunt usui logarithmorum in Trigonometria a Justo Byrgio primum reperto (b), sed a Johanne Nepere supra laudato primum ostenso (c).

PROBLEMA XXXVI.

346. Numeri cujuscunque logarithmum invenire ac Canonem logarithmorum pro numeris naturalibus construere.

RESOLUTIO.

I. Quoniam I. 10. 100. 1000. 10000 &c. Progressionem Geometricam constituunt (§. 332); eorum logarithmi arbitrario assumi possunt, modo sint numeri in Progressione Arithmetica progredientes (§. 334). Ut igitur intermediorum logarithmos per fractiones decimales exprimere liceat; assumantur 0. 00000000, 1. 00000000, 2. 00000000, 3. 00000000, 4. 00000000 &c.

L 2 2. Equi-

(a) In Arithmet. lib. 1. c. 4. p. 35. & seqq. & lib. 3. c. 5. p. 249. b. & 50. (b) Keplerus in Tabulis Rudolphinis c. 3. f. 11. (c) In Mirifici Logarithmorum Canonis descriptione.

2. Equidem manifestum est, (§. 334) numerorum, qui in scala progressionis geometricæ non continentur, logarithmos accuratos haberi non posse; adeo tamen veris propinquos reperire licet, ut, si usum spectes, accuratis æquipolleant. Quod ut appareat, ponamus inveniendum esse logarithmum novenarii seu 9. Inter 1. 0000000 & 10. 0000000 quæraturs medius proportionalis C (§. 301) & inter eorum logarithmos 0. 0000000 atque 1. 0000000 medius æquidiferens (§. 330), qui erit logarithmus ipsius C (§. 334), hoc est, numeri ternarium superantis $\frac{1622777}{10000000}$ adeoque a novenario multum distantis. Quæraturs inter B & C alius medius proportionalis D, qui ad novenarium propius accedit, & inter B

& D adhuc alius E & ita porro aliū inter numeros novenario proxime majores & minores, donec tandem reperiatur 9. 0000000, hoc est, $9\frac{0000000}{10000000}$ (§. 305): qui, cum a novenario ne unica quidem particula millionesima differat; ejus logarithmus citra errandi periculum pro logarithmo novenarii habetur. Error enim semper minor esse debet unica millionesima. Quaranturs itaque in quolibet casu logarithmi mediorum proportionalium & ita habebitur tandem logarithmus novenarii prope verus 0. 95424251.

3. Si eodem modo inter A & C numeros medios proportionales quæras & convenientes logarithmos singulis assignes, inveniatur tandem logarithmus numeri 2 & ita porro.



CALCULI TYPUS

	Numeri medii proportionales.	Logarithmi.		Numeri medii proportionales.	Logarithmi.
A	1.0000000	0.0000000	O	9.0021388	0.95434570
B	3.1622777	0.5000000	Q	9.0008737	0.95428467
C	10.0000000	1.0000000	P	8.9996088	0.95422363
B	10.0000000	1.0000000	Q	9.0008737	0.95428467
D	5.6234132	0.7500000	R	9.0002412	0.95425415
C	3.1622777	0.5000000	P	8.9996088	0.95422363
B	10.0000000	1.0000000	R	9.0002412	0.95425415
E	7.4989421	0.8750000	S	8.9999250	0.95421889
D	5.6234132	0.7500000	P	8.9996088	0.95422363
B	10.0000000	1.0000000	R	9.0002412	0.95425415
F	8.6596432	0.9375000	T	9.0000831	0.95424652
E	7.4989421	0.8750000	S	8.9999250	0.95423889
B	10.0000000	1.0000000	R	9.0002412	0.95425415
G	9.3057204	0.9687500	V	9.0000041	0.95424271
F	8.6596432	0.9375000	S	8.9999250	0.95423889
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
G	9.3057204	0.9687500	V	9.0000041	0.95424271
H	8.9768713	0.9531250	X	8.9999650	0.95424080
F	8.6596432	0.9375000	S	8.9999250	0.95423889
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
G	9.3057204	0.9687500	V	9.0000041	0.95424271
I	9.1398170	0.9609375	Y	8.9999845	0.95424217
H	8.9768713	0.9531250	X	8.9999650	0.95424080
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
I	9.1398170	0.9609375	V	9.0000041	0.95424271
K	9.0579777	0.95703125	Z	8.9999943	0.95424223
H	8.9768713	0.9531250	Y	8.9999845	0.95424217
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
K	9.0579777	0.95703125	V	9.0000041	0.95424271
L	9.0173333	0.95507812	a	8.9999992	0.95424247
H	8.9768713	0.9531250	Z	8.9999943	0.95424223
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
L	9.0173333	0.95507812	V	9.0000041	0.95424271
M	8.9970796	0.95410156	b	9.0000016	0.95424259
H	8.9768713	0.9531250	a	8.9999992	0.95424247
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
L	9.0173333	0.95507812	b	9.0000016	0.95424259
N	9.0072008	0.95458984	c	9.0000004	0.95424253
M	8.9970796	0.95410156	a	8.9999992	0.95424247
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
N	9.0072008	0.95458984	c	9.0000004	0.95424253
O	9.0021388	0.95434570	d	8.9999998	0.95424250
M	8.9970796	0.95410156	a	8.9999992	0.95424247
B	10.0000000	1.0000000	T	9.0000831	0.95424652
O	9.0021388	0.95434570	c	9.0000004	0.95442253
P	8.9996088	0.95422363	e	9.0000000	0.95424251
M	8.9970796	0.95410156	d	8.9999998	0.95424250

4. Enim vero non opus est, ut omnium numerorum logarithmi tanto labore investigentur: compositi enim cum per alios numeros dividi possint (§.76), adeoque & ex aliis se mutuo multiplicantibus (§. 212) oriantur, eorum logarithmi *per Theor. 63 & 64.* (§.337 & *seqq.*) inveniuntur. E. gr. si logarithmus numeri 9 bifecetur, prodit logarithmus 0. 47712125 numeri 3 (§. 338).

COROLLARIUM.

347. Characteristica igitur logarithmorum pro numeris ab 1 ad 10 est 0, pro numeris a 10 ad 100 est 1, pro numeris a 100 ad 1000 est 2 &c.

SCHOLIUM.

348. Canonem Logarithmorum pro numeris naturalibus ab 1 usque ad 20000 & a 90000 ad 100000 primus construxit Henricus Briggsius, Professor Geometriæ Savilianus in Academia Oxoniensi, ex consilio tamen primi inventoris Neperi (a) & methodum construendi una exposuit in sua Arithmetica Logarithmica. Lacunam inter 20000 & 90000 mox explevit Adrianus Vlaccus (b). In libellis vulgaribus habetur tantum Canon Logarithmorum pro numeris ab 1 usque ad 10000.

PROBLEMA XXXVII.

349. Invenire logarithmum pro numeris majoribus, quam in Canone continentur, minoribus tamen 10000000.

RESOLUTIO.

1. Refecentur 4 notæ ad sinistram numeri dati & earum ex canone excerpatur logarithmus.
2. Characteristicæ tot addantur unitates, quot notæ ad dextram residuæ (§. 347).

(a) Vide præfat. ad Arithmetica Logarithm.
(b) In altera editione Arithmeticæ Logarithmicæ Briggsii.

3. Logarithmus inventus subtrahatur a proxime sequente in canone.

4. Inferatur: ut differentia numerorum in canone evolutorum, ad differentiam tabularem logarithmorum ipsius respondentium; ita notæ residuæ numeri dati, ad differentiam logarithmicam *per Probl. 33.* (§. 302) inveniendam: quæ si

5. Addatur logarithmo *per n. 1 & 2* invento; summa erit logarithmus quæsitus.

E. gr. quæritur logarithmus numeri 92375. Refeca quatuor notas 9237 & characteristicam 3 logarithmi iis in tabulis minoribus respondentis 3. 9655309 auge unitate. Hinc e logarith. numeri 9238 = 3.9655780 subduc. log. num. 9237 = 3.9655309

relinquitur differ.	tabul.	-	-	471
Inferatur: 10	471	-	5	
5)	2			1 (§.316).
			235	

Jam logarithmo	4.9655309
addatur different. inventa	235

Summa est logar. quæs.	4.9655544
------------------------	-----------

SCHOLIUM.

350. Differentiæ equidem logarithmorum non sunt differentiis numerorum proportionales: ad praxin tamen, ubi in minimis scrupulosi non sumus, methodus tradita sufficit, si præsertim notæ residuæ numeri dati non fuerint adeo multæ. Certe in nostro casu adeo exactum reperimus, ut accuratior in tabulis majoribus Briggsii non occurrat.

PROBLEMA XXXVIII.

351. Invenire logarithmum fractionis, cujus numerator minor denominatore.

RESO-

R E S O L U T I O.

1. Logarithmus numeratoris subtrahatur a logarithmo denominatoris.
2. Residuo præfigatur signum subtractionis—.
- E. gr. Quærendus est logarithmus fractionis $\frac{3}{7}$.
 Logarithmus 7 = 0.8450980
 Logarithmus 3 = 0.4771213

 Logarithmus $\frac{3}{7}$ = — 0.3679767

D E M O N S T R A T I O.

Cum fractio sit quotus, ex divisione numeratoris per denominatorem emergens (§. 238); logarithmus ejus est differentia logarithmorum numeratoris ac denominatoris (§. 343), adeoque si numerator minor denominatore, major logarithmus e minore subtrahendus, quo in casu differentia evadit negativa (§. 105). *Q. e. d.*

S C H O L I O N.

352. Logarithmum fractionis propria esse negativum, si unitatis sit 0, jam notavit Stifelius (a), & mirum non est. Fractio enim minor unitate (§. 221). Sed unitatis logarithmus est 0 (§. 346). Ergo fractionis logarithmus est nibilo minor.

C O R O L L A R I U M I.

353. Cum in fractione spuria $\frac{9}{5}$ numerator sit major denominatore; ejus logarithmus habetur, si logarithmus denominatoris a logarithmo numeratoris subtrahitur (§. 238. 343).

Logarithmus 9 = 0.9542425
 Logarithmus 5 = 0.6989700

Logarithmus $\frac{9}{5}$ = 0.2552725

C O R O L L A R I U M II.

354. Quoniam integra cum adhærente fractione $3\frac{2}{7}$ ad fractionem spuriam $\frac{23}{7}$ reduci possunt (§. 224); eodem modo invenietur eorum logarithmus.

Logarithmus 23 = 1.3617278

Logarithmus 7 = 0.8450980

Logarithmus $3\frac{2}{7}$ = 0.5166289

P R O B L E M A XXXIX.

355. Invenire numerum logarithmo respondentem, qui in tabulis accuratus non occurrit.

R E S O L U T I O.

I. Si numerus, cui convenit logarithmus inter 1000 & 10000 cadit, hoc est, si characteristica fuerit 3 (§. 347).

1. Logarithmus proxime minor dato subtrahatur a proxime majore, itidemque a logarithmo dato.
2. Inferatur: ut differentia prior ad 100, ita secunda ad partes centesimas *per probl. 33.* (§. 302) inveniendas & numero, qui logarithmo proxime minori in tabulis respondet, addendas, ut habeatur numerus præpe verus, cui logarithmus datus convenit.

E. gr. Quæratnr numerus respondens Logarithmo 3.7589982

Logarithmus proxime major 3.7590632
 ————— minor 3.7589875

Differentia prima 757

Logarithmus datus 3.7589982
 — proxime minor. 3.7589875

Differentia secunda 107

757 — 100 — 107 107.00 (14

100 757

10700 313.0

3028

102

Cum numerus logarithmo minori conveniens sit 5741; quæsitus erit 5741 $\frac{14}{100}$.

II. Si numerus, cui convenit logarithmus datus, inter 1 & 1000 locum reperiatur, hoc est, si characteristica fuerit 0, 1 vel 2 (§. 347), characteristica mutatur in 3 & logarithmus quæritur inter

(a) In Arithmet. integra lib. 3. c. 5. p. 249 b.

inter 1000 & 10000 : qui enim ibi eidem respondet numerus, tot fractiones decimales adjunctas habet, quot characteristica unitates accessere (§. 346).

E. gr. Quæratür numerus logarithmo 1.9201662 conveniens. Cum in tabulis proxime minori respondeat numerus 83; logarithmus idem evolvitur sub characteristica 3 post 8300, ubi proxime minori respondet numerus 83. 21. Est itaque quæsitus $83\frac{21}{100}$. Quodsi fractionibus his non fueris contentus per casum primum minores istis inveniri possunt.

PROBLEMA XL.

356. *Invenire numerum convenientem logarithmo majori iis, qui in tabulis continentur.*

RESOLUTIO.

1. A logarithmo dato subtrahatur logarithmus numeri 10, vel 100, vel 1000, vel 10000, donec relinquatur logarithmus ultimo tabulæ minor.
2. Quæratür numerus ei respondens (§. 355) &
3. Multiplicetur per 10, vel 100, vel 1000, vel 10000.

Factum est numerus quæsitus (§. 346).

E. gr. Quærendus est numerus logarithmi 7.7589982. Subtrahatur logarithmus numeri 10000, qui est 4.000000, ut relinquatur 3.7589982, cui respondens numerus $5741\frac{1}{100}$ ducatur in 10000 factum 57411100 erit numerus quæsitus.

SCHOLIUM.

357. *Facile apparet, subtrahi posse logarithmum numeri cujuscunque in tabula occurrentem, modo per eundem numerum multiplicetur, qui logarithmo residuo respondet. Sed operatio tediosa evadit.*

PROBLEMA XLI.

358. *Invenire numerum dato lo-*

garithmo defectivo respondentem.

RESOLUTIO.

1. Dato logarithmo defectivo addatur logarithmus ultimus tabulæ five numeri 10000, hoc est, ille ab hoc subtrahatur.
2. Logarithmo residuo conveniens numerus quæratür (§. 355).

Dico, hunc esse numeratorem fractionis, cujus denominator est 10000.

E. gr. Quæratür fractio respondens Logar. defectivo — 0.3679767. Hic
ex 4.0000000 subd.

relinquit 3.6320233, cui convenit numerus $4285\frac{71}{100}$. Est ergo fractio quæsitæ $\frac{428571}{1000000}$.

DEMONSTRATIO.

Cum fractio sit quotus ex divisione numeratoris per denominatorem emergens (§. 138); erit unitas ad fractionem ut denominator ad numeratorem (§. 69). Sed ut unitas ad fractionem dato logarithmo defectivo respondentem, ita 10000 ad numerum logarithmo residuo convenientem (§. 337.66): Ergo si 10000 sumatur pro denominatore, erit numerus iste numerator fractionis quæsitæ (§. 305). *Q. e. d.*

PROBLEMA XLII.

359. *Datis tribus numeris invenire quartum proportionalem.*

RESOLUTIO.

1. Logarithmus secundi addatur logarithmo tertii.
2. Ab aggregato subtrahatur logarithmus primi.

Residuus est logarithmus quarti quæsitæ (§. 302. 337. 343).

E. gr.

E. gr. Sint numeri dati 4, 68 & 3.
 Logarith. 68 = 1.8325089
 Logarith. 3 = 0.4771213

 Aggregatum = 2.3096302
 Logarithm. 4 = 0.6020600

 Logarith. quæf. 1.7075702,
 cui in Tabulis respondet numerus 51.

SCHOLIION.
 360. Problematis hujus usus præstantissimus in Trigonometria elucet: cujus gratia pro numeris etiam naturalibus quæfiti sunt a Briggio & Vlacco Logarithmi, cum Neperus tantum canonem utur diversæ indolis logarithmorum pro sinibus & tangentibus construxisset. Tyrones igitur hanc de Logarithmis doctrinam tantisper seponant, donec ad Trigonometriam pedem promoverint.

C A P U T I X.

De Fractionibus Decimalibus.

DEFINITIO LXV.

361. *Fractio decimalis* est, cujus denominator est *articulus* quidam *primarius* 10, 100, 1000, 10000 &c. (§. 305).

COROLLARIUM I.

362. Progrediuntur adeo denominatores in ratione decupla.

SCHOLIION I.

363. E. gr. Si fuerit *fractio decimalis* $\frac{342857}{100000}$, eadem *aquivalet* huic *seriei*: $\frac{3}{1} + \frac{4}{10} + \frac{2}{100} + \frac{8}{1000} + \frac{5}{10000} + \frac{7}{100000}$, cujus *denominatores* 1. 10. 100. 1000. 10000. 100000 *in ratione decupla progrediuntur*.

COROLLARIUM II.

364. Quoniam logarithmi progressionis geometricæ 1. 10. 100. 1000. 10000. 100000 sunt 0. 1. 2. 3. 4. 5 (§. 346); si fractiones decimales sub forma numerorum integrorum scribantur, veluti in nostro casu loco $\frac{342857}{100000}$ ant $\frac{3}{1} + \frac{4}{10} + \frac{2}{100} + \frac{8}{1000} + \frac{5}{10000} + \frac{7}{100000}$ scribatur 3. 42857 (§. 306), loco denominatorum numeratoribus solitarie positis opportune tanquam *apices* adjiciuntur logarithmi. Ita loco fractionis $\frac{342857}{100000}$ scribimus 3°. 4' 2" 8''' 5' 7^v.

COROLLARIUM III.

365. Quoniam apices, qui sunt logarithmi denominatorum fractionum decimalium, in serie numerorum naturalium progrediuntur; sufficit notæ ultimæ adjici apicem convenientem, ceteris omissis, veluti in nostro casu 3. 42857^v.

COROLLARIUM IV.

366. Cum logarithmus fractionis inveniat, si logarithmus denominatoris a logarithmo numeratoris subtrahitur (§. 351), denominator autem fractionis decimalis sit articulus primarius (§. 361), adeoque ejus logarithmus præter characteristicam nonnisi meris cyphris constet (§. 346): a characteristica logarithmi numeratoris fractionis decimalis nonnisi characteristica logarithmi denominatoris subtrahenda, ut habeatur logarithmus fractionis decimalis.

SCHOLIION I.

367. E. gr. Si *fractio decimalis* fuerit 8. 735; logarithmus numeratoris 8735 est 3. 9412629, denominatoris 1000 vero 3. 0000000, adeoque logarithmus fractionis decimalis data 0. 9412629. Si *fractio decimalis* fuerit 0. 324; logarithmus numeratoris est 2. 5105456, denominatoris 1000 vero 3. 0000000, consequenter logarithmus fractionis decimalis = 1. 5105456. *Iidem ergo*

sunt logarithmi fractionum decimalium, qui numerorum integrorum, nisi quod characteristica differant.

COROLLARIUM V.

368. Quia characteristica logarithmi denominatoris fractionis decimalis eadem est cum apice ultimæ notæ (§. 364); logarithmus fractionis decimalis prodit, si a logarithmi numeratoris characteristica apex ultimæ notæ subducitur (§. 366).

SCHOLIUM II.

369. E. gr. In fractione decimali $8.735^{\text{'''}}$ apex ultimæ notæ est 3; a logarithmi igitur numeri 8735 , qui est, 3.9412629 , characteristica 3 subducitur ternarius, ut prodeat logarithmus fractionis decimalis 0.9412629 . Apex iste tot continet unitates, quot denominator habet cyphras, seu quot a puncto sequuntur notæ: unde patet, si nullus adscriptus fuerit apex, tot unitates a characteristica numeratoris subduci, quot denominator cyphras habet, seu quot notæ punctum sequuntur.

DEFINITIO LXVI.

370. Fractio decimalis exacta est, quæ veram exhibet rationem partis, quam designat, ad totum.

E. gr. $0.8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ exprimit rationem partis 4 ad totum 5 veram, cum sit 8:10 = 4:5 (§. 181).

DEFINITIO LXVII.

371. Fractio decimalis approximans est, quæ rationem partis, quam designat, ad totum exhibet prope veram, nempe vel vera minorem, vel majorem, defectu tamen vel excessu infra unitatem notæ ultimæ convenientem existente.

E. gr. $\frac{3}{7} > 0.42857$, sed < 0.42858 . exprimit adeo fractio approximans $\frac{42857}{100000}$ rationem nonnisi prope veram defectu scilicet existente minore, quam $\frac{1}{100000}$.

DEFINITIO LXVIII.

372. Notæ fractionum decimalium ejusdem ordinis dicuntur, quarum iidem sunt denominatores vel apices.

E. gr. Si duæ fuerint fractiones decimales 0.42857 & 0.0047 , notæ 8 & 4 ejusdem ordinis sunt, quoniam utrique respondens denominator est 1000 vel apex $^{\text{'''}}$; nam 8 designat $\frac{8}{1000}$ & 4 denotat $\frac{4}{1000}$.

PROBLEMA XLIII.

373. Fractiones decimales addere, vel a se invicem subtrahere.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Quoniam fractiones decimales perinde ac numeri integri constant ex notis, quarum unitates in ratione decupla progrediuntur (§. 364); notis ejusdem ordinis sub se invicem scriptis, additio & subtractio eodem modo peragitur ac in numeris vulgaribus (§. 98. 103), nisi quod in approximantibus locus ultimus sit incertus (§. 371).

Vide exemplum

I. Additionis:

3.50782 ^v	0.0638 ^v
0.0003.	0.00562 ^v
51.247	7.138

54.75512	7.20742
----------	---------

II. Subtractionis.

2.7864 ^v	0.95436 ^v
0.158	0.08512
2.6284	0.86924

PROBLEMA XLIV.

374. Fractiones decimales per se invicem multiplicare.

RESO-

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Si fractiones decimales ad formam numerorum integrorum reducantur (§. 306), multiplicatio peragitur ut in integris (§. 111); hoc unice notato, quod, quoniam apices sunt logarithmi denominatorum (§. 364), apex facti notarum in se invicem ductarum inveniatur, si earum apices addantur (§. 337).

E. gr. Si multiplicanda fuerit fractio decimalis $\frac{42857}{100000}$ per $\frac{47}{10000}$ hoc est, 0.42857^v

0. 4 2 8 5 7	per 0. 0047 ^v mul-
0. 0 0 4 7	tiplicatio peragitur
2 9 9 9 9	communi more du-
1 7 1 4 2 8	cendo 42857 primum
0. 0 0 2 0 1 4 2 7 9	in 7 & deinde in 4 si-

summa 9 dat apicem ultimum producti: unde apparet a sinistris adjiciendas esse tres cyphas, quarum prima puncto notata designat locum integrorum.

COROLLARIUM I.

375. Quodsi factor unus fuerit fractio decimalis approximans, cum fieri possit, ut multipulum notæ deficientis, quæ ultimam 6 proxime sequitur, sit novenario major, consequenter multipulum notæ ultimæ 6 inde augeatur (§. 111); in factonumerus locorum,

2. 3 5 7 6 †
0. 3 4
9 4 3 0 4
7 0 7 2 8
0. 8 0 1 5 8 4

in quibus notæ sunt incertæ, numerum notarum in factore exacto unitate superat, veluti in nostro exemplo notæ tres ultimæ 584 sunt incertæ, adeoque factum sumitur 0. 801.

COROLLARIUM II.

376. Si uterque factor fuerit approximans, eodem modo intelligitur, loca in factore incerta unitate excedere numerum

1 8. 3 5 7
6. 3 4
7 3 4 2 8
5 5 0 7 1
1 1 0 1 4 2
1 1 6. 3 8 3 3 8

notarum factoris longioris, veluti in adjecto exemplo, in quo numerus longior constat notis 5, loca incerta sunt numero 6, adeoque nonnisi duæ notæ dexteriores II. certæ

sunt. In exemplo anteriore si factor 0, 34^c ponatur quoque approximans, nulla profusus nota certa est.

COROLLARIUM III.

377. Quodsi nota deficiens, quæ proxime sequitur, ultimæ fuerit æqualis in multiplicando & multiplicatore exactus; tum in inmultiplicatione apparet, quot unitatibus augeri debeat multipulum notæ dextimæ, ut

0. 6 6 6 6
6. 8
5 3 3 3 2
3 9 9 9 9
4 5 3 3 2 2

nulla in facto nota incerta evadat. E. gr. in nostro exemplo, ubi nota deficiens est 6, facto ex 6 in 8 adjiciuntur 4 & alteri ex 6 in 6 adduntur 3.

SCHOLIUM.

378. Casus alios brevitatis gratia prætermittimus.

PROBLEMA XLV.

378. Fractionem decimalem per decimalem dividere.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Si fractiones decimales ad formam numerorum integrorum reducantur (§. 306), divisio peragitur ut in numeris integris (§. 117); hoc unice notato, quod, quoniam apices sunt logarithmi denominatorum (§. 364),

apex quoti inveniatur, si apex divisoris ab apice dividendi subtrahatur (§. 343) & dividendo adjungantur cyphræ, si divisor major fuerit vel dividendum non metiatur.

E. gr. Si 0.002014279 dividatur per 0.0047, quotus est 0.42857 (§. 374. 210). Nimirum 2014279 dividitur per 47, ut obtineatur quotus 42857. Jam cum notæ divisoris 4 conveniat apex 3 & notæ dividendi 0 apex 4, differentia 1 est apex notæ primæ quoti 4. Cum adeo quotus incipiat a partibus decimis, ut omnia loca compleantur eidem præfigitur cyphra, cum nullum fractioni adhæreat integrum. Similiter si 0.002014279 dividatur per 0.42857, quotus est 0.0047 (§. cit.). Nimirum 2014279 dividitur per 42857, ut obtineatur quotus 47. Jam cum notæ dividendi 0 conveniat apex 4 & notæ divisoris 4 apex 1, differentia 3 est apex notæ quoti 4. Cum adeo quotus incipiat a particulis millesimis (§. 364), eidem præfigendæ sunt cyphræ 3, ut habeatur fractio completa 0.0047.

COROLLARIUM I.

380. Quodsi divisor fuerit fractio decimalis approximans, adeoque nota ultima vel justo major, vel minor (§. 371); factum ex divisore in quotum duabus ultimis notis deficere potest. Quare cum a notis dividendi vel justo plus, vel minus subtrahatur; ubi divisor ad eandem fuerit promotus, notæ quoti incertæ evadent. E. gr. Si dividendus fuerit 21.3456 & divisor 3.82 fractio approximans, nonnisi unica nota quoti 5 certa est.

COROLLARIUM II.

381. Si dividendus fuerit fractio decimalis approximans, divisor exactus; nonnisi notam quoti ultimam subinde incertam evadere posse patet.

COROLLARIUM III.

382. Si & divisor, & dividendus fue-

rint fractiones approximantes, evidens est porro in determinandis locis certis respiciendum esse vel dividendum, vel divisorem, prout divisoris, vel dividendi nota deficiens propior fuerit primæ divisoris notæ. E. gr. Si divisor sit 2.5786. dividendus 3.067, adeoque cyphris augendus, ut divisio fieri possit; evidens est certitudinem expirare in nota tertia divisoris 6, consequenter junctis duabus cyphris divisionem eo usque continuari, ut prodeat quotus certus 1.1.

PROBLEMA XLV.

383. *Notas certas in multiplicatione & divisione fractionum decimalium approximantium accuratius determinare.*

RESOLUTIO.

Notæ factorum dextimæ sumantur nunc justo majores, nunc justo minores; in divisione nunc nota dextima in dividendo justo major, in divisore justo minor & contra: quæ in utraque multiplicatione ac divisione eadem proveniunt notæ, ex sunt accuratæ.

Quodsi ergo in exemplo superiori multiplicationis, ubi notæ ultimæ factorum ponuntur justo minores, eorum loco sumantur 18.358 & 6.35; factum quod obtinetur 116.57330 convenit cum superiori 116.38338 quoad tres notas dextimas 116: ex igitur solæ certæ sunt. Patet autem certam sic fieri notam tertiam 6, quæ per superiora in dubio relinquebatur (§. 376). Similiter si in exemplo divisionis superiori (§. 382) nunc 3068 divides per 2.5786, nunc 3067 per 2.5737, quotus utrobique est

18.358	35; factum quod ob-
6.35	tinetur 116.57330
91790	convenit cum superio-
55074	ri 116.38338 quo-
110148	ad tres notas dextimas
116.57330	116: ex igitur solæ
	certæ sunt. Patet au-
	tem certam sic fieri no-
	tam tertiam 6, quæ

est 1. 1 : unde patet, nonnisi duas istas notas certas esse, quas superius tales agnovimus.

SCHOLIUM.

384. Ipsa praxis loquetur, nos subinde

posse esse contentos, quod notas certas agnoscamus, quæ per superiora (§. 376. 382.) tales deprehenduntur, ut adeo ratio repetitæ multiplicationis vel divisionis supersedere, queamus.

CAPUT X.

De Fractionibus Sexagesimalibus.

DEFINITIO LXIX.

385. **F**ractiones sexagesimales sunt, quarum denominatores crescunt in ratione sexagecupla. Dicuntur etiam *Minutia physicales*.

SCHOLIUM.

386. E. gr. Si integrum sit 1, fractiones istiusmodi sunt $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{3600}$, $\frac{1}{216000}$ &c.

COROLLARIUM.

387. Quoniam logarithmi progressionis geometricæ 1. 60. 3600. 216000. 12960000 &c. sunt 0. 1. 2. 3. 4 &c. (§. 334); si fractiones sexagesimales instar numerorum integrorum scribendæ, numeratoribus solitarie positis perinde ac in fractionibus decimalibus tanquam apices adjiciendi sunt logarithmi. E. gr. $\frac{2}{1} = 3^{\circ}$, $\frac{25}{60} = 35'$, $\frac{46}{3600} = 46''$ &c.

DEFINITIO LXX.

388. Pars sexagesima integri dicitur *Minutum sive scrupulum primum*; pars sexagesima minuti primi *Minutum sive scrupulum secundum*; pars sexagesima minuti secundi *Minutum sive scrupulum tertium* & ita porro.

COROLLARIUM.

389. Scrupuli adeo primi apex sive index est 1, secundi 2, tertii 3 & ita porro (§. 387).

SCHOLIUM.

390. Hac ratione fractiones reducuntur ad numeros integros, ut integrorum instar tractari queant.

PROBLEMA XLVI.

391. *Fractiones sexagesimales addere.*

RESOLUTIO.

Additio eodem prorsus modo peragitur, quo numeri heterogenei in unam summam colliguntur (§. 99).

E. gr.	35°	46'	8''	15'''
	17	20	15	40
		14	18	

53 20 41 55

PROBLEMA XLVII.

392. *Fractiones sexagesimales a se invicem subtrahere.*

RESOLUTIO.

Subtrahuntur a se invicem eodem prorsus modo, quo numerorum heterogeneorum subtractio fieri solet (§. 104).

E. gr.	28°.	15'.	4''.	2.0'''.
	17	29	18	45

10 45 45 35

Nimirum unitas mutuo petita a specie majore hic valet 60. Ita $1'' = 60'''$, $1' = 60''$, $1^{\circ} = 60'$ (§. 388).

PROBLEMA XLVIII.

393. *Fractiones sexagesimales per se sexagesimales multiplicare.*

M 3 RESO.

RESOLUTIO.

Multiplicatio fractionum sexagesimalium coincidit cum multiplicatione decimalium (§. 374), nisi quod ex specie minore abjiciatur toties sexagenarius, quoties fieri potest, & tot speciei proxime majori addantur unitates, quoties sexagenarius fuit abjectus (§. 388): id quod divisio per 60 prodit (§. 223).

E. gr. Si multiplicandus $3^{\circ} 15' 38''$, multiplicator $2^{\circ} 18' 47''$. Duc singulas partes multiplicandi 1° . in 47, 2° . in 18, 3° . in 2; erit factum ex 38 in 47 = 1786 scr. quartis = $29'' 46''$. Scribuntur adeo 46 pro specie minima infra lineam cum suo apice & $29''$ reservantur speciei proxime sequenti annumeranda. Cum igitur factum ex $47''$ in $15' = 705''$; additis 29 prodibunt $734'' = 12'' 14''$. Scribuntur adeo 14 infra lineam & $12''$ reservantur facto proxime sequenti ex 3° in $47''$ addenda. Eodem modo ubi perrexeris; obtinebuntur tandem facta partialia, quæ in unam summam (§. 391) collecta exhibent factum quæsitum $7^{\circ} 32' 30'' 38''' 46''$ aut, si prope verum quæseris, $7^{\circ} 32' 31''$, cum species proxime major dimidium illius superet, aut 30 fuerit major. Vide exemplum:

3°	$15'$	$38''$		
2	18	47		
2	33	14	$46''$	
9	58	41	24	
6	31	16		
7°	$32'$	$30''$	$38'''$	$46''$

SCHOLIION.

394. Ne radia divisionis devoranda sint, constructus est Canon hexacontadon, qui facta in species resoluta exhibet, veluti factum ex 38 in 47 = 29. 46. Ratio constructionis ex operatione in problemate præcepta patet, modo notetur, perinde ac in abaco

Pythagorico (§. 109) factorem unum a latere, alterum in fronte canonis describi.

PROBLEMA XLIX.

395. Fractiones sexagesimales per sexagesimales dividere.

RESOLUTIO.


Divisio peragitur ut in fractionibus decimalibus, nisi quod in multiplicatione quoti per divisorem tenenda sint, quæ paulo ante in multiplicatione præcepimus (§. 393) &, ubi species dividendi prima fuerit minor specie divisoris prima, ista reducenda sit ad speciem proxime minorem & sequenti addenda, ut divisioni sit locus.

E. gr. Si $7^{\circ} 32' 30'' 38''' 46''$ dividere jubeamur per $2^{\circ} 18' 47''$; quære quoties 2 in 7 contineatur, & quoti loco scribe 3° . Duc 3° in $2^{\circ} 18' 47''$ & factum $6^{\circ} 56' 21''$ subtrahere ex $7^{\circ} 32' 30''$, ut relinquatur $36' 9''$. Jange residuo speciem sequentem 38 & divisionem eodem modo continua, donec ea tandem fuerit absoluta, quemadmodum ex typo exempli liquet:

$2^{\circ} 18'$	$7^{\circ} 32'$	$30''$	$38'''$	$46''$	$3^{\circ} 15'$
$47''$	6	56	21	$::$	$38''$
	36	9	38	$::$	
	34	41	45	$::$	
	1	27	53	$::$	
	five	87	53	46	
		87	53	46	
			0		

SCHOLIION.

396. Non absimili modo algorithmus fractionum aliarum quarumcunque absolvitur, quarum denominatores in ratione quacunque data progrediuntur, veluti in duodecupla, quæ olim in divisione mensuræ linearum obtinuit.



ELEMENTA GEOMETRIÆ.

P R Æ F A T I O.



EREXIGUUS est eorum numerus, qui Geometriæ pretium suum statuunt: notatione enim delusi cum Arte agrimensoria eam pessime confundunt, nec ea animo ipsorum obversatur idea, quæ nomen tam augustum excitare debebat. Omnis nimirum cognitionis distinctæ fundamenta jacet Geometria cum Arithmetica, ita ut non minor in scientiis, quam in artibus ejus sit usus. Equidem ob problemata, quorum resolutionem trado, non nisi ad locorum distantias variorumque objectorum altitudines, agrorum & camporum areas, corporumque molem dimetiendum conducere videtur; contrarium tamen luce meridiana clarius elucebit, cum ad reliquas Matheseos partes inferius applicabitur. Non hic repeto, quæ de vi Geometriæ in perficiendo intellectu jam superius (a) dicta sunt. Ne vero hoc fructu careret Geometriæ studium, a rigore in
demonst.

(a) In Commentat. de Methodo §. 52. 536.

demonstrando recedendum minime fuit. Hinc definitio, quæ vulgo definiri non solent, & passim demonstrò, quæ sine probatione ab aliis assumuntur. Equidem haud difficulter prævideo, fore ut imperitis improbetur hic ausus; sed sufficit eum probari peritis, & quod majus est, methodum nostram præstare, ne extra Mathesin ratiocinaturi in scopulos incidamus, in quos plerumque omnes hactenus incidisse, supra etiam (b) annotavimus. EUCLIDES & ejus exemplo hactenus omnes ex principio congruentiæ solo demonstrarunt omnia: sed cum ingeniosissimus LEIBNITIUS similitudinis notionem mecum communicaret, atque moneret, multum ejus in Geometria esse usum, ego vero meditatus amplissimum deprehenderem; similitudinis principium in Geometriam introducere nullus dubitavi. Multa igitur ex eo a me facillime demonstrata deprehendes, quæ alias ex principio congruentiæ nonnisi per ambages demonstrari solent. Nec injucundum arbitror, quod figurarum constructiones inter principia demonstrandi nunc obtineant locum, quæ alias praxi tantum interserviebant. Placuit tamen in nova hac editione mea similitudinis notione uti, cum Leibnitiana clarior sit. Tyrones definitionibus evolutis neglecta demonstratione problemata solvant. Hoc labore perfuncti ex theorematum hypothefibus figuras construant & demonstrationes empyricas superaddant, quarum in ipsa pertractatione fit mentio. (c) Tandem eo ordine elementa relegant, quo conscripta sunt. Qui vero mentis acie pollent, illamque diu possunt habere attentam; difficultates non sentient, etiamsi prima statim vice ad singula animum advertant.

(b) L. c. §. 52. p. 15.

(c) In schol. theor. 7. §. 158.

ELEMENTA GEOMETRIÆ.

PARS PRIOR

ELEMENTA GEOMETRIÆ PLANÆ EXHIBET.

CAPUT I.

De Principiis Geometriæ.

DEFINITIO I.

1. **G**eometria est scientia extensorum quatenus terminata sunt, hoc est, Linearum, Superficierum & Solidorum.

SCHOLIÖN.

2. *Quemadmodum extensio ex simultanea alicujus rei per locum diffusionem oritur; ita in mente representatur, dum multa in uno continuo simul percipimus. Hinc notio extensionis non modo totius ac partium notiones involvit (S. 9. Arith.); sed eadem in rerum aliarum notiones irrepit, quæ ideo per lineas, superficies ac solida representari possunt. Unde est, quod Geometria rebus plurimis applicari possit, ejusque adeo quàm latissime pateat usus.*

DEFINITIO II.

3. *Congruere dicuntur, quorum iidem termini esse possunt. Nempe Congruentia est coincidentia terminorum.*

SCHOLIÖN.

4. *Ne definitio negotium faceffat, vitanda est vocis termini equivocatio: id quod in se-
Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.*

quantibus satis cavetur. A termini vero definitione consulto abstinemus, ne ad demonstrationes metaphysicas dilabamur.

DEFINITIO III.

5. *Eundem situm habere dicuntur, inter quæ idem extensum poni potest.*

DEFINITIO IV.

6. *Punctum est, quod quaquaversum seipsum terminat, seu quod non habet terminos alios à se distinctos.*

COROLLARIUM I.

7. Ergo omne punctum alteri cuicunque congruit (S. 3).

COROLLARIUM II.

8. Nec ulla in eo distinguere licet partes.

SCHOLIÖN.

9. *Hinc Euclides: Punctum est, inquit, cujus pars nulla est. Nec sine ratione punctum*

punctum ut individuum concipiunt Geometræ, ut tale quid nec imaginari, nec pingere valeamus. In praxi enim ipsa Geometrica summo cum studio cavendum, ne punctum pars lineæ habeatur, cujus terminus existit.

DEFINITIO V.

Tab. I. 10. Linea describitur, si punctum
Fig. 1. ab uno puncto A ad alterum B move-
tur.

COROLLARIUM I.

11. Termini igitur lineæ secundum longitudinem sunt puncta A & B; secundum latitudinem & profunditatem ipsa sui terminus est (§. 6).

COROLLARIUM II.

12. Quoniam punctum partes nullas habet (§. 8), lineæ nec lata, nec profunda esse potest, sed in solam longitudinem extenditur.

SCHOLION I.

13. Quid ergo mirum, quod secundum latitudinem & profunditatem non habeat terminos a se distinctos, vi Cor. I. (§. 11)?

SCHOLION II.

14. Quamvis corpus omne tribus dimensionibus præditum sit, nec una a reliquis actu separari queat; necessarium tamen ac perutile est, ut unam absque reliquis consideremus. Necessitatem intellectus finitudo injungit, qui ad multa una diffundi nequit & hinc per abstractionem divellere tenetur, quæ nexu indivulso natura conjunxit. Utilitatem hujus abstractionis casus innumeri persuadent, in quibus unam dimensionem neglectis ceteris cognoscere jubemur, e. gr. altitudinem turris sine latitudine ac profunditate ipsius, latitudinem fluminis sine longitudine ac profunditate ejusdem.

DEFINITIO VI.

15. Distantia est lineæ brevissima inter duo.

SCHOLION.

16. Ita e. gr. distantia arboris a domo est lineæ brevissima, qua ab illa ad hanc duci potest.

DEFINITIO VII.

17. Linea recta AB est, cujus pars quæcumque est toti similis.

Tab. I.
Fig. 1.

COROLLARIUM I.

18. Lineæ igitur rectæ non differunt nisi quantitate (§. 26 Arithm.).

COROLLARIUM II.

19. Cum lineæ describantur, si punctum ab uno puncto ad alterum movetur (§. 10); motus puncti describentis in omnibus lineæ partibus idem esse debet: secus enim diversitate hujus motus partes a se invicem distinguerentur, adeoque similes non forent (§. 24 Arithm.), contra definitionem (§. 17). Quoniam itaque motus puncti differre nequit nisi celeritate ac directione, celeritas vero ad descriptionem rectæ nil confert; sola directionis habenda est ratio, consequenter recta describitur, si punctum ab uno puncto A ad alterum B eadem directione movetur.

POSTULATUM I.

20. A quovis puncto A ad quodvis punctum B posse duci lineam rectam.

Tab. I.
Fig. 1.

POSTULATUM II.

21. Lineam rectam terminatam AB utrinque produci posse.

DEFINITIO VIII.

22. Linea curva est, cujus partes toti dissimiles.

DEFINITIO IX.

23. Metiri idem est ac quantitatem aliquam pro unitate assumere ac aliarum

rum

rum homogenearum rationem ad eandem exprimere. Quantitas, quæ pro unitate assumitur, *Mensura* dicitur.

SCHOLIION.

24. *Hæc definitio latior praxi respondet: Aristoteli Euclides mensuram definit per quantitatem, quæ aliquoties repetita alteri sit æqualis: quam nos in Arithmetica partem aliquotam diximus.*

DEFINITIO X.

25. Hinc *Mensura linearum* est linea recta arbitrariæ longitudinis, in partes minores pro lubitu dividenda & subdividenda. Dividitur autem hodie a Geometris in 10 partes æquales, quæ *Pedes* vocantur: unde ipsa *Decempeda* appellatur. Pes subdividitur in 10 *Digitos*; digitus in 10 *Lineas* & ita porro.

SCHOLIION.

26. *Mensuræ longitudo & divisio non eadem est ubivis gentium. Varias differentias præter Willebrordum Snellium (a) exponunt Ricciolus (b), Malletus (c), Cl. Eisenchmidius (d) aliique. Aliquas celeberrimorum mensurarum varietates repræsentat tabula sequens in particulis istiusmodi, quælium pes Regius Parisinus est 1440. Continet is nempe 12 digitos, digitus 12 lineolas, lineola 10 particulas, adeoque pes integer particulas 1440.*

(a) In Eratosthene Batavo, lib. 2. c. 1. usque ad 5. p. 121 & seqq.

(b) In Geogr. Reform. lib. 2. c. 7. f. 43 & seqq.

(c) Geometrie pratique, lib. 1. p. 108.

(d) In disquisit. nova de ponderibus & mensuris veterum Rom. Græc. & Hebr. Sect. 3. c. 1. p. 93. & seqq.

Pes Regius		Constanti-	
Parisinus	1440	nopolitanus	3140
Rhenanus	1391 $\frac{3}{10}$	Bononiensis	1682 $\frac{2}{5}$
Romanus	1320	Argentorat.	1282 $\frac{2}{4}$
London.	1350	Norimberg.	1346 $\frac{3}{4}$
Suecicus	1320	Dantiscanus	1271 $\frac{1}{2}$
Danicus	1403 $\frac{2}{5}$	Halensis	1320
Venetus	1540		

SCHOLIION II.

27. *Divisionem mensuræ decimalem primus introduxit Stevinus, teste ipsius Geometria practica, dubio procul exemplo Regiomontani. Indicem autem decempedarum constituit 0, pedum 1, digitorum 2, linearum 3 &c. tanquam denominatorum logarithmos (S. 364 Arithm.) quos circello inclusos numeris adscribit. Sed commodius Johannes Bayerus in Logistica decimali & Stereometria logarithmos characteribus Romanis expressos apicibus numerorum adscribit. E. gr. tres pertica, quinque pedes, septem digiti & octo lineæ ita scribuntur: 3° 5' 7" 8". Commodissimum sæpe accidit, si numeri integra sive decempedas designantes a fractionibus decimalibus, pedibus nempe, digitis, lineis &c. puncto separantur, uti monuimus in Arithmetica (S. 306). Ita loco 3° 5' 7" 8" scribemus 3. 578. Admodum R. P. Franciscus Noël autor est (e), divisionem decimalem non modo in mensuris, sed & ponderibus Sænicis adhiberi.*

DEFINITIO XI.

28. *Superficies* est magnitudo duabus dimensionibus prædita, seu in longitudinem & latitudinem extensa.

COROLLARIUM.

29. *Termini superficiei secundum longitudinem & latitudinem sunt lineæ, secundum profunditatem ipsamet terminus sui existit.*

N 2

SCHOLIO

(e) In Observationibus Mathematico-Physicis in India & China factis, c. 7. p. 104 & seqq.

SCHOLIUM.

30. Nimirum in longitudine nullum assumi potest punctum, cui non respondeat aliqua linea secundum latitudinem, & contra.

DEFINITIO XII.

31. Per *Perimetrum* intelligimus continuum, quo aliud continuum terminatur.

DEFINITIO XIII.

32. *Figura* est continuum perimetro terminatum.

SCHOLIUM.

33. Dicitur tam de superficiebus, quam de solidis. In priori casu perimetri sunt lineae; in posteriori superficies.

DEFINITIO XIV.

34. *Figura rectilinea* est, cujus perimenter ex lineis rectis; *Curvilinea*, cujus perimenter ex curvis; *Mixtilinea*, cujus perimenter partim ex rectis, partim ex curvis constat.

DEFINITIO XV.

35. *Latus* est linea, quæ est pars perimetri figuræ superficialis.

DEFINITIO XVI.

36. *Planum* seu *figura plana* est, si e quovis puncto perimetri ad quodlibet ejusdem rectam in eadem ducere licet.

DEFINITIO XVII.

Tab. I.
Fig. 2. 37. *Circulus* est figura plana, linea in se redeunte terminata, ex cujus singulis punctis ad punctum intermedium C, quod *Centrum* vocari solet, ductæ rectæ sunt inter se æquales. Linea illa *Peripheria* dicitur.

DEFINITIO XVIII.

38. *Chorda* AB est recta a peripheria ad peripheriam ducta.

DEFINITIO XIX.

39. *Diameter* AE est chorda per centrum C transiens. Ejus dimidium AC, sive recta CD ex centro C ad peripheriam ducta dicitur *Semidiameter*, item *Radius*.

COROLLARIUM.

40. Radii ergo unius circuli inter se æquales sunt (S. 37).

DEFINITIO XX.

41. *Arcus* est pars quantalibet peripheriæ AFB: *Gradus* vero est pars ejusdem trecentesima sexagesima. Quilibet gradus in 60 *Minuta prima*; minutum quodlibet in 60 *secunda*; secundum unumquodque in 60 *tertia* &c. subdividitur. *Euclides* arcum quoque *peripheriam* vocat.

COROLLARIUM.

42. Cum peripheria cujuslibet circuli in 360 gradus dividatur; circuli majoris gradus sunt majores gradibus minoris.

SCHOLIUM.

43. *Scrupula graduum* sunt fractiones sexagesimales (S. 385 Arithm.) & apicibus suis notantur (S. 387 Arithm.). Gradui tanquam integro seu unitati cessit 0, minuto primo 1, secundo 2, tertio 3 &c. consequenter gradus cum suis scrupulis eodem modo scribuntur, quo decempeda cum suis (S. 27). E. gr. 3 gradus, 25 minuta, 16 secunda ita scribis: 3° 25' 16". Etsi autem Ægyptii veteres, quibus hanc divisionem acceptam ferunt, hoc artificio computum Astronomicum a fractionibus liberaverint, cum fractiones sexagesimales instar numerorum integrorum tractari possint, nec sine prudenti consilio eundem in finem eum graduum numerum fecerint, qui per 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. exacte divi-

dividitur, nec minus eum fecerint exponentem rationis, juxta quam scrupula decreſcunt, quem 2. 3. 4. 5 & 6 metiuntur; non tamen ſine ratione ſuaſerunt poſt Stevinum (a), Oughtredus (b), Walliſius (c) aliique, ut ſepoſitis fractionibus ſexageſimalibus, decimales reciperentur: nulla enim in decimalibus reductione minorum fractionum ad majores, vel majorum ad minores opus eſt; ſexageſimales vero non ſine radio reducuntur. Multiplicatio quoque & diviſio decimalium facilior quam ſexageſimalium (ſ. 364. & ſeqq. 393. & ſeqq. Arithm.). Id conſilium ſecuti ſunt Henricus Briggs in Canone tri angulorum artificiali apud Henricum Gellibrand in Trigonometria Britannica, Johannes Newton in Aſtronomia pariſter ac Trigonometria Britannica & Nicolaus Mercator in Inſtitutionibus Aſtronomiſicis. Stevinus (d) contendit, eandem circuli diviſionem antiquitus, in ſeculo ſapiente, quod adſtrivere conatur, obruiſſe.

DEFINITIO XXI.

Tab. I. Fig. 2. 44. Circuli concentrici ſunt, qui idem centrum habent: Excentrici vero, qui habent diverſa.

DEFINITIO XXII.

45. Segmentum circuli eſt pars ipſius AFBA arcu AFB & chorda AB comprehenſa. Dicitur Segmentum majus, quod ſemicirculo majus eſt; minus vero, quod minus eſt.

DEFINITIO XXIII.

46. Sector circuli eſt pars ejus ACD duobus radiis AC & CD atque arcu AD comprehenſa.

DEFINITIO XXIV.

Tab. I. Fig. 3. Fig. 5. Fig. 4. 47. Recta HI circulum in L tangit, ſi ipſi ita occurrat, ut producta tota extra circulum cadat. Circulus vero circu-

lum intus tangit, ſi huic occurrens totus intra hunc, extus vero tangit, ſi eidem occurrens totus extra hunc cadit.

COROLLARIUM I.

48. Recta CL ex centro C ad contactum L ducta eſt radius circuli (ſ. 39).

COROLLARIUM II.

49. Circuli ergo ſe extus tangentibus in L diverſa centra C & c habent, adeoque eccentrici ſunt (ſ. 44). Fig. 4.

DEFINITIO XXV. Tab. I.

50. Linea AB lineam CD ſecat in E, ſi eam dirimit in partes CE & ED cis & ultra ipſam ſitas. Fig. 6.

COROLLARIUM I.

51. Cum etiam CD ipſam AB dirimat in partes AE & EB cis & ultra CD ſitas; ſi AB ſecet CD in E, etiam viciffim CD ſecabit AB in eodem puncto E.

COROLLARIUM II. Tab. I.

52. Si recta MN circulum in O ſecet, pars ejus ON intra circulum cadit (ſ. 37). Fig. 7.

COROLLARIUM III.

53. Si circulus circulum ſecet, cum utriusque peripheria in ſe redeat (ſ. 37), pars peripheriæ unius circuli intra alterum cadat neceſſe eſt.

DEFINITIO XXVI.

54. Angulus eſt duarum linearum AB & AC in uno puncto A concurrentium mutua inclinatio. Lineæ AB & AC dicuntur crura; punctum concurſus A Vertex anguli. Tab. I. Fig. 9.

SCHOLIUM.

55. Angulus hic vel unica littera A vertici ejus adſcripta, vel ad evitandam in caſibus nonnullis confuſionem tribus litteris BAC indigitatur, ita ut vertici adſcripta medio loco ponatur. Sæpe nomen angulo imponit littera minor, veluti x, eidem inſcripta. Uſum vero angulis ad linearum ſitum determinandum.

(a) In præf. ad Tract. de Logiſtica decimali.
 (b) Clavis Mathematicæ. c. 1. p. m. 2.
 (c) Algebræ c. 9. f. 39. Vol. II. Oper. Math.
 (d) In Cofinographia lib. 1. def. 6. f. 109. Operum Gallice editorum.

DEFINITIO XXVII.

56. *Angulus insistere* dicitur lineæ, in qua crura ejus terminantur.

DEFINITIO XXVIII.

Tab. I. 57. *Mensura anguli* BAC est arcus DE ex vertice A, radio prorsus arbitrario AE, intra crura ejus AC & AB descriptus.

COROLLARIUM.

58. Anguli ergo distinguuntur per rationem arcuum ex vertice intra crura descriptorum ad peripheriam: distinguuntur enim per illos arcus, arcus vero per rationem ad peripheriam distinguere licet (§. 41. *Geom.* & §. 132 *Aritlm.*). Et eadem de causa quantitas anguli æstimatur ex ratione arcus istius ad peripheriam.

SCHOLION.

59. Tot scilicet graduum & scrupulorum dicitur esse angulus, quot graduum & scrupulorum est arcus DE (§. 41).

DEFINITIO XXIX.

Tab. I. 60. *Anguli contigui* FGH & HGI sunt, quorum idem est vertex G & crus unum commune GH.

DEFINITIO XXX.

Tab. I. 61. Rectæ lineæ AE & EB in directum sitæ sunt, si ejusdem rectæ AB partes existunt.

DEFINITIO XXXI.

Tab. I. 62. *Angulus deinceps positus* AEC dicitur, qui oritur, anguli AED latere uno ED in C producto.

COROLLARIUM I.

63. Habent adeo anguli deinceps positi AEC & AED crus unum AE commune & crus alterum unius CE in directum situm est cruri alteri alterius ED (§. 61).

COROLLARIUM II.

64. Hinc anguli deinceps positi sunt contigui, sed non contra (§. 60).

DEFINITIO XXXII.

65. *Angulus rectus* KLM est, cui deinceps positus KLN æqualis est. Tab. I. Fig. 11.

DEFINITIO XXXIII.

66. *Angulus obliquus* AEC est, cui deinceps positus AED inæqualis. *Angulus acutus* AEC est obliquus minor recto. *Angulus obtusus* AED est obliquus recto major.

DEFINITIO XXXIV.

67. *Anguli verticales* o & x sunt, si crura unius AE & EC in directum jacent cruribus alterius EB & ED. Tab. I. Fig. 6.

DEFINITIO XXXV.

68. Si lineæ ST duæ aliæ OA & RB a diversis plagis in diversis punctis A & B occurrant, *anguli*, quos cum ea efficiunt, x & y dicuntur *alterni*. Tab. I. Fig. 12.

DEFINITIO XXXVI.

69. Si vero lineæ ST duæ aliæ AP & BR itidem in diversis punctis A & B, sed ab eadem plaga occurrant, *anguli*, quos cum ea efficiunt, u & y, item z & y, dicuntur *oppositi*: & quidem u dicitur *oppositus externus*, z vero *oppositus internus* ipsius y.

DEFINITIO XXXVII.

70. *Angulus ad peripheriam* est angulus ABD, cujus vertex B & crura BA atque BD in peripheria terminantur. Dicitur etiam *Angulus in segmento*. Tab. I. Fig. 13.

COROLLARIUM.

71. Intercipitur adeo a duabus chordis AB & BD (§. 38 & 54) atque arcui AD insitit (§. 56).

DEFINITIO XXXVIII.

72. *Angulus ad centrum* est angulus ACD, cujus vertex in centro circuli C est, crura vero AC & CD in peripheria terminantur. Tab. I. Fig. 13.

COROLLARIUM.

73. Angulus ad centrum a duobus radiis interceptur (S. 39), atque arcui AD insitit (S. 41. 56); consequenter arcus AD ejus mensura (S. 57).

DEFINITIO XXXIX.

Tab. I. Fig. 14. 74. Angulus extra centrum HKI est, cujus vertex K extra centrum est, crura vero HK & IK in peripheria terminantur.

COROLLARIUM.

75. Insitit ergo arcui HI (S. 41. 56).

DEFINITIO XL.

Tab. I. Fig. 3. 76. Angulus contactus HLM est, quem arcus circuli ML cum tangente HL ad contactum efficit.

DEFINITIO XLI.

77. Angulus segmenti MLH vel MLI est, quem chorda ML cum tangente HL vel LI ad contactum L efficit.

DEFINITIO XLII.

Tab. I. Fig. 11. 78. Linea KL perpendicularis aut normalis est ad alteram LM, si cum ea efficit rectum angulum.

COROLLARIUM:

79. Si igitur LK ad NM perpendicularis, anguli ad L deinceps positi æquales sunt (S. 65) & contra.

DEFINITIO XLIII.

Tab. I. Fig. 9. 80. Linea AB est ad alteram AC obliqua, si cum ea efficit angulum obliquum.

DEFINITIO XLIV.

Tab. I. Fig. 12. 81. Linea OP parallela est alteri QR, si ubique eandem ab ea distantiam servat.

COROLLARIUM.

82. Lineæ ergo parallele in infinitum continuatæ non concurrunt.

DEFINITIO XLV.

83. Lineæ convergentes TO & VQ sunt, quarum distantia continuo fit minor. Tab. I. Fig. 15.

DEFINITIO XLVI.

84. Lineæ divergentes TN & VP sunt, quarum distantia continuo fit major.

DEFINITIO XLVII.

85. Opponi dicuntur, e quorum uno ad alterum perpendicularem ducere licet.

SCHOLIUM.

86. Puncta absolute considerata dicuntur punctis opponi, si fuerint termini ejusdem rectæ. Nimirum cum recta sit brevissima linea inter duos terminos (S. 191), qualis etiam est perpendicularis inter eas, quæ a puncto ad lineam vel superficiem duci possunt (S. 224); perpendicularis vicem in eo casu subit, ubi punctum alterutrum extra lineam vel superficiem sumitur.

DEFINITIO XLVIII.

87. Triangulum est figura tribus lineis terminata.

DEFINITIO XLIX.

88. Triangulum æquilaterum ABC est, cujus omnia latera inter se æqualia sunt. In genere Figura æquilatera dicitur, cujus latera singula inter se æqualia. Tab. I. Fig. 16.

DEFINITIO L.

89. Triangulum æquicrurum sive Isosceles DEF est, quod duo latera æqualia habet. Tab. I. Fig. 17.

DEFINITIO LI.

90. Triangulum scalenum ACB est, cujus nullum latus alteri æquale, seu cujus singula latera sunt inter se inæqualia. Tab. I. Fig. 18.

DEFINITION

DEFINITIO LII.

Tab. I.
Fig. 19. 91. *Triangulum rectangulum* KML est, cujus angulus unus K rectus est.

DEFINITIO LIII.

Tab. I.
Fig. 20. 92. *Triangulum obtusangulum* PNO est, cujus angulus unus N est obtusus.

DEFINITIO LIV.

Tab. I.
Fig. 16. 93. *Triangulum acutangulum* ACB est, cujus singuli anguli sunt acuti.

DEFINITIO LV.

94. *Triangulum obliquangulum* est, cujus singuli anguli sunt obliqui.

DEFINITIO LVI.

Tab. I.
Fig. 19. 95. *Hypothenuſa* ML est latus, in triangulo rectangulo, angulo recto K oppositum.

DEFINITIO LVII.

96. *Catheti* sunt latera trianguli rectanguli MK & KL angulum rectum K intercipientes.

DEFINITIO LVIII.

97. *Figura quadrilatera* est, cujus perimeter ex quatuor lateribus constat. *Rectangula* dicitur, si anguli ejus singuli fuerint recti; *obliquangula*, si obliqui.

DEFINITIO LIX.

Tab. I.
Fig. 21. 98. *Quadratum* ABDC est figura quadrilatera, æquilatera, rectangula.

DEFINITIO LX.

Tab. I.
Fig. 22. 99. *Rhombus* EFHG est figura quadrilatera, æquilatera, obliquangula.

DEFINITIO LXI.

Tab. I.
Fig. 23. 100. *Rectangulum* sive *oblongum* MLKI est figura quadrilatera, rectangula, latera opposita ML & IK, item IM & LK æqualia habens.

DEFINITIO LXII.

101. *Rhomboides* NOPQ est figura quadrilatera, obliquangula, latera opposita OP & NQ, item ON & PQ, æqualia habens.

DEFINITIO LXIII.

102. *Parallelogrammum* est figura quadrilatera, cujus latera opposita sunt parallela.

DEFINITIO LXIV.

103. *Trapezium* RTUS est figura quadrilatera non parallelogramma. Quidam *Trapezium* appellant figuram quadrilateram, cujus duo tantum latera opposita sunt parallela, quæ alias *Trapezium parallelarum basium* dici solet: figura vero, cujus neutrum latus alteri parallelum, *Trapezoides* iisdem dicitur.

DEFINITIO LXV.

104. *Figura polygona* seu *multilatera* ABCED vel FGHKI est, cujus perimeter ex pluribus, quam quatuor, lateribus componitur. Quodsi latera fuerint quinque, *Pentagonum*; si sex, *Hexagonum*; si septem, *Heptagonum*; si octo, *Octogonum* &c. dicitur.

DEFINITIO LXVI.

105. *Figura æquiangula* est, cujus singuli anguli æquales sunt.

DEFINITIO LXVII.

106. *Figura regularis* est figura æquilatera & æquiangula.

DEFINITIO LXVIII.

107. *Figura irregularis* est, quæ non simul æquilatera & æquiangula.

DEFINITIO LXIX.

108. *Figure inter se æquilatera* dicuntur,

cuntur, si singula latera unius fuerint figillatim æqualia singulis lateribus homologis alterius.

DEFINITIO LXX.

109. *Figuræ inter se æquiangulæ sunt*, si singuli anguli unius singulis angulis homologis alterius æquales sunt.

DEFINITIO LXXI.

110. Dicuntur vero tam *anguli quam latera homologa*, si eundem ordinem a primo in utraque figura servant.

DEFINITIO LXXII.

Tab. I. 111. *Diagonalis PN* est recta ex Fig. 24. vertice anguli unius P in verticem alterius N ducta.

DEFINITIO LXXIII.

Tab. I. 112. *Basis figuræ* est perimetri pars Fig. 19. ima KL.

COROLLARIUM.

113. Cum situs figuræ ipsi non sit essentialis, quamlibet perimetri partem seu latus figuræ quodlibet pro basi assumere licet.

DEFINITIO LXXIV.

Tab. I. 114. *Vertex figuræ M* est vertex Fig. 19. anguli basi KL oppositus.

DEFINITIO LXXV.

115. *Altitudo figuræ* est distantia verticis a basi.

DEFINITIO LXXVI.

116. *Figura ABCDE* dicitur *Circulo* Tab. *inscripta*, si peripheria per vertices sin- VI. gulorum angulorum ipsius transit: tunc- Fig. que *Circulus* figuræ dicitur *circumscrip-* 107. *tus*.

DEFINITIO LXXVII.

117. *Figura abcde* dicitur *Circulo* *circumscripta*, si singula ejus latera peripheriam tangant, tumque *Circulus* figuræ dicitur *inscriptus*.

DEFINITIO LXXVIII.

118. *Mensura figuræ* est quadratum, cujus latus perticæ æquale, diciturque *pertica quadrata*, & in pedes quadratos, sicut pes quadratus in digitos quadratos dividitur.

DEFINITIO LXXIX.

119. *Eodem modo determinari* dicuntur, si data, per quæ unum determinatur, fuerint similia datis, per quæ determinatur alterum, & utrobique ex datis similibus per easdem regulas reliqua determinantur.

COROLLARIUM.

120. Quæ itaque eodem modo determinantur, in iis coincidunt ea, per quæ discerni debent, adeoque similia sunt (S. 24. *Aarith.*)

CAPUT II.

De Propositionibus quibusdam Fundamentalibus.

PROBLEMA I.

121. **A** Dato puncto A ad datum punctum B lineam rectam ducere.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I,

RESOLUTIO.

I. In charta Tab. I. Linea recta ducitur juxta regulam Fig. 28. EF ad puncta data A & B applicatam gra-

graphio HI , penna aut plumbagine.

II. In ligno vel saxo

Recta delineatur etiam sine regula , si filum creta vel cerussa delibutum punctis datis A & B apprimatur & , medio digitis prehenso , sursum trahatur moxque iterum demittatur.

III. In campo

Tab. I. Recta designatur per baculos LK in
Fig. 29. punctis datis beneficio libellæ M ad horizontem perpendiculariter defixos , quorum summitati muccinum aut folium chartæ mundæ alligatur , si e longinquo videri debeant.

SCHOLIION I.

122. Cum regulæ orichalceæ & argenteæ chartam facile nigrent ; iis præferuntur , quæ ex lignis Indicis parantur , ut ebenina. His enim accuratam politiem inducere licet , ne sordes facile adhareseant , nec fibræ exiguæ calami graphiique motum uniformem impediant : quod quernis , nucis & his similibus familiare vitium.

SCHOLIION II.

Tab. I. 123. Pennæ optimæ sunt , quæ ex corvo-
Fig. 29. rum alis evelluntur : propterea quod , anserinis duriores , lineis subtilioribus & purioribus ducendis inserviunt. Baculi vero LK cuspidem ferrea K muniuntur , ut eo facilius in terra præsertim duriore defigi queant.

SCHOLIION III.

124. Utendum vero est atramento non communi , sed Sinico ; tum quia commune ob corrosivitatem vitrioli , quod ipsum ingreditur , chalybeam graphii cuspidem arrodit ; tum quia Sinicum facilius effluit , etiamsi atrius sit communi. Accedit , quod Sinico lineæ nitidiores ducantur , quam communi.

PROBLEMA II.

125. Duobus baculis in solo defixis ; tertium vel plures in eadem recta cum iis infigere.

RESOLUTIO.

Baculus ita infigitur , ut oculo in unum directo ceteri non appareant.

Ratio a luminis rectilinea propagatione petenda , de qua in Opticis.

PROBLEMA III.

126. Lineam rectam metiri.

RESOLUTIO.

Ad manus sit necesse est mensura Tab. I.
(§. 23). Nimirum pro lineis in charta Fig. 30. datis abscondantur ex RT IO partes æquales longitudinis arbitrariæ , quæ pedes designent : intervallum vero IO pedum RS in residuum lineæ transferatur , quoties fieri potest (§. 25). In campo vel catena , vel sine cannabino , vel pertica in digitos , pedes & decempedas legitime divisus utimur. Sufficit autem ultimam decempedam in pedes & pedem ultimum in digitos dividi. Quod si ergo lineam rectam metiri jubearis.

I. In charta

1. Ponatur crus circini unum in A & eo usque aperiatur , donec alterum extremum B attingat.
2. Mox circini crus unum in fine decempedæ alicujus , e. gr. in IO. ponatur & notetur , quemnam pedem mensuræ alterum attingat , e. gr. 5. Erit linea AB 1° 5'.

II. In Campo

1. In utroque lineæ extremo erigantur baculi (§. 121) & , si ea mensuræ longitudinem superet , constituentur cum iis alii in eadem recta (§. 125).
2. Fu-

2. Funis cannabinus aut catena mensuram largiens ab uno baculo usque ad alterum ita extendatur, ut utrumque ad angulos rectos secet (§.234): quod perpendicularo appenso evidens redditur.
3. Decempedæ, pedes atque digiti inter utrumque intercepti numerentur.

SCHOLIION I.

127. Si catena utrinque in annulos desinat, per quos baculos trajicere licet; lineam metimur, baculis hisce cum ceteris in eadem recta continuo collocatis (§.12). Notandum tamen, dum baculus ex A in B transfertur, non in vestigio baculi B, sed prope ipsum in D eundem insigi atque annulorum crassitiem longitudini mensuræ non accenseri debere. Quodsi tamen hac sit pars mensuræ eaque subdupla diametri baculi; baculus ex A ablati in ipso B desigi poterit. Parantur autem catenæ P Q ex filis ferreis pedibus, earumque longitudo tres decempedas excedere vix debet, ne pondere fiant molestæ: quam ob rationem nec filis ferreis nimium crassis utendum.

SCHOLIION II.

128 Si pertica circa alterum sui extremum tanquam centrum per quadrantem circuli elevata & per alterum rursus demissa lineam metitur; crassities ejus longitudini lineæ repertæ toties addenda, quoties ad eam applicata fuit, aut longitudo perticæ particula crassities congruente imminuenda. Ceterum quia perticæ, ab inæqualitate extensionis prorsus liberæ, prærogativam quandam præ catenis & funibus habent; earum extremitates annulis ferreis instrui oportet, ut observantibus, quæ in scholio præcedente diximus, tanto minus periculi supersit, ne a recta dimerianda declinetur.

SCHOLIION III.

129. Funes cannabinos humor contrahit & vires diversæ inæqualiter tendunt. Schwenterus (a) autor est, cum aliquando exercitiis Geometricis in campo vacaret, longitudinem funis, quæ erat 16 pedum, cadente pruina, horæ unius intervallo, ad pedes 15 rediisse. Ut igitur hi nævi tollantur, funiculi, ex quibus conficiuntur, in gyros contrarios contorquendi; ipse autem funis oleo ad ignem ferventi immittendus & postquam exsiccatus fuerit, per ceram liquefactam trahendus, tandemque cerandus. Nul- lum longitudinis decrementum notabis, etiamsi funem istiusmodi per diem integrum sub aquis demersum detineas. Ne autem funis humum contingat, sustentaculum Z ipsi supponendum. Perpendicularum, quo ad funem horizontaliter extendendum utimur, ex filio & appenso globo vel pondere plumbeo constat.

Tab. I.
Fig. 33.

PROBLEMA IV.

130. Data longitudine lineæ in mensura e. gr. Parisina, invenire eandem in mensura alia, e. gr. Londinensi, cujus ad priorem nota est ratio.

RESOLUTIO.

Sit e. gr. linea data 186 pedum Parisinorum, quæritur quot eadem sit pedum Londinensium? Quoniam pes Londinensis est ad Parisinum ut 135 ad 144 (§.26); inferatur (§.311. Arithm.):

$$\begin{array}{r}
 135 : 144 = 186 : \frac{26784}{135} = 198\frac{54}{135} \text{ ped.} \\
 \frac{186}{135} : 135 :: \text{Londin.} \\
 \hline
 864 \quad 1328 : \\
 1152 \quad 1215 : \\
 \hline
 144 \quad 1134 \\
 \hline
 26784 \quad 1080 \\
 \hline
 \quad \quad 54 \\
 \text{O 2} \quad \text{PRO}
 \end{array}$$

(a) Geometr. pract. lib. 1. Tract. 1. p. 381.

PROBLEMA V.

131. *Ex dato quovis centro C dato radio quæ AC Circulum describere.*

RESOLUTIO.

Tab.II. I. In charta

Fig.34. I. Collocetur circini crus unum in centro dato C & aperiatur intervallo radii dati AC.

2. Moveatur circinus circa centrum C: ita crus alterum peripheriam designabit (§. 37).

II. In solo & quotiescunque circini apertura tanta fieri nequit, quanta requiritur, radii vice fungitur filum, funiculus, aut virga five lignea, five ferrea.

SCHOLIION I.

Tab.II. Fig.35. 132. *Si fune aut filo utimur, cavendum est, ne stylus FA, quo peripheria designatur, e situ perpendiculari dimoveatur: id quod impedit filum transversum FE, si fuerit AF = 3, AE = 4 & FE = 5. Ratio patet per theorema Pythagoricum infra demonstrandum. (§. 417).*

SCHOLIION II.

Tab.II. Fig.37. 133. *Circini, ut instrumenta Geometrica reliqua, ex orichalco parantur obdurabilitatem, tractabilitatem & nitorem hujus metalli. Cuspides tamen crurum ex chalybe fiunt: fert enim ejus durities, ut subtilius exacuuntur. Circini, quo ad lineas metiendas & dividendas utimur, crura eadem sunt & invariata. Sed circini, qui peripheriis & arcibus describendis inserviit, crus alterum variari potest, ut tam plumbagine, quam atramento Sinico uti detur, prout commodum visum fuerit. Plumbagine nempe utimur, quoties arcus delineantur absoluta operatione rursus delendi. Longitudo vel 3 vel 6 digitorum esse solet.*

COROLLARIUM.

134. Quoniam unius circuli peripheria eodem modo determinatur, quo peripheria alterius cujuscunque (§. 119); omnes peripheriæ sunt inter se similes (§. 120). Eodem modo patet, omnes circulos & semicirculos esse inter se similes.

THEOREMA II.

135. *Diameter AE dividit tam Tab.I. peripheriam, quam circumulum ipsum in Fig. 2. duas partes æquales.*

DEMONSTRATIO.

Partes peripheriæ ADE & ABE, itemque circuli ADECA & ABECA determinantur, recta AC circa centrum C mota, donec sibi in directum jaceat (§. 131). Sunt adeo arcus ABE & ADE partes peripheriæ, segmenta ABECA & ADECA partes circuli eodem modo determinatæ, adeoque similes (§. 120). Quamobrem illi ad peripheriam, hæc ad circumulum eandem rationem habent (§. 170. *Arithm.*), consequenter tum illi, tum hæc inter se æquantur (§. 177 *Arithm.*). Q. e. d.

COROLLARIUM.

136. Super quavis igitur linea AE (producta, si opus sit, §. 21) ex assumpto in ea puncto C describi potest semicirculus.

THEOREMA III.

137. *Si ex centro C duorum circumulorum concentricorum ducantur radii CDA Tab.II. Fig.34. & CEB; tum arcus DE & BA ad peripherias, tum sectores DCE & ACB ad arcas suorum circumulorum eandem rationem habent.*

DEMONSTRATIO.

Cum circuli concentrici per hypoth. idem centrum C habeant (§. 44), & arcus.

arcus AB atque DE, itemque sectores ACB & DCE describantur, radiis AC & DC a communi termino CDA ad communem terminum CEB motis (§. 131); arcus isti atque sectores eodem modo determinantur (§. 119), consequenter illi peripheriarum, hi circulorum partes similes sunt (§. 120.) adeoque illi ad peripherias, hi ad circulos eandem rationem habent (§. 170. *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

Tab.II. Fig. 34. 138. Cum arcus DE & AB intra crura ejusdem anguli ACB ex ejus vertice C descripti sint arcus circulorum concentricorum (§. 44); ad suas quoque peripherias eandem rationem habent, consequenter inter se sunt ut peripheriæ (§. 173 *Arithm.*) Quoniam itaque peripheriæ eundem numerum graduum continent (§. 41); ipsi quoque eundem continere debent.

COROLLARIUM II.

139. Quia anguli quantitas æstimatur per rationem arcus ex vertice intra crura descripti ad totam peripheriam (§. 58); perinde est, quocumque radio arcus iste describatur (§. 137).

COROLLARIUM III.

140. Eadem ergo manet anguli quantitas, siue crura producantur, siue minuuntur.

THEOREMA IV.

Tab.II. Fig. 46. 141. *Angulorum aequalium A & a mensuræ BC & de sunt arcus similes, & contra si angulorum A & a mensuræ BC & de similes sunt, anguli æquales sunt.*

DEMONSTRATIO.

Cum anguli cujuscunque A vel a quantitas æstimetur per rationem ar-

cus BC vel de, ex vertice A vel a intra crura descripti, ad integram peripheriam (§. 58); si $A = a$, ratio arcuum BC & de ad peripherias suorum circulorum eadem esse debet, consequenter cum sint partes suarum peripheriarum (§. 42), similes sunt (§. 170 *Arithm.*). *Quod erat unum.*

Si arcus BC & de, mensuræ angulorum A & a (§. 57), fuerint similes; ad peripherias, quarum partes sunt (§. 42), eandem rationem habent (§. 170 *Arithm.*). Quare cum quantitas angulorum A & a per eam rationem æstimetur (§. 58), eadem omnino esse debet, hoc est, anguli æquales sunt. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM.

142. Cum arcus similes eandem rationem habeant ad peripherias, quarum sunt partes (§. 170 *Arithm.*), si fuerint partes æqualium peripheriarum, similes sunt (§. 177 *Arithm.*). Si ergo mensuræ angulorum æqualium fuerint partes ejusdem peripheriæ vel æqualium peripheriarum, æquales sunt (§. 141), & contra.

THEOREMA V.

143. *Anguli recti KLM mensura est quadrans circuli.*

Tab. I. Fig. 11.

DEMONSTRATIO.

Producatur LM in N (§. 21); erit $x = o$ (§. 65). Sed cum ex L super recta NM describi possit semicirculus (§. 136); angulorum x & o mensuræ AC & CB junctim sumtæ conficiunt semicirculum (§. 57). Ergo unius mensura est dimidius semicirculus, hoc est circuli quadrans (§. 142). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

144. Cum quadrans circuli 90° complectatur (§. 41); angulus rectus est 90° (§. 52).

COROLLARIUM II.

145. Omnes adeo recti sunt inter se æquales (§. 141), & æqualis recto etiam rectus est.

COROLLARIUM III.

146. Acutus igitur minor, obtusus major est quam 90° (§. 66).

THEOREMA VI.

Tab. I. Fig. 6. 147. Duo anguli deinceps positi x & y , aut quocunque ad idem punctum E super eadem recta CD constituti sunt æquales duobus rectis. Et contra si x & y fuerint duobus rectis æquales, CE sita est in directum ipsi ED .

DEMONSTRATIO.

Quoniam in casu priore anguli x & y sunt deinceps positi, per hypoth. EC cum ED eandem rectam constituit (§. 62). In casu posteriore omnes anguli constituti sunt super eadem recta CD ad idem punctum E , per hypoth. Quare cum ex E super CD describi possit semicirculus (§. 136); in utroque casu mensura omnium angulorum simul est semicirculus (§. 57). Sed idem est mensura duorum rectorum (§. 143). Ergo anguli isti sunt duobus rectis æquales (§. 142). *Quod erat unum.*

Quodsi x & y fuerint duobus rectis æquales, nec tamen CE ponatur ipsi ED in directum sita, recta quædam alia veluti EA ipsi ED in directum jacebit (§. 21), atque hinc $o + y$ & x erunt deinceps positi (§. 62), consequenter duobus rectis æquales, per demonstrata, adeoque $o + y + x = y + x$ (§. 87).

Arith. & §. 145 Geom.): quod cum sit absurdum (§. 84 *Arith.*), CE ipsi ED in directum sita. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM I.

148. Anguli, qui sunt deinceps, x & y ; aut plures circa idem punctum ejusdem rectæ constituti, si junctim sumantur, conficiunt 180° (§. 144).

COROLLARIUM II.

149. Angulorum deinceps positorum dato uno, alter itidem datur: relinquitur nimirum, si datus ex 180° subducatur.

COROLLARIUM III.

150. Si in campo angulum inaccessum vel obtusum Quadrante metiri jubemur & eum, qui est deinceps, accedere licet; illius loco hunc metimur: ex 180° enim subductus quæsitus relinquit (§. 149).

COROLLARIUM IV.

151. Certus evades, te omnes figuræ rectilineæ angulos in campo exacte dimensum esse, si finita operatione deinceps positos etiam metiaris & hos singulos illis singulis addas: quodsi enim ubique prodierit summa 180° , operatio rite peracta (§. 148).

PROBLEMA VI.

152. *Angulum metiri.*

RESOLUTIO.

Cum anguli ACB mensura sit arcus DE ex centro C intra crura AC & CB descriptus (§. 57), totum negotium huc redit, ut numerus graduum, qui arcui DE competunt, determinetur: id quod fit ope semicirculi in 180° exactissime divisi. Nimirum

I. In charta

1. centrum Semicirculi ad verticem anguli C applicatur & radius ejus CE cruri BC admovetur,

2. Gra-

Tab. II
Fig. 36

2. Gradus in arcu DE inter crura anguli AC & CB intercepto numerantur.

Tab. II. II. In Campo

- Fig. 38. 1. Instrumentum goniometricum ita collocatur, ut radius ejus CG uni cruri anguli; centrum vero C vertici ejusdem immineat. Prius obtinetur collineando per dioptras F & G, seu pinnulas immobiles ad diametrum perpendiculariter erectas, versus baculum in extremo cruris defixum; posterius vero perpendicularum ad centrum instrumenti applicando.
2. Regula HI circa centrum mobilis versus crus anguli alterum promoveatur, donec per pinnulas ipsi affixas baculus in extremo ejus defixus collineanti occurrat.
3. Gradus, quem regula instrumento indicat notatur.

SCHOLION I.

153. Semicirculus minor, quo in charta utimur, Instrumentum transportatorium vulgo appellatur. In campo quidam circulo integro, quidam nonnisi quadrante utuntur.

SCHOLION II.

154. Diameter transportatorii est trium fere digitorum Rhenanorum; majorum vero instrumentorum goniometricorum unius pedis aut ad summum unius cum dimidio. Divisio accurata fieri debet. In transportatoriiis gradus dimidii satisfaciunt; in majoribus dena prima. Angulos in campo instrumento majore captos, quantum fieri potest, accuratissime in charta designaturi, diametrum transportatorio non multo minorem diametro ejus instrumenti, quo in campo usi sumi, & regulam circa centrum mobilem indulgent.

PROBLEMA VII.

155. Data quantitate anguli, ipsum Tab. II. describere. Fig. 36.

RESOLUTIO.

- I. In charta
1. Ducatur recta CB &
 2. Super alterum ejus extremum C ponatur centrum instrumenti transportatorii, ita ut radius ejus cum recta CB coincidat.
 3. Numerentur gradus dati ab E versus D & ad gradum ultimum notetur punctum D.
 4. Ducatur recta CA. per C & C. Erit ACB angulus quæsitus (§. 141).

II. In campo

1. Collocetur instrumentum goniometricum ut in probl. præc. (§. 152).
2. Regula HI circa centrum C ad gradum datum promoveatur.
3. Baculus ita erigi jubeatur, ut per dioptras collineanti occurrat.

Tab. II. Fig. 38.

THEOREMA VII.

156. Si recta AB alteram CD secet in Tab. I. E, anguli verticales x & o, item y & E, sunt æquales. Fig. 6.

DEMONSTRATIO.

$$\left. \begin{aligned} x + y &= 180^\circ \\ y + o &= 180^\circ \end{aligned} \right\} (\S. 148)$$

Ergo $x + y = y + o$ (§. 87 Arithm.) adeoque $x = o$ (§. 91 Arithm.). Eodem modo ostenditur esse $y = E$. Q. e. d.

COROLLARIUM.

157. Quodsi in campo aut alio in casu angulum inaccessum x metiri jubeamur; accessum vero non neget verticalis o: hunc ejus loco metiri licet.

SCHO-

SCHOLIUM.

158. Cum tyrones sub initium studii Mathematici sensibus atque imaginationi nimis adhuc indulgeant ratiociniis ex assumtis deductis minus adsueta; figuras per data ex hypothesebus theorematum assumpta construere ac reliquarum linearum & angulorum per constructionem determinantum quantitatem explorare (§. 126. 152) iuvat: ita sensus & veritas propositionis eluciscit, & animus ad demonstrationes genuinas percipiendas excitatur: cum enim sit scire avidus, rationes veritatis nosse desiderat. In demonstratione magis acquiescunt tyrones, examine ratiocinationis legitime sic facto, non secus ac theoria physica magis satisfaciunt, ubi factis experimentis decretoriis consona deprehenduntur.

THEOREMA VIII.

Tab. I. 159. Omnes anguli x, y, o, E &c. Fig. 6, circa punctum aliquod E constituti sunt aequales quatuor rectis.

DEMONSTRATIO.

Describatur ex puncto E vertice communi angulorum x, y, o, E &c. (§. 45) intervallo quocunque Ea circulus (§. 131); evidens est mensuras omnium angulorum simul sumtas db, bc, ca, ad &c. conficere integram circuli peripheriam (§. 143). Mensura ergo angulorum x, y, o, E &c. junctim sumtorum est circulus integer (§. 55). Sed circulus est mensura quatuor rectorum (§. 143). Ergo omnes isti anguli aequales sunt quatuor rectis (§. 141). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

160. Omnes itaque anguli circa idem punctum constituti junctim 360° conficiunt (§. 144).

THEOREMA IX.

161. Quae sibi mutuo congruunt, ea & aequalia, & similia sunt.

DEMONSTRATIO.

Quae sibi mutuo congruunt, eorum iidem esse possunt termini (§. 3). Ergo unum in locum alterius salva quantitate substituere licet: consequenter aequalia sunt (§. 15. *Arith.*). *Quod erat unum.*

Porro quoniam, quae sibi mutuo congruunt, eosdem terminos habere possunt (§. 3): quin eodem modo determinari queant dubitandum non est. Sunt igitur similia (§. 120). *Quod erat alterum.*

THEOREMA X.

162. Quae aequalia & similia sunt, ea sibi mutuo congruunt.

DEMONSTRATIO.

Similia differre nequeunt, nisi quantitate (§. 26 *Arithm.*). Quamobrem si aequalia fuerint, profus non differunt (§. 15 *Arithm.*). Jam si sibi mutuo superimposita non iisdem terminis continerentur, diversitate terminorum differrent: quod cum sit absurdum per demonstrata, iisdem terminis contineri debent, consequenter sibi mutuo congruunt (§. 3). *Q. e. d.*

THEOREMA XI.

163. Si linea linea congruit, singula puncta unius singulis punctis alterius congruere debent.

DEMONSTRATIO.

Linearum enim, quae sibi mutuo congruunt, iidem termini esse possunt (§. 3.). Sed termini linearum secundum longitudinem sunt duo puncta; secundum latitudinem & profunditatem ipsamet sui termini existunt (§. 11). Ergo si lineae congruunt, non modo puncta extrema,

trema, sed etiam omnia intermedia congruere debent. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

164. Si centra & radii duorum circulorum congruunt; etiam peripheriæ, in quibus radii terminantur (§. 39), consequenter circuli ipsi congruere debent (§. 3).

COROLLARIUM II.

165. Ex uno itaque puncto eodem radio circulus nonnisi unicus describi potest.

THEOREMA XII.

Tab. II. Fig. 39. 166. Si fuerint duo anguli BAC & bac æquales, & vertex unius a ponatur super verticem alterius A; præterea crus illius ac super crus hujus AC: etiam crus alterum ab super alterum AB cadet.

DEMONSTRATIO.

Si negas, necesse est ut *ab* vel intra angulum BAC, vel extra eum cadat. Ducatur ex A, radio AD, arcus Df (§. 131): erit DE mensura anguli BAC, De vel Df mensura anguli bac (§. 39); Ergo in casu priore De mensura anguli bac minor; in posteriore eadem mensura Df major foret mensura anguli BAC (§. 20. Arithm.). Quod utrumque cum sit absurdum (§. 142); crus *ab* super AB cadit. *Q. e. d.*

THEOREMA XIII.

Tab. I. Fig. 9. 167. Si vertex & crura anguli unius DAE supra verticem & crura alterius BAC cadant; angulus unus DAE alteri BAC æqualis est.

DEMONSTRATIO.

Describatur enim ex communi vertice A, intra crura AD & AE, arcus DE (§. 131): erit is mensura anguli DAE
Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

(§. 57). Sed quoniam crura DA & DE supra crura alterius anguli AB & AC cadunt, per hypoth. idem arcus DE inter crura AB & AC intercipitur. Est igitur & mensura anguli BAC (§. cit.), consequenter DAE = BAC (§. 142). *Q. e. d.*

THEOREMA XIV.

168. Linea recta æquales sibi mutuo congruunt. Tab. II. Fig. 40.

DEMONSTRATIO.

Est *ab* = AB, per hypoth. Est vero etiam recta *ab* similis rectæ AB (§. 17). Ergo *ab* ipsi AB congruit (§. 162). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

169. Ergo si recta *ab* alteri æquali AB ita applicetur, ut punctum *a* supra A & *ab* supra AB cadat; etiam *b* supra B cadet (§. 3. II).

COROLLARIUM II.

170. Si rectarum extrema coincidunt; singula puncta unius erunt in recta altera (§. 162), atque hinc inter duo puncta nonnisi unica recta cadit.

COROLLARIUM III.

171. Cum radii circulorum sint lineæ rectæ (§. 39), ubi æquales fuerint, sibi mutuo congruunt (§. 168), consequenter etiam circuli congruere debent (§. 164); atque adeo circuli æquales sunt, quorum æquales sunt radii (§. 161).

COROLLARIUM IV.

172. Quoniam non absimili modo patet; circulum, cujus minor est radius, congruere parti circuli radium majorem habenti; minor est circulus, cujus minor radius; major vero, cujus radius major (§. 20 Arithm.).

Tab. I.
Fig. 2.

THEOREMA XV.

173. Si centro circuli C applicetur linea recta CD , radio AC æqualis, extremum unum; alterum peripheriam attinget.

DEMONSTRATIO.

Quoniam recta CD radio æqualis per hypoth. ipsi congruet (§. 168), adeoque eisdem cum eo terminos habere debet (§. 3). Sed radius ex centro eductus in peripheria terminatur (§. 39). Ergo & recta CD ipsi æqualis, si alterum extremum in C hæreat, altero peripheriam attinget. *Q. e. d.*

THEOREMA XVI.

174. Anguli similes sunt etiam æquales.

DEMONSTRATIO.

In angulis similibus ea coincidunt, per quæ a se invicem discerni debent (§. 24. *Arithm.*). Quare cum anguli distinguantur per rationem arcuum ex vertice intra crura descriptorum ad peripheriam (§. 58), si anguli sunt similes, arcus isti ad suas peripherias eandem rationem habere, hoc est, & ipsi similes esse debent (§. 141 *Geom.* & §. 170. *Arith.*). Sunt igitur anguli æquales (§. 141). *Q. e. d.*

THEOREMA XVII.

175. In figuris similibus anguli homologi sunt æquales & latera homologa proportionalia.

DEMONSTRATIO.

In figuris similibus ea coincidunt, per quæ a se invicem discerni debent

(§. 24 *Arith.*). Quare cum figuræ nequeant distingui nisi per angulos & latera; illi æquales (§. 174), hæc proportionalia esse debent (§. 154 *Arith.*). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

176. Sermo nobis tantum est de figuris rectilineis, quarum latera in se spectata omnia inter se similia sunt. Alias addendum foret, latera homologa debere esse insuper inter se similia & similiter posita, e. gr. arcus circulorum similes convexitatem centro figuræ obvertentes.

THEOREMA XVIII.

177. Figurarum sibi mutuo congruentium $RTUS$ & $rtus$ anguli & latera homologa inter se æqualia sunt. Tab. I.
Fig. 25

DEMONSTRATIO.

Quoniam figuræ $RTUS$ & $rtus$ sibi mutuo congruunt, per hypoth. iidem utriusque termini esse possunt (§. 3). Quare cum termini earum sint perimetri (§. 31); una $rtus$ supra aliteram $RTUS$ ita poni potest, ut tu ipsi TU , tr ipsi TR , rs ipsi RS &c. congruat. Ergo latera homologa sunt inter se æqualia (§. 161). *Quod erat unum.*

Sunt vero T & t , R & r , S & s &c. vertices; TU , TR , RS , SU & tu , tr , rs , su crura angulorum homologorum (§. 54). Quamobrem & anguli homologi æquales sunt (§. 167). *Quod erat alterum.*

SCHOLIUM.

178. Patet ex scholio precedente, quomodo idem theorema ad figuras quoque non rectilineas extendatur.

C A P U T I I I.

De Linearum Rectarum & Triangulorum Symptomatis.

T H E O R E M A X I X.

Tab.II. Fig.41. 179. **S**I in duobus triangulis ABC & abc fuerit $A=a$, $AB=ab$, $AC=ac$; erit etiam $BC=bc$, $C=c$, $B=b$ totaque triangula aequalia & similia erunt.

D E M O N S T R A T I O.

Concipiamus triangulum abc ita poni super alterum ABC, ut punctum a super A & recta ab super AB cadat. Quoniam $ab=AB$, $a=A$ & $ac=AC$, per hypoth. punctum b super B (§. 168), recta ac super AC (§. 166) & punctum c super C (§. 169), consequenter bc super BC (§. 170) cadit, adeoque $\triangle abc$ alteri ABC congruit (§. 3), consequenter $bc=BC$ (§. 161), $c=C$ & $b=B$ (§. 167), totaque triangula aequalia & similia sunt (§. 161).
Q. e. d.

P R O B L E M A V I I I.

Tab.II. Fig.41. 180. Datis duobus lateribus AB & AC, cum angulo intercepto A triangulum construere.

R E S O L U T I O.

1. Assumpto AB pro basi, in A constituatur angulus datus (§. 155).
2. In crus ejus alterum transferatur altera datarum AC.
3. Tandem ducatur recta BC. Erit ABC triangulum desideratum (§. 179).

S C H O L I O N.

181. Tyrone latera & angulos datos in numeris assumant: quod in aliquibus casibus ad demonstrationes empiricas distinctius percipiendas proderit, quas supra (§. 158) commendavimus.

C O R O L L A R I U M I.

182. Determinatis adeo duobus lateribus cum angulo intercepto, tota triangula determinantur.

C O R O L L A R I U M I I.

183. Quare si in duobus triangulis ACB & acb fiat $a=A$ & $ab:ac=ABAC$; triangula eodem modo determinantur (§. 119), adeoque similia sunt (§. 120), consequenter etiam $c=C$ & $b=B$, $ab:bc=AB:BC$ &c. (§. 175).

T H E O R E M A X X.

184. In triangulo equicruo DFE Tab.II. Fig.44. 1°. anguli ad basin y & u sunt aequalis, 2°. recta FG, que angulum DFE bifariam secat, basin quoque DE, & 3°. triangulum ipsum bifariam secat: immo 4°. FG ad basin DE perpendicularis.

D E M O N S T R A T I O.

Nam $o=x$, per hypoth. $DF=FE$ (§. 89) & $FG=FG$ (§. 81 Arithm). Ergo 1°. $y=u$, 2°. $DG=GE$, 3°. $\triangle DFG=\triangle GFE$ (§. 179). Et quia etiam anguli ad G aequales, (per §. cit.) 4°. FG ad DE normalis est (§. 79) Q. e. d.

COROLLARIUM.

185. Cum triangulum æquilaterum sit etiam æquicrurum (§. 88. 89.); theorema præfens de æquilatero itidem verum est.

THEOREMA XXI.

Tab. I. 186. In triangulo æquilatero ABC
Fig. 16. omnes anguli sunt inter se æquales.

DEMONSTRATIO.

Est enim $AC=CB$. (§. 88). Ergo $A=B$ (§. 184). Est vero etiam $AC=AB$ (§. 88). Ergo $C=B$ (§. 184). Quare $A=C$ (§. 87 *Arithm.*) *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

187. Triangulum itaque æquilaterum est etiam æquiangulum (§. 105).

THEOREMA XXII.

Tab. III. 188. Si trianguli ABC latus unum
Fig. 55. AC continuetur in D; erit angulus externus DAB major quolibet interno opposito B vel C.

DEMONSTRATIO.

Concipiatur AB, bifariam divisa in F ductaque recta CF producenda in G (§. 21), donec fiat $FG=FC$. Quoniam GC secat AB in F (§. 50), erit $z=y$ (§. 156), consequenter $o=x$ (§. 179). Sed $DAB > o$ (§. 84 *Arithm.*). Ergo & $DAB > x$ (§. 89 *Arithm.*). Eodem modo ostenditur esse DAB , aut, quod perinde est (§. 156), ejus verticalem $HAC > ACB$. *Q. e. d.*

THEOREMA XXIII.

Tab. III. 189. In omni triangulo ABC latus
Fig. 57. majus AC opponitur majori angulo B; minus AB minori C, & contra.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $AB < AC$. per *hypoth.* parti hujus AD æqualis est (§. 20. *Arithm.*), Ducatur recta BD (§. 121):

erit BAD triangulum æquicrurum (§. 89), adeoque $o=x$ (§. 184). Sed $o > C$ (§. 188). Ergo $x > C$ (§. 89 *Arithm.*), consequenter multo magis $B > C$. *Quod erat unum.*

Sit $B > C$, per *hypoth.* Si non sit $AC > AB$, erit vel $AC=AB$, vel $AC < AB$, adeoque in casu primo $B=C$ (§. 184.), in altero $B < C$, per *demonst.* Sed cum utrumque hypothefin evertat, absurdum est; consequenter si angulus $B > C$, etiam $AC > AB$. *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXIV.

190. In omni triangulo ABD duo
Tab. III. latera AD & BD simul sumta sunt tertio AB majora.
Fig. 57.

DEMONSTRATIO.

Producatur AD in C (§. 21), donec fiat $BD=DC$, adeoque $AC=AD+DB$ (§. 88. *Arithm.*): erit $\triangle BDC$ æquicrurum (§. 89) & hinc $y=C$ (§. 184), consequenter $C < x+y$ (§. 48. *Arithm.*). Quare AC seu $AD+DB > AB$ (§. 189.). *Q. e. d.*

THEOREMA XXV.

191. Linea recta AB est brevissima
Tab. I. omnium, que intra eosdem terminos A & B continentur.
Fig. 1.

DEMONSTRATIO.

Sit curva quæcunque ACB. Ducantur rectæ AC & CB: erit $AC+CB > AB$ (§. 190). Ducantur porro rectæ AD & DC, item CE & EB: erit $AD+DC > AC$ & $CE+EB > CB$ (§. *cit.*), consequenter $AD+DC+CE+EB > AC+CB$ (§. 90 *Arithm.*), adeoque multo magis $AD+DC+CE$

CE + EB > AB. Quodsi plures ducas subtenfas; erit earum aggregatum denovo majus ipsa AB. Quare cum illa subtenfa cum curva tandem coincident, erit ea major recta AB intra eosdem terminos contenta. Est ergo recta AB minor curva quacunque intra eosdem terminos contenta, hoc est omnium linearum brevissima, quae ab A usque ab B duci possunt. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

192. Distantia ergo puncti A a puncta B in plano est linea recta (§. 15. 36): cumque inter duo puncta nonnisi unica linea recta contineri possit (§. 170); via in plano brevissima est numero unica.

COROLLARIUM II.

193. Singula itaque peripheriae puncto a centro circuli aequaliter distant (§. 37).

PROBLEMA IX.

194. Metiri distantiam duorum locorum A & B ex eodem tertio C accessorum.

RESOLUTIO.

1. In loco C ad arbitrium electo defigatur baculus.
2. Linea AC transferatur ope funis & catenae ex C in a, ita ut baculus in a defigendus sit cum C & A in eadem recta (§. 125).
3. Eadem ratione ex C in b transferatur linea CB.
4. Investigetur longitudo rectae ab (§. 126). Dico, ab esse aequalem distantiae quaesitae.

DEMONSTRATIO:

Cum loca A & B punctorum instar in eodem plano sitorum considerentur, eorum distantia est recta AB (§. 192).

Quoniam vero A a & B b sunt lineae rectae per constr. & se mutuo secant in C (§. 50).

erit $x = y$ (§. 156).

Præterea $aC = CA$
 $bC = CB$ } per constr.

Ergo $ba = AB$ (§. 179). *Q. e. d.*

Aliter.

1. Collocato instrumento goniometrico in C investigetur quantitas anguli x Tab. II. Fig. 42. (§. 152).
2. Queratur porro longitudo rectarum AC & BC (§. 126).
3. Ex datis cruribus AC & CB cum angulo intercepto x construatur juxta scalam geometricam modicam triangulum acb (§. 180).
4. Inveniatur in eadem mensura longitudo basis ab (§. 126).

Iidem numeri indicabunt distantiam AB in ea mensura, qua in campo usus es.

DEMONSTRATIO.

Est enim $x = x$ & $ac : cb = AC : CB$, per constr. consequenter $cb : ab = CB : AB$ (§. 183). Ergo iidem numeri, qui respondent rectis cb & ab in mensura modica, etiam rectis CB & AB in majore respondent (§. 155. Arithm.) *Q. e. d.*

Aliter.

1. In mensura Geometrica in D horizontaliter collocata assumatur punctum c, & in eo acicula defigatur, ad quam Tab. II. Fig. 43.
2. applicata regula cum dioptris tam diu huc illucque moveatur, donec per ea prospicienti punctum B occurrat, ducaturque in hoc regulae situ recta cb.

3. Similiter collineatio fiat in punctum A ducaturque ca .
 4. Investigetur longitudo rectarum cA & cB (§. 126) &
 5. Ex mensura modica transferantur lineæ istis proportionales ex c in a & b .
 6. Tandem in eadem mensura inveniatur longitudo ipsius ab (§. 126).
- Idem numeri indicabunt distantiam AB in mensura majore, qua in campo usus es.

DEMONSTRATIO.

Coincidit cum proxime præcedente.

SCHOLIUM I.

Tab. II. Fig. 24. 195. Quodsi angustia spatii non permittit, ut integræ AC & BC in a & b transferantur; poterunt aC & bC fieri $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ & c. ipsarum AC & BC : quo in casu eodem modo ut in resolutione secunda demonstrabitur, esse $ab = \frac{1}{2}$, vel $\frac{1}{3}$, vel $\frac{1}{4}$ & c. ipsius AB .

SCHOLIUM II.

196. Notent tyrones artificium, quo demonstrationes Geometricas non modo ad facilitam intelligentiam reducere, sed & proprio Marte invenire possunt. Nimirum quicquid vel ex constructione problematis aut hypothese theorematis, vel ex conspectu figuræ utramque representantis, distincte cognoscitur, per characteres distincte exprimat, veluti in demonstratione prima presentis, quod $x = y$ $aC = AC$ & $bC = BC$. Quo facto dispiciatur, cujusnam theorematum antecedentium hypothesis in iis contineatur: thesis enim illius theorematis ostendit, quid ex iis consequatur, veluti in nostro exemplo, quod $ab = AB$. Cum vero maxima demonstrationum pars ex paucis de congruentia & similitudine triangulorum theorematis derivetur; eorundem recordatio tandem familiarissima evadit opus est.

THEOREMA XXVI.

197. Si ex punctis extremis C & O recta alicujus radii CP & PO , qui junctim sumti recta CO majores sunt, describantur circuli; ii se mutuo secant.

Tab. I. Fig. 8.

DEMONSTRATIO.

Sit $CP < CO$; erit parti hujus veluti CN æqualis (§. 20 *Arithm.*), adeoque ipsi congruit (§. 168). Quare si ex centro C radio CP circulus PNQ describatur (§. 131); erit punctum N in peripheria ipsius (§. 173). Eodem modo ostenditur, si ex centro O radio OP describatur circulus; fore punctum M in peripheria ipsius. Cum ergo $CN + NO < CP + PO$, per *hypoth.* & $CP = CN$ (§. 40); erit $NO < PO$ (§. 92 *Arithm.*). Sed $PO = MO$ (§. 40 & per *demonst.*). Ergo $NO < MO$ (§. 89. *Arithm.*). Quare punctum N peripheriæ circuli $PNQP$ cadit intra circulum $PMRP$, consequenter circuli se mutuo secant (§. 52). Quod erat unum.

Nec absimili modo idem ostenditur, si fuerit $CP > CO$, vel $CP = CO$. Quod erat alterum.

PROBLEMA X.

198. Super data recta AB triangulum æquilaterum construere.

Tab. I. Fig. 16.

RESOLUTIO.

1. Ex A ranquam centro intervallo ipsius AB describarur arcus y , &
2. Ex B eodem intervallo alius x (§. 131), qui priorem in C interfecabit (§. 197).
3. Ducantur rectæ AC & CB : erit ACB triangulum æquilaterum.

DE-

DEMONSTRATIO.

Etenim $AC=AB$ & $BC=AB$ (§.40). Ergo $AC=BC$ (§. 87 *Arithm.*). Quare triangulum ABC est æquilaterum (§. 88). *Q. e. d.*

PROBLEMA XI.

199. *Data basi DE & crure DF, quod illa dimidia majus sit, triangulum æquicrurum construere.*

RESOLUTIO.

- Tab. I. Fig. 17. 1. Ex uno basis extremo D intervallo cruris dati DF describatur arcus, &
2. ex altero extremo E eodem intervallo arcus alius (§. 131), qui ob $DF + EF > DE$ per *hypoth.* & *constr.* priorem in F interfecabit (§. 197).
3. Ducantur rectæ DF & EF (§. 121). Dico, DFE esse triangulum æquicrurum.

DEMONSTRATIO.

$DF=FE$, per *constr.* Ergo EDF est triangulum æquicrurum (§. 89). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

200. Determinatis ergo basi DE & crure DF totum triangulum æquicrurum determinatur.

COROLLARIUM II.

201. Duo igitur triangula æquicrura DFE & dfe eodem modo determinantur, si fiat $DF:DE = df:de$ (§. 119), consequenter similia (§. 120), adeoque sibi mutuo æquiangula sunt (§. 175 & 109).

THEOREMA XXVII.

Tab. II. Fig. 45. 202. *Duo semicirculi CLE & DGF nonnisi in puncto unico G se mutuo secare possunt.*

DEMONSTRATIO.

Secent enim, si fieri possit; præterea se etiam in L. Ducantur ex centris A & B ad puncta intersectionum L & G rectæ AL, AG, BL, BG; puncta item intersectionum connectantur rectæ GL (§. 121). Quoniam $BL=BG$ (§. 40); erit $BGL=BLG$ (§. 184). Sed $BGL > AGL$ (§. 84. *Arithm.*): ergo $BLG > AGL$ (§. 89 *Arithm.*). Porro quia $AL=AG$ (§. 40); $AGL=ALG$ (§. 184). Quare $BLG > ALG$ (§. 89 *Arithm.*): quod cum sit absurdum (§. 84 *Arithm.*); duo semicirculi nonnisi unico in puncto se mutuo secare possunt. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

203. Ergo duo integri circuli non nisi duobus in punctis se mutuo secare possunt.

THEOREMA XXVIII.

204. *Si in duobus triangulis ACB & acb fuerit $AC=ac$, $AB=ab$, $BA=bc$; etiam $A=a$, $B=b$, $C=c$, totaque triangula equalia sunt & similia.* Tab. II. Fig. 418

DEMONSTRATIO.

Ex centro A radio AC, descriptus concipiatur arcus y &, ex centro B radio BC, alius x (§. 131). Concipiamus porro $\triangle acb$ ita poni supra $\triangle ACB$, ut punctum a super A & recta ab super AB, cadat. Quoniam $ab=AB$, per *hypoth.* punctum b super B cadet (§. 169). Et quia $ac=AC$ & $bc=BC$, per *hypoth.* recta ac in arcu y & bc in arcu x terminabitur (§. 173), consequenter punctum c super C cadet (§. 202) & rectæ ac, bc rectis AC, BC congruent (§. 170). Quare $a=A$, $b=B$.

$b = B, c = C$ (§. 167); cumque $\triangle acb$ alteri $\triangle ACB$ congruat (§. 3), $\triangle acb = \triangle ACB$ (§. 161). *Q. e. d.*

PROBLEMA XII.

Tab. I. Fig. 18. 205. *Datis tribus lateribus AB, BC, CA, quorum duo simul sumta AC & BC tertio AB majora sunt, triangulum construere.*

RESOLUTIO.

1. Assumta AB pro basi ex A intervallo ipsius AC describatur arcus y &
2. ex B intervallo ipsius BC arcus alius x (§. 131), qui ob $AC + BC > AB$ per *hypoth.* priorem in C secabit (§. 197).
3. Ducantur rectæ AC & BC (§. 121). Ita factum est, quod petebatur.

COROLLARIUM I.

206. Cum ex tribus datis rectis nonnisi unicum triangulum constitui possit (§. 204); determinatis tribus lateribus, totum triangulum determinatur.

COROLLARIUM II.

207. Quare si in duobus triangulis ACB & $\triangle acb$ fiat $AC : AB = ac : ab$, $AC : BC = ac : bc$; triangula eodem modo determinantur (§. 119), consequenter similia (§. 120), adeoque sibi mutuo æquiangula sunt (§. 175. 109).

PROBLEMA XIII.

Tab. II. Fig. 46. 208. *Angulo dato DAE æqualem bac constituere.*

RESOLUTIO

I. In charta

1. Ex A intervallo AC describatur arcus BC, erit $AB = AC$ (§. 40).
2. Ducatur recta $ac = AC$ & ex a intervallo ipsius AB describatur arcus x , item

3. Ex c intervallo ipsius CB alius y , qui ob $AB + BC > AC$ (§. 190); seu $ab + bc > ac$ (§. 190), priorem in b interfecabit (§. 197).

4. Ducatur recta ab (§. 121).

Dico esse $a = A$.

II. In Solo

1. Defigatur baculus in C cum A & E, itemque alius in B cum A & D in eadem recta (§. 125).

2. In a & c defigantur baculi ea lege, ut sit $ac = AC$.

3. Ad eos funis vel catena ita applicetur, ut pars ipsius $ab = AB$ & altera $cb = CB$ fiat.

4. In b defigatur baculus. Dico esse $bac = BAC$.

Interdum etiam in solo uti licet modo priore.

DEMONSTRATIO.

In utroque casu $ac = AC, ab = AB, cb = CB$, per *construct.* Ergo $bac = BAC$ (§. 204). *Q. e. d.*

PROBLEMA XIV.

209. *Angulum datum HIK in duas partes æquales dividere.* Tab. II. Fig. 47.

RESOLUTIO.

1. Ex centro I ducatur radio quocunque arcus LM (§. 131).

2. Ex L & M, intervallo dimidia LM majore, ducantur arcus se mutuo secantes in N (§. 197).

3. Ducatur recta IN (§. 121). Dico esse $HIN = NIK$.

DEMONSTRATIO.

Est enim $IL = IM$ (§. 40), $LN = MN$, per *constr.* $IN = IN$. Ergo $HIN = NIK$ (§. 204). *Q. e. d.*

PRO-

PROBLEMA XV.

Tab.II. 210. *Lineam rectam AB in duas*
Fig.50. partes æquales dividere & in medio
ejus perpendicularem erigere.

RESOLUTIO.

- I. In charta
 1. Ex A & B, intervallo dimidia AB
 majore, ducantur arcus se mutuo
 in Csecantes (§. 197).
 2. Fiat similis intersectio infra lineam
 in D (§. cit.).
 3. Ducatur recta DC (§. 121).
 Dico esse $AE = EB$.

DEMONSTRATIO.

ΔACB est æquicrurum (§. 198) &
 recta CED dividit angulum ACB bi-
 fariam (§. 209). Ergo eadem recta CD
 dividit AB bifariam in E & ad AB in
 E perpendicularis (§. 184). *Q. e. d.*

Aliter.

- Tab.II. 1. Ponatur circinus in A & eo usque a-
Fig.51. periat, donec medium lineæ attingere
videatur in D.
 2. Intervallum AD transferatur ex B
 in E: quo factò
 3. Non difficile erit determinatu punc-
 tum medium F.

II. In Solo.

1. Filum longitudini lineæ AB æquale
 complicetur, ut punctum medium
 inveniatur.
 2. Hoc acicula infixæ notetur & filum
 lineæ datæ rursus coextendatur.
 3. Ad punctum medium baculus in ter-
 ra defigatur.

Sic factum est, quod petebatur.

Wolffi Oper. Mathem. Tom. I.

SCHOLIUM.

211. *Duo modi posteriores equidem se-*
caudi rectam bifariam mechanici dicuntur,
non geometrici, quia tentando res peragitur:
illorum tamen in praxi egregius est usus.

PROBLEMA XVI.

212. *Ex puncto G in recta ML da-*
to perpendicularem GI excitare.

RESOLUTIO.

- I. In charta.
 1. Posito circino in G, arbitrario inter-
 vallo refecentur utrinque partes æ-
 quales GK & GH. *Tab.II. Fig.49.*
 2. Ex punctis K & H, intervallo dimidia
 KH majore, fiat intersectio in I (§.
 197).
 3. Ducatur recta GI (§. 121), quæ erit
 ad ML perpendicularis.

DEMONSTRATIO.

Nam $KG = GH$ & $KI = IH$, *per*
construct. $IG = IG$. Ergo anguli ad
 G sunt æquales (§. 204), consequen-
 ter IG ad ML perpendicularis (§. 79).
Q. e. d.

Aliter.

1. Normæ, hoc est, instrumenti ex
 duabus regulis ad angulum rectum
 junctis compositi crus unum ita ap-
 plicetur ad rectam ML, ut anguli
 vertex supra punctum datum G ca-
 dat. *Tab.II. Fig.52.*
 2. Ducatur juxta crus alterum recta
 IG (§. 121), quæ erit ad ML per-
 pendicularis.

DEMONSTRATIO.

Angulus normæ est rectus, *per hy-*
poth. sed ipsi æqualis est IGL (§. 167):
 ergo IGL est itidem rectus (§. 145),

Q

adeo-

adeoque IG ad ML perpendicularis
(§. 78).

Tab. II. II. In folo.
Fig. 52.

Norma utimur majore & juxta crus
GI filum extenditur. Aut

Tab. II. I. Filum KIH in duas partes æquales in
Fig. 49. I divisum ex punctis KIH extenditur &

2. In I baculus defigitur, tandemque
 3. KH bifariam secatur in G (§. 210).
- Dico esse GI ad KH perpendicularem.

DEMONSTRATIO.

Cum $KI = HI$, & $KG = GH$, per
construct. $GI = GI$. Anguli ad G
deinceps positi sunt æquales (§. 204),
consequenter IG ad ML normalis (§. 79).
Q. e. d.

THEOREMA XXIX.

Tab. III. 213. Ex uno puncto D super eadem
Fig. 53. III. recta AB nonnisi perpendicularis unica
CD erigi potest in eodem plano.

DEMONSTRATIO.

Si fieri potest, sit præterea DE ad
idem punctum D perpendicularis, quæ
intra crura anguli ADC cadat: erit ADE
angulus rectus (§. 78). Et quoniam CD
perpendicularis ad AD, per hypoth. ADC
similiter rectus est (§. cit.), consequen-
ter $ADE = ADC$ (§. 145): quod cum
sit absurdum (§. 84 Arithm.), ED ad
AB perpendicularis esse nequit. *Q. e. d.*

THEOREMA XXX.

Tab. III. 214. Si recta CD perpendicularis ad
Fig. 53. DB continuetur in F, erit etiam DF ad
DB perpendicularis.

DEMONSTRATIO.

Quoniam CD perpendicularis ad DB
per hypoth. angulus x rectus est (78).
Ergo y similiter rectus est (§. 65), con-
sequenter DF perpendicularis ad DB
(§. 78). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXI.

215. Si duo puncta H & Q alicujus
rectæ HI a duobus punctis K & L alte-
rius rectæ MN utrinque æqualiter dis-
tent; erit HI ad MN perpendicularis. Tab. III. Fig. 54.

DEMONSTRATIO.

Quoniam puncta H & Q utrinque a
punctis K & L æqualiter distant, per
hypoth. $HK = HL$ & $QK = QL$ (§.
192). Est vero etiam $QH = QH$. Er-
go $o = x$ (§. 204), consequenter cum
 $HI = HI$, anguli ad I æquales (§. 179),
adeoque HI ad MN perpendicularis (§.
79). *Q. e. d.*

PROBLEMA XVII.

216. A dato puncto H ad rectam MN
perpendicularem HI demittere. Tab. III. Fig. 54.

RESOLUTIO.

I. In charta.

1. Posito circino in H intervallo ar-
bitrario, eodem tamen, interfecetur
MN in K & L.
2. Ex K & L fiat intersectio in Q (§.
197).
3. Ducatur per Q recta HI (§. 121).
Hæc erit ad MN perpendicularis.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $KH = LH$ & $KQ = LQ$
per construct. puncta H & Q a punctis K
& L utrinque æqualiter distant (§. 192).
Ergo HI ad MN perpendicularis (§.
215). *Q. e. d.*

Aliter.

Aliter.

Tab. II. Fig. 52. 1. Applicetur norma ad lineam datam ML; ita ut crus unum eandem stringat, alterum vero punctum datum I attingat.

2. Ducatur recta GI (§. 121), quæ ad ML perpendicularis erit.

DEMONSTRATIO.

Eadem est quæ in casu simili problematis 16. (§. 212).

II. In solo

Tab. III. Fig. 54. Aut utimur norma majore, ut in probl. 16. aut

1. Fune ex H extenso designantur puncta K & L & in iis baculi defiguntur.

2. Intervallum KL dividitur bifariam in I (§. 210).

Dico, baculos in H & I defixos perpendicularem HI designare.

DEMONSTRATIO.

Quoniam KH=LI & KI=LI, per construct. HI=HI; anguli ad I sunt æquales (§. 204), adeoque HI ad MN perpendicularis (§. 79). Q. e. d.

THEOREMA XXXII.

Tab. III. Fig. 56. 217. Ab uno puncto H ad eandem rectam LM non nisi unica perpendicularis HI duci potest.

DEMONSTRATIO.

Ducatur, si fieri potest, adhuc alia HK ad LM itidem perpendicularis, erit o rectus (§. 78). Quia HI ad LM perpendicularis, per hypoth. erit x quocunque rectus (§. cit.). Est vero o > x (§. 188), adeoque unus rectus altero recto major: quod cum sit absurdum (§. 145), a puncto H ad LM non nisi unica perpendicularis duci potest. Q. e. d.

THEOREMA XXXIII.

218. In omni triangulo rectangulo HIK angulus non nisi x rectus est; reliqui H & K sunt acuti. Tab. III. Fig. 56.

DEMONSTRATIO.

Angulus y rectus est (§. 79). Sed y > m, item y > H (§. 188). Ergo K & H sunt recto minores, adeoque acuti (§. 66). Q. e. d.

COROLLARIUM I.

219. Angulorum igitur maximus in triangulo rectangulo est rectus.

COROLLARIUM II.

220. In triangulo rectangulo latus maximum est hypotenusa (§. 95. 189.).

THEOREMA XXXIV.

221. In triangulo obtusangulo PNO angulus obtusus non nisi unicus est, reliqui P & O sunt acuti. Tab. I. Fig. 20.

DEMONSTRATIO.

y + x = 2 rectis (§. 147.) Sed y, utpote obtusus per hypoth. major recto (§. 66). Ergo x recto minor. Quoniam vero x > O, item x > P (§. 188); erunt O & P multo magis recto minores, adeoque acuti (§. 66). Q. e. d.

COROLLARIUM I.

222. In triangulo obtusangulo angulorum maximus est obtusus.

COROLLARIUM II.

223. Ergo latus maximum, quod obtuso opponitur (§. 189).

THEOREMA XXXV.

224. Linea perpendicularis HI est brevissima omnium, quæ a puncto H ad eandem rectam LM duci possunt. Tab. III. Fig. 56.

DEMONSTRATIO.

Quoniam HI perpendicularis ad LM *per hypoth.* angulus x rectus est (§. 78), adeoque HK hypotenusa, consequenter $HK > HI$ (§. 220). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

225. Ergo distantia puncti a linea vel plano est recta ab illo puncto ad lineam vel planum perpendicularis (§. 15).

COROLLARIUM II.

Tab. III. Fig. 58. 226. Quare si linea HI fuerit ipsi KL parallela, erunt perpendiculara quævis ex illa in hanc demissa GE, AB, CD inter se æqualia & contra (§. 81).

COROLLARIUM III.

227. Altitudo figuræ est perpendicularum ex vertice in basin demissum (§. 115).

COROLLARIUM IV.

Tab. I. Fig. 19. 228. In triangulo rectangulo angulus K rectus (§. 91) & hinc cathetus unus MK ad alterum KL perpendicularis (§. 78). Ergo si KL sumatur pro basi, erit M vertex (§. 114), adeoque MK altitudo (§. 227).

COROLLARIUM V.

Tab. I. Fig. 21. 23. 229. Similiter in quadrato & oblongo latus unum cum altero efficit rectum C vel K (§. 98. 100), adeoque unum ad alterum perpendicularare (§. 78). Quod si ergo latus unum CD vel IK sumatur pro basi; erit A vel L vertex (§. 114), consequenter AC vel LK altitudo (§. 227).

THEOREMA XXXVI.

Tab. III. Fig. 58. 230. Si HI fuerit parallela & BA perpendicularis ad KL; erit eadem AB etiam perpendicularis ad HI.

DEMONSTRATIO.

Fiat $EB = BD$ & erigantur ex E & D perpendicularares EG & DC (§. 212); erit $GE = CD$ (§. 225) & $E = D$

(§. 78. 145), consequenter $BG = BC$ & $y = u$ (§. 179). Sed quoniam AB perpendicularis ad KL, *per hypoth.* ideo $u + x = o + y$ (§. 79). Ergo & $x = o$ (§. 91. *Arithm.*). Quare cum porro sit $AB = AB$; erit & $m = n$ (§. 179), adeoque BA ad HI perpendicularis (§. 79). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

231. Sunt ergo EG, AB, CD distantiarum rectæ KL a recta HI, tum rectæ HI a rectæ KL (§. 225), adeoque si HI parallela ipsi KL, etiam KL parallela est ipsi HI (§. 81).

THEOREMA XXXVII.

232. Parallela AB & EF eidem tertiarum CD sunt etiam parallela inter se, & parallelis parallela sunt inter se parallela. Tab. III. Fig. 59.

DEMONSTRATIO.

Ducantur GI & KM perpendicularares ad CD (§. 216): erunt eadem perpendicularares ad AB & EF (§. 214. 230). Ergo $GH = KL$ & $HI = LM$ (§. 226), consequenter $GH + HI = KL + LM$ (§. 88. *Arithm.*) hoc est, $GI = KM$ (§. 86. 87 *Arithm.*) adeoque AB parallela ipsi EF (§. 225. 81). *Quod erat unum.*

Posterius patet per prius.

THEOREMA XXXVIII.

233. Si duas parallelas AB & CD fecet transversa EF in G & H, erunt 1°. anguli alterni y & u æquales; 2°. angulus externus x æquatur interno opposito u ; 3°. duo interni oppositi o & u sunt æquales duobus rectis. Tab. III. Fig. 60.

DEMONSTRATIO.

Si recta EF fecet parallelas AB & CD

CD ad angulos rectos, omnia manifesta sunt per Theorema 36 (§. 230). Si vero oblique secet; ducantur perpendicularares GI & HK (§. 212). Producat GI in M & HK in L (§. 21), donec fiat $IM=GI$ & $KL=HK$.

1°. Quoniam GI perpendicularis ad CD per construct. crunt anguli ad I æquales (§. 79). Porro $GI=IM$ per constr. & $HI=IH$. Ergo $HG=HM$ & $u=z$ (§. 179). Eodem modo ostenditur esse $HG=GL$ & $y=t$. Quamobrem & $GL=HM$ (§. 87. Arithm.). Est vero etiam $HK=GI$ (§. 226) & hinc $HK+KL=GI+IM$ (§. 88. Arithm.), hoc est, $HL=GM$ (§. 86 Arithm.) & $GH=GH$: Unde $t+y=u+z$ (§. 204). Cum itaque $t=y$ & $u=z$ per demonstrata: erit $y+y=u+u$ (§. 15 Arithm.), hoc est $2y=2u$, consequenter $y=u$ (§. 94 Arithm.). Quod erat primum.

2°. $x=y$ (§. 156) & $u=y$ (per n. 1.). Ergo $x=u$ (§. 87 Arithm.). Quod erat alterum.

3°. $x+o=180^\circ$ (§. 148). Sed $x=u$ (per num. 2.). Ergo $u+o=180^\circ$ (§. 15. Arithm.). Quod erat tertium.

PROBLEMA XVIII.

Tab. II. 234. Datis duobus lateribus AB Fig. 41. & BC cum angulo A uni eorum BC opposito, triangulum ABC construere.

RESOLUTIO.

I. Ducta recta AB, in puncto A excitetur angulus dato æqualis (§. 208), factaque AB uni datorum laterum æquali,

2. Ex B intervallo alterius lateris dati BC crus anguli AC interfecetur in C.
3. Puncta B & C connectantur recta (§. 121). Si factum est, quod petebatur.

COROLLARIUM I.

235. Cum ex duobus lateribus atque angulo uni eorum opposito triangulum constructi possit; iis datis, trianguli reliqui anguli & crus reliquum una determinatur. Quare si in duobus triangulis ABC & abc fuerit $AB=ab$, $BC=bc$ & $A=a$; erit etiam $AC=ac$, $B=b$, $C=c$, & $\triangle ABC=\triangle abc$: nulla enim subest ratio, cur triangula ex æqualibus datis constructa inæqualia forent.

SCHOLIUM.

236. In genere liquet, æqualia esse, quæ per æqualia determinantur, seu, quod perinde est, figuras esse æquales, quæ ex æqualibus datis eodem modo construuntur. Unde non solum triangulorum, verum etiam reliquarum figurarum congruentia ex hoc principio demonstrari potest.

COROLLARIUM II.

237. Quodsi in duobus triangulis ABC & abc fuerit $A=a$ & $AB:BC=ab:bc$, triangula eodem modo determinantur (§. 119), adeoque similia sunt (§. 120), consequenter etiam $B=b$, $C=c$, $BC:CA=bc:ca$ & $CA:AB=ca:ab$ (§. 175).

THEOREMA XXXIX.

238. Perpendiculara KH & GI æquales parallelarum partes KG & HI interceptiunt. Tab. III. Fig. 60.

DEMONSTRATIO.

$KH=GI$ (§. 230. 226), $u=y$ (§. 233) & $GH=GH$. Ergo $KG=HI$ (§. 235). Q. e. d.

Q 3.

THEO.

THEOREMA XL.

Tab. III. Fig. 61. 239. Si trianguli cujuscunque ACB latus unum AC continetur in D; erit angulus externus DCA aequalis duobus internis oppositis y & z simul sumtis.

DEMONSTRATIO.

Ducatur CE basi AB parallela, erit $x=y$ & $o=z$ (§. 233), consequenter $DCA=x+o=y+z$ (§. 88 Arithm.). Q. e. d.

THEOREMA XLI.

Tab. III. Fig. 61. 240. In quovis triangulo ACB tres anguli y, u, z junctim sumti sunt æquales duobus rectis seu 180° .

DEMONSTRATIO.

Nam $o+x=y+z$ (§. 239). Ergo $o+x+u=y+z+u$ (§. 88. Arithm.). Sed $o+x+u=180^\circ$ (§. 147): ergo $y+z+u=180^\circ$ (§. 87 Arithm.). Q. e. d.

COROLLARIUM I.

Tab. I. Fig. 19. 241. In triangulo igitur rectangulo MKL duo anguli obliqui M & L junctim sumti efficiunt rectum seu 90° , adeoque semirecti sunt, si triangulum fuerit æquicrurum (§. 184).

COROLLARIUM II.

242. Si unus angulus est obtusus, duo reliqui simul sumti sunt recto minores (§. 66).

COROLLARIUM III.

Tab. I. Fig. 16. 243. In triangulo æquilatelo ACB quilibet angulus est 60° , nimirum $180:3$. (§. 186).

COROLLARIUM IV.

244. Cum itaque in triangulo rectangulo necessario angulus unus sit rectus (§. 91); triangulum rectangulum æquilaterum esse sequit.

COROLLARIUM V.

245. Si unus trianguli angulus ex 180° subtrahitur, summa duorum reliquorum relinquitur; & si summa duorum ex 180° aufertur, residuus fit tertius.

COROLLARIUM VI.

246. Si duo anguli unius trianguli æquantur duobus alterius sive sigillatim, sive junctim; etiam tertius unius æqualis est tertio alterius (§. 91 Arith.).

COROLLARIUM VII.

247. In quovis triangulo anguli ad basin y & z junctim sumti sunt duobus rectis minores.

Tab. III. Fig. 61.

COROLLARIUM VIII.

248. Quoniam in triangulo æquicruro DFE anguli ad basin y & u æquales sunt (§. 184), si angulus ad verticem F subtrahitur a 180° & residuum bifecatur, unus angulorum æqualium y vel u prodit. Similiter si duplum anguli unius ad basin y a 180° subtrahitur, angulus ad verticem F relinquitur.

Tab. I. Fig. 17.

PROBLEMA XIX.

249. In extremitate F lineæ FG perpendicularem FH excitare.

Tab. III. Fig. 62.

RESOLUTIO.

1. Super FG construatur Δ æquilaterum FIG (§. 189).
2. Producat GI in H (§. 121), donec fiat $HI=GI$.
3. Ducatur recta HF (§. 121): quæ erit ad FG perpendicularis.

DEMONSTRATIO.

Quoniam Δ FIG est æquilaterum, per constr. $o=60^\circ$ & $u=60^\circ$ (§. 243). Ergo $y=120^\circ$ (§. 234), consequenter ob $FI=HI$ per constr. $x=30^\circ$ (§. 248). Cum adeo $x+o=90^\circ$; angulus ad F rectus (§. 144) & HF ad FG perpendicularis est (§. 78). Q. e. d.

THEO-

THEOREMA XLII:

Tab. III. Fig. 63. 250. Si recta DE secet rectam AB in C; non alibi eandem denuo secabit. DEMONSTRATIO.

Occurrat enim, si fieri potest, recta DE alteri AB in alio adhuc puncto, e. gr. in A: erunt rectæ ADCE puncta duo A & C in recta altera AB, consequenter recta ADCE tota supra AB cadit (§. 170) atque adeo eam non secat (§. 50): quod cum hypothese repugnet, DE non alibi, quam in C, ipsam AB secare potest. Q. e. d.

THEOREMA XLIII.

Tab. II. Fig. 41. 251. Si in duobus triangulis ABC & abc fuerit AB=ab, A=a & B=b; erit etiam AC=ac, BC=bc, C=c & Δ ACB=Δ acb.

DEMONSTRATIO.

Concipiamus Δ abc poni supra alterum ABC, ita ut punctum a super A & recta ab super AB cadat. Quoniam ab=AB, a=A & b=B, per hypoth. punctum b super B (§. 169), recta ac super AC & bc super BC (§. 167), consequenter c super C (§. 250) cadit. Cum adeo Δ abc alteri ABC congruat (§. 3); erit ac=AC, bc=BC, c=C (§. 177) & Δ abc=Δ ABC (§. 161). Q. e. d.

COROLLARIUM:

252. Si in duobus triangulis ACB & acb fuerit A=a, B=b & BC=bc; erit etiam C=c (§. 246), consequenter AC=ac, AB=ab. & Δ ACB=Δ acb (§. 251).

THEOREMA XLIV.

253. Si in triangulo DFE anguli ad basin u & y aequales; triangulum est æquicrurum.

DEMONSTRATIO.

Secet FG angulum F bifariam (§. Tab. II. 209); erit DF=FE (§. 252). Est Fig. 44. ergo Δ. DFE æquicrurum (§. 89). Q. e. d.

COROLLARIUM.

254. Si ergo tres anguli fuerint æquales; æquilaterum est (§. 88).

THEOREMA XLV.

255. Si duas lineas AB & CD secet transversa EF in G & H, ita ut vel 1°. y=u; vel 2°. x=u; vel 3°. 0+u=180°; erunt lineæ istæ inter se parallele. Tab. III. Fig. 60.

DEMONSTRATIO.

1: Demittantur ex H & G perpendiculares HK & GI (§. 212); erit K=I (§. 78. 145). Est vero & y=u₂ per hypoth. & HG=HG. Quare HK=GI (§. 252), consequenter cum HK & GI sint distantie linearum AB & CD (§. 225); lineæ AB & CD sunt inter se parallele (§. 81). Quod erat primum.

2. x=u per hypoth. x=y (§. 156). Ergo y=u (§. 87 Arithm.), consequenter AB & CD sunt inter se parallele, per num. 1. Quod erat secundum.

3. 0+u=180°, per hypoth. Sed 0+x=180° (§. 147). Ergo u=x (§. 87 Arithm.), consequenter AB & CD sunt inter se parallele, per num. 2. Quod erat tertium.

THEOREMA XLVI.

156. Si duæ lineæ EG & AB fuerint perpendiculares ad eandem tertiam HI; erunt inter se parallele. Tab. III. Fig. 58.

DE-

DEMONSTRATIO.

Fiat $AB=EG$ ducaturque recta KL ; erit HI ipsi KL parallela (§. 81), consequenter $EB=GA$ (§. 238). Quare cum etiam sit $GB=GB$; erit $y=u$ (§. 204), consequenter EG ipsi AB parallela (§. 255). *Q. e. d.*

THEOREMA XLVII.

257. *Parallele DF & GA inter eadem parallelas FA & DG sunt equales. Et contra, si DF & GA fuerint parallele & equales; erit etiam FA ipsi DG parallela & equalis.*

DEMONSTRATIO.

Ducatur recta DA (§. 121): erit $x=y$ & $o=u$ (§. 233). Quare cum $AD=AD$, erit $DF=GA$ (§. 251). *Quod erat unum.*

$DF=AG$, per *hypoth.* & cum eadem lineæ sint parallele per *hypoth.* $o=u$ (§. 233). Quare cum etiam sit $DA=DA$, erit $x=y$ (§. 179), consequenter FA ipsi DG parallela (§. 255), adeoque etiam æqualis per *num. 1.* *Quod erat alterum.*

PROBLEMA XX.

258. *Per datum punctum V parallelam rectæ RS ducere.*

RESOLUTIO.

I. In charta

1. Ex V demittatur perpendicularis VK (§. 216).
2. Ex puncto quolibet T erigatur perpendicularis $TA=KV$ (§. 212).
3. Per V & A ducatur recta MN , quæ erit ipsi RS parallela (§. 81).

Aliter.

1. Regula ad rectam RS applicetur

& circinus intervallo VK aperiatur. 2. Crus unum circini juxta ductum regulæ ab R versus S promoveatur. Ita crus alterum per V parallelam ipsi RS describet (§. 81).

Aliter.

1. Per datum punctum V ducatur utcunque recta RG .
2. In V fiat $o=x$ (§. 208). Erit VN seu MN parallela ipsi RS (§. 255).

Aliter.

Ex modo procedente enatus est sequens.

1. Triangulum rectangulum AVN ex ligno ebenino aut alio Indico paratum ita applicetur ad rectam RS , ut basis ejus VN parti ipsius congruat.
2. Hypothensæ ejusdem Trianguli AV applicetur regula RG , quæ altera manu in hoc situ immota detineatur.
3. Triangulum AVN juxta ductum regulæ promoveatur, donec basis punctum V attingat.

Erit enim in quovis situ, basis VN , ob $y=x$, ipsi RS parallela (§. 255). *Q. e. d.*

Aliter.

Utimur interdum *Parallelismo*, ex duabus regulis ligneis potius, quam orichalceis (§. 122) AB & CD composito, quæ ejusdem ubique latitudinis retinaculis EF & GH inter se æqualibus ita junguntur, ut retinacula intervallis æqualibus EG & EH a se invicem distent, ipsæ autem regulæ variis intervallis diduci queant. Nimirum

1. Re-

Tab.
III.
Fig. 64.

Tab.
III.
Fig. 66.

Tab.
III.
Fig. 65.

Tab.
III.
Fig. 67.

1. Regula una debite applicetur ad rectam RS.
2. Altera ad datum punctum V adducatur &
3. Juxta hujus ductum recta AB per V ducatur : quæ erit ipsi RS parallela.

DEMONSTRATIO.

Ducatur obliqua linea EH (§. 121). Quoniam $EG = FH$, $EF = GH$ per constr. & $EH = EH$, erit $o = x$ (§. 204) adeoque FH parallela ipsi EG (§. 255). Sed AB ipsi EG & RS ipsi FH parallela, per constr. Ergo AB parallela ipsi RS (§. 232). *Q. e. d.*

II. In campo

Commode utimur modo primo antecedentium, vel

1. In puncto quolibet K defigatur baculus cum aliis in R & S defixis in eadem recta (§. 125).

2. Ad V fiat $o = x$ (§. 208).

Erit MV, quæ facile produci potest in N (§. 125), ipsi RS parallela (§. 255).

Aliter.

1. In punctis K & T defigantur baculi cum aliis in R & S defixis in eadem recta (§. 125).

2. Fiat $u = x$ (§. 208) & $TA = VK$.

3. In M & N defigantur baculi cum aliis in V & A defixis in eadem recta (§. 125).

Erit MN parallela ipsi RS.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $x = u$ per constr. erit TA parallela ipsi KV (§. 255), consequenter $z = y$ (§. 233). Est vero etiam $TA = KV$, per construct. & $TV = TV$. Ergo $m = n$ (§. 179), consequenter MN parallela ipsi RS (§. 255). *Q. e. d.*

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

SCHOLIUM.

259. Si parallelismis crebro utaris, retinacula continuo affrictu nimis efforantur & a rectitudine cito recedunt ipsi parallelismi. Huic malo præsens remedium attulit Jacobus Leupoldus, artifex insignis, qui retinaula ex geminis lamellis orichalceis elasticis, in medio firmiter connexis, & capita clavorum, quibus regulis affiguntur, conica parare solet. Notum vero est, orichalcum ad elasticitatem usque vehementi contusione indurari.

THEOREMA XLVIII.

260. Per idem punctum C eidem rectæ DE parallela nonnisi unica AB duci potest.

Tab. III. Fig. 69.

DEMONSTRATIO.

Ducatur enim, si fieri potest, adhuc alia HG, priorem secans in C, cujus adeo pars GC efficit cum parte alterius CB angulum BCG. Ex I erigatur perpendicularis IL (§. 212); erit tum IK ad CG, tum IL ad CB perpendicularis (§. 230), consequenter anguli CKL (§. 214) & CLK recti (§. 78): quod cum sit absurdum (§. 218), per C nonnisi AB ipsi DE parallela duci potest. *Q. e. d.*

Aliter.

Angulus $NCH = NQD$ & $NCA = NQD$ (§. 233). Ergo $NCH = NCA$ (§. 87 Arithm.): quod cum sit absurdum (§. 84 Arithm.), HG & AB non sunt simul ipsi DE parallela. *Q. e. d.*

THEOREMA XLIX.

261. Si recta NO secet duas rectas alias HG & DE in C & Q ita ut

Tab. III. Fig. 69.

R

duo

duo anguli interni oppositi HCO & DQN fuerint simul summi duobus rectis majores; lineæ GH & ED versus eam plagam divergunt.

DEMONSTRATIO.

Ducatur ACB parallela ipsi DE per C (§. 258); tum angulus ACO cum angulo DQN efficiet duos rectos (§. 233). Sed HCO & DQN simul sunt duobus rectis majores, per hypoth. Ergo $HCO > ACO$ (§. 90 *Arithm.*), consequenter AC intra spatium $HCQD$ cadit. Eri-gatur perpendicularis PS (§. 212): erit $PR=CF$ (§. 226), consequenter $PS > PR$ (§. 84 *Arithm.*) $> CF$ (§. 89 *Arithm.*). Distantiæ igitur rectarum CH & QD versus H & D crescunt (§. 225), adeoque lineæ CH & QD versus eam plagam divergunt (§. 84). *Q. e. d.*

THEOREMA L.

Tab. III. Fig. 69. 262. Si duas rectas HG & DE secet transversa NO in C & Q , ita ut Anguli GCO & EQN simul summi sint duobus rectis minores; lineæ CG & QE versus eam plagam convergunt.

DEMONSTRATIO.

Quoniam CG ipsi QE parallela esse nequit (§. 233), ducatur AB parallela ipsi DE per C (§. 258): tum angulus BCQ cum angulo EQN efficiet duos rectos (§. 233). Sed GCO & EQN simul summi sunt duobus rectis minores per hypoth. Ergo $GCO < BCQ$, (§. 90 *Arithm.*), consequenter CB extra spatium $GCQE$ cadit. Demittantur perpendiculares LI & CF (§. 216); erit $CF=IL$ (§. 226); consequenter IK

$< IL$ (§. 84 *Arithm.*) $< CF$ (§. 89 *Arithm.*). Distantiæ igitur rectarum CG & QE decrescunt versus G & E (§. 225), adeoque lineæ CG & QE versus eam plagam convergunt (§. 83). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

263. Si anguli GCQ & EQC simul summi fuerint duobus rectis minores; erunt ipsi deinceps positi duobus rectis majores (§. 147). Quare lineæ, quæ versus unam plagam convergunt (§. 262), versus oppositam divergunt (§. 261).

PROBLEMA XXI.

264. Datis recta AB & angulis ad-Tab. I. jacentibus, A & B , qui junctum summi Fig. 18. duobus rectis minores sunt, triangulum ABC describere.

DEMONSTRATIO.

1. Ad datam rectam AB excitentur anguli dati A & B (§. 155).
2. Crura AC & BC continuentur, donec sibi mutuo occurrant in C (§. 250. 262). ABC triangulum erit desideratum.

COROLLARIUM I.

265. Data ergo linea una datisque duobus angulis, triangulum determinatur.

COROLLARIUM II.

266. Quare si in duobus triangulis fiat Tab. II. $A = a$ & $B = b$; triangula eodem modo de- Fig. 41. terminantur (§. 119), adeoque similia sunt (§. 120).

COROLLARIUM III.

267. Si in duobus triangulis fuerit $A = a$ & $B = b$; consequenter in rectangulis unus obliquorum in uno æqualis uni in altero (§. 145); erit etiam $C = c$ (§. 246), hoc est, $\triangle ACB$ & acb sibi mutuo æquiangula (§. 109).

(§. 109). Quare $\triangle\triangle$ sibi mutuo æquiangula similia sunt (§. 296) & hinc latera homologa seu æqualibus angulis opposita proportionalia habent (§. 175).

THEOREMA LI.

Tab. 268. Si in Triangulo ABC recta DE basi AC parallela ducatur, segmenta crurum cruribus proportionalia sunt, hoc est, $BA:BC=BD:BE=AD:EC$ & $BA:AC=BD:DE$, atque $BDE \sim \triangle BAC$.

DEMONSTRATIO.

Quoniam DE parallela ipsi AC, erit $x=y$ & $o=u$ (§. 233), adeoque $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ & $BA:BC=BD:BE$ & $BA:AC=BD:DE$ (§. 267). Ergo & $BA:BD=BC:BE$ (§. 173 Arithm.) consequenter $AD:BD=EC:BE$ (§. 193 Arithm.) seu $BD:AD=BE:EC$ (§. 169. Arithm.), vel denique $BD:BE=AD:EC$ (§. 173 Arithm.). Q. e. d.

THEOREMA LII.

Tab. 269. Recta FH angulum GFE bifariam secans basin GE cruribus adjacentibus EF & GF proportionaliter secat.

DEMONSTRATIO.

Producatur EF in I (§. 21.), donec fiat $FI=GF$, erit $o+x=y+u$ (§. 239). Sed $o=x$ per hypoth. & $y=u$ (§. 184), adeoque $2y=2o$ (§. 15. Arithm.). Ergo $o=y$ (§. 94 Arithm.); consequenter HF ipsi GI parallela (§. 255). Quare $EF:EH=FI:GH$ (§. 268) $=GF:GH$ (§. 168 Arithm.). Q. e. d.

COROLLARIUM.

270. Est ergo & $EF:GF=EH:GH$ (§. 173 Arithm.), consequenter $EF+FG:EF=GE:EH$ (§. 190 Arithm.); seu $EF+$

$FG:GE=EF:EH$ (§. 173 Arithm.) hoc est, ut summa crurum ad basin integram, ita crus unum ad segmentum hujus adjacentens. Q. e. d.

PROBLEMA XXII.

271. Datis tribus lineis AB, AC & BD, invenire quartam proportionalem. Tab. III. Fig. 72.

RESOLUTIO.

1. Ducatur angulus non nimis acutus FAG pro arbitrio.
2. Ex A in B transferatur linearum datarum prima; ex A in C altera; ex B in D tertia.
3. Ducatur recta BC (§. 121).
4. In D constituatur angulus ipsi ABC æqualis (§. 208).

Dico, esse $AB:AC=BD:CE$.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $o=x$, per constr. erit B C ipsi DE parallela (§. 255). Quamobrem $AB:AC=BD:CE$ (§. 268). Q. e. d.

COROLLARIUM I.

272. Quod si duabus lineis AB & AC datis tertia inveniri debet; etiam BD ipsi AC æqualis fieri, hoc est, AC bis poni debet. Erit nimirum $AB:AC=AC:CE$.

COROLLARIUM II.

273. Si DB sumatur pro unitate; respondebit CE exponenti rationis $AC:AB$ (§. 140 Arithm.).

PROBLEMA XXIII.

274. Datam rectam AB in quocunque partes æquales dividere. Tab. IV. Fig. 73.

RESOLUTIO.

1. Ex recta CD pro arbitrio assumpta refecentur tot partes æquales, in quot data AB dividenda, e. gr. 5.

2. Super harum partium intervallo
construatur triangulum æquilaterum
CED (§. 198).
3. Ex E in *a* transferatur recta AB, iti-
demque ex E in *b*.
4. Ducatur recta *ab* : ducantur itidem
aliæ ex E in 1. 2. 3. &c.
- Dico esse $ab = AB$, $a 1 = \frac{1}{2} AB$, $a 2 = \frac{2}{7} AB$ &c.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $Ea = Eb$ & $EC = ED$,
per construct. erit $Ea : Eb = EC : ED$.
(§. 168 *Arithm.*). Quare cum angu-
lus E utriusque triangulo ECD & E *ab*
communis sit : erit $EC : CD = Ea :$
 ab & $o = x$ (§. 183.). Sed $EC = CD$
per construct. Ego $Ea = AB = ab$
(§. 151. *Arithm.*). Quod erat unum.

Quoniam $o = x$ *per demonstr.* erit *a* 1
parallela ipsi C 1 (§. 255), conse-
quenter $EC : C 1 = Ea : a 1$ (§. 268),
hoc est, ob $EC = CD$, *per construct.*
& $Ea = ab$, *per demonstr.* $CD : C 1 = ab :$
 $a 1$ (§. 168 *Arithm.*). Sed C 1
 $= \frac{1}{2} CD$, *per construct.* Ergo $a 1 = \frac{1}{2} ab$
(§. 151 *Arithm.*). Quod erat
alterum.

Eodem modo ostenditur, esse $a 2 = \frac{2}{7} AB$,
consequenter $1 2 = \frac{1}{7} AB$,
& ita porro.

COROLLARIUM.

Tab. 275. Quodsi ergo CD fuerit utcunque di-
IV. visa in 1 & 2; eodem modo recta *ab* feci-
Fig. 74, bitur in eadem ratione. Est nempe $CD : C 1 = ab :$
 $a 1$; $CD : C 2 = ab : a 2$ &c. (§. 274).

SCHOLIUM.

276. Corollarii hujus usus amplissimus est
in Architectura tam civili, quam militari,
presertim ubi Ichnographiæ vel ampliandæ,
vel contrahendæ.

PROBLEMA XXIV.

277. Scalam Geometricam conf- Tab.
truere. IV.

Fig. 75.

RESOLUTIO.

1. Ducatur recta AF & in eam transfe-
rantur partes 10 æquales B 1, 1 2, 2 3,
3 4 &c. intervallum vero 10 partium
AB totidem ex B in E, ex E in F &c.
quoties libuerit.
2. In A excitetur perpendicularis AC
arbitrariæ longitudinis, in partes 10
æquales divisa (§. 249).
3. Per puncta divisionum 1. 2. 3. 4. 5
&c. agantur parallelæ cum AF
(§. 258).
4. In ultimam CD transferantur partes
10 partibus ipsius AB æquales.
5. Tandem puncta 10 & 9, 9 & 8, 8
& 7 &c. lineis transversis connectan-
tur (§. 121).
- Dico, si AB fuerit decempeda, fore B 1,
1 2, 2 3, 3 4 &c. pedes, 9 9 digi-
tum unum, 8 8 digitos duos, 7 7 tres,
6 6 quatuor &c.

DEMONSTRATIO.

$B 1 = 1 2 = 2 3$ &c. $= \frac{1}{10} AB$,
per construct. Sed pes est decempedæ
pars decima (§. 25). Ergo cum AB sit
decempeda, *per hypoth.* erunt B 1,
1 2, 2 3 &c. pedes. Quod erat unum.

Porro quia 9 9 est parallela ipsi A 9,
per construct. $C 9 : C A = 9 9 : A 9$,
(§. 268). Sed $C 9 = \frac{1}{10} CA$, *per*
construct. Ergo $9 9 = \frac{1}{10} A 9$ (§. 151
Arithm.). Quare cum A 9 sit pes, *per*
demonstr. erit 9 9 digitus (§. 25). Eo-
dem modo ostenditur esse 8 8 duos,
7 7 tres &c. digitos. Quod erat al-
terum.

SCHOLIO

SCHOLIUM.

278. Quomodo hic linea exigua A 9. in 10 partes aequales dividitur; ita eadem in quotcumque alias eodem artificio dividi potest. Neque opus est, ut angulus A sit rectus; sed idem obliquus esse potest.

COROLLARIUM.

279. Quodsi ergo circini crus unum collocatur in I & alterum in K , erit intervallum $IK = 1^\circ 4' 5''$ & ita porro.

PROBLEMA XXV.

280. Invenire distantiam duorum locorum AB , quorum unus B tantum accedi potest.

RESOLUTIO.

1. Baculo ad arbitrium in E defixo, recta BE transferatur ex E in C , ita ut baculus in C defixus sit cum E & B in eadem recta (§. 125).
2. In C constituatur angulus ECF ipsi B aequalis (§. 208).
3. Tandem ex C progrediendum versus D , donec baculus in D defixus sit cum F & C , itemque cum E & A in eadem recta (§. 125).

Dico esse $DC = BA$.

DEMONSTRATIO.

Nam $BE = EC$, $o = x$, per construct. & $y = u$ (§. 156). Ergo $AB = DC$ (§. 251). *Q. e. d.*

Aliter.

1. Defigatur baculus in I cum B & A in eadem recta (§. 125), itidemque alius utcumque in K .
2. Ex K in L transferatur IK , in M vero KB .
3. Denique ex K progrediendum in N , donec baculus ibi defixus sit cum M & L , itidemque cum K & A in eadem recta (§. 125).

Dico esse $MN = BA$.

DEMONSTRATIO.

$BK = KM$ & $IK = KL$, per construct. $o = u$, (§. 156). Ergo $IB = ML$ & $y = x$ (§. 179). Quare cum sit $o + m = u + n$ (§. 156), & $IK = KL$ per construct. erit $IA = NL$ (§. 251), consequenter $AB = NM$ (§. 91. *Arith.*) *Q. e. d.*

Aliter.

1. Mensula Geometrica in C collocata, per dioptras collineetur in A & B , ducanturque rectae ac & cb .
2. Queratur distantia stationis a loco accessu AC (§. 126). &
3. Ex Scala Geometrica in ac transferatur (§. 277).
4. Translocetur mensula in A , ita ut punctum a ipsi A immineat & per dioptras regulae ad ac applicatae baculus in prima statione C defixus conspiciatur.
5. Mox collineatio in B fiat, ducanturque ab .
6. Denique in Scala Geometrica capiatur intervallum ipsius ab (§. 277). Ita distantia quaesita AB innotescet.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $c = C$ & $a = A$ (per construct. & §. 167), erit $ac : ab = AC : AB$ (§. 267), hoc est, iidem numeri rationes $ac : ab$ & $AC : AB$ indignant (§. 149. *Arithm.*) *Q. e. d.*

Aliter.

1. Baculo in C defixo investigetur quantitas angulorum A & C (§. 152), itemque longitudo ipsius AC (§. 126).
2. Ope instrumenti transportatorii & scalae Geometricae construatur triangulum acb (§. 264).

R 3

3. Ad

Tab. IV. Fig. 76.

Tab. IV. Fig. 78.

Tab. IV. Fig. 77.

Tab. IV. Fig. 78.

3. Ad scalam Geometricam applicetur recta ab (§. 277).

Ita distantia AB innotescet.

DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ proxime præcedens.

PROBLEMA XXVI.

281. Metiri distantiam duorum locorum inaccessorum AB .

RESOLUTIO.

Tab. IV. Sine instrumentis tædiosior est problematis resolutio, quam ut commendari possit. Cui tamen volupe fuerit eandem experiri, is

1. Statione in E assumpta rectas BE & AE inveniat (§. 280).

2. His datis reperiet DC ipsi BA æqualem (§. 194).

Aliter.

Tab. IV. 1. Duabus stationibus in C & D electis in prima C collocetur mensula & per dioptras collineetur in D , B & A , ducanturque juxta regulæ, cui affiguntur, ductum rectæ cd , cb , ca .

2. Quæratum porro distantia stationum CD (§. 126) &

3. Ex scala Geometrica transferatur in cd (§. 279).

4. Baculo in C defixo mensula collocetur in D ea lege, ut punctum d ipsi D , hoc est puncto, in quo defigebatur ante baculus, immineat & per dioptras regulæ ad cd applicatæ respicienti baculus in C occurrat.

5. Hinc porro collineatio fiat in A & B ducanturque rectæ da & db .

6. Tandem distantia punctorum a & b investigetur in scala Geometrica (§. 279).

Dico esse $cd : ab = CD : AB$.

DEMONSTRATIO.

Est enim $cdb = CDB$ & $bcd = BCD$ (per construct. & §. 167). Ergo $dc : cb = DC : CB$ (§. 267). Similiter cum sit $acd = ACD$ & $adc = ADC$ (per construct. & §. 167), erit $dc : ac = DC : AC$, adeoque $bc : ac = BC : AC$ (§. 196 *Arithm.*), consequenter ob $acb = ACB$ (per construct. & §. 167) $ac : ab = AC : AB$ (§. 183) & ob $dc : ac = DC : AC$ per demonstr. $dc : ab = DC : AB$ (§. 197 *Arithm.*). *Q. e. d.*

Aliter.

1. Electis duabus stationibus C & D investigetur quantitas angulorum y & x , item z & w (§. 152), quorum summæ dant angulos C & D (§. 86 *Arithm.*). Tab. IV. Fig. 80.

2. Quæratum porro distantia stationum CD (§. 126) &

3. Ducatur in charta linea recta, in quam ex scala Geometrica transferatur recta cd ipsi CD respondens (§. 279).

4. Super ea ope angulorum x & D construatur triangulum bcd & ope angulorum z & C alterum acd (§. 264).

5. Tandem in scala Geometrica investigetur distantia punctorum a & b (§. 279).

Dico esse $ab : cd = AB : CD$.

DEMONSTRATIO.

Eadem est cum proxime præcedente.

SCHO-

SCHOLIION I.

282. *Levi attentione patet, non absimili methodo ex duabus stationibus reperiri distantias plurium locorum.*

SCHOLIION II.

Tab. IV. Fig. 81. 283. *Nec minus manifestum est, mensuram suam in istiusmodi operationibus horizontalem esse debere: id quod obtinetur ope perpendiculari. Q.*

PROBLEMA XXVII.

284. *Altitudinem accessam AB metiri.*

RESOLUTIO.

- Tab. V. Fig. 82. 1. Baculus DE tantæ longitudinis sumatur, ut terræ perpendiculariter infixus altitudinem oculi adæquet.
2. Humi prostratus baculum ad calces pedum perpendiculariter terræ infigi cura (§. 121).
3. Quodsi contingat, ut E & B sint cum oculo C in eadem recta; erit CA=AB; sin punctum inferius F cum E & oculo in eadem recta fuerit, propius cum baculo ad altitudinem AB provolaris opus est; sin punctum superius, procul recedendum, donec prædicta conditio adimpleatur.
4. Tandem distantiam oculi C ab altitudine AB metiaris necesse est (§. 126).
- Dico esse CA=AB.

DEMONSTRATIO.

Quoniam enim AB (§. 227) & ED per construct. ad AC perpendiculares; inter se parallelæ sunt (§. 256), adeoque CD:DE=CA:AB (§. 268). Sed CD=DE, per hypoth. Ergo CA=AB (§. 149 Arithm.). Q.e. d.

Aliter.

1. In distantia plurium e. gr. 30, 40 & Tab. V. Fig. 83. amplius pedum defigatur perpendiculariter baculus DE & aliquo hinc intervallo in C alius minor, ita ut cum oculo in F constituto E & B sint in eadem recta.
2. Investigetur distantia baculorum GF & baculi minoris ab altitudine quæsitâ HF, itemque differentia altitudinum baculorum GE (§. 126).
3. Quærat ad GF, GE & HF quarta proportionalis BH (§. 302 Arithm.).
4. Huic addatur altitudo baculi minoris FC vel pars AH.
- Dico summam esse altitudinem AB.

E. gr. Sit HF=48', GF=20', GE=16', FC=5''.

20	—	16	—	48	5)	192	(38 ² / ₅)=BH	
5,		4		4		15	5=FC	
							192	42 43 ² / ₅ =AB
							40	
							2	

DEMONSTRATIO.

Cum HF ipsi AC parallela supponatur, sintque BA (§. 227) & ED per construct. ad AC perpendiculares; erunt eadem perpendiculares ad HF (§. 230) adeoque GE & BH parallelæ (§. 256), consequenter GF:GE=HF:AB (§. 268). Quod erat unum.

Porro cum HA & FC sint perpendiculares inter easdem parallelas HF &

& AC (per constr. & §. 227); erit FC = HA (§. 226). Quare BH + FC = BH + HA (§. 88 Arithm.). = BA (§. 86 Arithm.). Q. e. d.

Aliter.

Tab. V. 1. Mensula in D verticaliter erigatur, Fig. 84. ita ut latus ipsius FE sit horizonti parallelum: id quod obtinetur ope perpendiculari Q.

Tab. IV. 2. Ducatur recta ef lateri mensulæ parallela, & regula cum dioptris ad Fig. 81. hanc applicata vertamur mensula, donec collineatio in altitudinem quaeritam fiat.

3. Circa punctum e vertatur regula, donec oculo per dioptras transpicienti apex altitudinis A occurrat, ducaturque recta eb.

4. Queratur distantia stationis ab altitudine e C (§. 126) &

5. Ex Scala Geometrica minore transferatur ex e in c (§. 279):

6. Ex c erigatur perpendicularum bc (§. 212), quod

7. Ad Scalam Geometricam applicatum (§. 279) partem altitudinis AC manifestat.

8. Addatur altitudo BC. Dico, summam esse altitudinem AB.

DEMONSTRATIO.

Quoniam AC perpendicularis ad BD (§. 227) & Ce ipsi BD parallela per constr. erit eadem AC perpendicularis, ad CE (§. 230). Sed ad eandem etiam bc perpendicularis, per constr. Ergo bc ipsi AC parallela (§. 256), consequenter $ec : cb = EC : CA$ (§. 268).

Aliter.

1. Investigetur quantitas anguli e (§. 152) & distantia stationis e C (§. 126).

2. Super ec in Scala Geometrica minore assumpta (§. 279) construatur triangulum ad c rectangulum cbe (§. 264).

3. Reliqua fiant ut ante.

DEMONSTRATIO.

Est enim $c = C$ & $e = E$, per constr. Ergo $ec : cb = EC : CB$ (§. 267). Q. e. d.

SCHOLIION.

285. In omnibus istis resolutionibus supponitur planities perfecte horizontalis: que cum rarissime in praxi occurrat, si notabilis fuerit declivitas, non tam instrumenti altitudo, quam ipsa CB addenda, in altitudine accessu facile investiganda. Neesse etiam est, ut baculi, quantum fieri potest, exactissime ad horizontem perpendiculariter infigantur & in instrumentis præscripta ratione collocandis cura maxima adhibeatur: immo altitudo BC eodem modo investigari potest, quo ipsam AC invenimus.

PROBLEMA XXVIII.

286. Altitudinem inaccessam AB metiri. Tab. V. Fig. 83.

RESOLUTIO.

Sine instrumentis prolixa est operatio. Nimirum

1. Distantia stationis CA vel FH quaeritur per problema 25 (§. 280).

2. Reliqua fiunt, ut in problemate præcedente (§. 284).

Aliter.

1. Statione in D electa mensula collocetur ut in problemate præcedente Tab. V. Fig. 85. n. 1. (§. 234).

2. Ducantur ut ibidem rectæ *ef* & *af*.
3. Baculi in *G* defixi, ut sit in recta *fc*, quærat distantia a puncto *f* (§. 126) &
4. Ex scala Geometrica transferatur in *fe* (§. 279).
5. Sub puncto *f* in *D* defigatur baculus & mensula ita collocetur in *G*, ut punctum *e* ipsi *G* immineat & per dioptras regulæ ad *ef* applicatæ respicienti baculus in *D* occurrat.
6. Vertatur regula circa punctum *e*, donec per dioptras prospiciens apicem *A* videat, ducaturque recta *ea*.
7. Ex puncto *a* demittatur *ac* ad *fc* perpendicularis (§. 216): quæ
8. Ad Scalam Geometricam (§. 279) applicata prodit altitudinem *AC*.
9. Quodsi puncta *B*, *E*, *D* fuerint in eadem recta, addatur altitudo puncti *f* ut habeatur *AB*; sin minus, regula circa *e* vertatur, donec per dioptras despiciens videat *B*, ducatur *eb*, perpendicularum *ac* continuetur, donec ipsi *eb* in *b* occurrat. Etenim *ab* in Scalam Geometricam translata manifestabit *AB*.

DEMONSTRATIO.

In $\Delta\Delta$ enim *fea* & *FeA* est angulus *afe* = *AFC* & *aef* = *AeF* per construct. Ergo *fe: ea* = *Fe: eA* (§.

267). Porro *AC* & *ac* perpendiculares ad *FC* (per §. 227 & constr.) adeoque inter se parallelæ (§. 256). Quare *ac: ac* = *Ae: AC* (§. 268), consequenter *fe: ac* = *Fe: AC* (§. 194 *Arithm.*). Quod erat unum.

Quoniam *ab* parallela ipsi *AB* per demonstrata: erit *ae: ab* = *Ae: AB* (§. 268), consequenter *fe: ab* = *Fe: AB* (per demonst. & §. 194 *Arithm.*). Quod erat alterum.

Aliter.

1. Investigetur quantitas anguli *AFC* in *D* & anguli *AeC* in *G*, itemque *CeB* in eadem statione *G* (§. 152).
2. Quærat distantia *Fe* (§. 126).
3. Construatur ex his datis juxta Scalam modicam triangulum *aef* (§. 279).
4. Demittatur ex vertice *a* in basin continuatam perpendicularis *ac* (§. 216) indefinite producenda.
5. Fiat angulus *ceb* ipsi *CeB* æqualis (§. 208) & producaturs crus *eb*, donec perpendiculari *ab* in *b* occurrat (§. 21).

Dico esse *fe: ab* = *FC: AB*.

DEMONSTRATIO.

Coincidit cum præcedente.

Tab.V.
Fig.85.

Tab.V.
Fig.85.
n. 2.

CAPUT IV.

De Circuli Symptomatis.

THEOREMA LIII.

Tab. I. 287. **C**irculi se intus tangentes sunt eccentrici.

DEMONSTRATIO.

Quoniam circulus unus alterum intus tangit, *per hypoth.* ille totus intra hujus peripheriam continetur (§. 47). Quare si ex centro ejus C ducatur in peripheriam majoris recta CN (§. 121); ea peripheriam minoris in M secabit (§. 50), eritque adeo radius minoris CM pars ipsius CN (§. 9 *Arithm.*). Quod si jam C ponatur centrum commune circulorum; erit $CL = CM$ & $CL = CN$ (§. 40), adeoque $CM = CN$ (§. 87 *Arithm.*), quod cum sit absurdum (*per demonstr. & §. 84 Arithm.*); circuli idem centrum habere nequeunt. Sunt ergo eccentrici (§. 44). *Q. e. d.*

THEOREMA LIV.

Tab. V. 288. Duo circuli se mutuo secantes sunt eccentrici.

DEMONSTRATIO.

Quoniam circulus X alterum Z secat, *per hypoth.* pars illius intra hunc cadit (§. 53). Ducatur itaque ex C centro circuli X radius CB, qui continuatus ad peripheriam circuli Z secabit peripheriam illius in E (§. 50) eritque CB pars ipsius CE (§. 9 *Arithm.*). Quod si C ponatur centrum etiam circuli Z; erit $CB = AC$ & $CE = AC$ (§. 40), adeoque $CB = CE$ (§. 87 *Arith.*). Quod cum

fit absurdum (*per demonstr. & §. 84 Arithm.*); circuli X & Z idem centrum habere nequeunt. Sunt ergo eccentrici (§. 44). *Q. e. d.*

THEOREMA LV.

289. In eodem vel in equalibus circulis chordæ æquales AB & DE æquales arcus subtendant: & contra.

Tab. V.

Fig. 87.

DEMONSTRATIO.

Quoniam $AB = DE$ *per hypoth.* $BC = CE$ & $AC = CD$ (§. 40); angulus $ACB = DCE$ (§. 204), consequenter arcus AB & DE, mensuræ angulorum ACB & DCE (§. 57), æquales sunt (§. 142). *Quod erat primum.*

Arcus AB & DE æquales sunt *per hypoth.* Sunt vero etiam iidem mensuræ angulorum ACB & DCE (§. 57): anguli igitur isti æquales sunt (§. 142). Quoniam porro $BC = CE$ & $AC = CD$ (§. 40); erit quoque $AB = DE$ (§. 179). *Quod erat alterum.*

THEOREMA LVI.

290. Si in circulis inæqualibus arcus AB & ab fuerint similes, chordæ cognomines ad suos radios AC & ac eandem rationem habent.

Tab. V.

Fig. 87.

DEMONSTRATIO.

Quoniam arcus AB & ab similes sunt, *per hypoth.* iidemque mensuræ angulorum ACB & acb (§. 57); erit $ACB = acb$ (§. 142). Est vero $AC : BC = ac : bc$ (§. 40 *Geom.* & §. 149 *Arithm.*). Ergo $AB : BC = ab : bc$ (§. 183). *Q. e. d.* THEO-

THEOREMA LVII.

Tab.V. 291. Radius CE, chordam BA bifariam secans in D, etiam arcum bifariam secat in E & ad chordam BA perpendicularis: & contra.

DEMONSTRATIO.

AD=DB, per hypoth. AC=CB (§. 40) & DC=DC. Ergo $o=x$ & $y=u$ (§. 204), consequenter CE ad AB perpendicularis in D (§. 79) & arcus AE atque EB, æqualium angulorum u & y mensuræ (§. 57), æquales sunt (§. 142): Quod erat primum.

Sint arcus AE & EB æquales per hypoth. cum iidem sint mensuræ angulorum u & y (§. 57); erit $y=u$ (§. 142). Est vero etiam AC=CB (§. 40) & DC=DC. Ergo AD=DB & $o=x$ (§. 179), consequenter CD ad AB perpendicularis (§. 79). Quod erat secundum.

Sit denique radius CE perpendicularis ad chordam AB in D per hypoth. erit $o=x$ (§. 79). Est vero etiam AC=CB (§. 40) & hinc $m=n$ (§. 184), consequenter $y=u$ (§. 246). Quare arcus AE & EB, æqualium angulorum u & y mensuræ (§. 57), æquales sunt (§. 142) & AD=DB (§. 251.) Quod erat tertium.

THEOREMA LVIII.

Tab.V. 292. Si recta NE chordam AB bifariam secet & ad eam perpendicularis fuerit; per centrum transit & tam arcum AEB, quam ANB bifariam secat.

DEMONSTRATIO.

Quoniam ND perpendicularis ad AB, per hypoth. erit $o=x$ (§. 79).

Est vero etiam AD=DB per hypoth. & ND=ND. Ergo AN=NB (§. 179), consequenter arcus cognomines æquales sunt (§. 289). Eodem modo ostenditur, arcus AE & EB æquales esse. Quod erat unum.

Arcus AN=NB & AE=EB, per demonstr. Ergo NA+AE=NB+BE (§. 88 Arithm.) consequenter NE diameter circuli (§. 135), adeoque per centrum transit (§. 39). Quod erat alterum.

PROBLEMA XXIX.

293. Datum arcum AB in duas partes æquales dividere.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Ducatur ad punctum medium E chordæ AB perpendicularis NE (§. 210), Tab.V. hæc arcum AB bifariam secabit (§. 292). Fig.88. Q.e.f. & d.

PROBLEMA XXX.

294. Per data tria puncta non in directum jacentia A; B & C circumulum describere. Tab.V. Fig.89.

RESOLUTIO.

1. Ex A & C fiant intersectiones in D & E, itemque aliæ duæ G & H ex C & B.
2. Ducantur rectæ DE & HG (§. 121). Dico I esse centrum circuli per A, C & B. describendi (§. 131).

DEMONSTRATIO.

Puncta A, C & B sunt in periphæria alicujus circuli, per hypoth. atque adeo rectæ AC & CB chordæ (§. 38). Sed ED ad AC, GH ad BC perpendicularis & ED ipsam AC, GH vero

BC bifariam secat (§. 210). Ergo utraque per centrum transit (§. 292). Quare cum DE & GH tantum in I se mutuo secent (§. 250); erit I centrum circuli per puncta data A, C & B transeuntis. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

295. Assumtis in peripheria vel arcu circuli tribus punctis, centrum inveniri datusque arcus perfici potest.

COROLLARIUM II.

296. Si tria puncta unius peripheriæ tribus punctis alterius congruant; peripheriæ totæ congruunt; atque adeo circuli æquales sunt (§. 161).

COROLLARIUM III.

297. Omne triangulum est circulo inscriptibile (§. 116).

THEOREMA LIX.

Tab.V. Fig.87. 298. In eodem vel equalibus circulis chordæ æquales AB & DE a centro C æqualiter distant: & contra.

DEMONSTRATIO.

Quoniam FC & CG sunt distantia chordarum AB & DE a centro C, per *hypoth.* erunt ad chordas perpendiculares (§. 225): & hinc o & x recti (§. 78), adeoque æquales (§. 145). Porro cum $AB=DE$ per *hypoth.* & CF ad AB perpendicularis, per *demonstrata*, ipsam AB; CG vero perpendicularis ad DE, per *demonstrata*, ipsam DE bifecet (§. 291); erit $FA=DG$ (§. 177 *Arithm.*). Quare cum etiam sit $AC=CD$ (§. 40); erit $CF=CG$ (§. 235). *Quod erat nnum.*

Quodsi distantia FC & CG fuerint æquales, per *hypoth.* cum sit $o=x$ per *demonstr.* & $AC=CD$ (§. 40); erit

$AF=DG$ (§. 235). Sed $AF=\frac{1}{2}AB$ & $DG=\frac{1}{2}DE$ (§. 291). Ergo $AB=DE$ (§. 177 *Arithm.*). *Quod erat alterum.*

THEOREMA LX.

299. Chordarum maxima est diameter AB. Tab. I. Fig. 74.

DEMONSTRATIO.

Est enim $CO=BC$ & $CN=CA$ (§. 40). Sed $CO+CN > ON$ (§. 190). Ergo $BC+CA$, hoc est, $BA > ON$ (§. 89 *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA LXI.

300. Si intra triangulum ACB supra ejusdem basi AB construatür triangulum ADB; erunt crura interioris AD & DB simul sumta minora cruribus exterioris AC & CB simul sumtis; angulus vero ad verticem interioris D major angulo ad verticem exterioris C. Tab.V. Fig.90.

DEMONSTRATIO.

Quia $AE < AC+CE$ (§. 190); $AE+EB < AC+CE+EB$ (§. 90. *Arithm.*), hoc est, $AD+DE+EB < AC+CB$ (§. 86. 89 *Arithm.*). Sed $DB < DE+EB$ (§. 190). Ergo multo magis $AD+DB < AC+CB$. *Quod erat unum.*

Quoniam $o > x$ & $u > m$ (§. 188); erit $o+u > x+m$ (§. 90 *Arithm.*) *Quod erat alterum.*

THEOREMA LXII.

301. Chordæ arcus majoris AB major est, chordæ minoris AD minor. Tab.V. Fig.91.

DEMONSTRATIO.

$EB+EC > BC$ (§. 190), hoc est, quia $DE+EC=BC$ (§. 40), $EB+EC$

+EC > DE+EC (§. 89. *Arithm.*) consequenter EB > DE (§. 92. *Arithm.*). Est vero AE+DE > DA (§. 190.). Ergo multo magis AE+EB > DA, hoc est, AB > DA (§. 86. 89. *Arithm.*) Q. e. d.

THEOREMA LXIII.

Tab. I. Fig. 7. 302. *Secantium MA, MN, ME ex eodem puncto M ductarum maxima est MA, que per centrum transit; relique sunt tanto minores, quo a centro remotiores. Contra earundem portiones extra circulum MD, MO, MB sunt tanto majores, quo magis a centro distant; minima est MB secantis MA per centrum transeuntis.*

DEMONSTRATIO.

1. NC+MC > MN (§. 190). Sed NC=CA (§. 40). Ergo CA+CM=NC+MC (§. 88 *Arithm.*)=MA (§. 86. *Arithm.*), > MN (§. 89. *Arithm.*) Quod erat primum.

2. MO+EO > ME (§. 190). Sed ON > EO (§. 286). Ergo multo magis MO+ON, hoc est, MN (§. 86 *Arithm.*) > ME. Quod erat secundum.

3. CO+OM > MC (§. 190). Sed CO=CB (§. 40). Ergo OM > MB (§. 90 *Arithm.*). Quod erat tertium.

4. CD+DM > CO+OM (§. 300). Sed CD=CO (§. 40). Ergo DM > OM (§. 90 *Arithm.*). Quod erat quartum.

THEOREMA LXIV.

Tab. V. Fig. 92. 303. *Si ex puncto E intra circulum assumpto ducantur in peripheriam recte EF, EB, EG &c. item EA, ED,*

EH &c. maxima erit EF, que per centrum C transit, relique EB, EG &c. tanto majores, quo maxime propiores. Contra minima est EA, que continuata per centrum transit: relique ED, EH &c. sunt tanto majores, quo ab ea remotiores.

DEMONSTRATIO.

1. EC+BC > EB (§. 190). Sed BC=FC (§. 40). Ergo EC+BC=EC+FC (§. 88 *Arithm.*) hoc est, EF (§. 86 *Arithm.*) > EB (§. 89 *Arithm.*). Quod erat primum.

2. EI+GI > GE & IB+IC > BC (§. 190), hoc est, ob BC=GI+IC (§. 40), IB+IC > GI+IC (§. 89 *Arithm.*), adeoque IB > GI (§. 92 *Arithm.*). Quare EI+IB > EI+GI (§. 90 *Arithm.*) adeoque EI+IB, hoc est, EB (§. 86 *Arithm.*) > GE. Quod erat alterum.

3. EC+ED > DC (§. 190), Sed CD=EC+EA (§. 40). Ergo EC+ED > EC+EA (§. 89 *Arithm.*), consequenter ED > EA (§. 92. *Arithm.*). Quod erat tertium.

4. EK+KD > ED & KH+KC > CH (§. 190), hoc est, ob CH=CK+KD (§. 40), KH+KC > KC+KD (§. 98 *Arithm.*), adeoque KH > KD (§. 92 *Arithm.*). Quare EK+KH > EK+KD (§. 90 *Arithm.*), adeoque EK+KH, hoc est, EH (§. 86 *Arithm.*), > ED. Quod erat quartum.

THEOREMA LXV.

304. *Recta IL radio CL perpendiculariter,*

lariter insistsens tangit circulum in unico puncto L: nec inter tangentem HL & circulum alia recta duci potest.

DEMONSTRATIO.

Tab. I. Ducatur enim quælibet alia CK (S. Fig. 3. 121). Quoniam IL perpendicularis ad CL per hypoth. adeoque L est rectus (S. 78); K erit acutus (S. 218). Ergo CK > CL (S. 220), consequenter quodlibet punctum K a L diversum, hoc est tota linea LI seu HI extra circulum cadit (S. 40), & ideo circulum tangit in unico puncto L (S. 47). Quod erat unum.

Ducatur deinde, si fieri potest, inter tangentem HL & circulum recta ML. Demittatur in eam ex centro C perpendicularis CD (S. 216); erit D rectus (S. 78) adeoque CL > CD (S. 220). Cadit itaque D intra circulum (S. 40): quod cum hypothese repugnet (S. 47), inter tangentem & circulum per contactum transiens recta alia duci nequit. Quod erat alterum.

COROLLARIUM I.

305. Angulus igitur contactus, tangente HL & arcu ML interceptus, est quovis rectilineo minor: angulus vero semicirculi, inter radium CL & arcum ML interceptus, est quovis rectilineo acuto major.

SCHOLION.

306. Hoc paradoxum Euclidis exercuit Mathematicorum ingenia. Agitata est de eo controversia inter Jacobum Peletarium Cenomani in Gallia Matheseos Professore & Christophorum Clavium Jesuitam Bambergensem: quorum (a) hic angulum contactus rectilineo heterogeneum (S. 30 Arithm.) ag-

(a) In Schol. ad 16. Elem. III. f. 117. & seqq. Tom. I. Oper.

novit, quemadmodum linea est superficies heterogenea; ille vero e numero angulorum sustulit & pro non quanto declaravit. Peculiarem de angulo contactus & semicirculi Tractatum A. 1656. conscripsit Wallisus, qui legitur Operum Vol. II. f. 605 & seqq. ubi, cum Peletario, angulum contactus omni assignabili minorem adeoque nullius magnitudinis esse defendit.

COROLLARIUM II.

307. Circulum in eodem puncto L non nisi unica recta HI tangere potest.

THEOREMA LXVI.

308. Omnis recta HI circulum tangens radio CL ad punctum contactus ducto perpendicularis est.

DEMONSTRATIO.

Ponamus IL non esse ipsi CL perpendicularem. Ergo ex C duci poterit KC ad HI perpendicularis (S. 216.) hæcque utpote tangens per hypoth. extra circulum cadet (S. 47), consequenter CK > CN (S. 84 Arithm.) > CL (S. 40 Geom. & S. 89 Arithm.). Est vero etiam CK < CL (S. 220): quod cum sit absurdum, tangens IL radio CL ad contactum perpendicularis. Q. e. d. Tab. I. Fig. 3.

COROLLARIUM I.

309. Tangens IL efficit cum radio CL in puncto contactus rectum (S. 78).

COROLLARIUM II.

310. Si HI circulum tangit & ex centro C ad eam perpendicularis CL demittatur (S. 216), punctum contactus L determinatur.

PROBLEMA XXXI.

311. Ducere rectam HI circulum in dato puncto L tangentem. Tab. I. Fig. 3.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Ex centro circuli C ad punctum contractus L ducatur radius CL.
2. In L excitetur perpendicularis LH (§. 249), quæ circumulum in L tanget (§. 308). *Q. e. f. & d.*

THEOREMA LXVII.

Tab.V. Fig.91. 312. *Arcus FG & HI inter chordas parallelas intercepti sunt aequales.*

DEMONSTRATIO.

Demittatur CK ex centro C perpendicularis ad FH (§. 216): erit eadem perpendicularis ad GI (§. 230), ob FH & GI *per hypoth.* parallelas; dividetque adeo tam arcum FKH, quam GKI bifariam in K (§. 291). Quare KF = KG = KH = KI, hoc est, FG = HI (§. 91 *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA LXVIII.

Tab.I. Fig.13. 313. *Angulus ad centrum ACD est duplus anguli ad peripheriam ABD, eidem arcui AD insistentis.*

DEMONSTRATIO.

I. Ducatur EF per centrum C ipsi BD parallela (§. 258), erit EB = DF (§. 312), adeoque $o = x$ (§. 142). Sed $o = y$ (§. 156). Ergo $x = y$ (§. 87 *Arithm.*) $\Rightarrow \frac{1}{2}ACD$. Porro $o = u$ (§. 233). Ergo $u = y = \frac{1}{2}ACD$ (§. 87 *Arithm.*). *Quod erat primum.*

Tab.V. Fig.93. II. In casu altero $o = 2y$ & $u = 2x$ *per cas. I.* Ergo $u + o = 2x + 2y$ (§. 88 *Arithm.*) hoc est, $ABD = \frac{1}{2}ACD$ (§. 94 *Arithm.*). *Quod erat secundum.*

Fig.94. III. In casu tertio $o + u = 2y + 2x$ *per cas. I.* & $o = 2y$ *per cas. I.*

Ergo $u = 2x$ (§. 91 *Arithm.*) hoc est, $\frac{1}{2}ACD = ABD$ (§. 94 *Arithm.*). *Quod erat tertium.*

THEOREMA LXIX.

314. *Anguli ad peripheriam ABD mensura est arcus dimidius AD, cui insistit.* Tab. I. Fig.13.

DEMONSTRATIO.

I. Sit ABD angulus in majore segmento: insistet ergo arcui minori AD quam semicirculo (§. 70. 56), adeoque ipsi respondet angulus ad centrum ACD (§. 72. 135). Sed anguli ACD mensura est arcus AD (§. 73). Ergo ipse ABD mensura dimidius arcus AD (§. 313. 142). *Quod erat unum.*

II. Sit ACB angulus in semicirculo. Ducatur utcumque recta CD: erit arcus dimidius AD mensura anguli ACD & $\frac{1}{2}DB$ mensura ipsius DCB *per cas. I.* Ergo $\frac{1}{2}ADB$ mensura anguli ACB. *Quod erat secundum.* Tab. V. Fig.95.

III. Sit denique HIK angulus in minore segmento. Ducatur utcumque recta IL: erit ut ante $\frac{1}{2}HL$ mensura anguli HIL & $\frac{1}{2}LK$ mensura anguli LIK *per cas. I.* Ergo denuo $\frac{1}{2}HLK$ mensura anguli HIK. *Quod erat tertium.* Tab. V. Fig.96.

COROLLARIUM I.

315. Duo vel plures anguli HLI & HMI eidem arcui HI vel æqualibus arcibus insistentes æquales sunt (§. 142). Tab. I. Fig.14.

COROLLARIUM II.

316. Quare cum porro sit $o = x + u$ (§. 239); erit anguli extra centrum mensura dimidium arcuum HI & LM, quibus ipse & ejus verticalis K insistent (§. 314). Tab. I. Fig.14.

COROL-

COROLLARIUM III.

Tab.V. 317. Cum angulus in semicirculo ACB
Fig.95. semicirculo insistat *per hypoth.* mensura ejus
est circuli quadrans (§. 314), adeoque ipse
rectus est (§. 143).

COROLLARIUM IV.

Tab.V. 318. Cum angulus in majore segmento
Fig.96. DIF arcui minori DF, quam est semicir-
culus, insistat (§. 70); mensura ejus est
seniquadrante minor (§. 314), adeoque ip-
se recto minor (§. 143), consequenter acu-
tus §. 66).

COROLLARIUM V.

Tab.V. 319. Non absimili ratione liquet, angu-
Fig.96. lum in minore segmento HIK esse obtusum.

COROLLARIUM VI.

Tab. 320. Quoniam $0 = x + y$ (§. 239) &
VI. anguli 0 mensura est $\frac{1}{2}$ LM, anguli y vero
Fig.97. $\frac{1}{2}$ NO (§. 314); anguli extra peripheriam
G mensura est differentia inter dimidium ar-
cum concavum LM, cui insistit, & dimi-
dium convexum NO inter crura intercep-
tum.

PROBLEMA XXXII.

Tab. 321. Normam examinare, utrum
VI. exacta sit nec ne.
Fig.98.

RESOLUTIO.

1. Describatur intervallo arbitrario se-
micirculus AEF &
2. Ducantur in eo ex diametri utroque
extremo A & F ad punctum E in pe-
ripheria arbitrario assumtum rectæ
AE & FE.
3. Cruribus anguli AEF ita applicetur
norma, ut ejus vertex super E ca-
dat. Hoc enim si fieri potest; erit
norma exacta.

DEMONSTRATIO.

Tum enim angulus normæ LEM
æqualis est angulo AEF (§. 167),

adeoque rectus (§. 317), consequen-
ter norma exacta (§. 212). *Q. e. d.*

THEOREMA LXX.

322. Mensura anguli minoris seg-
menti ATB est dimidium arcus TDB;
anguli vero majoris segmenti BTH di-
midium arcus majoris BGT.

Tab.
VI.
Fig.99.

DEMONSTRATIO.

Ducatur ex puncto contactus T dia-
meter TE; erit ATE rectus (§. 308).
Cum adeo ejus mensura sit arcus dimi-
dius EBT (§. 135. 143), anguli vero
BTE dimidius arcus EB (§. 314); erit
anguli ATB mensura dimidius arcus BDT
Quod erat unum.

Eodem modo patet, cum dimidius
semicirculus EGT sit mensura anguli
ETH (§. 135. 143) & dimidius arcus
EB mensura anguli BTE (§. 314), esse
dimidium arcum BGT mensuram anguli
BTH. *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM I.

323. Cum anguli G mensura etiam sit
dimidius arcus BDT, ipsius D vero arcus
dimidius BGT (§. 314); angulus in majore
segmento G æqualis est angulo minoris seg-
menti ATB & angulus in minore segmento
D æqualis est angulo majoris segmenti BTH
(§. 142).

COROLLARIUM II.

324. Si chorda GT ultra circumulum con-
tinuetur in F; erit anguli BTF mensura semi-
summa arcuum TB & TG a chordis cog-
nominibus subtensorum. Nam $ATF = GTH$
(§. 156). Ergo ejus mensura dimidius arcus
TG (§. 322). Est vero anguli ATB mensura
arcus dimidius TB (§. cit.). Quare semi-
summa eorundem arcuum est mensura an-
guli BTF.

COROL-

COROLLARIUM III.

Tab. VI. Fig. 100. 325. Si LM & MN sint tangentes ex eodem puncto ductæ; erit angulorum MLN & MNL mensura arcus dimidius LN (§. 322), consequenter anguli ipsi sunt æquales (§. 142) & ideo LM = MN (§. 253).

COROLLARIUM IV.

326. Quia angulorum L, M & N mensura est semicirculus (§. 140. 243), angulorum vero L & N junctim sumtorum arcus LN (§. 322); erit anguli M a duabus tangentibus LM & NM intercepti mensura differentia arcus intercepti LN a semicirculo.

PROBLEMA XXXIII.

327. Inter duas lineas AB & BE mediani proportionalem BD invenire.

RESOLUTIO.

1. Jungantur lineæ datæ AB & BE in directum, dividaturque AE bifariam in C (§. 210).
2. Ex C intervallo ipsius AC describatur semicirculus ADE (§. 136).
3. Ex B erigatur perpendicularis BD (§. 212).

Dico esse AB : BD = BD : BE.

DEMONSTRATIO.

Quoniam BD perpendicularis ad AE, per construct. m & n sunt anguli recti (§. 78). Sed $o + x$ est itidem rectus (§. 317) & y utrique triangulo ABD & ADE communis. Ergo $o = z$ (§. 246), consequenter $y = x$ (§. cit.), & tunc AB : BD = BD : BE (§. 267). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

328. Cum sit AB : BD = BD : BE; ex data sagitta AB & dimidia chorda BD invenitur diameter (§. 302 *Arith.*). Sit e. gr. *Wolffi Oper. Mathem. Tom. I.*

AB = 80'', BD = 300''; erit BE = 1125'', adeoque AB + BE = AE 1205'' seu fere 12'.

COROLLARIUM II.

329. Ex demonstratione una liquet, Δ rectangulum ADE per lineam perpendicularem DB ex angulo recto D in hypothensam AE demissam resolvi in duo triangula ABD & BDE inter se & toti ADE similia (§. 267).

COROLLARIUM III.

330. Cum adeo etiam sit AB : AD = AD : AE (§. cit.); si lineæ fuerint majores, una datarum ex A in B, altera ex A in E transferatur, factisque reliquis ut in resolutione problematis erit AD media proportionalis quaesita.

COROLLARIUM IV.

331. Si ergo AB sit unitas, erit BD radix ipsius BE, aut AD ipsius AE (§. 247. *Arithm.*).

THEOREMA LXXI.

332. Si due chordæ HM & LI se Tab. I: mutuo secent in K; erit HK : LK = Fig. 14. KI : KM.

DEMONSTRATIO.

Quoniam enim $x = x$ & $u = u$ (§. 315); ideo HK : LK = KI : KM (§. 267). *Q. e. d.*

THEOREMA LXXII.

333. Si fuerint due secantes GL & Tab: VI. GM ex eodem puncto G ductæ; erit Fig. 97. GM : GL = GN : GO.

DEMONSTRATIO.

Angulus x est utrique triangulo GNO & GLM communis. Anguli GNO mensura est semisumma arcuum NL & NO (§. 324). Sed anguli GML mensura est semisumma eorundem arcuum (§. 314). Quare GNO = GML (§. 142), consequenter GM : GL = GN : GO (§. 267). *Q. e. d.*

THEOREMA LXXIII.

Tab. 334. Si ex eodem puncto *A* ducantur
 VI. due rectæ *AD* & *AB*, quarum altera
 Fig. circulum tangit, altera secat; erit tan-
 102. gens *AD* media proportionalis inter to-
 tam secantem *AB* & ejus portionem ex-
 tra circulum *AC*.

DEMONSTRATIO.

Angulus *A* est utrique triangulo
ACD & *ABD* communis. Anguli
ADC & *ABD* æquales sunt (§. 323).
 Ergo $AC : AD = AD : AB$ (§. 267).
Q. e. d.

CAPUT V.

De Figurarum descriptione.

THEOREMA LXXIV.

Tab. 335. **I**N parallelogrammis latera oppo-
 VI. sita sunt equalia, & si in figura
 Fig. quadrilatera latera opposita fuerint equalia,
 103. erunt eadem parallelogramma.

DEMONSTRATIO.

Quoniam *OPQN* parallelogrammum
 per *hypoth.* erit *OP* parallela ipsi *NQ*, &
ON parallela ipsi *PQ* (§. 102), conse-
 quenter ducta diagonali *PN* erit $x = o$ &
 $n = m$ (§. 233), adeoque $OP = NQ$ &
 $ON = PQ$ (§. 251). *Quod erat unum.*

Quodsi $OP = NQ$ & $ON = PQ$ per
hypoth. cum etiam sit $NP = NP$; erit:
 $x = o$ & $n = m$ (§. 204). *Quod erat*
alterum.

COROLLARIUM.

336. Cum in Quadrato, Oblongo, Rhom-
 bo & Rhomboide latera opposita equalia
 sint (§. 98. 99. 100. 101.); erunt Quadra-
 tum, Oblongum, Rhombus & Rhomboi-
 des parallelogramma (§. 335).

THEOREMA LXXV.

Tab. 337. Diagonalis dividit parallelo-
 VI. gramma in duas partes equalēs, anguli
 Fig. in iis diagonaliter oppositi sunt equalēs,
 103. anguli vero ad idem latus oppositi duobus
 rectis æquantur & duo latera simul sum-
 ta sunt diagonali majora.

DEMONSTRATIO.

In Parallelogrammis $ON = PQ$ &
 $PO = QN$ (§. 335). Sed $PN = PN$.
 Ergo $\triangle NOP = \triangle NQP$ (§. 204). *Quod*
erat unum.

Quoniam in parallelogrammis *OP*
 ipsi *NQ* & *ON* ipsi *PQ* parallela (§.
 103): anguli *O* & *N*, *N* & *Q*, *Q* &
P, *P* & *O* simul sumti æquantur duo-
 bus rectis (§. 233). *Quod erat secun-*
dum.

Quoniam angulus $O + N = N + Q$
 per demonstrata; erit $O = Q$ (§. 91
Arithm.). Similiter quoniam $Q + P =$
 $Q + N$ per demonstrata; erit $P = N$
 (§. 91 *Arithm.*). *Quod erat tertium.*

Denique $NO + PO > NP$ & $PQ +$
 $QN > PN$ (§. 190). *Quod erat quar-*
tum.

PRO-

Tab:
VI.
Fig.
104

PROBLEMA XXXIV.

338. Super data recta CD quadratum construere.

RESOLUTIO.

1. In C erigatur perpendicularis AC (§. 249) = CD.
2. Ex D & A intervallo ipsius CD fiat intersecio in B (§. 197).
3. Ducantur AB & DB.

DEMONSTRATIO.

AC = CD = AB = BD, per constr. Ducta ergo diagonali AD, patet esse C = B (§. 204). Sed C rectus est per constr. Ergo B etiam rectus (§. 145), consequenter o & x, item y & m semi-recti (§. 241), adeoque o + x & x + m itidem recti. Quare figura est quadratum (§. 98). Q. e. d.

Aliter.

1. In C & D erigantur perpendiculares CA & DB ipsi CD aequales (§. 249).
2. Ducatur recta AB.

DEMONSTRATIO.

Est enim CA = DB = CD, per constr. & quoniam AC & BD perpendiculares ad CD per constr. anguli ad D & C sunt recti (§. 78) adeoque BA parallela ipsi DC (§. 226), consequenter anguli A & B sunt recti (§. 233) & ob parallelas AC & BD (§. 256) AB = CD (§. 238). Est igitur ABCD Quadratum (§. 98). Q. e. d.

PROBLEMA XXXV.

339. Datis duabus rectis MI & IK rectangulum parallelogrammum seu oblongum construere.

RESOLUTIO.

1. Jungantur MI & IK ad angulos rectos (§. 249).
2. Ex M intervallo ML = IK describatur arcus & ex K intervallo KL = IM alius priorem interfecans in L (§. 197).
3. Ducantur recta ML & KL.

DEMONSTRATIO.

MI = KL & ML = IK, per construct. Est ergo MIKL parallelogrammum, (§. 335) consequenter I = L, & I + MacI + K = duobus rectis (§. 337). Sed I est rectus, per constr. Ergo & L (§. 145), itemque M & K recti sunt. Est ergo figura constructa oblongum (§. 100). Q. e. d.

PROBLEMA XXXVI.

340. Data recta GH una cum angulo obliquo G rhombum construere.

RESOLUTIO.

1. Ad rectam datam GH constituatur in G angulus dato aqualis (§. 208).
2. Fiat GE = GH & reliqua peragantur ut in probl. 34. (§. 338).

DEMONSTRATIO.

EG = EF = FH = HG, per construct. Est ergo EFHG parallelogrammum (§. 335), consequenter G = F & G + H ac G + F = duobus rectis (§. 337). Sed G est angulus obliquus ex hypothesi: Ergo & F, consequenter etiam E & H sunt obliqui. Adeoque figura constructa rhombus est (§. 99). Q. e. d.

Tab:
VI.
Fig.
105

Tab:
VI.
Fig.
106

PROBLEMA XXXVII.

Tab. VI. Fig. 103.

341. *Datis duabus rectis ON & OP una cum angulo intercipiendo O rhomboidem construere.*

RESOLUTIO.

1. Jungantur rectæ ON & OP sub angulo dato (§. 208).
2. Reliqua peragantur ut in probl. 35. (§. 339).

DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ problematis præcedentis.

THEOREMA LXXVI.

Tab. VI. Fig. 107.

342. *Si peripheria circuli dividatur in partes quotcumque æquales ducanturque subtense AB, BC, CD &c. figura circulo inscripta regularis est.*

DEMONSTRATIO.

Cum enim arcus AB, BC, CD &c. sint æquales, per *hypoth.* etiam chordæ cognomines æquales sunt (§. 289) cumque anguli A, B, C &c. æqualibus arcubus BCDE, CDEA, DEAB &c. insistant, ipsi quoque æquales sunt (§. 315). Figura igitur circulo inscripta regularis est (§. 106). *Q. e. d.*

PROBLEMA XXXVIII.

343. *Invenire summam omnium angulorum in quocumque polygono.*

RESOLUTIO.

1. Multiplicentur 180° per numerum laterum.
2. A producto subtrahantur 360°: residuum est summa quæsita.

E. gr. Pentag. 180	Hexag. 180
5	6
900	1080
360	360
540	720

DEMONSTRATIO.

Qualibet figura ex assumpto in ea puncto F in tot triangula AFB, BFC, CFD &c. resolvitur, quot habet latera AB, BC, CD &c. Si ergo 180° per numerum laterum multiplices, prodit summa omnium angulorum in dictis triangulis (§. 240). Sed anguli circa punctum F, qui non pertinent ad angulos polygones, semper efficiunt 360° (§. 159). Quodsi ergo a factò supra invento subtrahantur 360°, summa angulorum polygones relinquitur. *Q. e. d.*

Aliter.

Cum numerus triangulorum ABC, CAD & DAE, in quæ resolvitur figura polygones per diagonales AC & AD ex puncto A ductas, a numero laterum AB, BC, CD, DE, EA constanter binario differat; si 180° multiplicentur per numerum laterum binario multatum, prodit summa omnium angulorum A, B, C, D & E (§. 240). *Q. e. i. & d.* E. gr. pro Pentag. 180 pro Hexag. 180

3	4
540	720

COOLLARIUM I.

344. Quodsi summa inventa per numerum laterum dividatur; quotus est angulus polygones regularis (§. 106).

SCHOLIUM.

345. *En tibi tabulam, in qua summa angulorum in figuris rectilineis quibuscumque & quantitas unius in regularibus a trigono usque ad dodecagonum exhibetur (§. 343). Construitur columna secunda continua additione 180; tertia vero numeris in omnia per numerum angulorum sive laterum*

Tab. VI. Fig. 108.

Tab. VI. Fig. 111.

terum divisio (§. 344). Utimur hac tabula tum in figuris regularibus describendis; tum in angulorum quantitate examinanda, utrum scilicet instrumento rite explorata fuerit, nec ne. Aberratum enim esse intelligimus, ubi eorum summa minor vel major deprehenditur ea, quæ in tabula definitur, e. gr. si in heptagono superet 900.

Num. Lat.	Sum. Ang.	Ang. Fig. regul.	Num. Lat.	Sum. Ang.	Ang. Fig. reg.
III	180	60	VIII	1080	135
IV	360	90	IX	1260	140
V	540	108	X	1440	144
VI	720	120	XI	1620	147 $\frac{3}{11}$
VII	900	128 $\frac{4}{7}$	XII	1800	150

COROLLARIUM II.

346. Si latera figuræ polygonæ cujusunque continentur, anguli externi 1, 2, 3, 4 &c. cum angulis figuræ internis efficiunt bis tot rectos, quot sunt latera (§. 147). Sed interni soli efficiunt bis tot rectos quot sunt latera, demtis quatuor (§. 343). Ergo externi in omni casu conficiunt 4 rectos seu 360°.

PROBLEMA XXXIX.

347. Dato polygono regulari cuicunque ABCDE circumscriptum describere.

RESOLUTIO.

1. Duo ejus anguli E & D dividantur bifariam rectis EF & DF (§. 209) ob angulos FED & FDE duobus rectis minores concursurus in F (§. 262).
2. Ex puncto concursus F describatur radio EF circulus (§. 131).

DEMONSTRATIO.

Quoniam o & u sunt angulorum polygones dimidii, per construct. erit $o = u$ (§. 106 Geom. & §. 94. Arithm.),

consequenter $EF = FD$ (§. 253). Circulus adeo transiens per E transit etiam per D (§. 40). Ducatur jam ex F in A recta FA (§. 121). Quoniam $o = x$, per constr. $ED = EA$ (§. 106) & $EF = FD$; erit $AF = FD$ (§. 179). Ergo circulus transiens per D & E transit etiam per A (§. 40). Porro quia $AF = EF$, per demonstr. erit $m = x$ (§. 184). Sed x dimidius angulus polygones, per constr. Ergo & m (§. 87 Arithm.), consequenter etiam y. Quare si ducatur FB (§. 121); erit ut ante $FB = FE$, adeoque radius circuli. Eodem modo ostenditur FC, & si quæ plures fuerint rectæ istiusmodi, esse radios circuli, adeoque circumscriptum transire per omnes angulos polygones, hoc est, eidem circumscripti (§. 116). Q. e. d.

COROLLARIUM.

348. Omnis ergo figura regularis est circulo inscriptibilis (§. 216).

PROBLEMA XLIX.

349. Invenire angulum in dato polygono regulari.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Concipiatur polygonum regulare ABCDE circulo inscriptum (§. 348.) Quoniam arcus dimidius BCDE est mensura anguli quæsitæ A (§. 314); arcus vero AB, qui ipsius EAB dimidius, habetur, circuli peripheriam per numerum laterum dividendo (§. 289); angulus polygones A relinquatur, si arcum AB a semicirculo subtraxeris. Q. e. i. & d.

Tab. VI. Fig. 108.

Tab. VI. Fig. 107.

E. gr. Quærat^r angulus pentagoni. Dividatur 360 per 5, quotus 72 est arcus AB, qui ex 180 subductus relinquit 108 angulum pentagoni quæsitum.

THEOREMA LXXVII.

Tab. VI. Fig. 109. 350. *Quadrilateri circulo inscripti GHIK anguli bini oppositi H & K, item G & I consiciunt duos rectos.*

DEMONSTRATIO.

Insistunt enim junctim summi integro circulo, e. gr. K arcui GHI & H complemento ejus ad circulum GKI (§. 56), adeoque ipsorum mensura est semicirculus (§. 314). Sunt ergo duobus rectis æquales (§. 143). *Q. e. d.*

PROBLEMA XLI.

Tab. VI. Fig.* 351. *Circulo quadratum circumscribere.*

RESOLUTIO.

1. Ducantur diametri AB & DE se mutuo in centro C ad angulos rectos secantes (§. 210).
2. Ex A, E, B, D, intervallo radii, fiant intersectiones in F, G, H, I.
3. Ducantur rectæ FG, GH, IH & IF. Erit FGHI quadratum circulo circumscriptum.

DEMONSTRATIO.

Anguli ad A, E, B, D sunt recti (§. 338) adeoque FG, GH, HI & IF circulum tangunt (§. 304). Sunt vero anguli G, F, I, H recti (§. 338) & FG=GH=HI=FI=2 AC *per constr.* Ergo FGIH est quadratum (§. 98) idque circulo circumscriptum (§. 117). *Q. e. d.*

PROBLEMA XLII.

352. *Super data recta ED polygonum regulare quodcumque describere.*

RESOLUTIO.

1. Quærat^r angulus polygoni (§. 344. 349).
 2. Fiat in E ipsi æqualis (§. 155) & EA=ED.
 3. Per puncta A, E, D describatur circuli peripheria (§. 294).
 4. In ea applicetur data recta ED, quoties fieri potest.
- Ita describetur figura quæsitæ (§. 342. 348).

Aliter.

1. In E & D fiant anguli dimidio angulo polygoni sigillatim æquales (§. 155), quorum crura EF & DF se mutuo secabunt in F (§. 262).
2. Ex F tanquam centro, radio EF, describatur circulus, qui erit circulus polygono circumscriptus (§. 347).
3. Reliqua absolvantur ut ante.

PROBLEMA XLIII.

353. *Circulo dato polygonum regulare quodcumque inscribere.*

RESOLUTIO.

1. Dividantur 360 per numerum laterum, ut innotescat quantitas anguli EFD (§. 59).
 2. Construatur is ad centrum (§. 155).
 3. Chorda ED ad peripheriam toties applicetur, quoties fieri potest.
- Ita figura regularis erit circulo inscripta (§. 342. 117). *Q. e. f. & d.*

SCHOLIUM.

354. *Resolutio problematis præsentis & præcedentis mechanica quidem est, cum ad constructionem instrumento transportatorio utamur (§. 155): non tamen ideo contemnenda;*

Tab. VI. Fig. 107.

Tab. VI. Fig. 107.

nenda, tum quia universalis & facilis, tum quia constructionis rite peractæ indicium præbet. Pentagoni, Decagoni & Quindecagoni constructionem tradunt Euclides (a) & Ptolemæus (b): de qua in *Analysi*. Equidem & heptagoni, enneagoni & hendecagoni constructiones Geometricæ passim apud Autores, practicos imprimis, occurrunt: sed a rigore demonstrationum abhorrent. Joh. Carolus Renaldinus (c) omnium polygonorum describendorum regulam catholicam præscribit, passim Geometriis practicis insertam: sed quantum fallat, Cl. Wagnerus, *Mathemat. in Academia Helmstad. Professor ostendit* (d) & nos inferius in *Analysi* ostendemus.

PROBLEMA XLIV.

355. Polygonum regulare quodcumque circulo circumscribere.

RESOLUTIO.

1. Inscribatur figura regularis similis circulo dato, v. gr. pentagonum ABCDE, si pentagonum *abcde* circumscribendum (§. 353).
2. Chorda AB bifariam secetur in H per rectam *Fh* ad eandem in H normalem (§. 210), quæ arcum cognominem in *h* secat.
3. Per A & B producantur radii FA & FB.
4. Per *h* ducatur ipsi AB parallela radii continuatis in *a* & *b* occurrens: erit *ab* latus unum polygoni circumscripti.

(a) Elem. 4. prop. 11. 16. & Elem. 13. prop. 10.

(b) *Almag.* lib. 1. c. 9. f. m. 8. conf. Joannes Regiomontanus in epitome hujus *Almag.* lib. 1. prop. 1.

(c) Lib. 2 de Resolut. & composit. *Mathem.* f. 367.

(d) In peculiari Dissertatione Helmstadii 1700 habita.

5. Producantur radii FE, FD, FC, donec fiat $Fe = Fd = Fc = Fa$ & puncta *a, e, d, c, b* connectantur rectis *ae, ed, dc, cb*: erit *abcde* polygonum circulo circumscriptum. Q. e. f.

DEMONSTRATIO.

Quoniam *ab* parallela ipsi AB per construct. erit angulus $Fha = FHA$ (§. 233). Sed ob *FH* ad AB perpendicularem per construct. *FHA* rectus est (§. 78). Ergo etiam *Fha* rectus (§. 145), consequenter *ab* circulum in *h* tangit (§. 78. 304). Est vero etiam angulus $Fab = FAB$ (§. 233), adeoque dimidius angulus polygoni (§. 347). Porro quoniam *AB = AE* per construct. & $FA = FE = FB$ (§. 40); erit angulus $bFa = aFe$ (§. 204). Quare cum etiam sit $Fa = Fe$ per construct. & ob $Fab = Fba$ per demonstrata, rectos ad *h* & latus *Fh* utrique triangulo *Fab* & *Fhb* commune, $Fb = Fa$ (§. 252); erit $ae = ab$ & $Fae = Fab$ (§. 179), consequenter *a* angulus polygoni, e. gr. in nostro casu pentagoni. Eodem modo ostenditur, angulos quoque *e, d, c, b* esse angulos polygoni circumscribendi & $ed = dc = cb = ab$. Quod vero etiam *ae* circulum in *g* tangat, ita demonstratur. Demittatur ex *F* perpendicularis ad *ae* (§. 216); erit angulus ad *g* rectus (§. 78). Quoniam porro $Fab = Fag$ per demonstrata, & $Fa = Fa$; erit $Fh = Fg$ (§. 252). Quare cum *Fh* sit radius circuli per construct. erit etiam *Fg* radius circuli (§. 40), atque adeo *ae* circulum in *g* tangit.

Tab. VI. Fig. 107.

tangit (§. 304). Idem eodem modo ostenditur de rectis *ed, dc, bc*: Polygonum itaque *abcde* circulo est circumscriptum (§. 117). *Q. e. d.*

THEOREMA LXXVIII.

Tab. VI. Fig. 110.

356. *Latus hexagoni AB æquatur radio circuli circumscripti AC.*

DEMONSTRATIO.

Angulus $C=60^\circ$ (§. 57). Ergo $A+B=120^\circ$ (§. 245), consequenter ob $AC=BC$ (§. 40) $A=B=60^\circ$ (§. 184). Quare $\triangle ACB$ æquilaterum (§. 254), consequenter $AB=AC$ (§. 88). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

357. Hexagonum regulare circulo inscribitur, si radius ad peripheriam sexies applicetur.

COROLLARIUM II.

358. Si super linea data *AB* hexagonum describendum; triangulum æquilaterum *ACB* construitur (§. 198): est enim vertex *C* centrum circuli hexagono quæsito circumscribendi (§. 356).

PROBLEMA XLV.

Tab. VI. Fig. 111.

359. *Datis omnibus lateribus figuræ cujuscunque & tot diagonalibus, quot sunt latera, demtis tribus; figuram construere.*

RESOLUTIO.

Cum figura qualibet *ABCDE* per diagonales *AC* & *AD* in tot triangula *BAC, CAD, DAE* resolvatur, quot sunt latera, demtis tribus; non alia re opus est, quam ut unum triangulum super altero excitetur (§. 205).

Tab. VI. Fig. 112.

PROBLEMA XLVI.

360. *Datis omnibus lateribus figuræ*

& tot angulis, quot sunt latera, demtis tribus; figuram construere.

RESOLUTIO.

1. Ducatur recta *AB* uni datorum laterum æqualis.
2. Ad *A* & *B* excitentur anguli eidem adjacentes (§. 155) & latera *AE* & *BC* per data debite determinentur.
3. Fiat porro in *C* angulus conveniens (§. 155) & determinetur latus *DC* &c.
4. Tandem ex *E* & *D* fiat intersectio in *F* intervallo laterum *EF* & *DF*.

Ductis enim *DF* & *EF*, figura terminabitur eritque æqualis quæsita (§. 161. 177).

Eodem modo construi possunt figuræ regulares ex latere & angulo dato (§. 106).

COROLLARIUM.

361. Si omnes anguli præter unum *F* dentur, duo latera *DF* & *FE* ut dentur opus non est.

SCHOLION.

362. *Tyrones ut se exercent in figuris irregularibus describendis, lineas pro arbitrio in pedibus ac digitis, quantitates angulorum in gradibus, assumere debent. Quodsi contingat figuram non terminari, id indicio erit, casum esse impossibilem, adeoque vel in angulorum, vel in linearum quantitate quedam erunt immutanda.*

PROBLEMA XLVII.

363. *Area cujusdam campestris rectilineæ abcde libere permeabilis Ichnographiam perficere, hoc est, figuram area campestri similem describere.*

Tab. VI. Fig. 111.

RESO-

RESOLUTIO.

1. Investigetur longitudo singulorum laterum ab, bc, cd, de, ea , itemque diagonalium ac & ad (§. 126).
 2. Construatur figura ABCDEA (§. 359) juxta scalam geometricam minorem (§. 279).
- Dico figuram ABCDE esse figuræ campi $abcde$ similem.

DEMONSTRATIO.

Est enim $AB : BC = ab : bc, BC : CD = bc : cd, CD : DE = cd : de$ &c. Etenim e. gr. $ab, 6$; & $bc, 7$ pedum in campo existentibus, etiam $AB = 6$ & $BC = 7$ in charta *per constr.* Quare cum porro sit $AC : AB = ac : ab, AC : AD = ac : ad, AD : AE = ad : ae$ &c. *per constr.* erit $o = o, x = x, y = y, n = n, m = m, r = r, u = u, s = s, t = t$ (§. 207); consequenter $x + m + r = x + m + r, y + n = y + n, u + s = u + s$ (§. 88 *Arithm.*). Quamobrem figura ABCDE est figuræ campi $abcde$ similis (§. 175.). *Q. e. d.*

Aliter.

1. Posita mensula ita in uno figuræ angulo ut punctum a vertici ejus immineat, per dioptras regulæ affixas collineatio fiat in baculos in singulis angulis B, C; D, E defixos ducanturque lineæ indefinitæ ab, ac, ad, ae .
2. Investigetur longitudo rectorum aB, aC, aD, aE (§. 126) &
3. Exinde juxta scalam modicam (§. 279) determinentur ab, ac, ad, ae .
4. Ducantur bc, cd, de .

Dico $abcde$ esse similem figuræ ABCDE.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

DEMONSTRATIO.

Quoniam in $\Delta\Delta abc$ & aBC angulus a communis & $ab : ac = aB : aC$ *per constr.* erit angulus $abc = aBC$ & $acb = aCB$, nec non $ab : bc = AB : BC$ & $ac : bc = AC : BC$ (§. 237). Similiter quoniam in $\Delta\Delta acd$ & aCD angulus a communis & $ac : ad = aC : aD$, atque in $\Delta\Delta dae$ & DaE angulus a itemdem communis & $ad : ae = aD : aE$ *per construct.* erit angulus $acd = aCD$ & $adc = aDC$, nec non $ac : cd = aC : cD$ & $ad : cd = aD : cD$, itemque angulus $ade = aDE$ & $aed = aED$, nec non $ad : de = aD : DE$ & $ae : ed = aE : ED$ (§. 237). Quoniam itaque $a = a, b = B, acb + acd = aCB + aCD$, h. e. $c = C, adc + ade = aDC + aDE$, h. e. $d = D$ & denique $e = E$ *per demonstrata*, figuræ $abcde$ & $aBCDE$ inter se æquiangulæ sunt (§. 109). Porro cum sit $ac : bc = aC : BC$ & $ac : cd = aC : CD$ *per demonstr.* erit etiam $bc : cd = BC : CD$ (§. 196 *Arithm.*) & cum sit $ad : de = aD : DE$ & $ad : dc = aD : DC$ *per demonstr.* erit denuo $dc : de = DC : DE$. Quamobrem cum quoque sit $ab : bc = aB : BC$ & $ae : ed = aE : ED$ *per demonstrata*; latera æquales angulos comprehendentia proportionalia sunt. Sunt itaque figuræ $abcde$ & $aBCDE$ similes (§. 175.). *Q. e. d.*

Aliter.

1. Mensula intra figuram posita eligatur punctum f , ex quo per dioptras regulæ affixas ut ante collineatio fiat in baculos in A, B, C, D & E

Tab. VI. Fig. 114

V

defi-

defixos ducanturque rectæ indefinitæ $fa, fb, fc, &c.$

2. Investigetur longitudo rectarum fA, fB, fC, fD, fE (§. 126).
3. Inde determinetur longitudo rectarum $fa, fb, fc &c.$ juxta scalam modicam (§. 279).
4. Tandem ducantur $ab, bc, cd, &c.$ Dico $abcdeg$ esse figuræ $ABCDEG$ similem.

DEMONSTRATIO.

Angulus f utrique Δfab & fAB communis, estque $fa:fb=fA:fB$ per constr. Ergo anguli ad a & A , item ad b & B æquales sunt atque $fa:ab=fA:AB$ (§. 237). Eodem modo ostenditur esse in Δfga & fGA angulos ad a & A æquales, atque $fa:ag=fA:AG$, consequenter $ab:ag=AB:AG$ (§. 196. *Arithm.*) & angulus $bag=BAG$ (§. 86. *Arithm.*). Quare cum eadem ratione demonstratur, esse $g=G, e=E, d=D, c=C, b=B$ & $ag:ge=AG:GE, ge:ed=GE:ED, ed:dc=ED:DC, dc:cb=DC:CB$ & $cb:ba=CB:BA$, figura $abcdeg$ est majori $ABCDEG$ similis (§. 175). *Q. e. d.*

Aliter.

- Tab. VI. Fig. III.
1. Collocato instrumento Goniometrico in a investigetur quantitas angulorum x, m, r (§. 152) & longitudo rectarum ab, ac, ad & ae (§. 126).
 2. Construantur juxta scalam modicam $\Delta ABC, ACD$ & ADE (§. 180).
- Dico $ABCDE$ esse similem figuræ $abcde.$

DEMONSTRATIO.

Coincidit cum secunda problematis presentis.

Aliter.

1. Collocato instrumento Goniometrico in f , investigetur quantitas angulorum $AfB, BfC, CfD, DfE, EfG, GfA$, (§. 152) & longitudo rectarum fA, fB, fC, fD, fE, fG (§. 126).
 2. Construantur ut ante juxta scalam modicam $\Delta bfa', asg, gfe, efd, dfe$ & cfb (§. 180).
- Dico $abcdeg$ esse similem figuræ $ABCDEG.$

Tab. VI. Fig. 114.

DEMONSTRATIO.

Coincidit cum tertia problematis presentis.

Aliter.

1. Pyxis cum acu magnetica, cujus Tab. VI. Fig. III. margo in 360 gradus divisa & quæ in cardine meridiei ac septentrionis dioptris instructa, ita collocetur in a , ut ejus centrum ipsi a imminet & per dioptras collineanti baculus in b defixus occurrat, noteturque angulus declinationis acus a linea meridiana pyxididis ipsi $a b$ imminente versus ortum vel occasum.
2. Pyxididis dioptræ convertantur successive ad baculos in c, d & e defixos, notenturque ut ante in singulis casibus anguli declinationis.
3. Investigetur longitudo rectarum ab, ac, ad, ae (§. 126).
4. Ducatur in charta recta LM & assumpto in ea puncto A applicetur centrum instrumenti transportatorii &

& fiant anguli i, x, m, r angulis declinationum, rectorum ab, ac, ad, ae æquales (§. 155) atque ex harum longitudine per scalam modicam determinetur longitudo ipsarum AB, AC, AD, AE, (§. 279).

Dico figuram ABCDE esse alteri $abcde$ similem.

DEMONSTRATIO.

In campo acus magnetica semper eidem lineæ respondet in plano horizontali imaginario mundi, quod immobile est, etsi diversis in pyxide successive immineat. Lineam istam designet in charta recta LM & punctum A centrum acus, ex quo descriptus est circulus. Quodsi jam linea meridiana pyxidis admoventur lateri AB, erit principium numerationis in g & acus indicabit in f quantitatem anguli i . In instrumento transportatorio initium numerandi fit in f , & si arcus fg declinationi in campo observatæ æqualis assumitur, angulus i idem erit, qui ante, situsque lineæ AB rite determinatur. Arcus enim fg perinde metitur declinationem ipsius AB a linea meridiana, quam monstrat acus, sive numerandi principium in f , sive in g fiat. Eodem modo liquet, arcus fb, fk, fl determinare situm rectorum AC, AD, AE respectu lineæ LM, consequenter anguli x, m, r in figura ABCDE erunt æquales totidem cognominibus in altera $abcde$. His suppositis reliqua demonstrantur ut supra in demonstratione secunda.

Aliter.

Quodsi pyxis cum acu magnetica dio-

ptris non fuerit instructa, sed lignea regula fg ita affixa, ut linea meridiana ejusdem bd , transiens per centrum pyxidis c sit eidem parallela:

Tab. XI. Fig. 174.

1. Regula fg ad latus figuræ AB applicetur, quo facto AB erit ipsi bd parallela.
2. Notetur gradus, quem indicat acus magneticæ ae circa centrum c libere mobilis cuspis a : dico esse angulum bca ipsi BAL æqualem, si ML ducatur acui magneticæ ae in I productæ parallela.
3. Eodem modo si regula, cui pyxis affixa, applicetur diagonali AE & recta ae designet situm acus, bd autem ipsi AE parallela lineam meridianam pyxidis; erit angulus acb ipsi EAL æqualis. Cetera igitur peraguntur ut ante.

DEMONSTRATIO.

Id tantummodo demonstrari debet, angulum acb esse ipsi BAL & in altero situ pyxidis ipsi EAL æqualem. Quoniam ex resolutione patet, bd esse ipsi BA parallelam, erit angulus IHA ipsi ecd (§. 233), consequenter ejus verticali bca æqualis (§. 156 Geom. & §. 87 Arithm.). Similiter cum sit ML ipsi Ia parallela, per construct. erunt alterni IHA & HAL æquales (§. 233) consequenter HAL = bca (§. 87. Arithm.). Quod erat unum.

Similiter si pyxis ad diagonalem AE applicatur, cum sit bd ipsi EA parallela *vi solutionis*; erit NKA = ecd (§. 233). Quare cum porro sit $bca = ecd$ (§. 156); erit NKA = bca

(§. 87 *Arithm.*). Denique quia acus magnetica pyxide quomodocunque promotum situm obtinet priori, quem habuerat, parallelum, estque adeo Na ipsi Ia parallela; ML vero parallela ipsi Ia *per construct.* erit etiam ML ipsi Na parallela (§. 232), consequenter $NKA = EAL$ (§. 233.), ac ideo $EAL = bca$ (§. 87 *Arith.*). *Quod erat alterum.*

Aliter.

Tab.
VII.
Fig.
115.

1. Charta super mensula expansa ex centro o describatur circulus.
2. In eodem defigatur stylus, cui inferatur regula cum dioptris.
3. Collineetur in singulos areæ angulos A, B, C &c. notenturque in peripheria circuli puncta diametraliter opposita a & a, b & b, c & c &c.
4. Investigetur longitudo rectarum oA, oB, oC &c. (§. 126).
5. Charta a mensula remota alteri inunda coextendatur in tabula & Parallelismus ad aa applicatus arbitrario intervallo aperiatur, donec in charta munda ipsi parallela AA commode duci possit (§. 258.)
6. Idem Parallelismus applicetur ad bb & eo usque aperiatur, donec recta BB huic parallela ducta alteram AA ipsi aa parallelam in puncto commode O interfecet.
7. Applicetur porro successive ad rectas cc, dd, ee , quæ confusionis evitandæ gratia in schemate non omnes sunt expressæ, & aperiatur usque ad punctum intersectionis O ipsis aa & bb parallelarum, ducanturque per idem dictis cc, dd, ee parallelæ CC &c.

Tab.
VII.
Fig.
116.

8. Tandem ex puncto intersectionis O convenienter determinetur longitudo rectarum ipsis oA, oB, oC &c. respondentium juxta scalam modicam (§. 279). Ita enim ut supra Ichnographiam absolvere licebit.

DEMONSTRATIO.

Coincidit cum tertia probl. præf. modo demonstratur, si plures lineæ aa, bb, cc &c. se interfecent in o & his ducantur totidem alia parallelæ AA, BB, CC &c. se itidem in O interfecantes; fore $y = m, x = n, z = l$ &c. Quod facile patet. Continuetur enim BB , donec ipsi aa occurrat in f ; continuentur etiam CC & cc , donec ipsis bb & AA occurrant in g & k . Erit, ob parallelas aa & AA , $m = f$ &, ob parallelas bb & BB , $y = f$ (§. 233), adeoque $m = y$ (§. 87 *Arithm.*). Similiter, ob parallelas bb & BB , $n = g$ &, ob parallelas cc & CC , $x = g$ (§. 233), adeoque $n = x$ (§. 87 *Arithm.*). Item, ob parallelas aa & AA , $z = k$ &, ob parallelas cc & CC , $l = k$ (§. 233), adeoque $l = z$ (§. 87 *Arithm.*) *Q. e. d.*

Tab.
VII.
Fig.
116.

SCHOLIUM I.

364. Ideo commendatur methodus ultima, quod exigua eaque unica charta ingenti tractui dimeticendo sufficiat. Si enim campus in plures resolutus fuerit partes, littera initialis in singulis nota quadam numerica notanda \mathcal{S} , ubi unum alphabetum fuerit absolutum, aliud literis aliis usurpandum.

SCHO-

SCHOLIION II.

365. Etiam sine parallelismo Ichnographiam facillime conficere datur, si puncta a & a , item b , c , d &c. subtili acu perforentur & per foramina pulvis carbonum linteo inclusus trajiciatur. Puncta enim a & a dabunt rectam, qua bisariam divisa determinatur centrum O : reliqua puncta b , c , d &c. situm angulorum figurae respectu hujus centri determinant.

SCHOLIION III.

366. Acus magnetica ex optima chalybe cudenda, nec foraminibus (quod ornatus gratia interdum fieri solet ab ignavis) pertundenda, quoniam vis magnetica per lineam rectam diffunditur. Ejus longitudo 6 digitos ne superet, ne sphaeram magnetis excedat; a duobus ne deficiat. Praestat major minore, ut angulus, quo in usu a linea meridiana pyxidis declinat, exactius innotescat. Communiter utuntur acu duorum vel ad summum trium digitorum. Uno magnetis polo cum aliqua mora eam affricari sufficit: affricanda autem est pars acus, quae septentrionem respicere debet, polo australi, nec ductu contrario destruendum, quod anteriore communicatum fuerat. In hemispherio septentrionali, quod nos inhabitamus, pars acus borealis post contactum magnetis ponderosior evadit & inclinatur: quare levior fieri debet australi. Pyxis ex ligno, ebore vel orichalco; stylus, cui capitellum acus ex aere, cupro vel argento intus in conum excavatum imponitur, ex orichalco vel argento paratur. Ut acus tanto exactius libretur, quidam styli apicem chalybeum faciunt.

PROBLEMA XLVIII.

Tab. VII. Fig. 117. 367. Ichnographiam areæ ABCDE ex duabus stationibus A & B perficere.

RESOLUTIO.

I. Posita mensula in A collineatio

fiat in singulos areæ angulos B , C , D & E ducanturque rectæ versus eos ex a .

2. Quæraturs distantia stationum AB (§. 126) & in mensulam ex scala Geometrica (§. 279) transferatur in ab .
 3. Mensula ex A deferatur in B , ita ut punctum cognomine b in ea designatum ipsi B respondeat, & regula ad lineam ba applicata per dioptras collineanti baculus in A defixus occurrat.
 4. Ex puncto b in singulos rursus figuræ angulos collineatio fiat, & versus eos rectæ ducantur, quæ priores in e , d , c interfecant.
 5. Denique jungantur puncta a & e , e & d , d & c , rectis ae , ed , dc .
- Dico, Ichnographiam esse absolutam.

DEMONSTRATIO.

Quoniam 1°. $ABC = abc$ & $CAB = cab$ (per constr.) erit $AB:BC = ab:bc$ & $AB:AC = ab:ac$ (§. 267). Similiter 2°. quia $EAB = eab$ & $EBA = eba$ (per constr.) erit $AEB = aeb$, itemque $EA:AB = ea:ab$ & $EB:AB = eb:ab$ (§. cit.). Porro 3°. cum sit $DAB = dab$ & $DBA = dba$; erit etiam $DA:AB = da:ab$ & $DB:AB = db:ab$ (§. cit.). 4°. $DBC = dbc$ (per constr.) & quoniam $DB:AB = db:ab$ (per num. 3) atque $AB:BC = ab:bc$ (per num. 1) $DB:BC = db:bc$ (§. 194 Arithm.). Ergo $CDB = cdb$ atque $BCD = bcd$ & $BC:CD = bc:cd$, nec non $BD:CD = bd:cd$ (§. 183). 5°. $DB:BC = db:bc$

(per demonstrata n. 4.) & $AB: BC = ab: bc$ (per num. 1). Ergo $DB: AB = db: ab$ (§. 195 *Arithm.*). Est vero etiam $EB: AB = eb: ab$ (per num. 2). Ergo $DB: EB = db: eb$ (§. cit.). Quare cum etiam sit $DBE = dbc$ (per construct.) erit $BDE = bde$ & $DEB = deb$, nec non $DB: DE = db: de$ & $DE: EB = de: eb$ (§. 183). 6°. $BD: CD = bd: cd$ (per num. 4.) & $DB: DE = db: de$ (per num. 5). Ergo $CD: DE = cd: de$ (§. 196 *Arithm.*). 7°. $EB: AB = eb: ab$ (per num. 2) & $DE: EB = de: eb$ (per num. 5). Ergo $DE: AB = de: ab$ (§. 197 *Arithm.*). Quare cum porro sit $EA: AB = ea: ab$ (per num. 2) erit $DE: EA = de: ea$ (§. 195 *Arithm.*). 8°. Quia $CDB = cdb$ (per num. 4) & $BDE = bde$ (per num. 5) erit $CDE = cde$ (§. 86 *Arithm.*). 9°. Similiter quia $AEB = aeb$ (per num. 2) & $DEB = deb$ (per num. 5) erit $DEA = dea$ (§. 86 *Arithm.*). Cum itaque sit $EAB = eab$, & $ABC = abc$ (per constr.), $BCD = bcd$ (per num. 4), $CDE = cde$ (per num. 8), & $DEA = dea$ (per num. 9); atque præterea $AB: BC = ab: bc$ (per num. 1), $BC: CD = bc: cd$ (per num. 4), $CD: DE = cd: de$ (per num. 6), $DE: EA = de: ea$ (per num. 7), tandemque $EA: AB = ea: ab$ (per num. 2); figuræ $ABCDE$ altera $abcde$ similis est (§. 175). *Q. e. d.*

Aliter.

Tab.
VII.
Fig.
117.

1. In A investigetur quantitas angulorum EAD , DAC & CAE , itemque ex B quantitas angulorum ABE , EBD & DBC (§. 152), quæraturreturque stationum distantia AB (§. 126).
2. Ducta in charta recta ab per scalam

modicam distantiae stationum AB convenienter determinetur (§. 279).

3. In a constituentur angulis EAD , DAC , CAB æquales ead , dac , cab ; in b vero ipsis ABE , EBD & DBC æquales abe , ebd & dbc (§. 155).
4. Tandem puncta intersectionum b , c , d , e , a , rectis connectantur. Dico $abcde$ esse similem areae $ABCDE$.

D E M O N S T R A T I O.

Coincidit cum præcedente.

Aliter.

1. Ope pyxidis magneticæ observentur ut in probl. præc. ex duabus stationibus A & B declinationes linearum AB , AC , AD , AE itemque BC , BD , BE a linea meridiana acus.
2. Quæraturretur distantia stationum (§. 126).
3. In charta eodem modo, quo in probl. præc. determinetur situs rectarum ab , ac , ad &c. puncta intersectionum c , d , e rectis connectantur.

Ita Ichnographia erit absoluta.

D E M O N S T R A T I O.

Coincidit cum præcedente, modo una notentur, quæ in demonstratione penultima problematis præcedentis dicta sunt.

P R O B L E M A X L I X.

368. *Ichnographiam areae perficere, cujus integram peripheriam peragere licet.*

R E S O -

R E S O L U T I O.

Aliter.

Tab.
VII.
Fig.
117.

1. Mensula in A collocata collineetur in baculos in B & E defixos, ut angulo BAE æqualis *bae* in eadem designari possit.
2. Longitudo utriusque rectæ AB & AE (§. 126) explorata ex scala minore transferatur in mensulam ex *a* in *b* & *e* (§. 279).
3. Mensula in B translocetur, ita ut ipsi B punctum cognomine in eadem respondeat & visus per dioptras collineantis baculum in A attingat. Quo facto,
4. Idem dirigatur per easdem in C, quo sicut ante, angulo ABC æqualis *abc* & rectæ BC proportionalis *bc* in mensula designari possint.
5. Quodsi idem cum reliquis areæ angulis & lateribus fiat; erit figura in mensula delineata areæ propositæ similis.

D E M O N S T R A T I O.

Singuli enim anguli figuræ in mensula delineatæ sunt æquales singulis angulis areæ & latera illius lateribus hujus homologis proportionalia sunt *per constr.* Figura igitur delineata est areæ similis (§. 175). *Q. e. d.*

Aliter.

Queratur longitudo omnium laterum (§. 126) & quantitas tot angulorum, quot sunt latera, demtis tribus (§. 152). His enim datis Ichnographia *per probl.* 46. (§. 360), vi demonstrationis præcedentis absolvetur.

Tab.
VII.
Fig.
118.
n. 1.

1. Notetur in singulis angulis figuræ A, B, C, D, E, laterum AB, BC, CD, DE, AE declinatio a linea meridiana pyxidis magneticæ ut in probl. 47 (§. 363).
2. Queratur simul longitudo laterum (§. 126).
3. In charta designetur linea *ab* & in eam transferatur ex scala modica longitudo lateris AB (§. 279).
4. Ad rectam *ab* applicetur latus pyxidis lineæ ejusdem meridianæ parallelum, ita tamen ut extremum ipsius septentrionale septentrionem respiciat & charta cum pyxide huc illucque moveatur, donec acus angulum declinationis debitum monstret.
5. Charta immota idem latus pyxidis collocetur in *a* & circa id vertatur, donec angulum declinationis convenientem lateri AE indicet acus: ita enim rectam *ae* ducere & per scalam modicam ipsi AE proportionalem determinare licet.
6. Quodsi hæc operatio continuetur; Ichnographia tandem absolvetur.

n. 7.

D E M O N S T R A T I O.

Non aliud hic demonstrandum est, quam angulum *bae* ope pyxidis magneticæ in charta sic designatum esse alteri BAE in campo æqualem. Superius usum pyxidis magneticæ nullis dioptris instructæ exponentes demonstravimus, pyxide ad latus figuræ AB in campo ita applicata ut linea meridiana ejusdem sit huic parallela, angulum declinationis

nis

nis acus esse ipsi BAM æqualem, si ML ita ducatur ope pyxididis, ut ejusdem lineæ meridianæ parallela existat (§. 363). Eodem modo ex ibidem demonstratis apparet, pyxide eadem lege ad latus figuræ AE applicata, esse angulum EAL angulo declinationis acus in hoc situ æqualem. His jam datis, si latus pyxididis lineæ meridianæ ejusdem parallelum ad rectam *ab* in charta ductam applicetur & charta cum pyxide vertatur, donec acus, in conveniente situ, angulum declinationis eundem, quem in campo ad latus BA, monstret; erit perinde *baK* eidem angulo declinationis æqualis. Similiter si eadem lege pyxis applicetur ad punctum *a*, donec acus angulum declinationi lateris AE convenientem monstret & juxta ejus latus ducatur *ae*; erit angulus *eaI* angulo declinationis æqualis. Supponimus nempe rectam KI per *a* ea lege esse ductam, ut lineæ meridianæ pyxididis in plano mundi imaginario immobili respondeat, centro in *a* collocato. Est igitur $1=I$ & $6=VI$ (*per construct.*) Sed $1+7+6=180^\circ$ & $1+VII+VI=180^\circ$ (§. 147), consequenter $1+7+6=1+VII+VI$ (§. 87 *Arithm.*). Quare $7=VII$ (§. 91 *Arithm.*). *Q. e. d.*

Vel:

- Tab. VII. Fig. 118. n. 2.
1. In charta ducantur lineæ quotcunque parallelae.
 2. Instrumentum transportatorium parallelismo instructum ad extimam parallelarum ita applicetur, ut centrum sit in *a*, radius vero ipsi *aK*

respondeat, noteturque punctum *z*, indicans in peripheria instrumenti gradum declinationis acus a linea meridianæ pyxididis in campo ad punctum A.

3. Ab *a* per *z* ducatur recta & ex *a* in *b* transferatur ex scala modica longitudo rectæ AB in campo mensurata.
4. Regula parallelismi solitaria unam parallelarum stringente, altera cui cohæret instrumentum transportatorium promoveatur, donec hujus centrum ipsum *b* attingat & ad gradum declinationis in B observatæ designetur punctum *y*: quo facto, ut ante, rectam *bc* ducere licet.
5. Hac operatione continuata, integra area Ichnographia tandem absolvetur.

DEMONSTRATIO.

$1=I$, $2=II$, $3=III$, $4=IV$ & $5=V$ (*per constr.*) & quoniam recta per *b* ducta (quæ diametrum instrumenti transportatorii refert) ipsi *aK* parallela, (*per construct.*) acus vero magnetica in B est parallela situi in A; erit $1=8$ & $1=VIII$ (§. 233), consequenter $8=VIII$ (§. 87 *Arithm.*). Simili modo ostenditur esse $6=VI$. Quare cum sit $1+7+6=1+VII+VI$ (§. 147 *Geom.* & §. 87 *Arithm.*); erit $7=VII$ (§. 91 *Arithm.*). Porro $2=II$ (*per constr.*) & $8=VIII$, (*per demonstr.*). Ergo $8+2=VIII+II$ (§. 88 *Arithm.*). Similiter $12=2$ & $XII=II$ (§. 233) & $3=III$, (*per constr.*). Quare cum sit

fit $12 + 9 + 3 = XII + IX + III$ (§. 147); erit $9 = IX$ (§. 91 *Arithm.*). Porro $4 = IV$ (*per constr.*) & hinc, cum sit $10 = 3 + X = III$ (§. 233), adeoque ob $3 = III$ (*per demostr.*) $10 = X$ (§. 87 *Arith.*), $4 + 10 = IV + X$ (§. 88 *Arith.*). Denique $5 = V$ (*per constr.*) & $4 + 11 = IV + XI$ (§. 233 *Geom.* & §. 87 *Arith.*) adeoque ob $4 = IV$ (*per constr.*) $11 = XI$. Quare $5 + 11 = V + XI$ (§. 88 *Arithm.*). Singuli igitur anguli figuræ *abcde* sunt æquales singulis angulis areæ *ABCDE*. Quare cum etiam latera illius lateribus hujus homologis proportionalia sint (*per constr.*) figura *abcde* areæ *ABCDE* similis (§. 175.). *Q. e. d.*

PROBLEMA L.
369. *Figura in charta delineata similem in campo designare.*

RESOLUTIO.
Quoniam hoc problema est inversum alterius, quo Ichnographias arearum paramus; non modo tot ejus dantur casus, quot hujus commemoravimus, sed & ipsius resolutio ex resolutionibus problematum immediate præcedentium intelligitur. E. gr. Si semicirculo vel menfula & pertica utimur: anguli singuli figuræ aut anguli diagonalibus intercepti &c. in solo designantur *per probl.* 7 (§. 155) & latera vel diagonales &c. per mensuram majorem decenter determinantur.

CAPUT VI.

De Figurarum Dimensione ac Divisione.

PROBLEMA LI.

370. **I** *Nvenire aream quadrati.*

RESOLUTIO.

1. Quæratür longitudo lateris (§. 126).
2. Hæc ducatur in seipsam.

Factum exprimit aream Quadrati.
Sit e. gr. Latus quadrati = 345:
erit Area = 119025

DEMONSTRATIO.

Tab. VII. Fig. 119. **I** *Aream quadrati investigans quærit, quot digiti quadrati, hoc est, quot quadratula digitorum longa & lata in eodem contineantur (§. 118). Evidens vero est, si latus quadrati AB concipiatur in quocunque partes æquales & quadratum ipsum per rectas puncta divisionum in lateribus oppositis connectentes in quadrata minora divisum; tot esse quadratorum series, quot partes*

habet latus AB & in qualibet serie tot reperiri quadratula, quot latus BC, vel idem AB habet partes. Numerus ergo quadratorum invenitur, si latus in seipsum ducatur. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

371. Si latus quadrati fuerit 10, area erit 100. Cum igitur decem-peda sit 10 pedum, pes 10 digitorum &c. (§. 25): pertica quadrata 100 pedes quadratos; pes quadratus 100 digitos quadratos &c. continet (§. 118).

COROLLARIUM II.

372. Si latus quadrati fuerit 12, area erit 144. Quare cum pertica dividatur in 12 pedes; pes in 12 digitos &c. pertica quadrata continet 144 pedes quadratos; pes quadratus 144 digitos quadratos &c. (§. 118).

COROLLARIUM III.

373. Datus igitur numerus in priori casu facile in digitos, pedes & perticas quadratas resolvitur, si scilicet a dextra sinistram versus.

duæ notæ digitis, duæ pedibus refecentur: quæ enim sinistram versus residuæ sunt, perticis cedunt. E. gr. 119025 digiti conficiunt 11 perticas, 90 pedes, 25 digitos.

COROLLARIUM IV.

374. Quadrata sunt inter se in ratione duplicata laterum (§. 159 *Arithm.*). E. gr. Quadratum lateris dupli est quadruplum quadrati lateris simpli. Et quadrata æqualia sunt, quorum latera æqualia sunt.

PROBLEMA LII.

Tab. VII. Fig. 120. 375. *Invenire arcam rectanguli ABCD.*

RESOLUTIO.

1. Investigetur longitudo laterum AB & AC (§. 126).
2. Ducatur AB in AC. Factum erit area rectanguli.

DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ problematis præcedentis.

COROLLARIUM I.

366. Rectangula sunt in ratione composita fuorum laterum AB & AC (§. 159 *Arithm.*).

COROLLARIUM II.

377. Si ergo fuerint tres lineæ continue proportionales, quadratum mediæ rectangulo extremarum æquale est (§. 298 *Arithm.*).

COROLLARIUM III.

378. Si quatuor fuerint lineæ rectæ proportionales; rectangulum sub extremis æquatur rectangulo sub mediis (§. 297 *Arithm.*).

COROLLARIUM IV.

Tab. VI. Fig. 102. 379. Quare si ex eodem puncto A ducantur duæ rectæ, quarum altera AD circumulum tangit, altera AB secat; erit quadratum tangentis AD rectangulo sub secante AB & ejus portione extra circumulum AC æquale (§. 334 & 377).

COROLLARIUM V.

Tab. VI. Fig. 97. 380. Si duæ vel plures secantes HL & GM ex eodem puncto G ducantur, erunt rectangula sub totis & earum portionibus extra circumulum æqualia (§. 333 & 379).

COROLLARIUM VI.

381. Si duæ chordæ HM & LI se mutuo fecent in K; erunt rectangula sub segmentis inter se æqualia (§. 332. 378). Tab. I. Fig. 14.

COROLLARIUM VII.

382. Cum orgyæ, qua lignorum strues metimur, vel quadrati, vel rectanguli figuram habeat; ejus area per *probl. præc. vel præf.* inveniri potest. Per hanc itaque si factum ex longitudine in latitudinem struis dividatur; quotus indicat, quot ipsa orgyæ contineat (§. 69 *Arithm.*).

THEOREMA LXXIX.

383. *Duo parallelogramma ABDC & ECDF super eadem basi CD & inter easdem parallelas AF & CD constituta sunt inter se æqualia.* Tab. VII. Fig. 121.

DEMONSTRATIO.

Quoniam AB & CD; itemque EF & CD sunt latera opposita parallelogrammi per *hypoth.* erit $AB = CD$ & $EF = CD$ (§. 335), consequenter $AB = EF$ (§. 87 *Arithm.*) & hinc porro $AE = BF$ (§. 88 *Arithm.*). Quoniam porro $AC = BD$ & $CE = DF$ (§. 335); erit $\triangle ACE = \triangle BDF$ (§. 204), adeoque $ABGC = FECD$ (§. 91 *Arithm.*), consequenter $ABDC = ECDF$ (§. 88 *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

384. Quoniam AF & CD sunt parallelæ per *hypoth.* erunt perpendiculara inter eas intercepta æqualia (§. 226): quæ cum sint altitudines parallelogrammorum (§. 227); parallelogramma inter easdem parallelas constituta ejusdem altitudinis sunt. Patet adeo parallelogramma super eadem basi & ejusdem altitudinis æqualia esse (§. 383).

COROLLARIUM II.

385. Ergo & triangula super eadem basi & ejusdem altitudinis æqualia sunt. Nam

Tab. VII. Fig. 121.

Nam Parall. ACDB = Parall. ECDF (§. 384), sed $\Delta ACD = \frac{1}{2}$ Parall. ACDB & $\Delta FCD = \frac{1}{2}$ Parall. ECDF (§. 337). Ergo $\Delta ACD = \Delta FCD$ (§. 94 *Arith.*)

COROLLARIUM III.

386 Quodcumque adeo triangulum CFD est dimidium parallelogrammi ACDB super eadem vel æquali basi CD & ejusdem altitudinis, seu intra easdem parallelas. Nam $\Delta CFD = \Delta ACD$ (§. 337). Sed $\Delta ACD = \frac{1}{2}$ Parall. ACDB (§. 355). Ergo $\Delta CFD = \frac{1}{2}$ Parall. ACDB (§. 87 *Arith.*).

PROBLEMA LIII.

387. Invenire aream rhombi & rhomboidis seu parallelogrammi obliquanguli.

RESOLUTIO.

Tab. VII. Fig. 122.

- In CD pro basi assumptam demittatur perpendiculum AE (§. 216), quæ erit altitudo parallelogrammi (§. 227).
- Multiplisetur basis per altitudinem.

$$\begin{array}{r} \text{E. gr. Sit } CD = 4^{\circ} 5' 6'' \\ \quad \quad \quad AE = 2 \quad 3 \quad 4 \\ \hline \quad \quad \quad 1 \quad 8 \quad 2 \quad 4 \\ \quad \quad \quad 1 \quad 3 \quad 6 \quad 8 \\ \quad \quad \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

Erit Area = 10° 67' 0 4''

DEMONSTRATIO.

Parallelogrammum obliquangulum æquatur rectangulo super eadem basi CD & ejusdem altitudinis CE (§. 384). Sed area rectanguli æquatur factæ ex basi in altitudinem (§. 375 & 229). Ergo eidem æqualis est area parallelogrammi obliquanguli (§. 87 *Arith.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

388. Parallelogramma sunt in ratione composita altitudinum & basium (§. 159

Arithm.), adeoque & triangula eorum dimidia (§. 386) in eadem existunt (§. 181 *Arithm.*).

COROLLARIUM II.

389. Ergo si altitudines sunt æquales, basium; si bases sunt æquales, altitudinum rationem habent (§. 181 *Arithm.*).

COROLLARIUM III.

390 Parallelogramma æqualia bases & altitudines reciprocant (§. 299 *Arithm.*).

THEOREMA LXXX.

391. *Triangulum est æquale parallelogrammo super eadem basi sed dimidia altitudinis, itemque parallelogrammo super dimidia basi & ejusdem altitudinis.*

Tab. VII. Fig. 123.

DEMONSTRATIO.

Sit AEFB parallelogrammum rectangulum, cum obliquangulo cuicumque super eadem basi AB & intra eadem basi parallelas AB & EF existenti æquale sit (§. 383) atque adeo eidem salva quantitate substitui possit (§. 15 *Arithm.*). Jam

I. Si triangulum ADC fuerit rectangulum, assumpta AD pro basi, erit CD altitudo; sumpta vero DC pro basi, erit AD altitudo (§. 228). Jam cum altitudo parallelogrammi rectanguli AE (§. 229) sit altitudini dimidiæ trianguli CG æqualis *per hypoth.* & angulus ad D sit rectus (§. 91) adeoque ob EF & AB parallelas (§. 102) is ad G similiter rectus (§. 233), ac præterea angulus ad E itidem rectus (§. 100), & hinc G=E (§. 145); sint vero etiam verticales ad H æquales (§. 156): erit $\Delta CGH = \Delta EHA$ (§. 252), consequenter $EGDA = \Delta ACD$ (§. 88 *Arithm.*). *Q. e. d.*

X 2

II. Si

II. Si triangulum ACB fuerit obliquangulum, per perpendicularum DC in duo rectangula ADC & CDB resolvetur (§. 78. 91). Ergo si fiat FB = DG dimidiæ altitudini; erit DGFB = Δ DCB & AEGD = Δ ACD, per cas. I. Ergo AEFB = Δ ACB (§. 88 Arithm.). Quod erat unum.

Tab. VIII. Fig. 124.

Sit DK = KB = ½ DB & GB = AG = ½ AD; erit GK = ½ AB, adeoque dimidia basis. Jam CFKD = Δ DCB & GECD = Δ ACD, per cas. I. Quare EGKF = Δ ACB (§. 88 Arithm.). Quod erat alterum.

PROBLEMA LIV.

392. Invenire aream Trianguli.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Tab. VIII. Fig. 125.

1. Multiplicetur basis AB per altitudinem CD: erit productum area rectanguli ejusdem baseos & altitudinis (§. 387).
2. Productum dividatur bifariam. Ita prodit area trianguli ABC (§. 386).

Aliter.

Basis dimidia ½ AB multiplicetur per altitudinem CD; vel basis AB per altitudinem dimidiam ½ CD. Factum erit area trianguli (§. 391. 387).

E. gr. AB = 3°4'2"	AB = 3°4'2"
CD = 234	½ CD = 117
1368	2394
1026	342
684	342
80028	Δ 40014

2) —————
Δ ACB 40014

½ AB = 1°7'1"

CD = 234

684

513

342

Δ 40014

COROLLARIUM I.

393. Triangula æqualia bases & altitudines dimidias (§. 299 Arithm.), consequenter etiam bases & altitudines integras reciprocant (§. 178 Arithm.).

COROLLARIUM II.

394. Si area trianguli per basin dimidiam dividitur, quotus est altitudo (§. 210 Arithm.).

PROBLEMA LV.

395. Invenire latus quadrati parallelogrammo, vel triangulo dato æqualis.

RESOLUTIO.

Quærat inter basin & altitudinem parallelogrammi, vel inter dimidiam basin & altitudinem, aut integram basin & dimidiam altitudinem trianguli media proportionalis per §. 327 aut in numeris per §. 301 Arithm. Ita prodit latus quadrati quæsitum.

DEMONSTRATIO.

Factum enim ex basi in altitudinem exprimit aream parallelogrammi (§. 375. 387) & factum ex dimidia basi in altitudinem, vel ex dimidia altitudine in basin aream trianguli (§. 392). Cum adeo quadratum lineæ vel numeri reperi sit in utroque casu facto isti æquale (§. 298 Arithm.) erit quadratum istud in priori casu parallelogrammo, in posteriori triangulo æquale. Q. e. d.

THEOREMA LXXXI.

396. In parallelogrammis & triangulis similibus altitudines sunt lateribus homologis proportionales & bases ab iis lateribus proportionaliter secantur.

Tab. VII. Fig. 122.

DEMONS-

DEMONSTRATIO.

Cum altitudines AE & ae sint ad bases CD & cd perpendiculares (§. 227); Erunt E & e anguli recti (§. 78) adeoque æquales (§. 145). Et quia parallelogrammum ABDC ipsi abdc; triangulum CAD ipsi cad simile, per hypoth. erit C=c (§. 175). Quare AC:AE=ac:ae (§. 267). Est vero etiam AC:CD=ac:cd (§. 175). Ergo AE:CD=ae:cd (§. 196 Arithm.). Quod erat unum.

Quoniam E=e & C=c, per demonstr. erit AC:CE=ac:ce (§. 267). Est vero etiam AC:CD=ac:cd (§. 175). Ergo CE:CD=ce:cd (§. 196 Arithm.); adeoque ED:CE=ed:ce (§. 193 Arithm.). Q. e. d.

SCHOLIION.

397. Patet quoque a priori. Quoniam enim ABDC ∼ abdc & Δ ACD ∼ Δ acd, per hypoth. perpendicularia AE & ae pariterque segmenta basium CE & ce, itidemque ED & ed eodem modo determinantur (§. 119. 216), adeoque similia sunt (§. 120). Cum adeo ea eadem sint, per quæ a se invicem discerni debebant (§. 24 Arithm.), lineæ autem rectæ utpote similes (§. 17) non aliter nisi ratione discerni possint (§. 132 Arithm.); tam perpendicularia, quam segmenta basium ad latera homologa figurarum eandem rationem habere debent (§. 149. Arithm.). Eodem modo generaliter patet, rectas quascunque in figuris similibus eodem modo determinatas tum inter se, tum ad latera homologa eandem rationem habere.

COROLLARIUM I.

398. Quoniam parallelogramma & triangula sunt in ratione composita altitudinum & basium (§. 388), similia vero habent bases altitudinibus proportionales (§. 396); igitur parallelogramma & triangula similia habent rationem duplicatam homologorum laterum (§. 159 Arithm.). Et eodem modo patet,

quod etiam sint in ratione duplicata altitudinum ac segmentorum basios; immo linearum eodem modo utlibet determinatarum (§. 397).

COROLLARIUM II.

399. Sunt ergo ut quadrata laterum altitudinum & segmentorum basium homologorum, necnon linearum eodem modo utlibet determinatarum (§. 374).

PROBLEMA LV.

400. Invenire arcam polygoni irregularis ac trapezii.

RESOLUTIO.

1. Resolvatur per diagonales AD & AC in triangula.
2. Inveniantur areae singulorum triangulorum (§. 392) &
3. Addantur. Erit summa area quaesita (§. 86 Arithm.).

E. gr. $\frac{1}{2}AD = 43'$ $\frac{1}{2}AD = 43'$ $\frac{1}{2}AC = 42'$
 $EF = 35$ $GC = 45$ $BH = 30$

215	215 ΔABC, 1260
129	172
Δ AED, 1505 Δ DAC, 1935	
Δ AED, 1505	
Δ ABC, 1260	

Area polygoni irreg. 4700'

Quodsi $\frac{1}{2}AD$ multiplicetur per summam altitudinum EF + GC, vel integra AD per $\frac{1}{2}(EF + GC)$; prodibit area trapezii AEDC.

E. gr. EF = 35 $\frac{1}{2}AD = 43$
 GC = 45 EF + GC = 80

EF + GC = 80 AEDC = 3440

$\frac{1}{2}(EF + GC) = 40$
 AD = 86

AEDC = 3440

X 3

Tab:
VIII.
Fig.
126.
n. 1.

Simi-

Tab. VIII. Fig. 127. Similiter si in trapezio fuerit AB ipsi CD parallela, erunt triangulorum altitudines BF & GC æquales (§. 226. 227), consequenter trapezii area prodit, ducta femisumma basium parallelarum AB & CD in altitudinem ejus BF (§. 392).

Tab. VIII. Fig. 127. E. gr. Sit AB 246", CD = 378", BF = 195" erit AB + CD = 624 BF = 195

$$\begin{array}{r} 3120 \\ 5616 \\ \hline 624 \end{array}$$

Area Trapezii 121680

THEOREMA LXXXII.

Tab. VI. Fig. 107. 401. *Figura regularis ABCDE ex centro circuli circumscripti F in triangula aequalia atque similia resolvitur & area ejus aequatur triangulo, cujus basis peripheria totius polygoni AB + BC + CD &c. altitudo perpendicularum FG ex centro F in latus unum AB demissum. Idem valet de area circumscripti abcde, nisi quod altitudo sit radius FG.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam AB=BC=CD=DE=EA (§. 106) & AF=FB=FC=FD=FE (§. 40); triangula AFB, BFC, CFD, DFE, EFA aequalia & similia sunt (§. 204). *Quod erat unum.*

Tab. VIII. Fig. 128. Constituantur triangula AFB, BFC, CFD &c. in quæ resolutum est polygonum ABCDE super eadem recta AA (§. 199). Erigatur in A perpendicularis Af (§. 249) ipsi altitudini triangulorum æqualis. Erit Af B=AFB, Bf C=BFC, Cf D=CFD &c. (§. 385); consequenter Af A=AFB + BFC + CFD

&c. (§. 88 *Arithm.*), æqualis est arcæ polygoni regularis (§. 86. 87 *Arithm.*). *Quod erat secundum.*

Cum recta Fg ex centro F ad contactum g ducta sit radius & ad latus ae perpendicularis (§. 308); erit ea altitudo trianguli aFe (§. 227). Reliqua patent ut ante. *Quod erat tertium.*

Tab. VI. Fig. 107.

PROBLEMA LVI.

402. *Invenire aream polygoni regularis.*

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Latus polygoni AB multiplicetur per dimidium laterum numerum, e. gr. latus hexagoni per 3.
2. Factum porro ducatur in perpendicularum GF ex centro circuli circumscripti in latus AB demissum.

Tab. VI. Fig. 107.

Ita prodit area quæsitæ (§. 392. 401).

E. gr. AB = 504'
 dimidius Numer later. 2½

$$\begin{array}{r} 27 \\ 108 \\ \hline \end{array}$$

Semiperimeter = 135
 FG = 29

$$\begin{array}{r} 1215 \\ 270 \\ \hline \end{array}$$

Area Pentagoni 39015'

THEOREMA LXXXIII.

403. *Quadrilatera & Polygona similia ABCDE & abcde per diagonales AC, AD & ac, ad in similia triangula ABC & abc, ACD & acd, ADE & ade dividuntur, & inter se & totis proportionalia.*

Tab. VI. Fig. 111.

DEMONSTRATIO.

Quoniam ABCDE \sim abcde per hypoth. erit $o = o$ & AB : BC = ab : bc (§. 175). Ergo $\Delta bac \sim \Delta BAC$, $y = y$ atque bc : ca = BC : CA (§. 183), Est vero etiam bc : cd = BC : CD & $n + y = n + y$ (§. 175). Ergo ca : cd = CA : CD (§. 156 Arithm.) & $n = n$ (§. 91 Arithm.), consequenter $\Delta bad \sim \Delta BAD$, cd : da = CD : DA & $u = u$ (§. 183). Est vero etiam $u + s = u + s$ & cd : de = CD : DE (§. 175). Ergo $s = s$ (§. 91 Arithm.) & da : de = DA : DE (§. 196 Arithm.), consequenter $\Delta dea \sim \Delta DEA$ (§. 183). Quod erat primum.

Quoniam $\Delta ABC \sim \Delta abc$, $\Delta DAC \sim \Delta dac$ & $\Delta DAE \sim \Delta dae$ per demonstrata; erit $\Delta ABC : \Delta abc = CA^2 : ca^2$, $\Delta DAC : \Delta dac = CA^2 : ca^2 = DA^2 : da^2$ & $\Delta DAE : \Delta dae = DA^2 : da^2$ (§. 398), consequenter $\Delta ABC : \Delta abc = \Delta DCA : \Delta dca$ & $\Delta DCA : \Delta dca = \Delta DAE : \Delta dae$ (§. 167 Arith.), adeoque etiam $\Delta DEA : \Delta dea = \Delta ABC : \Delta abc$ (§. cit.). Sunt igitur $\Delta\Delta ABC$, $\Delta\Delta ACD$, $\Delta\Delta ADE$, & abc, acd, ade inter se proportionalia. Quod erat secundum.

Quoniam denique $\Delta ABC : \Delta abc = \Delta DCA : \Delta dca = \Delta DEA : \Delta dea$, per secundum hujus; erit $\Delta ABC + \Delta DCA + \Delta DEA : \Delta abc + \Delta dca + \Delta dea = \Delta ABC : \Delta abc$ (§. 192 Arithm.). Sed $\Delta ABC + \Delta DCA + \Delta DEA =$ polygono ABCDE & $\Delta abc + \Delta dca + \Delta dea = abcde$ (§. 86 Arithm.). Ergo ABCDE : abcde = $\Delta ABC : \Delta abc = \Delta DEA : \Delta dea : \Delta dca$ &c. (§. 168 Arithm.), consequenter ABCDE : $\Delta ABC = abcde : \Delta abc$,

& ABCDE : $\Delta DCA = abcde : \Delta dca$ &c. (§. 173 Arithm.). Quod erat tertium.

COROLLARIUM.

404. Cum polygona regularia sint æquilatera & æquiangula (§. 106), tum etiam sibi mutuo æquiangula (§. 344); polygona regularia ejusdem ordinis, veluti omnia pentagona, omnia hexagona &c. regularia inter se similia sunt (§. 175). Polygoni igitur regularia ejusdem ordinis per diagonales in triangula similia dividuntur & inter se, & totis proportionalia.

SCHOLIUM.

405. Poterat theorema præfens ex notione determinationis facilius demonstrari. Nimirum cum figuræ ABCDE & abcde sint similes, per hypoth. adeoque anguli A & a æquales (§. 175), atque præterea diagonales AC, AD & ac, ad ex angulis hisce æqualibus A & a ducantur; $\Delta\Delta ABC$ & abc, CAD & cad, DAE & dae eodem modo determinantur (§. 119), consequenter & inter se similia sunt & similes partes figurarum existunt (§. 120), eandem adeo ad figuras tanquam tota rationem (§. 170 Arithm.), inmo eandem inter se rationem quam polygoni aut quadrilatera habent (§. 171 Arithm.).

THEOREMA LXXXIV.

406. Figuræ tam regulares, quam similes irregulares habent rationem duplicatam homologorum laterum.

Tab. VI. Fig. 111.

DEMONSTRATIO.

Sint figuræ ABCDE & abcde sive regulares, sive irregulares similes, eæque sive quadrilateræ, sive polygonæ quæcunque ejusdem ordinis; erit ABCDE : abcde = $\Delta ABC : \Delta abc = \Delta ACD : \Delta acd = \Delta ADE : \Delta ade$ (§. 403. 404). Sed $\Delta ABC : \Delta abc = AB^2 : ab^2 = BC^2 : bc^2$; $\Delta ADC : \Delta adc = CD^2 : cd^2$ & $\Delta ADE : \Delta ade$

$ade = DE^2 : de^2 = EA^2 : ea^2$ (§. 398). Ergo $ABCDE : abcde = AB^2 : ab^2 = BC^2 : bc^2 = CD^2 : cd^2 = DE^2 : de^2 = EA^2 : ea^2$ (§. 167 *Arithm.*).
Q. e. d.

S C H O L I O N.

407. Eodem modo ostenditur, figuras rectilineas similes esse in ratione duplicata diagonalium ex angulis aequalibus A & a ductarum, vel linearum aliarum quarumcunque eodem modo intra eas determinatarum (§. 405).

T H E O R E M A LXXXV.

408. Circuli & figurae similes ipsis inscriptae vel circumscriptae sunt inter se ut quadrata diametrorum.

D E M O N S T R A T I O.

Ponamus describi duos circulos & iis circumscribi quadrata, omnia utrobique eodem modo determinabuntur (§. 119 & 357). Sunt ergo figurae utraeque inter se similes (§. 128). Cum adeo utrobique eadem sint, per quae distingui debent (§. 24 *Arithm.*); quadrata circulis circumscripta ad suos circulos eandem rationem habere debent (§. 132 *Arithm.*). Quamobrem circuli inter se sunt ut quadrata diametrorum (§. 173 *Arithm.*). Quod erat unum.

Eodem modo ostenditur, figuras similes circulis inscriptas vel circumscriptas esse ut circulos, quibus inscribuntur vel circumscribuntur. Sed circuli sunt ut quadrata diametrorum, per demonstrata. Ergo figurae ipsis inscriptae & circumscriptae similes sunt ut quadrata diametrorum (§. 167 *Arithm.*). Quod erat alterum.

Aliter.

Resolvantur polygona circulis inscripta $ABCDE$ & $abcde$ ex centrīs F & f in $\triangle\triangle ABF$, BFC , CFD , & afb , bfc , afd , &c. erit angulus $FAB = fab$ & $FBA = fba$ &c. (§. 344. 347), consequenter $\triangle AFB \sim \triangle afb$ (§. 267). Eodem modo patet, esse $\triangle BFC \sim \triangle bfc$, $\triangle CFD \sim \triangle cfd$ &c. Habemus itaque $\triangle AFB : \triangle afb = BF^2 : bf^2$, $\triangle BFC : \triangle bfc = BF^2 : bf^2$ &c. (§. 398). Ergo $ABCDE : abcde = BF^2 : bf^2$ (§. 167 *Arith.*), consequenter cum radii EF & bf sint ut diametri (§. 39 *Geom.* & 178 *Arithm.*), polygona similia circulo inscripta sunt ut quadrata diametrorum (§. 260 *Arithm.*). Et idem eodem modo ostenditur de polygonis circulo circumscriptis, cum triangula similia etiam sint in ratione duplicata altitudinum (§. 398), altitudines vero triangulorum, in quae resolvitur polygonum circulo circumscriptum, sunt radii circulorum (§. 355).

Tab.
VI.
Fig.
107.

Quodsi

Quodsi jam polygonum circulo inscriptum tot sumatur laterum, donec subtensa a peripheria magnitudine inassignabili differat; polygonum cum circulo idem erit. Unde etiam circuli erunt inter se ut diametrorum quadrata.

COROLLARIUM.

409. Habent ergo circuli rationem duplicatam diametrorum (§. 374), adeoque, cum radii sint ut diametri (§. 39 Geom. & §. 181 Arithm.), & radorum (§. 260. 259 Arithm.).

THEOREMA LXXXVI.

410. *Circulus equalis est triangulo, cujus basis peripheriæ, altitudo radius equalis.*

DEMONSTRATIO.

Concipiatur peripheria circuli in partes numero infinitas inter se æquales adeoque infinite parvas divisa; arcus infinite exigui *ab* supra chordam cognominem excessus erit quovis dato minor, seu inassignabilis, adeoque revera nullus. Concipiantur porro ex centro *c* ad extrema arcus infinite parvi *ab* ducti radii *cb* & *ca*: erit angulus *acb* infinite parvus, adeoque *a* & *b* non different a recto (§. 240), consequenter si *ab* sumatur pro basi, radius *ac* erit trianguli *abc* altitudo (§. 228). Cum adeo area circuli resolvatur in istiusmodi triangula numero infinita, quorum altitudo communis est radius *ac*, bases vero junctim sumtæ sunt peripheriæ circuli æquales, per demonstrata; erit ille æqualis triangulo, cujus basis peripheria, altitudo radius circuli (§. 401).
Q. e. d.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

SCHOLIUM.

411. *Hac demonstrandi methodo primus usus est Keplerus (a). Eam exemplo ejus excitatus (b) sub nomine Methodi indivisibilium magis excoluit Cavalerius. Demonstrationem indirectam dedit Archimedes (c) non contemnendam, quoniam ipsius demonstrandi methodo principia methodi infinitesimalis rigidantur.*

COROLLARIUM I.

412. Sunt igitur circuli in ratione composita peripheriarum & radorum (§. 388). Sed iidem sunt in ratione duplicata radorum (§. 409). Quare peripheriæ sunt inter se ut radii (§. 159 Arithm.).

COROLLARIUM II.

413. Cum adeo sit, ut peripheria circuli unius ad suum radius, ita peripheria alterius cujuscunque ad suum (§. 173 Arithm.); ratio peripheriæ ad radius seu diametrum (§. 39. Geom. & §. 181 Arithm.) in omnibus circulis eadem.

SCHOLIUM.

414. *Idem etiam hoc modo ostenditur: cum omnes circuli inter se similes sint (§. 134), per quæ distingui possent, ea eadem sunt (§. 24 Arithm.). Quoniam itaque per rationem peripheriarum ad diametros distingui possent, siquidem ea in diversis circulis diversa foret (§. 132 Arithm.); ratio in omnibus eadem esse debet. Q. e. d.*

THEOREMA LXXXVII.

415. *Sector circuli ACD equalis est triangulo, cujus basis arcus AD, altitudo radius AC.*

Y

DE-

(a) In Nova Stereometria doliorum vinariorum part. 1. theor. 2. f. B2.

(b) Vide præfat. ad Geometriam indivisibilium continuorum nova ratione promotam. p. b. 2.

(c) In libello de circuli dimensione, prop. 1.

Tab. VIII. Fig. 133.

DEMONSTRATIO.

Eadem est, quæ theorematis præcedentis (§. 410).

THEOREMA LXXXVIII.

416. Polygonum inscriptum minus ; circumscriptum majus est circulo. Similiter illius perimeter minor ; hujus autem perimeter major est peripheria circuli.

DEMONSTRATIO.

Tab. VI. Fig. 107. Latera AB, BC, CD &c. polygони inscripti sunt chordæ arcus cognomines subtendentes (§. 342). Sed chordæ sunt arcubus minores (§. 191). Ergo singula polygони latera AB, BC, CD &c. sunt singulis arcubus eisdem respondentibus minora, consequenter perimeter polygони circulo inscripti est hujus peripheria minor (§. 90 *Arithm.*). Et quoniam chordæ totæ intra circulum cadunt: area polygони parti circuli congruit (§. 9 *Arithm.* & §. 3 *Geom.*), adeoque ipsi æqualis est (§. 161), consequenter polygonum inscriptum circulo minus (§. 20 *Arithm.*). Quod erat primum & secundum.

Latera polygони circumscripti *ab, bc, cd* &c. tangunt circulum (§. 355) adeoque totæ extra eum cadunt (§. 47), consequenter circulus parti polygони congruit (§. 9 *Arithm.* & §. 3 *Geom.*). Hinc ipsi æqualis (§. 161), hoc est, circulus polygono circumscripto minor est (§. 20 *Arithm.*). Quod erat tertium.

Area polygони circumscripti est ad aream circuli in ratione composita radii circuli & perimetrorum (§. 401. 410. 388), consequenter ut factum ex radio in perimetrum polygони ad factum ex radio in peripheriam circuli (§. 159 *Arith.*). Ergo illa ad hanc ut illius perimeter ad

hujus peripheriam (§. 181 *Arithm.*). Sed polygonum majus circulo *per demonstr.* Ergo & ejus perimeter major peripheria hujus (§. 149 *Arith.*). Quod erat quartum.

THEOREMA LXXXIX.

417. In triangulo rectangulo ABC quadratum hypotenusa AC æquale est quadratis laterum AHIB & BCED simul sumtis.

Tab. VIII. Fig. 130.

DEMONSTRATIO.

Ducantur rectæ AE & BF (§. 121), itemque BK ipsi CF parallela (§. 258). Quoniam $\triangle ACE$ cum quadrato CEDB super eadem basi & inter easdem parallelas (§. 336) existit; hujus dimidium est (§. 391). Ex eadem ratione $\triangle BCF$ est dimidium parallelogrammi LCFK. Enimvero quia $x = o$ (§. 98. 145), adeoque $x + y = o + y$ (§. 88 *Arithm.*), $BC = CE$ & $AC = CF$ (§. 98); ideo $\triangle ACE = \triangle BCF$ (§. 179), consequenter $BCED = LCFK$ (§. 93 *Arith.*). Eodem modo ostenditur, esse $AHIB = ALKG$. Quamobrem $BCED + AHIB = LCFK + ALFG$ (§. 88 *Arithm.*) = $ACFG$ (§. 86 *Arithm.*). Q. e. d.

SCHOLIUM.

418. Hoc theoremata Pythagoras invenit: unde Pythagoricum dicitur. Amplissimi per *Mathesin universam* est usus: ideo ab illius auditoribus Hecatombe, hoc est, centum bovm sacrificio redemptum fertur.

COROLLARIUM I.

419. Quadratum construitur duobus aut pluribus datis simul sumtis æquale, si 1^o. latera duorum AC & AB jungantur ad angulos rectos (§. 249); 2^o. super ducta hypotenusa BC erigatur latus tertii CD perpendiculariter (§. *cit.*) ducaturque hypotenusa BD &c. Est enim $BC^2 = AB^2 + AC^2$ & BD^2

Tab. VIII. Fig. 131.

$BD^2 = BC^2 + CD^2$ (§. 417). Ergo $BD^2 = AB^2 + AC^2 + CD^2$ &c.

COROLLARIUM II.

Tab. VIII. 420. Quodsi AB fuerit = 1 & AC = 1; erit CB = $\sqrt{2}$. Si porro fiat AD = CB = $\sqrt{2}$; erit DB = $\sqrt{3}$. Si fiat AE = 2; erit BE = $\sqrt{5}$. Si fiat AF = EB = $\sqrt{5}$; erit FB = $\sqrt{6}$ & ita porro in infinitum. Omnes adeo radices quadratae surdæ sunt ad unitatem ut linea recta ad aliam rectam, consequenter numeri (§. 10 *Arithm.*) iique irrationales (§. 43. 295 *Arithm.*)

COROLLARIUM III.

421. Cum CB sit diagonalis Quadrati (§. 111); erit ea ad latus AB ut $\sqrt{2}$ ad 1. Sed $\sqrt{2}$ est numerus irrationalis (§. 420), adeoque unitati incommensurabilis (§. 43 *Arith.*), consequenter diagonalis quadrati est lateri incommensurabilis.

COROLLARIUM IV.

422. Dantur adeo quantitates incommensurabiles, hoc est, quarum nulla datur pars aliquota communis (§. 31 *Arithm.*), consequenter rationes irrationales (§. 164 *Arith.*). Et hinc patet non repugnare, ut hæc numeris irrationalibus exprimantur (§. 419).

PROBLEMA LVII.

Tab. VIII. 423. Datis chorda AB & radio AC invenire chordam arcus dimidii AD.

Fig. 133. RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Quoniam radius CD arcum AB bifecat in D, per *hypoth.* etiam chordam AB bifecat & ad eam perpendicularis (§. 291), adeoque anguli ad A, recti sunt (§. 78). Quare

I. A quadrato radii AC subtrahatur quadratum chordæ dimidiæ datæ AE: residuum est quadratum ipsius EC (§. 417).

2. Ex hoc residuo extrahatur radix quadrata (§. 269. *Arithm.*), quæ erit EC.

3. Hæc ex radio DC subducta relinquit DE.

4. Addantur quadrata AE & DE, summa est quadratum DA (§. 417)

5. Inde ergo si extrahatur radix (§. 269 *Arithm.*); habetur chorda arcus dimidii AD.

E. gr. Sit radius AC = 10000 & AB latus hexagoni: erit AB itidem 10000 (§. 356) & AE = 5000.

Quare

$AC^2 = 100000000$	$AE^2 = 25000000$
$AE^2 = 25000000$	$ED^2 = 1795600$
$CE^2 = 75000000$	$DA^2 = 26795600$
$CE = 8660$	$DA = 5176$
$DC = 10000$	
$DE = 1340$	

PROBLEMA LVIII.

424. Dato latere polygoni regularis inscripti AB invenire latus circumscripti FG. Tab. VIII. Fig. 134.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Quoniam FG parallela ipsi AB & DC chordam AB bifariam dividit (§. 355); erit $AE = \frac{1}{2} AB$ & $CE:EA = CD:DG$ (§. 268). Quare si ob angulum rectum ad E (§. 291) EC investigetur ut in problemate præcedente; reperietur DG (§. 302 *Arithm.*), cujus duplum est latus polygoni circumscripti FG. Est enim $CE:CD = EA:DG$ & $CE:CD = EB:DF$ (§. 268). Cum adeo sit $EA:DG = EB:DF$ (§. 167 *Arithm.*) & $EA = EB$ per

demonstrata: erit etiam $DG=DF$ (§. 177. *Arithm.*) adeoque $FG=2 DG$.
Q. e. i. & d.

E. gr. Sit $CD=AB=10000$; erit $AE=5000$ & $EC=8660$ (§. 423), adeoque $DG=5773$. Hinc $FG=11546$.

PROBLEMA LIX.

425. *Invenire rationem diametri ad peripheriam.*

RESOLUTIO.

1. Quærantur per continuam bisectionem latera polygonorum inscriptorum (§. 423), donec perveniatur ad latus arcum quantumlibet exiguum subtendens.
2. Invento hoc latere, quæratu porro latus polygoni similis circumscripti (§. 424).
3. Multiplicetur utrumque per numerum laterum polygoni, ut habeatur perimenter polygoni tam inscripti, quam circumscripti (§. 106).

Erit ratio diametri ad peripheriam circuli major quam ejusdem ad perimetrum polygoni circumscripti; minor vero, quam ejusdem ad perimetrum inscripti (§. 416 *Geom.* & §. 205 *Arithm.*). Differentia vero inter utramque perimetrum cognita, haud difficulter definitur ratio diametri ad peripheriam circuli in numeris prope veris.

Sit e. gr. radius circuli 1 seu (ut latera polygonorum per fractiones decimales exprimere liceat) 1.000,000,000,000,000,000,000,000,000; reperietur, continua a quadrato bisectione, latus polygoni 1,073,741,824 laterum inscripti vero proxime minus 0.00000000058516723170686387122 circumscripti autem latus vero itidem proxime majus 0.000000

000585167231706863873784.
Hinc perimenter circumscripta 6.28318530717958649156537 vero proxime major; inscripta autem 6.28318530717958645093 vero proxime minor. Cum ergo circuli peripheria intra hos limites continetur; posita diametro 2.0000000000000000, erit peripheria minor quam 6.2831853071795865, major vero quam 6.2831853071795863. Unde ratio prope vera diametri ad peripheriam ut 10000000000000000 ad 31415926535897932. Compendia calculi tradit Ludolphus a Ceulen (a).

SCHOLIION. I.

426. *In quadrando circulo ab omni ævo, quo Geometria exulta, defudarunt ingenia præstantissima: perfectam tamen quadraturam in numeris finitis nemo adhuc dedit, utut nostra præsertim atate ars inveniendi egregie promotâ fuerit. Rationem tamen diametri ad peripheriam in numeris prope veris dederunt multi: Archimedes (b) ea fini excogitavit methodum quadrandi circulum per polygona regularia inscripta & circumscripta, & polygonis 96 laterum usus invenit rationem diametri ad peripheriam esse ut 7 ad 22 fere. Nimirum si diameter 1, perimenter polygoni inscripti reperitur $3\frac{1}{2}$; perimenter vero circumscripti $3\frac{1}{2}$. Ejus vestigiis insistentes posteriores rationes propiores investigarunt. Nemo autem plus operâ impendit Ludolpho a Ceulen (c), qui tandem reperit, posita diametro peripheriam esse minorem quam 3.14159265358979323846264338327950, sed majorem quam idem numerus, cyphra ultima in unitatem mutata. Enimvero quoniam numeri adeo prolixi praxi parum respondent; in Geometris practica hodie a plerisque assumitur, diametrum*

(a) In libro de circulo & adscriptis conf. *Fundamenta Arithmetica & Geometrica* lib. 6. probl. 1. p. m. 241. & seqq.

(b) In libello de circuli dimensione prop. 2.

(c) In *Zetematum Geometricorum Epilogsimo* Zetem. 2.p. 92.

trum esse ad peripheriam ut 100 ad 314, vel in circulis majoribus ut 10000 ad 31415: in qua proportione Ptolemæus, Vieta, Hugenus cum Ludolpho consentiunt. Hugenus (a) compendiosiore monstravit viam; sed pluribus theorematis nixam, quæ in hisce Elementis non demonstrantur.

COROLLARIUM.

427. Si diameter fuerit 113; erit periphæria 113. 31415: 10000 (S. 272 Arithm.) hoc est 355 quam proxime.

SCHOLIUM II.

428. Hæc proportio, quam Adrianus Metius tradit (b) a parente suo inventam & demonstratam (c); inter omnes, quæ parvis numeris exprimuntur, accuratissima. Quodsi enim numerum 355 septem cyphras ad obtinendas fractiones decimales auctum per 113 divides; quotus cum proportione Ludolphina collatus ostendet eam ne quidem $\frac{3}{10000000}$ a vera differre.

PROBLEMA LIX.

429. Data diametro circuli invenire peripheriam & aream ejus, & data periphæria diametrum.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Cum detur ratio diametri ad periphæriam (S. 426. 427); una data, invenietur altera (S. 302 Arithm.).
2. Periphæria ducta in quartam diametri partem, habetur area circuli (S. 410. 392).

E. gr. Sit diameter 56: erit

100	— 314	— 56	Periph.	17584''
56			$\frac{1}{4}$ Diam.	1400
1884				7033600
1570				17584
Per. 17° 5' 84''	Area 24° 61' 76'' 00''			

(a) In inventis de circuli magnitudine prop. 10. p. 15. & prop. 20. p. 40.
 (b) In Geometria practica part. 1. c. 10. S. 3. p. m. 89.
 (c) In libello adversus quadraturam circuli Simonis a Quercu conscripto.

COROLLARIUM I.

430. Si diameter 100; periphætia 314 (S. 426), adeoque area circuli 7850 (S. 429). Est vero quadratum diametri 10000 (S. 370): ergo hoc ad aream circuli ut 10000 ad 7850, hoc est, ut 1000 ad 785 (S. 181 Arithm.) quam proxime.

COROLLARIUM II.

431. Similiter si diameter 113, periphæria 355 (S. 427), adeoque area circuli 10028 $\frac{3}{4}$ (S. 429). Est vero quadratum diametri 12769 (S. 370). Ergo hoc ad illam ut 12769 ad 10028 $\frac{3}{4}$ hoc est, ut 51076 ad 40115 (S. 178 Arithm.) consequenter (dividendo per 113) ut 452 ad 355 (S. 181 Arithm.), quæ Metiana proportio priori accuratior.

COROLLARIUM III.

432. Area igitur circuli etiam invenitur, si ad 1000, 785 & quadratum diametri; vel ad 452, 555 & quadratum diametri numerus quartus proportionalis quaratur (S. 302 Arithm.).

Sit e. gr. diameter 56'', erit quadratum ejus 31° 36' 00''. Quare

$$1000 - 31^{\circ} 36' 00'' - 785$$

785	

1568000	
25088	
21952	

24° 61' 76''	Area circuli.

COROLLARIUM IV.

433. Si area circuli minoris GEHF subtrahatur ex area majoris concentrici ADBC; relinquitur annulus ADBCGEHF.

Tab. VIII. Fig. 135.

PROBLEMA LX.

434. Data area circuli, invenire diametrum.

RESOLUTIO.

- I. Quaratur ad 785, 1000 & aream circuli datam 246176 numerus quartus

Y 3	tus
-----	-----

tus proportionalis 313600 (§. 302 *Arithm.*): qui est quadratum diametri (§. 430).

2. Inde extrahatur radix quadrata 560 (§. 269 *Arithm.*), quæ est diameter (§. 236 *Arithm.* & §. 370 *Geo m.*).

PROBLEMA LXI.

Tab. VIII. Fig. 133.

435. Dato radio circuli AC una cum ratione arcus AB ad peripheriam invenire aream sectoris ACB.

RESOLUTIO.

1. Quærat^r ad 100, 314 & radium AC numerus quartus proportionalis (§. 302 *Arithm.*): qui est semiperipheria (§. 436 *Geom.* & §. 181 *Arithm.*).
2. Quærat^r porro ad 180°, arcum datum AB & semiperipheriam inventam numerus quartus proportionalis (§. 302 *Arithm.*): ut habeatur arcus AB in eadem mensura, in qua radius AC datur.
3. Tandem arcus AB ducatur in semiradium.

Factum exprimet aream sectoris (§. 415. 392).

E. gr. Sit radius 6'; arcus 60°.

$$\begin{array}{r} 100 - 314 - 600'' \\ \hline 600 \end{array}$$

Semiperiph. 1884|00

$$180 - 1884 - 60$$

$$60) \quad 3 \text{ ————— } 1$$

$$628'' = AB$$

$$300 = \frac{1}{2} AC$$

$$\text{Area } 18'84''|00| = ACB$$

PROBLEMA LXII.

436. Datis altitudine segmenti DE & dimidia basi EA, invenire aream ejus.

Tab. VIII. Fig. 133.

RESOLUTIO.

1. Quærat^r diameter (§. 328).
2. Describatur circulus (§. 131) & in eo applicetur basis segmenti AB.
3. Ducantur radii AC & BC & ope instrumenti transportatorii investigetur numerus graduum arcus ADB.
4. Dato jam radio AC una cum arcus ADB ad peripheriam ratione, investigetur area sectoris ACB &
5. Ex chorda AB atque altitudinis segmenti DE complemento ad radium EC, area trianguli ACB (§. 392).
6. Hoc denique ex illo auferatur: residuum erit segmentum ADBEA.

E. gr. Sit AB = 600'', DE = 80''; erit DF = 1205'' (§. 313), arcus AB = 60° (§. 152). Ergo area sectoris ADBC = 18'84'' (§. 435). Jam EC = 522½'' AE = 300''. Quare Δ ACB = 156756'' consequenter segmentum AEBDA = 31650''.

COROLLARIUM.

437. Quodsi segmentum majus BFA quærat^r; triangulum BCA sectori BFACB addendum.

SCHOLIUM.

438. Ne pro inveniendâ area sectoris atque segmenti peripheriam investigare opus sit; arcuum gradus atque scrupula tam prima, quam secunda istiusmodi particulis expressæ in tabula subsequente exhibere placet, qualium

Grad.	Part. per.	Min.	Part. per.
1	872	1	14
2	1745	2	29
3	2617	3	43
4	3490	4	58
5	4363	5	72
<hr/>			
6	5235	6	87
7	6108	7	101
8	6981	8	116
9	7853	9	130
10	8726	10	145
<hr/>			
20	17453	20	290
30	26179	30	436
40	34906	40	581
50	43633	50	727
60	52359	Sec.	Part. per.
<hr/>			
70	61086	2	0
80	69813	3	$\frac{1}{2}$
90	78539	4	$\frac{1}{2}$
100	87266	5	1
110	95993	6	1
<hr/>			
120	104719	7	$1\frac{1}{2}$
130	113446	8	$1\frac{1}{2}$
140	122173	9	2
150	130899	10	2
<hr/>			
160	139626	20	4
170	148353	30	7
180	157079	40	9
360	314159	50	12

lium diameter est 100000. Constructio tabula intelligitur ex resolutione problematis 61 (S. 435): usus talis est. Sit e. gr. ut in casu problematis citati diameter 1200^m, arcus

60°. Cum 60 gradibus in tabula respondeant 52359 particulae diametri; inferatur:

$$\begin{array}{r}
 100000 - 52359 - 1200 \\
 \hline
 1200 \\
 \hline
 10471800 \\
 \hline
 52359 \\
 \hline
 628130800
 \end{array}$$

Est ergo arcus 628^m, ut supra (S. cit.) eundem reperimus.

PROBLEMA LXIII.

439. Parallelogrammum ABEC ex dato puncto D in duas partes aequales dividere. Tab. VIII.

RESOLUTIO Fig. 136.

Fiat EF=AD & ducatur recta DF: erit ADFC=DBEF.

DEMONSTRATIO.

Ducatur diagonalis AE: erit $o=x$ (S. 156) & ob parallelas AB & EC (S. 102) $y=u$ (S. 233). Sed AD=FE, per const. Ergo $\triangle ADG = \triangle FGE$ (S. 252). Est vero $\triangle ACE = \triangle AEB$ (S. 337). Quare ACFG=DBEG (S. 91 Arithm.), consequenter ADFC=DBEF (S. 88 Arithm.). Q. e. d.

PROBLEMA LXIV.

440. Parallelogrammum atque triangulum in partes quotcunque aequales dividere. Tab. VIII.

RESOLUTIO. Fig. 137.

1. Dividatur basis CD in tot partes aequales, in quot figura dividenda (S. 274).

2. In parallelogrammo ducantur rectae 1 1, 2 2; in triangulo A 1, A 2. 138.

DEMONSTRATIO.

Quoniam parallelogramma A 1 1 C, 1 2 2 1, 2 B D 2 inter easdem parallelas AB & CD existunt (S. 102); eandem altitudinem habent (S. 227. 228). Sunt itaque in basium ratione (S. 389), consequenter ob CI=12=2D, per const. aequales. Quod erat unum. Cum

Cum ex uno puncto A ad eandem rectam CD perpendicularis non nisi unica duci possit (§. 213); triangula ACI, IA2, 2 AD eandem altitudinem (§. 228), adeoque basium rationem habent (§. 389). Sed bases æquales sunt, per constr. Ergo & triangula. *Quod erat alterum.*

PROBLEMA LXV.

441. *Figuram rectilineam quamcumque ABCDE in partes æquales dividere.*

RESOLUTIO.

Tab. VIII. Fig. 139.

1. Quærat area figuræ (§. 400) & dividatur in tot partes æquales, in quot figura dividi debet, e. gr. in 3.
2. Area partis, in nostro casu tertiæ, ulterius dividatur bifariam.
3. Area trianguli AED subtrahatur a parte tertia & residuum dividatur per $\frac{1}{2}$ AD; erit quotus altitudo trianguli AID priori AED addendum, ut AEDI sit pars tertia figuræ (§. 394).
4. Quare intervallo hujus altitudinis ducatur parallela ipsi AD (§. 258), quæ secabit latus AB in I: quo puncto dato, rectam DI ducere licet, tertiam partem figuræ AIDE abscindentem.
5. Pars tertia dimidia sive sexta totius figuræ dividatur per $\frac{1}{2}$ DI, quotus erit altitudo trianguli IKD sextam figuræ partem constituentis (§. 394).
6. Intervallo igitur hujus altitudinis agatur ipsi ID parallela, ut habeatur punctum K (§. 258).
7. Dividatur quoque dimidia pars tertia figuræ per $\frac{1}{2}$ KD, ut habeatur altitudo trianguli KLD sextæ itidem parti figuræ æqualis (§. 394).
8. Quare hujus intervallo denuo aga-

tur ipsi KD parallela (§. 258), ut punctum L determinetur ducaturque recta KL, quæ partem figuræ tertiam KIDL refecabit.

9. Si figura in plures quam tres partes resolvenda; eodem modo ulterius procedendum.

E. gr. Sit AD = 516", AC = 580", EH = 154", DG = 315", BF = 375"; erit AED = 39732" ADC = 91350 & ABC = 108750 (§. 392.) adeoque area figuræ 239832 (§. 400); ejus pars tertia 79944; pars sexta 39972.

$$\begin{array}{r} \text{Pars III} = 79944 \\ \text{AED} = 39732 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{AID} = 40212 \quad (155 + \text{seu } 156 \text{ fere} = \text{IM}) \\ \frac{1}{2} \text{AD} = 258 \quad \underline{258} \\ 1441 \\ 1290 \\ \hline 1512 \\ 1290 \\ \hline 222 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Pars VI} = 39972 \quad (151'' = \text{KN}) \\ \frac{1}{2} \text{DI} = 264 \quad \underline{264} \\ 1357 \\ 1320 \\ \hline 372 \\ 264 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Pars VI} = 39972 \quad (139'' = \text{LO}) \\ \frac{1}{2} \text{DK} = 287 \quad \underline{287} \\ 1127 \\ 861 \\ \hline 2662 \\ 2583 \\ \hline 79 \end{array}$$

SCHOLIION I.

442. Si AED majus tertia e. gr. parte figuræ; ipsam ab illo subtrahi necesse est & residuum erit triangulum a triangulo AED auferendum, ut tertiæ parti figuræ æqualis evadat. Sæpe etiam consultum est, ut prima pars AEDI per duo triangula uti cetera determinetur.

SCHOLIION II.

443. Ubi in charta divisio absoluta; in campo puncta I, K, L per quantitatem rectarum AI, IK & DL facile determinantur (§. 126).

ELEMENTA GEOMETRIÆ
 PARS POSTERIOR
 ELEMENTA GEOMETRIÆ SOLIDÆ PROPONIT.
 CAPUT PRIMUM.

De Principiis Geometriæ solidæ.

DEFINITIO I.

444. **S**olidum sive corpus est magnitudo tribus dimensionibus prædita, seu extensum in longitudinem, latitudinem atque profunditatem.

DEFINITIO II.

445. Angulus solidus B est plurium quam duarum linearum BA, BC, BF in eodem puncto B concurrentium, nec in eodem plano constitutarum ad omnes inclinatio.

COROLLARIUM I.

446. Ergo angulus solidus B pluribus quam duobus planis in eodem plano non constitutis ABF, FBC, CBA continetur.

COROLLARIUM II.

447. Quoniam adeo tres minimum lineæ ad angulum solidum constituendum requiruntur (§. 445); tres minimum anguli plani ad solidum constituendum necessarii.

SCHOLIUM I.

448. Unde etiam angulus solidus definitur, quod sit is, qui pluribus quam duo-

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

bus planis angulis in eodem plano non consistentibus, ad idem tamen punctum constitutis, continetur.

COROLLARIUM III.

449. Ut anguli solidi sint æquales, angulis planis & multitudine & magnitudine æqualibus ac eodem ordine dispositis contineri debent (§. 15. *Arithm.*).

SCHOLIUM II.

450. Suppono scilicet, ut anguli solidi salva quantitate sibi mutuo substitui possint, eos intra se invicem positos congruere debere: quemadmodum etiam anguli solidi æquales vulgo definiuntur, quod intra se invicem positi congruant.

COROLLARIUM IV.

451. Cum anguli solidi distingui nequeant nisi per planos, quibus continentur (§. 448), ubi plani & numero, & magnitudine æquales ac eodem ordine dispositi fuerint, ea coincidunt per quæ a se invicem distingui debent. Sunt ergo similes (§. 24 *Arithm.*), consequenter anguli solidi similes sunt æquales & contra (§. 449).

Z

COROL-

COROLLARIUM V.

452. Si anguli plani in eodem puncto concurrentes conficiant summam 360 graduum; planum circuli sternunt (§. 41. 59) adeoque solidum angulum non constituunt (§. 446). Quare summa eorum, qui ultra solidum non assurgunt, quatuor rectis seu 360° (§. 144.) minor esse debet.

DEFINITIO III.

453. *Corpus regulare* est solidum planis regularibus & inter se æqualibus terminatum. Reliqua corpora dicuntur *irregularia*.

SCHOLIUM.

454. *Corpora regularia dicuntur etiam Platonica, propterea quod Plato in Timæo corpora, quæ statuit, simplicia, cælum puta, ignem, aerem, aquam atque terram cum iidem comparat.*

COROLLARIUM.

455. Cum quilibet angulus corporis regularis angulis planis & numero, & magnitudine æqualibus contineatur (§. 453), omnes anguli corporis cujuslibet regularis æquales sunt (§. 449).

DEFINITIO IV.

Tab. VIII. Fig. 410. 456. Si figura rectilinea ACB juxta ductum lineæ rectæ AE motu sibi semper parallelo feratur, *Prisma* deorsum ABCDFEA describit: & quidem *rectum*, si linea directrix AE fuerit ad planum describens perpendicularis; *obliquum* vero, si ea ad idem fuerit obliqua. In specie *Prisma* dicitur *triangulare sive trigonum*, si planum describens fuerit triangulum; *quadrangulare*, si fuerit figura quadrilatera & ita porro.

COROLLARIUM I.

457. Quodlibet adeo prisma habet duas bases oppositas ABC & EDF æquales & circumcirca terminatur tot parallelogrammis,

quot basis latera habet. Est enim AC ipsi ED parallela atque æqualis *per hypoth* Ergo & AE parallela ipsi CD (§. 257), consequenter ACDE est parallelogrammum (§. 102). Et idem eodem modo de ceteris planis lateralibus ostenditur.

COROLLARIUM II.

458. Plana sectionum prismatis basi ACB parallele factarum sunt inter se æqualia. Æquantur enim plano describenti ACB (§. 456 *Geom.* & §. 81. *Arithm.*), ergo & inter se æqualia sunt (§. 87 *Arithm.*).

DEFINITIO V.

459. Si planum describens ABCD fuerit quadratum & linea dirigens AE lateri ejus AB æqualis, atque angulus BAE rectus; *Cubus* describitur. Tab. VIII. Fig. 141.

COROLLARIUM I.

460. Cubus terminatur sex quadratis inter se æqualibus: est enim ABCD = EFGH (§. 459. *Geom.* & §. 81 *Arithm.*). Cumque ex eadem ratione AB & EF sint inter se æquales atque parallele, & BA ad AE perpendicularis; erit etiam AE ad EF perpendicularis (§. 230), consequenter ABFE quadratum (§. 338), ipsi ABCD æquale (§. 374). Eodem modo ostenditur, reliqua plana terminantia esse quadrata ipsi ABCD æqualia.

COROLLARIUM II.

461. Plana sectionum basi parallele factarum sunt quadrata ipsi æqualia (§. 459 *Geom.* & §. 81 *Arithm.*), consequenter etiam æqualia inter se (§. 87 *Arithm.*).

DEFINITIO VI.

462. Si planum describens IKLM fuerit parallelogrammum; *Parallelepipedum* describitur. Tab. VIII. Fig. 142.

COROLLARIUM I.

463. Plana sectionum basi parallele factarum sunt parallelogramma ipsi æqualia (§. 462 *Geom.* & §. 81. *Arithm.*), adeoque & æqualia inter se (§. 87. *Arithm.*).

Co-

COROLLARIUM II.

464. Cum LM & NO sint æquales & inter se parallelæ (§. 462 *Geom.* & §. 81 *Arithm.*); etiam MO & LN æquales sunt & parallelæ (§. 257), consequenter LMNO parallelogrammum (§. 102). Eodem modo ostenditur, plana terminantia reliqua esse parallelogramma. Terminatur adeo parallelepipedum sex parallelogrammis, quorum bina opposita inter se æqualia sunt.

DEFINITIO VII.

465. Si circulus AB juxta ductum rectæ AD motu sibi semper parallelo deorsum feratur, *Cylindrus* describitur; *rectus* quidem, si recta CF centra basium C & F jungens, quæ *Axis* dicitur, fuerit ad diametrum DE perpendicularis; *scalenus* vero, si ad angulos obliquos eidem insistat. Quodsi parallelogrammum rectangulum CBEF circa latus unum CF gyretur; *Cylindrum* describit *rectum*.

COROLLARIUM.

466. Sunt ergo non modo bases cylindri AB & DE æquales; verum etiam sectiones basibus parallelæ sunt circuli iisdem & inter se æquales,

DEFINITIO VIII.

467. Si recta quædam KM in peripheria circuli NM ita incedat, ut constanter inhæreat puncto fixo K; describetur *Conus* NKM. Recta ex puncto K, qui *vertex* conii dicitur, ad centrum basis L ducta dicitur *Axis Conii*: qui si ad diametrum circuli NM fuerit perpendicularis, *Conus rectus* est; si vero ad angulos obliquos eidem insistat, *scalenus*. Linea describens KM seu recta ex vertice in peripheriam basis ducta vocatur *Latus Conii*. Possumus quo-

que *Coni* genesin ita concipere, ut circellus infinite parvus, dum motu sibi semper parallelo ita deorsum fertur, ut centrum continuo sit in axe KL, radius PQ axi KP proportionaliter continuo augeatur. Quodsi triangulum rectangulum KLM circa rectam KL gyretur; *Conus* describitur *rectus*.

COROLLARIUM.

468. Quodsi PQ ipsi LM parallela; per ultimam conii genesin erit $KL : KP = PQ : LM$. Quare cum PQ & LM sint radii circulorum sibi invicem parallelorum; planum sectionis basi conii parallele factæ circulus est eadem minor.

SCHOLIUM.

469. Ex genesi ultima conii apparet, in definitionibus geometricis genericis tanquam entium imaginariorum admitti etiam posse miraculosa. Et quoniam in cono obliquo latus conii non ejusdem longitudinis in quovis peripheriæ puncto; patet lineam describentem KM, quæ altero sui extremo peripheriæ NM constanter adheret, per punctum fixum K aliqua sui parte nunc deorsum, nunc sursum moveri debere.

DEFINITIO IX.

470. Si semicirculus K juxta diametrum AB gyretur; *Sphæra* describitur, diciturque diameter circuli AB etiam *Diameter* atque *Axis Sphære*, centrum C etiam *Centrum Sphære*.

COROLLARIUM.

471. Omnes ergo rectæ ex sphære superficie in centrum ductæ sunt inter se æquales (§. 40).

DEFINITIO X.

472. *Pyramis* est solidum terminatum circumcirca tot triangulis ADC, CDB & BDA in uno puncto D

Z 2 cœcum-

Tab. VIII. Fig. 143.

Tab. IX. Fig. 144.

Tab. IX. Fig. 145.

Tab. IX. Fig. 146.

coëuntibus, quot basis ABC latera habet. Dicitur autem *triangularis*, *quadrangularis*, *quinquangularis* &c. si basis triangularis, quadrangularis, quinquangularis &c.

COROLLARIUM I.

473. Si *ac*, *cb*, *ba*, lateribus AC, CB, BA basis ACB parallelæ ducantur; erit DC: DC = CA: ca = CB: cb (§. 268) adeoque CA: ca = CB: cb (§. 167 *Arithm.*), consequenter cum eodem modo ostendi possit esse CA: ca = AB: ab, erit triangulum *acb* simile triangulo ACB (§. 207). Quare si pyramis triangularis ACDB secatur plano basi parallelo; planum istud huic simile erit.

COROLLARIUM II.

474. Quoniam pyramis multangularis in tot triangulares resolvi potest, quot sunt latera basis demtis duobus, nempe quadrangularis in duas, quinquangularis in quinque &c. si pyramis multangularis plano basi parallelo secetur, constabit id ex triangulis, quæ singula singulis similia sunt, in quæ resolvitur basis (§. 473), consequenter cum vi demonstrationis primæ problematis 47 (§. 363) pateat, similes esse figuras rectilineas quascunque, quæ ex triangulis similibus eo-

dem ordine inter se junctis componuntur, in quavis pyramide planum sectionis basi parallelum est figura basi similis.

DEFINITIO XI.

475. *Tetraëdrum* est solidum quatuor; *Octaëdrum* est solidum octo; *Icosædrum* est solidum viginti triangulis æquilateris & æqualibus comprehensum; *Dodecaëdrum* vero solidum duodecim pentagonis regularibus & æqualibus contentum.

Tab.
IX.
Fig.
147.
148.
149.
150.

DEFINITIO XII.

476. *Inclinatio plani* KEGL ad planum ACDB est angulus HFI, quem efficiunt rectæ HF & FI in puncto F ad lineam sectionis EG perpendiculares.

Tab.
XI.
Fig.
151.

DEFINITIO XIII.

477. *Mensura solidi* est cubus, cujus latus perticæ unius, diciturque *Pertica cubica*. Hæc dividitur in *Pedes*, *Digitos*, &c. *cubicos*, hoc est, in cubos, quorum latus pedem, digitum &c. adæquat.

CAPUT III.

De Sectione & Situ Planorum.

THEOREMA I.

478. **R**ecta linea pars quedam AB non est in subjecto plano DE, pars vero BC in sublimi.

Tab.
XI.
Fig.
175.

DEMONSTRATIO.

Sit enim, si fieri possit, pars lineæ rectæ AB in plano DE, pars vero altera BC in sublimi. Cum linea recta

terminata utrinque produci possit (§. 21); producatur AB in F: erit ergo AB pars rectæ AF. Sed eadem AB est pars rectæ ABC, per *hypoth.* Punctum igitur rectam describens in B mutat directionem, cum & versus F, & versus C progredi valeat, ubi ad B pervenit: quod cum sit absurdum

furdum (§. 19), rectæ lineæ quædam pars AB non potest esse in subjecto plano DE, pars vero quædam BC in sublimi. *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

Tab. 479. Duæ igitur rectæ ADEB & CDEF
XI. segmentum commune DE habere nequeunt
Fig. (§. 478), consequenter duæ rectæ CAB
176. & CF se mutuo non intersecant nisi in uno puncto D.

COROLLARIUM II.

Tab. 480. Cumque pars rectæ AD esset in sub-
XI. jecto plano, pars vero BD in sublimi, si
Fig. trianguli ABC pars ADE esset in subjecto
177. plano, pars vero DBCE in sublimi; triangulum ABC erit in eodem plano.

COROLLARIUM III.

Tab. 481. Et quoniam rectorum BE & DC se
XI. mutuo secantium in A partes AB & AC sunt
Fig. crura trianguli ABC; erunt eadem in eodem
178. plano (§. 480). Sed in eodem plano est EA, in quo est AB, & AD in eodem est, in quo est AC (§. 478). Ergo lineæ se mutuo secantes EB & DC in eodem sunt plano.

THEOREMA II.

Tab. 482. Si duo plana ABCD & EFHG
XI. se mutuo secent; erit communis sectio recta IK.

DEMONSTRATIO.

179. Quoniam rectæ AB & EF se mutuo non intersecant nisi in puncto I, nec rectæ DC & GH nisi in puncto K (§. 479); si communis planorum sectio non est recta unica, sed aliquod planum, termini illius plani in punctis I & K coire debent. Ducantur ergo in plano EFHG recta ILK & in plano ABCD recta IMK, quod fieri posse patet, si sectio communis planorum ABCD & EFHG non est recta unica IK, utut planum sectionis

lineis curvis in punctis I & K coëuntibus terminari sumas (§. 191). Duæ igitur rectæ ILK & IMK, cum earum extrema in I & K coincident, totæ in punctis omnibus coincidere debent (§. 170), consequenter communis sectio esse nequit nisi recta jungens puncta I & K. *Q. e. d.*

THEOREMA III.

483. Si duæ rectæ AB & CD fuerint
in eodem plano, recta EF eas secans in
G & H erit in eodem plano. Tab. XI. Fig. 180.

DEMONSTRATIO.

Secet planum aliud planum datum, in quo positæ sunt rectæ AB & CD, in punctis G & H; recta transiens per G & H est communis sectio planorum (§. 482). Sed eadem est pars lineæ EF (§. 170), quæ duas AB & CD secat *per hypothes.* Recta igitur EF est in eodem plano, in quo ponuntur duæ AB & CD. *Q. e. d.*

THEOREMA IV.

484. Si recta IE fuerit perpendicularis ad rectam KL in plano ABCD ductam; erit ea perpendicularis ad rectas omnes MN, OP &c. quæ per punctum E ducuntur. Tab. XI. Fig. 181.

DEMONSTRATIO.

Concipiamus enim rectam KL, cui IE perpendiculariter insistit, circa punctum E moveri, donec ipsi MN immineat. Quoniam recta KL cum recta MN coincidit (§. 36), IE vero situm ad eandem non mutat: erit ipsa IE etiam perpendicularis ad MN. Eodem modo patet, eandem rectam IE etiam perpendicularem esse debere ad rectam OP & quamcunque

cunque aliam per punctum E in plano ABCD ductam. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

485. Recta igitur IE, ad rectam KL in plano ABCD perpendicularis, omnibus rectis per punctum E in eodem plano ductis ad angulos rectos insistit (§. 78).

SCHOLIUM.

486. Hinc linea recta IE ad planum ABCD perpendicularis definitur, quod ad rectas omnes lineas in plano ductas, a quibus illa tangitur, angulos rectos facit.

THEOREMA V.

Tab. XI. Fig. 182. 487. Si recta IE fuerit ad planum ABCD perpendicularis, & ex E tanquam centro in eodem plano descriptus sit circulus; erunt rectæ IG, IF &c. ab eodem puncto sublimi ad peripheriam ductæ inter se æquales.

DEMONSTRATIO.

Ducantur ex centro E ad puncta peripheriæ F, G &c. radii EF, EG &c. erit $EF = EG$ (§. 40), cumque anguli FEI & GEI sint recti (§. 485), etiam $FEI = GEI$ (§. 145). Quare cum porro sit $EI = EI$; erit $FI = GI$ (§. 179). *Q. e. d.*

THEOREMA VI.

Tab. XI. Fig. 181. 488. Ex eodem puncto E ad planum ABCD nonnisi unica perpendicularis EI duci potest.

DEMONSTRATIO.

Ducatur, si fuerit potest, adhuc alia EQ & per punctum E in plano recta OP: erit cum EQ, tum EI ad eandem rectam OP perpendicularis (§. 486): quod cum sit absurdum (§. 213), ex eodem puncto E nonnisi unica perpendi-

cularis ad planum EI erigi potest. *Q. e. d.*

THEOREMA VII.

489. Ab eodem puncto I in sublimi dato ad idem planum ABCD perpendicularis nonnisi unica IE demitti potest.

DEMONSTRATIO.

Demittatur enim, si fieri potest, adhuc alia IG. Jungantur puncta E & G in plano recta EG; erit IEG triangulum in eodem plano (§. 480). Duo igitur in triangulo ad basin anguli E & G recti sunt (§. 486): quod cum sit absurdum (§. 218), a puncto I ad planum ABCD nonnisi unica perpendicularis demitti potest. *Q. e. d.*

THEOREMA VIII.

490. Linea perpendicularis IE est brevissima, que a puncto extra planum dato ad idem duci potest.

DEMONSTRATIO.

Ducatur enim recta adhuc alia IG & jungantur puncta E & G in plano recta EG; erit triangulum IEG in eodem plano (§. 480) & angulus ad E rectus (§. 486). Est igitur IE < IG (§. 220). *Q. e. d.*

THEOREMA IX.

491. Si recta LE duabus rectis FE & HE, vel pluribus FE, HE, IE in eodem puncto E concurrentibus perpendiculariter insistat; erunt duæ illæ rectæ FE & HE vel plures FE HE, & IE in eodem plano ABCD.

DEMONSTRATIO.

Sit enim, si fieri potest, recta EH in plano ABCD & EF in plano LEGK. Erit ergo linea EG cum EH in eodem plano, consequenter LE per-

Tab. XI. Fig. 182.

Tab. XI. Fig. 182.

Tab. XI. Fig. 183.

perpendicularis ad EH insistet ipsi EG ad angulum rectum (§. 485). Sed cum LE etiam ipsi EF sit perpendicularis *per hypoth.* erit etiam angulus LEF rectus (§. 78), consequenter angulus LEF ipsi LEG æqualis (§. 145), pars nempe toti (§. 9 *Aritbm.*): quod cum sit absurdum (§. 84 *Aritbm.*), rectæ FE & HE, quibus recta LE in puncto E perpendiculariter insistet, in eodem sunt plano ABCD. *Quod erat unum.*

Si plures fuerint rectæ EF, EH, EI &c. quibus recta EL perpendiculariter insistet; patet *per demonstrata*, esse rectas EI & EH, itemque EH & EF in eodem plano ABCD. Sunt igitur & rectæ EI & EF, consequenter omnes rectæ EI, EH & EF in eodem plano ABCD. *Quod erat alterum.*

THEOREMA X.

Tab. XI. Fig. 184. 492. *Lineæ rectæ GE & HF eidem plano ABCD perpendiculares sunt inter se parallelæ; & si una parallelarum GE & HF fuerit ad planum perpendicularis, etiam ad idem perpendicularis erit altera.*

DEMONSTRATIO.

Ducatur recta EF & cum GE perpendicularis sit ad planum ABDC *per hypoth.* insistet ea rectæ EL in plano isto ductæ ad angulos rectos; erit ergo etiam GE perpendicularis ad EF (§. 484). Sumatur $EL = EF$ & moveatur GE juxta ductum rectæ EL, donec in L perveniat, ita ut rectæ EL semper inhæreat ad angulum rectum; erit LI perpendicularis ad EL (§. 78)

& ipsi GE parallela (§. 256). Moveatur recta EL cum sua perpendiculari LI, donec ipsi EF congruat (§. 168), consequenter punctum E in F cadat (§. 3). Quoniam LI rectæ EF est perpendicularis *per demonstrata*; ad idem vero punctum F ejusdem rectæ EF nonnisi unica recta perpendicularis esse potest (§. 213); etiam recta LI cadet in rectam FH, atque adeo HF erit ad EF perpendicularis, consequenter HF & GE inter se parallelæ. *Quod erat unum.*

Sint jam GE & HF inter se parallelæ & GE ad planum perpendicularis. Patet, ut ante, si ponatur perpendicularis ad rectam EL, eam etiam perpendicularem esse debere ad EF. Ad eandem EF igitur etiam perpendicularis est HF (§. 230), consequenter HF perpendicularis ad planum ABDC (§. 484. 486). *Quod erat alterum.*

COROLLARIUM.

493. Rectæ igitur omnes ad rectam EF in plano GEFH perpendiculares etiam ad planum ABDC perpendiculares sunt.

SCHOLIUM.

494. *Hinc Euclides planum definit ad planum rectum sive perpendiculare, cum omnes rectæ lineæ, quæ communi planorum ABDC & GEFH sectioni EF perpendiculares ducuntur in planorum uno GEFH, rectæ sunt alteri plano ABDC.*

THEOREMA XI.

495. *Rectæ AB & EF, quæ sunt eidem rectæ CD parallelæ, non tamen in eodem cum ipsa plano, sunt inter se parallelæ.*

Tab. XI. Fig. 185.

DEMONSTRATIO.

Ducatur in plano parallelarum AB & CD recta GH ad AB perpendicularis, & ex H perpendicularis HI ad EF in plano parallelarum CD & EF. Jungantur puncta G & I recta GI; erit triangulum GHI in eodem plano (§. 480). Quoniam AG perpendicularis ad GH & EI perpendicularis ad HI *per construct.* erunt etiam AG & EI perpendiculares ad GI (§. 484), consequenter inter se parallelæ (§. 256).
Q. e. d.

THEOREMA XII.

Tab. X. Fig. 167. 496. Si due rectæ AC & CB fuerint parallelæ duabus rectis DF & FE, etiam si non sint in eodem plano, anguli, quos comprehendunt, æquales sunt.

DEMONSTRATIO.

Fiat $CB=FE$ & $CA=FD$: quoniam CB parallela ipsi FE & CA parallela ipsi FD *per hypothesin*; erit BE ipsi CF & AD eidem CF parallela & æqualis (§. 257), consequenter BE parallela (§. 495) & æqualis (§. 87 *Arithm.*) ipsi AD, ac ideo AB parallela & æqualis ipsi DE (§. 257). Est igitur angulus $DFE=ACB$ (§. 204).
Q. e. d.

THEOREMA XIII.

Tab. XI. Fig. 186. 497. Si recta IK duobus planis ABCD & EFGH fuerit perpendicularis, erunt plana inter se parallelæ.

DEMONSTRATIO.

Ducatur recta IL in plano ABCD & erigatur ML ad eam perpendicularis, quæ plano EFGH in M occurrat, cumque angulus I rectus sit *per hypothesin*.

ad IK parallela est (§. 492), consequenter plano EFGH ad angulos rectos insitit (§. 492). Quamobrem si puncta M & K jungantur recta MK, erit angulus K rectus (§. 485), consequenter $LM=IK$ (§. 238). Cum eodem modo demonstretur rectam ex quovis alio puncto plani ABCD ductam ipsi IK parallelam eidem æqualem esse; plana ABCD & EFGH ubivis a se invicem eodem intervallo distare (§. 225) patet. Sunt igitur inter se parallelæ.

SCHOLIUM.

498. Nimirum planum ABCD alteri EFGH dicitur parallelum, perinde ac recta alteri recta parallela est (§. 81), si ubivis eandem ab eadem distantiam servat.

THEOREMA XIV.

499. Si planum ADCB secet duo plana parallelæ EFGH & IKLM; erunt sectiones AD & BC inter se parallelæ.

Tab. XI. Fig. 187.

DEMONSTRATIO.

Ponamus enim sectiones AD & BC non esse inter se parallelas; ergo continuatæ alicubi concurrent (§. 81. 83). Cum igitur si plana cum ipsis continuentur totæ in iisdem sint (§. 478); ipsa quoque plana EFGH & IKLM concurrent. Parallela igitur non sunt (§. 498): quod cum sit absurdum, sectiones AD & BC planorum parallelorum EFGH & IKLM parallelæ sunt. *Q. e. d.*

THEOREMA XV.

500. Si due rectæ lineæ se mutuo tangentibus AC & AB duabus aliis se mutuo tangentibus EG & EF fuerint parallelæ, etiam plana ACDB & EGLF per ipsas ducta erunt parallelæ.

Tab. XI. Fig. 188.

DE-

DEMONSTRATIO.

Concipiatur AH ad planum EGLF recta, & ex H ducantur HK ac HI rectis EF atque EG parallelæ (§. 258); erunt eadem HK & HI etiam parallelæ rectis AB & AC (§. 495). Perpendicularis igitur AH ad HK etiam perpendicularis est ad AB (§. 230), consequenter planum ABCD parallelum plano EFLG (§. 497). *Q. e. d.*

THEOREMA XVI.

Tab. 501. *Dux lineæ rectæ NR & OS a*
 XI. *planis parallelis ABDC, EFHG,*
 Fig. *IKLM proportionaliter secantur, ut*
 189. *nempe sit PR:PN=TS:TO.*

DEMONSTRATIO.

Jungantur puncta sectionum N & O, R & S rectis NO & RS, ducaturque recta OR; erit triangulum NOR & similiter triangulum OSR in eodem plano (§. 480), & PQ parallela ipsi NO, QT vero parallela ipsi RS (§. 499). Est igitur RQ:QN=RP:PN & QR:QO=TS:TO (§. 268), consequenter RP:PN=TS:TO (§. 167 *Arithm.*). *Q. e. d.*

PROBLEMA I.

Tab. 502. *Ad datum planum ABDC in*
 XI. *dato puncto E erigere perpendicularem*
 Fig. *EI.*
 182.

RESOLUTIO.

Ducatur ex puncto E in dato plano ABDC intervallo quocunque EG circulus, & ex centro E erigatur recta EI ea lege, ut punctum I quodcunque a peripheriæ punctis quibuscunque F & G æqualiter distet: erit ea ad planum ABCD in dato puncto E perpendicularis (§. 487). *Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.*

COROLLARIUM I.

503. Cum triangulum IEG & quodcunque eodem modo determinatum veluti EIF sit rectangulum; evidens est, si crus unum normæ ita ad EG vel EF applicetur, ut vertex anguli recti, quem crura comprehendunt, sit in centro E, fore crus alterum ad planum ABCD in dato puncto E perpendiculare: ut adeo pateat normæ usus in erigendis perpendicularibus ad planum datum in puncto dato.

SCHOLIUM.

504. *Neceffe est ut normæ crura non desinant in aciem tenuem, sed aliquam habeant latitudinem, ut norma ad rectam EG applicata sit ad planum recta, nec oculorum iudicium fallat.*

COROLLARIUM II.

505. Quodsi punctum I extra planum detur, norma super plano, erecta huc illucve promovenda, donec crus erectum idem attingat, si e puncto I perpendicularis IE inde demittenda. Quodsi crus normæ brevius sit, quam ut punctum I attingere possit, cum filo ex puncto I extenso idem coincidere debet.

THEOREMA XVII.

506. *Si in plano EFGH uno recta*
 Tab. *EH est ad planum ABCD perpendicu-*
 XI. *laris, omnis recta IK vel LM ad sec-*
 Fig. *tionem HG perpendicularis est ad pla-*
 190. *num perpendicularis.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam recta EH est ad planum recta *per hypothesin*, IK vel LM ducatur ipsi EH parallela (§. 258); erit IK vel LM ad HG perpendicularis (§. 230), consequenter eadem IK & LM etiam perpendiculares sunt

A a ad

ad rectas quascunque alias, quæ per puncta K & M in plano ducuntur, veluti ad PQ & RS (§. 484), adeoque ad planum ipsum (§. 486). *Q. e. d.*

S C H O L I O N.

507. Coincidit hoc theorema cum corollario theorematis 10 (§. 193): unde definitionem plani perpendicularis ad alterum deduximus.

T H E O R E M A X V I I I.

Tab. XI. 508. *Sectio NO duorum planorum EFGH & IKLM ad idem tertium ADCB perpendicularium est ad idem planum perpendicularis.*
Fig. 191.

D E M O N S T R A T I O.

Quoniam planum EFGH ad planum ADCB perpendiculare *per hypoth.* ex puncto O duci poterit in plano EFGH recta ad planum ADCB perpendicularis (§. 507). Eodem modo patet, ex eodem puncto O duci posse rectam intra planum IKLM ad planum ADCB perpendicularem. Quare cum ad idem punctum O eidem plano ADCB nonnisi unica perpendicularis insistere possit (§. 488), communis autem plano-

rum IKLM & EFGH sectio NO nonnisi unica recta sit (§. 482); sectio illa communis NO erit illa perpendicularis, quæ in utroque plano EFGH & IKLM ad planum ADCB duci potest. *Q. e. d.*

T H E O R E M A X I X.

509. *Plani KLGE ad planum ABDC in omnibus punctis F, f & c. inclinatio eadem.*

D E M O N S T R A T I O.

Erigantur ex punctis F & f perpendiculares FH & fh in plano ABDC & alia FI & fi in plano EKLK (§. 212); fiatque $HF = hf$ & $FI = fi$, erunt HF & hf, itemque FI & fi parallelæ (§. 256), consequenter etiam Hb & Ii parallelæ ipsi Ff & $Hb = Ff$, itemque $Ii = Ff$ (§. 257), adeoque etiam Hb parallelæ ipsi Ii (§. 495) & $Hb = Ii$ (§. 87 *Arith.*). Quoniam itaque HI & hi inter se parallelæ atque æquales sunt (§. 257): erunt anguli F & f æquales (§. 204), atque adeo inclinatio plani ad idem planum in singulis punctis eadem (§. 476). *Q. e. d.*

Tab. IX. Fig. 151.

C A P U T I I I.

De Solidorum Constructione.

P R O B L E M A I I.

Tab. VIII. 510. *Cubum ADCBFEHG vel parallelepipedum IKMLNOPQ in plano describere.*
Fig. 141.

R E S O L U T I O.

442. I. Construatur pro cubo rhombus DA BC (§. 340); pro parallelepipedo rhomboides IKLM (§. 341).

2. Construatur porro pro cubo quadratum AEFB & rhombus BCGF (§. 338. 340), pro parallelepipedo rectangulum LMON, cujus latus LN altitudini æquale & rhomboides MK PO (§. 339. 341).

Cum rhombi pro quadratis, & rhomboides

boides pro reſtāngulis conſtruantur; ut planā lateralīa FBCG & MKPO videri poſſint; erit ſolidum AG cubus (§. 459); ſolidum vero IP parallelepipedum (§. 462).

PROBLEMA III.

511. *Prisma ACBFDE in plano deſcribere.*

RESOLUTIO.

- Tab. VIII. Fig. 140. 1. Deſcribatur baſis, e. gr. triangulum ACB, ſi priſma fuerit triangularē.
2. In A excitetur perpendicularis ad AB altitudinī æqualis AE (§. 249).
3. Conſtruantur parallelogramma ACED, BCDF (§. 341).
Erit ACBFDE priſma triangularē (§. 456. 457).

PROBLEMA IV.

Tab. IX. Fig. 146. 512. *Pyramidem DACB in plano deſcribere.*

RESOLUTIO.

1. Deſcribatur baſis, e. gr. triangulum ACB, ſi triangularis fuerit, ita tamen ut latus AB, tanquam a facie averſum, non exprimatur.
2. Super AC & CB conſtruantur triangula ADC & CDB in puncto D coëuntia: ſeu aſſumto vel determinato puncto D, ducantur reſtæ AD, CD, BD.

Erit ADBC pyramis triangularis (§. 472).

PROBLEMA V.

Tab. IX. Fig. 152. 513. *Rete deſcribere, ex quo cubus conſtrui poſſit.*

RESOLUTIO.

1. In reſtām AB latus cubi quater transferatur.
2. In A erigatur perpendicularis AC la-

teri cubi AI æqualis (§. 249) & parallelogrammum ACBD compleatur (§. 339).

3. Intervallo lateris cubi determinantur quoque in CD puncta K, M & O.
4. Denique ducantur reſtæ IK, LM, NO & BD, producanturque IK & LM utrinque in E & F atque in G & H, donec fiat $EI = IK = KF$ & $GL = LM = MH$ & agantur reſtæ EG, FH.

DEMONSTRATIO.

CK & AI ad AC perpendicularē ſunt per conſtr. & $AI = CK = AC$, per conſtr. Ergo ACKI quadratum (§. 338). Non abſimili modo oſtenditur eſſe IKML, MLNO &c. quadrata ipſi AK æqualia. Eſt itaque ADFG rete, ex quo cubus conſtrui poteſt (§. 460). *Q. e. d.*

PROBLEMA VI.

514. *Rete deſcribere, ex quo parallelepipedum conſtrui poteſt.*

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. In reſtām BD transferatur ex B in H latitudo, ex H in I longitudo, ex I in K iterum latitudo, & ex K in D longitudo parallelepipedi.
2. Super his lineis tanquam baſibus conſtruantur parallelogramma AH, EI, FK & GD, quorum communis altitudo AB altitudinī parallelepipedi æqualis.
3. Super EF vero & HI conſtruantur parallelogramma EM & HO, quorum altitudo EL & HN latitudinī parallelepipedi æqualis (§. 339).
Quoniām $AEBH = GFIK$, $EHIF = GCKD$, $ELMF = HNOI$ (§. 383); ex hoc reti parallelepipedum conſtrui licet (§. 463. 464). *Q. e. f. & d.*

PROBLEMA VII.

515. Rete pro prismatico describere.

RESOLUTIO.

- Tab. IX. Fig. 154.
1. Construaturs basis prismatis e. gr. pro triangulati triangulum KBD.
 2. Continuetur latus BD in A & E, donec fiat $AB=BK$ & $DE=DK$.
 3. Super AB, BD & DE construantur parallelogramma AG, BH, DF, quorum altitudo AC altitudini prismatis æqualis (§. 339).
 4. Denique super GH triangulum GIH, ipsi BKD æquale (§. 205).
- Ex hoc reti prisma triangulare, nec ab simili modo multangulare quodcunque construetur (§. 457).

THEOREMA XX.

Tab. IX. Fig. 155.

516. Superficies cylindri recti seclusis basibus æqualis est rectangulo sub peripheria & altitudine cylindri.

DEMONSTRATIO.

Concipiatur arcus EF adeo parvus ut pro linea recta haberi possit, ducanturque rectæ EG & FH inter se parallelæ & ad EF perpendiculares. Quoniam etiam arcus EF ipsi GH parallelus (§. 465); erit EGHF rectangulum. Superficies itaque cylindri in innumera rectangula, ipsi EGHF æqualia resolvitur, quorum communis altitudo est EG seu altitudo cylindri (§. 229), bases vero junctim sumtæ peripheriæ æquantur. Ergo eadem æqualis est rectangulo sub peripheria & altitudine cylindri (§. 389). *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

517. Nimirum arcus in quolibet casu tam exiguus assumitur, ut, si ejus differentia multiplicari supponatur per numerum par-

tium, in quas peripheria concipitur divisa, prodeat particula in dato casu inassignabilis, adeoque contemptibilis parvitas: quod fieri posse patet, quod polygonum circulo inscriptum continuo appropinquat ad peripheriam. Et idem tenendum est in aliis casibus, ubi de infinite parvo sermo fuerit. Sed ex instituto ea de re dicimus in philosophia prima.

PROBLEMA VIII.

518. Rete pro cylindro describere.

RESOLUTIO.

1. Eadem diametro describantur circuli AB & CD.
2. Inveniatur horum peripheria (§. 429).
3. Super BC altitudini cylindri æquali construaturs rectangulum (§. 339), ita ut CD sit peripheriæ inventæ æqualis.

Ex hoc reti construi potest cylindrus (§. 517).

THEOREMA XXI.

519. Superficies conii recti seclusa basi æqualis est triangulo, cujus basis peripheria, altitudo latus conii.

DEMONSTRATIO.

Si arcus LM infinite parvus adeoque a recta non differens; triangulum KLM pro rectilineo recte habetur, cumque angulus K sit infinite parvus; anguli L & M a rectis non differunt (§. 240), estque adeo KM ad LM perpendicularis (§. 78), consequenter trianguli KML altitudo (§. 228). Sed conii recti superficies in innumera istiusmodi triangula inter se æqualia resolvitur (§. 467. 251). Ergo integra conii recti superficies æqualis est triangulo, cujus altitudo lateri, basis peripheriæ conii æqualis (§. 389). *Q. e. d.*

COROL.

COROLLARIUM.

520. Superficies conii recti æquatur sectori circuli latere conii tanquam radio descripti, cujus arcus peripheriæ conii æqualis (§. 415), adeoque ad suam peripheriam eam rationem habet, quam diameter basis ad latus conii (§. 412 Geom. & §. 167 Arithm.).

PROBLEMA IX.

521. Rete pro pyramide describere.

RESOLUTIO.

Sit e. gr. construenda pyramis triangularis.

1. Radio AB describatur arcus BE & ei applicentur tres chordæ BC, CD & DE inter se æquales.
2. Super DC construatur triangulum æquilaterum DFC ducanturque rectæ AD & AC.

Ex hoc reti pyramis construi potest (§. 472).

SCHOLIUM.

522. Si latera basis pyramidis DC, CF & DF inæqualia fuerint; evidens est fieri debere $ED = DF$ & $CB = CF$. Nec adeo laret, quid factu opus sit, si basis fuerit polygonum sive regulare, sive irregulare.

PROBLEMA X.

523. Rete pro Cono recto describere.

RESOLUTIO.

1. Diametro basis AB describatur. Circulus & diameter producat in C, donec AC lateri conii æqualis fiat.
2. Quærat in 2 AC & AB in numeris determinatas, atque 360° numerus quartus proportionalis (§. 302. Arithm.).
3. Radio CA ex centro C describatur arcus DE & ope instrumenti trans-

portatorii fiat angulus DCE, consequenter arcus DE (§. 54) numero graduum invento æqualis.

Erit sector CDE cum circulo AB rete pro cono recto (§. 520).

COROLLARIUM.

524. Quodsi ex A in F transferatur latus conii truncati & radio CF arcus GH describatur, tandemque ad 360°, numerum graduum arcus GH atque FC numerus quartus proportionalis quærat & inde diameter circuli IF determinetur; habebitur rete pro cono truncato. Est enim CDBAE rete pro cono integro. CGFIH pro cono abscisso (§. 523); ergo DBEHIG pro truncato.

PROBLEMA XI.

525. Rete pro Tetraëdro describere.

RESOLUTIO.

1. Construatur triangulum æquilaterum DEF (§. 198).
2. Super singulis ejus lateribus construuntur adhuc alia itidem æquilatera DAE, EBF & FCD (§. cit.).

Ex hoc reti tetraëdram construi potest (§. 475).

COROLLARIUM.

526. Quodsi BC continuetur in H, donec fiat $CH = FC$, & ut in resolutione problematis construuntur triangula æquilatera CHI, CGH, HLI, DCI (§. 198); ex reti octaëdram construi potest (§. 475).

PROBLEMA XII.

527. Rete pro Icosædro describere.

RESOLUTIO.

1. Construatur triangulum æquilaterum ABC (§. 198).
2. In basi AB continuata fiat $AB = BF = FG = GH = HD$.
3. Per C agatur ipsi AB parallela CE (§. 258) & fiat $AB = CI = IK = KL = LM = ME$.

A a 3

4. Ducan-

Tab. IX. Fig. 158.

Tab. IX. Fig. 160.

Tab. IX. Fig. 161.

Tab. XI. Fig. 159.

Tab. X. Fig. 162.

4. Ducantur rectæ CS per C & B, NT per I & F, OV per K & G &c.
5. Similiter ducantur aliæ rectæ YO per B & I, SP per F & K, TQ per G & L &c.

Dico ex hoc reti construi posse Ico-
saedrum.

DEMONSTRATIO.

Demonstrandum est, viginti triangu-
la ACB, ABY, CBI, CIN, BSF, BIF,
IOK &c. æquilatera & inter se æqua-
lia esse (§. 475): id quod sequenti
ratione patescit. Quoniam CE paral-
lela ipsi AD *per construct.* & AC ipsi
BI (§. 257); erit $o = x$ & $m = n$ (§.
233), consequenter $CAB = \sphericalangle \sphericalangle CBI$
(§. 251). Eodem modo ostenditur esse
 $CBI = \sphericalangle \sphericalangle BIF = \sphericalangle \sphericalangle FIK$ &c. Por-
ro quoniam CI & BF sunt inter se
æquales atque parallele *per constr.* erit
NT parallela ipsi CS (§. 257), adeo-
que $y = u$ & $t = o$ (§. 233), conse-
quenter $CIN = \sphericalangle \sphericalangle CBI$ (§. 251).
Eodem modo ostenditur esse $CBI = \sphericalangle \sphericalangle$
 $\sphericalangle IOK = \sphericalangle \sphericalangle KPL$ &c. $= \sphericalangle \sphericalangle BSF$
 $= \sphericalangle \sphericalangle FTG$ &c. Sunt itaque omnia
triangula inter se æqualia & æquilatera.
Q. e. d.

PROBLEMA XIII.

528. Rete pro dodecaëdro describere.

RESOLUTIO.

1. Describatur pentagonum regulare
(§. 352).
2. Applicata regula ad A & D ducan-
tur rectæ AG & DF ipsi AB æquales.
3. Eodem modo ducantur AI & CH,
BL & DK, BN & EM &c.
4. Intervallo lateris pentagoni fiat in-

tersectio in Q ex G & L, in R ex
N & O, in S ex H & F &c. ducan-
turque CQ & QL, NR & OR, HS
& FS &c.

5. Eodem modo construantur pentago-
na reliqua *a, b, c, d, e, f.*

DEMONSTRATIO.

Demonstrandum est pentagona om-
nia esse regularia ipsique ABCDE æqua-
lia (§. 475). Nimirum $AB = GA =$
 $BL = GQ = QL$, *per constr.* Cumque
anguli x mensura sit arcus dimidius
ABCD (§. 324), anguli vero pentago-
ni E similiter sit mensura dimidius arcus
ABCD (§. 314); erit angulus x angu-
lo pentagoni E æqualis (§. 141). Et
quoniam eodem modo ostenditur, esse
quoque angulum u angulo pentagoni
æqualem; erit ABLQG pentagonum re-
gulare (§. 352), idque, ob latus com-
mune AB, ipsi AEDCB æquale (§.
177.161). Eadem demonstratio cum
de reliquis pentagonis valeat; evidens
est, omnia & regularia, & inter se
æqualia esse. *Q. e. d.*

PROBLEMA XIV.

529. Corpora Geometrica construere.

RESOLUTIO.

1. Delineentur retia in charta ex pluri-
bus foliis compacta (§. 511 & seqq.).
2. Delineata excindantur, resecta
charta superflua juxta eorum perime-
tros.
3. Excissa agglutinentur chartæ co-
lorata.
4. Hujus superfluum ita resecetur, ut
partibus perimetri alternis margines
quidam relinquuntur, quemadmo-
dum in reti tetraëdri indicavimus.

Tab.
IX.
Fig.
160.

5. Sin-

Tab.
X.
Fig.
163.

5. Singula retium intra perimetrum lineamenta, e. gr. EF, FD & DE in reti tetraëdri, scalpello profundius imprimantur, ut commode complicari queant latera perimetri solidi.
6. Denique retia complicentur & marginum ope conglutinentur.

T H E O R E M A XXII.

530. *Cubus, Tetraëdrum, Octaëdrum, Dodecaëdrum & Icosaëdrum sunt corpora regularia, nec præter hæc quinque aliud possibile.*

D E M O N S T R A T I O.

Cubus sex quadratis, tetraëdrum quatuor, octaëdrum octo, icosaëdrum viginti triangulis regularibus, dodecaëdrum denique duodecim pentagonis regularibus inter se æqualibus terminatur (§.460.475). Sunt igitur hæc corpora regularia (§.453). *Quod erat unum.*

In tetraëdro tres, in octaëdro qua-

tuor, in icosaëdro quinque anguli plani trianguli regularis ad solidum efficiendum concurrunt (§.523.524.525). Quoniam vero summa 6 istiusmodi angulorum est 360° (§.243); triangulis regularibus nullum corpus præter illa tria contineri potest (§.452). In cubo tres anguli quadrati solidum efficiunt (§.511). Quare cum summa quatuor istiusmodi angulorum sit 360° (§.98.144); quadratis nullum corpus continetur nisi cubus. In dodecaëdro tres anguli pentagoni regularis solidum constituunt (§.526). Quia vero summa quatuor est 432°, & summa trium in reliquis figuris regularibus 360° major (§.345), ad angulum vero solidum constituendum minimum tres plani requiruntur (§.447); pentagonis regularibus nonnisi dodecaëdrum, figuris vero plurium laterum nullum corpus terminari potest. Corpora igitur regularia nonnisi quinque sunt. *Quod erat alterum.*

C A P U T IV.

De Dimensione Solidorum.

531. **S**uperficiem ac soliditatem Cubi determinare.

R E S O L U T I O.

- I. Cum superficies cubi ex sex quadratis æqualibus componatur (§.460); latus cubi in seipsum ducatur & factum per 6 multiplicetur (§.370).
- II. Quodsi idem factum in latus ducatur: prodibit soliditas cubi.

Sit e. gr. latus cubi AB 274².

AB = 274	Basis = 75076
274	AB = 274
1096	300304
1918	525532
548	150152
ABDC = 75076	Solidit. 20570824
6	
Superfic. 450456	

DEMONS-

Tab.X.
Fig.
164.

DEMONSTRATIO.

Tab.X. Fig. 164. Cum mensuræ solidorum sint cubi, quorum latera perticæ, pedi, digito &c. æqualia (§. 477); soliditatem cubi determinaturus invenire debet, quot perticæ, pedes, digiti &c. cubici in eo contineantur. Quodsi jam latus in partes quotcunque æquales divisum concipiamus, tot erunt cuborum ordines, quot in latere AB partes & in quolibet ordine totidem existent, quot in basi ACFE quadrata. Quare si basin ACFE, hoc est, factum ex latere cubi in seipsum (§. 370), per latus cubi AB multiplices; prodibit numerus cuborum minorum, ex quibus major componitur. Q. e. d.

COROLLARIUM I.

532. Si latus cubi fuerit 10, erit soliditas 1000: si illud 12, hæc 1728. Quare cum pertica Geometrarum sit 10 pedum, pes 10 digitorum &c. (§. 25); pertica cubica est 1000 pedum cubicorum, pes cubicus 1000 digitorum cubicorum &c. Hinc in exemplo nostro soliditas cubi est 20° 57' 0824". Similiter cum pertica Rhenana sit 12 pedum, pes 12 digitorum; pertica cubica est 1728 pedum, pes cubicus 1728 digitorum. Quare si in nostro exemplo 20570824 divides per 1728, quotus erit 11904' & 712". Quodsi 11904' porro divides per 1728; quotus erit 6° & 1536, adeoque habebis 6°, 1536' & 712".

SCHOLIUM.

533. Patet adeo, quantum divisio mensuræ in 10 partes præstet divisione in 12.

COROLLARIUM II.

534. Cubi sunt in ratione triplicata laterum (§. 259 Arithm.) & æquales, si latera æqualia sint.

THEOREMA XXIII.

535. Parallelepipeda, Prismata & Cylindri, quorum bases & altitudines æquantur, æqualia sunt.

DEMONSTRATIO.

Concipiantur hæc corpora planis eorum basibus parallelis secari in discos crassitiei quantumlibet exiguæ. Quoniam altitudines æquantur, per hypoth. ex uno tot disci prodibunt, quot ex altero. Cumque plana sectionum basi parallelarum eidem æqualia (§. 463. 456. 466); bases vero illorum corporum inter se æquales sunt, per hypoth. etiam disci singuli unius corporis discis singulis alterius æquantur (§. 87 Arithm.), consequenter cum disci omnes simul sumti cum corporibus idem sint, corpora tota inter se æqualia sunt (§. 88 Arithm.). Q. e. d.

PROBLEMA XVI.

536. Metiri superficiem ac soliditatem parallelepipedi.

RESOLUTIO.

1. Quærat area parallelogrammorum ILMK, LMON & OMKP (§. 375. 387).
2. Addantur in unam summam & hæc multiplicetur per 2. Erit factum superficies parallelepipedi (§. 464).
3. Quodsi basis ILMK multiplicetur per altitudinem; prodibit soliditas ejusdem.

Sit e. gr. LM = 36', MK = 15', MO = 12' & parallelepipedium rectangulum.

LM = 36	LM = 36	MK = 15
MK = 15	MO = 12	MO = 12
180	72	30
36	36	15
LIK 540	LMON 432	MOKP 180
MO = 12	LIK 540	
1080	MOKP 180	
54	1152	
	2	

Solid. 6° 480' 23° 04' Superficies.

Tab. VIII. Fig. 142.

DEMONSTRATIO.

De parallelepipedo rectangulo eadem valet demonstratio, qua in probl. 15 (§. 531) usi sumus. Cum vero obliquangulum æquetur rectangulo super eadem basi & ejusdem altitudinis (§. 535); ducta basi in altitudinem habetur quoque soliditas obliquanguli. *Q. e. d.*

THEOREMA XXIV.

537. *Planum diagonale AHFD dividit parallelepipedum ABDCEFG in duo prismata ADCEFH & ADBFGH inter se aequalia.*

DEMONSTRATIO.

Tab. X. Fig. 165. Diagonalis AD dividit parallelogrammum CABD in duo triangula aequalia ACD & DBA (§. 337). Habent ergo prismata bases aequales. Quare cum DF perpendicularis ad DB (§. 462), sit etiam perpendicularis ad DA & DC, adeoque cum ad triangulum ADB, tum ad alterum ADC (§. 492. 494); eadem quoque erit utriusque altitudo DF (§. 227) & ipsa itidem aequalia sunt (§. 536). *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

538. Est ergo prisma triangulare dimidium parallelepipedum super eadem basi & ejusdem altitudinis.

PROBLEMA XVII.

539. *Metiri superficiem ac soliditatem prismatis.*

RESOLUTIO.

I. Quæraturs basis (§. 392. 400. 402)

Wolffii. Oper. Mathem. Tom. I.

& multiplicetur per 2.

2. Quærantur porro area parallelogrammorum prisma circumcirca terminantium & earum summa addatur factò antecedenti.

Ita prodibit superficies integra prismatis (§. 456).

3. Quodsi basis BAC per altitudinem CD multiplicetur; habebitur ejusdem soliditas.

E. gr. Sit $BC = 4^{\circ}3'2''$, $AG = 3^{\circ}5'7''$
 $CD = 8^{\circ}6'9''$.

$\frac{1}{2}BC = 216''$	$AC = 432''$
$AG = 357$	$CD = 869$
1512	3888
1080	2592
648	3456

Basis 77112''	ACDE 375408
$CD = 869$	3
694008	1126224
462672	2 ABC 154224
616896	Superfic. 128°04'48''
67°010'328''	Solidit.

DEMONSTRATIO.

Prisma triangulare est dimidium parallelepipedum super dupla basi, sed ejusdem altitudinis (§. 539). Quodsi vero dupla basis, hoc est parallelogrammum multiplicetur per altitudinem soliditas parallelepipedum prodit (§. 537). Ergo si simpla, hoc est, triangulum per eandem altitudinem multiplicetur; parallelepipedum dimidium, hoc est prismatis soliditas habetur. Omnia prismata reliqua cum in triangularia resolvi possunt; eorum quoque

B b foli-

Tab. VIII. Fig. 140.

soliditas prodit, basi per altitudinem multiplicata. *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

540. In exemplo nostro assumimus, prismatis basin esse triangulum regulare. Quod si vero basis fuerit figura irregularis; parallelogramma lateralia inæqualia sunt, adeoque area uniuscujusque sigillatim invenienda.

PROBLEMA XVIII.

Tab. VIII. Fig. 143. 541. Data diametro AB & altitudine cylindri CF; invenire superficiem ac soliditatem ejus..

RESOLUTIO.

1. Quærat peripheria baseos & basis ipsa (§. 429), hæcque multiplicetur per 2.
2. Peripheria ducatur in altitudinem; quod prodit est superficies, seclufis basibus (§. 517).
3. Quare si eidem addatur factum antecedens; habebit superficies integra.
4. Ducatur quoque basis in altitudinem. Factum erit soliditas cylindri.

E. gr. Sit AB = 5° 6', CF = 24° 6'; erit peripheria = 17° 584

$$CF = 24^{\circ}600$$

$$\begin{array}{r} 10550400 \\ 70336 \\ \hline 35168 \end{array}$$

Sup. absque Bas. 432°56'64"100

Dupl. Bas. 492352

Superfic. 481°80'16"

Basis = 24°61'76"

CF = 2460

$$\begin{array}{r} 14770560 \\ 984704 \\ \hline 492352 \end{array}$$

605°592'960"

DEMONSTRATIO.

Cum circulus æqualis sit triangulo, cujus basis peripheria, altitudo radius (§. 410); cylindrus æqualis erit prismati triangulari eandem cum ipso altitudinem & basin æqualem habenti (§. 520). Ejus ergo soliditas habetur, ducta basi in altitudinem (§. 539). *Q. e. d.*

THEOREMA XXV.

542 Pyramides & Coni super eadem basi & ejusdem altitudinis sunt æquales.

DEMONSTRATIO.

Sit ACB unum e triangulis, quibus terminatur pyramis una; ABD vero unum e triangulis, quibus terminatur altera: ducta EL ipsi AB parallela (§. 258), erit IK=LM (§. 226); adeoque ob CK=DM per hypoth. CI=DL (§. 91 Arithm.): EF vero & GH erunt latera planorum, quibus secantur pyramides basibus suis parallelorum. Jam cum sit Δ CEF ∼ Δ CAB & Δ DGH ∼ Δ DAB (§. 268); erit CI:CK=EF:AB & DL:DM=GH:AB (§. 396). Sed CI=DL & CK=DM, per demonstr. Ergo EF:AB=GH:AB (§. 167 Arithm.), consequenter EF=GH (§. 177 Arithm.) Jam si pyramides secantur planis basi parallelis, planarum basi similia sunt (§. 474), consequenter planum, cujus latus est EF, erit ad basin ut EF² ad AB², & planum, cujus latus est GH, erit ad eandem basin ut GH² ad AB² (§. 406). Quare cum EF²=GH² per demonstr. planum, cujus latus est EF & planum, cujus latus est GH, ad basin eandem rationem habent (§. 168 Arithm.), consequenter

Tab. X. Fig. 166.

ter plana ista inter se æqualia sunt (§. 177 *Arithm.*). Igitur & disci, quantumlibet exiguæ crassitiei, in eadem a basi distantia inter se æquantur. Quoniam itaque ob æquales altitudines *per hypoth.* ex una pyramide tot disci secari possunt, quot ex altera; pyramis una alteri æqualis sit necesse est (§. 88 *Arithm.*). *Quod erat unum.*

• Quodsi triangula ACB & ADB fuerint sectiones triangulares conorum; erunt EF & GH diametri circulorum basi communi parallelorum (§. 468). Cum adeo circuli isti æquales sint (§. 171), eodem quo ante modo demonstratur, conos æquales esse. *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXVI.

543. *Prisma triangulare in tres pyramides æquales dividi potest.*

DEMONSTRATIO.

Tab. X. Fig. 167. Quoniam planum ACB parallelum plano ADE (§. 456), pyramides ABCF & DFEA habent altitudinem eandem (§. 498) atque bases ACB & DFE æquales (§. 457). Sunt ergo æquales (§. 543). Similiter cum BEFC sit parallelogrammum (§. 457), $\triangle CFB = \triangle BFE$ (§. 337). Habent adeo pyramides ACBF & BEFA æquales bases. Quoniam vero hæ bases in eodem sunt plano, quod per se patet, & verticem communem in A habent, ab eodem vero puncto sublimi A ad idem planum BEFC non nisi unica perpendicularis duci potest (§. 488); pyramides istæ eandem quoque altitudinem habent, consequenter æquales sunt (§. 543). Quamobrem tres istæ

pyramides inter se æquantur (§. 87 *Arithm.*). *Q.e.d.*

SCHOLIUM.

544. *Si ex ligno paretur prisma & debita ratione secetur; demonstratio capti tyronum magis accommodatur. Immo ad bilancem æqualitas ponderum examinari & inde magnitudinis æqualitas colligi potest.*

COROLLARIUM I.

545. Pyramis triangularis est tertia pars prismatis super eadem basi & ejusdem altitudinis.

COROLLARIUM II.

546. Et quoniam multangulare quodvis in triangularia resolvi potest; quælibet pyramis est pars tertia prismatis super eadem basi & ejusdem altitudinis (§. 187. *Arithm.*).

COROLLARIUM III.

547. Quia conus pro pyramide infinitangula haberi potest & cylindrus pro prismate infinitangulo, conus pars tertia est cylindri super æquali basi & ejusdem altitudinis.

PROBLEMA XIX.

548. *Metiri superficiem ac soliditatem pyramidis & conii.*

RESOLUTIO.

Quæratu soliditas prismatis vel cylindri eandem cum pyramide vel cono basin habentis (§. 540. 542), inventaque per 3 dividatur: quotus erit soliditas pyramidis vel conii (§. 547 548).

E.gr. Si soliditas prismatis fuerit 67010328", ut in probl. 17. (§. 540); erit soliditas pyramidis 22336776". Si soliditas cylindri fuerit 605592960" ut in probl. 18 (§. 542); erit soliditas conii 201864320".

Superficies pyramidis habetur, si Tab; tam basis ABC, quam triangulorum IX. lateralium ACD, CBD, BDA area investigentur (§. 392) atque in unam Fig. summam colligantur. 146.

Coni denique recti superficies pro-
dit, peripheria baseos in latus ejus di-
midium ducta (§. 519) & basi, qui
circulus est, eidem addita.

E. gr. Sit diameter conii NM = 56' erit
Tab. peripheria 17584'', basis 246176'' (§.429).
IX. Sit altitudo KL = 246''. Quoniam
Fig. LM = ½ NM = 28' & KM² = KL² +
144. LM² = 60516 + 784 = 61300 (§.417) erit.
KM = 2475''' §.269 *Arithm.*), consequen-
ter superficies conii seclufa basi 2166020''
& hinc integra 2412196''.

PROBLEMA XX.

Tab.X. 549. *Metiri superficiem ac solidita-*
Fig. *tem conii truncati; datis ejus altitudi-*
168. *ne CH & diametris basium AB & CD.*
n. 1.

RESOLUTIO.

1. Datis diametris basium CD & AB
inveniantur peripheriæ (§. 429).
2. Ad quadratum altitudinis CH ad-
datur quadratum semidifferentiæ ra-
diorum AH & ex aggregato extra-
hatur radix (§. 269 *Arithm.*), ut
habeatur latus AC.
3. Semisumma peripheriarum multipli-
cetur per latus AC.

Sit e. gr. AB = 8', CD = 6', CH = 10', erit
AH = 1'.

$$\begin{array}{r} 200 - 314 - 8'' \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2512''' \text{ periph. maj.} \\ \hline \end{array}$$

$$CH^2 = 100'$$

$$AH^2 = 1$$

$$AC^2 = 101$$

Ergo AC = 1005''' fere,

$$\begin{array}{r} 100 - 314 - 6' \\ \hline 6. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1884''' \text{ Periph. min.} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2512 \text{ Periph. maj.} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4396 \text{ Summa.} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2198 \text{ Semisumma.} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1005 \text{ AC} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10990 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 219800 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2208990 \text{ Superfic. conii trunc.} \\ \hline \end{array}$$

DEMONSTRATIO.

Superficies conii truncati relinquitur, Tab.X.
si superficies conii minoris ECD a super- Fig.
ficie majoris AEB subtrahitur. Sed 168.
superficies minoris æquatur triangulo, n. 1.
cujus basis HI peripheria diametro CD n. 2.
descripta, altitudo MK, latus EC; su-
perficies majoris vero triangulo, cujus
basis NO peripheria diametro AB de-
scripta, altitudo ML, latus AE (§. 519).
Cum vero prior sit pars posterior; illa
ex hac subtracta, relinquitur pro super-
ficie conii truncati trapezium parallela-
rum basium HION, cujus quidem ba-
ses HI & NO peripheriis diametris CD
atque AB descriptis æquales sunt, alti-
tudo KL vero latus AC existit. Habe-
tur igitur superficies conii truncati semi-
summa dictarum peripheriarum in AC
ducta (§. 400). *Q. e. d.*

Demissa ex C perpendiculari CH ad
diametrum AB, cum etiam sit axis EF
ad eandem in cono recto perpendicula-
ris (§.467), erunt CH & EF parallelae
(§.492). Quamobrem cum triangu-
lum EAF secet duo plana parallela CD
& AB *per hypoth.* erunt semidiametri
CG & AF parallelae (§.499), conse-
quenter CG = HF (§.226) & CH = FG
(§. 238). Soliditatem adeo conii trun-
cati inventurus.

I. In-

1. Inferat (§. 268) : ut differentia semidiametrorum AH ad altitudinem conii truncati CH, ita semidiameter major AF ad altitudinem conii integri FE, per probl. 33 Arithm. (§. 302 Arithm.) inveniendam.
2. Ex hac inventa subducatur altitudinem conii truncati GF, ut relinquatur altitudo ablati EG.
3. Querat soliditatem conorum CED & AEB (§. 549).
4. Denique illam ex hac auferat; residua erit soliditas conii truncati ACDB.

E. gr. Sint omnia, ut ante: erit $FE = 40'$, & hinc $EG = 30'$.

Periph. major 2512^{'''}

	$\frac{1}{4} AB$	200			
<hr/>					
Basis maj.	502400				
EF	4000				
		2009600000			
			3		
<hr/>					
Conus AEB	66986666 $\frac{2}{3}$				
Periph. min.	1884 ^{'''}				
$\frac{1}{4} CD$	1 $\frac{1}{2}$ 00				
<hr/>					
		94200			
		1884			
		<hr/>			
Bas. min.	282600				
$\frac{1}{3} EG$	1000				
<hr/>					
Con. CED	282600000				
Con. AEB	66986666 $\frac{2}{3}$				
<hr/>					
Con. trunc.	38726666 $\frac{2}{3}$				

T H E O R E M A X X V I I .

550. Sphæra æquatur pyramidi, cujus basis æqualis superficiei, altitudo autem radio sphære.

D E M O N S T R A T I O .

Concipiatur superficies sphære in qua-

dratula infinite exigua resoluta, quæ a planis non amplius dissident, & ex centro concipiuntur ad eorum angulos ductæ rectæ. Evidens est sphæram constare ex innumeris pyramidibus quadratis in centro coëuntibus, quarum altitudines a radiis differunt quantitate inassignabili, hoc est, revera nulla, bases vero simul sumptæ superficiei sphære æquantur. Tota igitur sphæra recte habetur pro pyramide, cujus basis superficies, altitudo radius sphære. *Q. e. d.*

T H E O R E M A X X V I I I .

551. Sphæra est ad cylindrum super æquali basi & ejusdem altitudinis ut 2 ad 3.

Tab. X. Fig. 169.

D E M O N S T R A T I O .

Si quadratum ABDC cum quadrante DBC & triangulo ADC inscripto circa latus DC gyretur, ipsum quidem cylindrum (§. 465) quadrans hemisphærium (§. 470), triangulum conum (§. 476) describit. Altitudo horum corporum cum eadem sit nempe DC (§. 227); si ea in discos quantumlibet exiguæ crassitiei secentur, numerus eorum in omnibus idem erit. Sit jam EH semidiameter unius disci cylindri; erit EG semidiameter disci respondentis in hemisphærio, EF semidiameter disci in cono. Cum vero hi disci sint circuli, quod ex genesi patet (§. 131); erunt ipsi inter se ut quadrata rectarum EH, EG & EF (§. 408), hoc est, cum sit ob parallelismum EH & CB per hypoth. $EH = CB$ (§. 238) $= CG$ (§. 40), atque ob $CD : DA = CE : EF$ (§. 268) & $CD = DA$ (§. 98) $EC = EF$, ut quadrata rectarum CG, EG & EC. Quare si

Bb 3 discum:

discum conii a disco cylindri subtrahas, relinquitur discus sphaeræ (§.417). Idem cum valeat de singulis discis ex reliquis divisionibus emergentibus, soliditas sphaeræ relinquetur soliditate conii ex soliditate cylindri subducta. Est vero conus $\frac{1}{3}$ Cylindri (§.547). Ergo sphaera duas ejusdem partes tertias continet. *Q. e. d.*

THEOREMA XXIX.

552. *Cubus diametri est ad sphaeram propemodum ut 300 ad 157.*

DEMONSTRATIO.

Si diameter sphaeræ 100, cubus ejus 1000000 (§. 531) & cylindrus eandem cum sphaera basin & altitudinem habens 785000 (§. 541), consequenter sphaera 1570000 : 3. (§. 551). Est itaque cubus diametri ad sphaeram ut 1000000 ad 1570000 : 3, hoc est, ut 300 ad 157 (§. 178 *Arithm.*) *Q. e. d.*

SCHOLIUM.

553. *Dico cubum diametri esse ad sphaeram propemodum ut 300 ad 157. In demonstratione enim assumitur ratio prope vera diametri ad peripheriam 100 : 314 (§.426).*

THEOREMA XXX.

554. *Superficies sphaera est quadrupla circuli radio sphaerae descripti.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam sphaera æqualis est pyramidi, cujus basis est superficies, altitudo radius sphaeræ (§. 551) superficies ejus habetur, si soliditas per tertiam semidiametri aut sextam diametri partem dividitur (§. 548). Est vero soliditas sphaeræ factum ex $\frac{2}{3}$ Circuli maximi in diametrum (§. 551. 541). Quare si hoc

factum per $\frac{1}{2}$ Diametri dividas, seu, quod perinde est, primum per diametrum, ut quotus sint $\frac{2}{3}$ circuli maximi, hoc est, circuli circa diametrum sphaeræ descripti, (§. 210. *Arithm.*), & deinde per $\frac{1}{6}$ (§. 208. 210 *Arithm.*); erit quotus $\frac{12}{3}$ circuli maximi (§.243 *Arithm.*), hoc est quadruplus circuli maximi (§.223 *Arithm.*). Sed idem est superficies sphaeræ, per demonstrata. Ergo sphaeræ superficies circuli maximi quadrupla. *Q. e. d.*

COROLLARIUM.

555. Area circuli maximi est facta ex periphæria ejus in quartam diametri partem (§. 429). Ergo quadruplum hujus circuli est factum ex periphæria in diametrum. Superficies ergo sphaeræ habetur, periphæria in diametrum ducta, consequenter rectangulo æqualis est, cujus basis periphæria circuli radio sphaeræ descripti, altitudo diametri sphaeræ (§. 375).

PROBLEMA XXI.

556. *Data diametro sphaera, invenire superficiem ac soliditatem ejus.*

RESOLUTIO.

1. Quærat periphæria circuli radio sphaeræ describendi (§. 429).
2. Inventa ducatur in diametrum. Factum est superficies sphaeræ (§. 556).
3. Hoc si porro multiplicetur per sextam diametri partem; prodibit sphaeræ soliditas (§. 550. 540).

E. g. Sit diameter 5600^{'''}, erit

Periph. Circuli 17584^{'''}

Diam. 5600

10550400

87920

Superf. sphaer. 98470400^{'''}

Superf.

Superf. Sphær. 984704" 100
 Diamet. 560"

 59082240
 4923520

 551434240

$\frac{1}{2}$ 4
 $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ (91905706 $\frac{2}{3}$ Sol. Sphær.
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$

Aliter.

1. Quærat^{ur} cubus diametri 175616000" (§. 531).
2. Inveniatur porro ad 300, 157 & cubum inventum 175616000" numerus quartus proportionalis 91905706 $\frac{2}{3}$ (§. 302 Arithm.), qui erit soliditas sphæræ (§. 552).

SCHOLIION.

557. Segmenta sphæræ ac sectores inferius in *Analysi* facilius invenire docemus quam hoc loco fieri poterat.

PROBLEMA XXV.

558. Metiri soliditatem ac superficiem quinque corporum regularium.

RESOLUTIO.

Cubi soliditas investigatur per probl. 15. (§. 539.). Tetraëd^{rum} cum sit pyramis & Octaëd^{rum} pyramis geminata, icosaëd^{rum} vero ex viginti pyramidibus triangularibus, dodecaëd^{rum} ex duodecim quinquangularibus confet, quarum bases in superficie icosaëdri & dodecaëdri sunt, vertices in centro coëunt (§. 472. 475); horum corporum soliditas habetur per probl. 19 (§. 548). Superficies eorundem prodit, si area figuræ unius ex terminantibus ipsa quærat^{ur}. (§. 392. & 402) & inventa per numerum, a quo corpus denominatur, multiplicetur, nempe

pro tetraëdro per 4, pro hexaëdro seu cubo per 6, pro octaëdro per 8, pro dodecaëdro per 12, pro icosaëdro per 20 (§. 475).

PROBLEMA XXIII.

559. Corporis irregularis cujuscunque soliditatem invenire. Tab.X. Fig. 170.

RESOLUTIO.

1. Immittatur corpus parallelepipedo cavo eique aqua aut arena superfundatur & altitudo aquæ seu arenæ AB notetur.
2. Corpore extracto, observetur denovo aquæ aut arenæ complanatæ altitudo AC.
3. Subtrahatur AC ex AB, ut relinquatur BC.
4. Quoniam corpus irregulare æquatur parallelepipedo, cujus basis ECGF, altitudo BC; ejus soliditas invenitur per probl. 16 (§. 536). Sit e. gr. AB 8', AC 5'; erit BC 3'. Sit porro DB 12', BE 4'; erit soliditas corporis 144'.

SCHOLIION I.

560. Quodsi corpus in aqualiculo istiusmodi commode deponi nequeat, e. gr. si statuam certo loco affixam dimetiri jubeamur; prisma quadrangulare aut parallelepipedum circa ipsum construi debet ex asseribus. Reliqua peragenda sunt ut ante.

COROLLARIUM.

561. Inveniri ergo potest, quot linearum cubicarum sit aliquod lignum, saxum, metallum aut materia aliqua quæcunque pendens libram unam.

SCHOLIION II.

562. Hinc in usus futuros construi potest: Tabula gravitatem diversorum corporum ostendens secundum libras, quas pendit eorum pes cubicus: id quod per praxes hydrostaticas aliis

PROBLEMA XXIV.

565. *Invenire soliditatem corporis cavi.*

Tab. X. Fig. 171.

RESOLUTIO.

Casus I. Si corpus cavum in numero Geometricorum non contineatur, resolutio eadem, quæ problematis præcedentis (§. 600).

Casus II. Si corpus cavum fuerit parallelepipedum, prisma, cylindrus, sphaera, pyramis vel conus; soliditas primum totius corporis cavitate inclusa, dein cavitatis, quæ eandem cum

corpore figuram habere supponitur, per methodos supra traditas (§. 536. 539. 541. 548. 556) inveniatur: hac enim ex ista subducta, relinquitur soliditas corporis cavi.

Sit e. gr. soliditas cylindri cavi ABCD invenienda, sitque diameter totius corporis AB 56", longitudo AC 2° 4' 6", erit soliditas cylindri inclusa cavitate 605' 592" 960". Sit diameter cavitatis 500"; erit soliditas 482' 775" 000": quæ ex supra inventa subducta relinquit soliditatem corporis cavi 122' 817" 960".

C A P U T V.

De Similitudine ac Ratione Solidorum.

THEOREMA XXXI.

564. *Corpora similia sunt, quorum plana terminantia & numero aequalia & similia existunt.*

DEMONSTRATIO.

Cum corpora ex planorum terminantium concursu gigni posse concipiamus; eodem modo determinantur, si plana terminantia & numero aequalia fuerint & similia (§. 119). Sunt igitur & ipsa similia (§. 120). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

565. Cum in planis similibus anguli homologici sint æquales (§. 175), anguli vero solidi homologici ex concursu planorum homologorum (§. 446) & in corporibus similibus multitudine aequalium orientantur (§. 564); in corporibus similibus anguli solidi homologici æquales sunt (§. 449).

COROLLARIUM II.

566. Quoniam in planis similibus latera homologa sunt proportionalia (§. 175); si e. gr. juxta parallelepipedum ABCDEHGF aliud simile *abdcehgf* (quod in tabula non expressimus) poni imaginemur, erit AB:BD = *ab*:*bd* & DB:BG = *db*:*bg*. Quamobrem ex æquo AB:BG = *ab*:*bg* (§. 194 *Arithm.*). Cum adeo sit AB:*ab* = BD:*bd* & AB:*ab* = BG:*bg* (§. 173 *Arithm.*); corporum similium longitudines AB & *ab*, latitudines DB & *db*, itemque altitudines BG & *bg* in eadem ratione existunt.

Tab. X. Fig. 165.

COROLLARIUM III.

567. Cubus sex quadratis aequalibus terminatur (§. 460). Sunt vero quadrata omnia similia (§. 98. 175). Ergo cubi omnes sunt similes (§. 564).

COROLLARIUM IV.

568. Quoniam corpora regularia planis regu-

regularibus, adeoque similibus (§. 106. 175) & ejusdem quidem speciei numero æqualibus (§. 530) terminantur; corpora quoque regularia ejusdem speciei similia sunt (§. 564).

COROLLARIUM V.

569. Omnia igitur Tetraëdra, omnia quoque Octaëdra, Dodecaëdra & Icosaëdra similia sunt (§. 530).

THEOREMA XXXII.

570. *Cylindrorum & Conorum similitudines sunt ut radii basium; axes sunt itidem ut radii basium & iis sub eodem angulo junguntur.*

DEMONSTRATIO.

Tab. VIII. Si Coni & Cylindri similes sunt, ea in iisdem eadem sunt, per quæ a se invicem discerni possunt (§. 24 *Arithm.*). Fig. 143. Patet vero Conos & Cylindros non posse distingui nisi per rationem axis IX. DF vel KL ad diametrum basis DE Fig. 144. vel NM atque angulum CFE vel KLM, quem efficit axis cum diametro (§. 465. 467). Axes igitur in Conis & Cylindris similibus ad diametros basium eandem rationem habent & ad eas similiter inclinantur, seu ad eundem angulum insistant. *Quod erat unum.*

Cum in figuris solidis perinde ac in planis (§. 228) altitudo sit recta ex vertice in basin ad angulos rectos ducta; in Conis & Cylindris rectis axes sunt altitudines (§. 465. 467), adeoque patet, *per demonstrata*, altitudines tum esse diametris basium proportionales. Et quoniam in ceteris altitudines in triangulis rectangulis subtendunt eosdem angulos obliquos, sub quibus nempe axes ad diametros inclinantur; ideo

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

axibus (§. 252), consequenter etiam diametris basium (§. 167 *Arithm.*) proportionales sunt. *Quod erat alterum.*

THEOREMA XXXIII.

571. *Omnis sphaera est alteri similis.*

DEMONSTRATIO.

Omniem semicirculum esse alteri similem, patet ex demonstratione theorematis 2 part. 1 (§. 135). Sed sphaera describitur semicirculo K circa diametrum AB gytrato (§. 459): omnes igitur sphaeræ eodem modo determinantur (§. 119), adeoque similes sunt (§. 120). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXIV.

572. *Omnia prismata, parallelepipedata, cylindri, pyramides & conisunt in ratione composita basium & altitudinum.*

DEMONSTRATIO.

Sunt enim ut facta ex basibus in altitudines (§. 536. 539. 541. 548. *Geom.* & §. 178 *Arithm.*): ergo in ratione composita basium & altitudinum (§. 159 *Arithm.*). *Q. e. d.*

COROLLARIUM I.

573. Quare si bases fuerint aequales, altitudinum, si altitudines, basium rationem habent (§. 181. *Arithm.*).

COROLLARIUM II.

574. Cylindrorum & Conorum bases sunt circuli (§. 465. 467). Circuli sunt in ratione duplicata diametrorum (§. 409). Ergo cylindri & conis quicumque sunt in ratione composita ex simplici altitudinum & duplicata diametrorum (§. 572); & si fuerint æque alti, sunt ut quadrata diametrorum (§. 573).

C c COROL-

Tab. IX. Fig. 145.

COROLLARIUM III.

575. Quare si in cylindris altitudo fuerit diametro basium æqualis; erunt in ratione triplicata diametrorum basium (§. 159 *Arithm.*).

PROBLEMA XXV.

576. *Invenire cubum dato corpori, cujus soliditas inveniri potest, æqualem, vel qui sit ad hoc in data quacunque ratione, e. gr. ut 3 ad 1, vel ut 1 ad 4.*

RESOLUTIO.

1. Investigetur soliditas corporis per problemata *Cap. præc.* tradita.
2. Ex ea vel ejus multiplo aut submultiplo desiderato, e. gr. triplo aut subquadruplo extrahatur radix cubica (§. 282 *Arithm.*), quæ erit latus cubi desiderati (§. 531 *Geom.* & §. 248 *Arithm.*).

E. gr. Sit soliditas cylindri $107^{\circ} 171' 875''$ reperietur latus cubi æqualis $4^{\circ} 7' 5''$.

PROBLEMA XXVI.

577. *Dato corpore, cujus soliditas inveniri potest, invenire dimensiones alterius ipsi æqualis dati generis & altitudinis vel baseos datae.*

RESOLUTIO.

1. Inveniatur soliditas corporis per problemata *Cap. præc.* tradita.
2. Dividatur per basin datam: quotus erit altitudo in prismatis, parallelepipedis & cylindris (§. 536. 539. 541 *Geom.* & §. 210 *Arithm.*), tertia vero altitudinis pars in pyramidibus atque conis (§. 548 *Geom.* & §. *cit.* *Arithm.*).
3. Si altitudo detur, soliditas corporis

inventa dividatur per eam, ut habeatur basis prismatum, parallelepipedorum & cylindrorum; per tertiam altitudinis partem, ut habeatur basis pyramidum & conorum (§. *cit.*).

4. Pro parallelepipedis & prismatis triangularibus & quadrangularibus area baseos discerpatur in factores duos, ut habeatur longitudo & altitudo (§. 387. 392. 402. 456. 462), quorum alteruter pro basi triangulari prismatis per 2 multiplicanda (§. 392) & insuper pro multangularis basi alter per numerum laterum dividendus, ut prodeat latus figuræ polygonæ (§. 402).
5. Pro Cylindro & cono ex basi inventa porro quærenda ejus diameter (§. 434).

E. gr. Sit soliditas alicujus corporis $3^{\circ} 456' 978''$. Inveniri debet cylindrus, cujus altitudo $2^{\circ} 4' 6''$. Reperietur basis $1^{\circ} 40' 53''$ fere; diameter $134''$.

THEOREMA XXXV.

578. *Corpora similia, prismata, parallelepipeda, cylindri, pyramides atque conii sunt in ratione triplicata homologorum laterum, itemque altitudinum.*

DEMONSTRATIO.

Sunt enim in ratione composita basium & altitudinum (§. 572). Sed bases sunt in ratione duplicata homologorum laterum (§. 406. 570) & altitudines lateribus basium homologis proportionales sunt (§. 566). Ergo corpora ipsa in ratione triplicata laterum homologorum, itemque altitudinum, existunt (§. 150 *Arithm.*).
Q. e. d. THEO-

THEOREMA XXXVI.

579. *Sphære sunt ut cubi diametro-
rum.*

DEMONSTRATIO.

Sit circulo DAEB quadratum GFH circumscriptum (§. 351). Quodsi semicirculus AEB cum quadrato dimidio AGHB circa axem communem AB in orbem moveatur, ille sphæram, hoc cylindrum describet, cujus altitudo AB diametro basis IH æqualis (§. 470. 465). Quare si ponamus circulum adhuc alium cum quadrato similiter circumscripto; quoniam ex theorematis 2 Part. I. demonstratione constat (§. 135); omnem semicirculum esse alteri similem, & AB ad BH utrobique est ut 1 ad 2, adeoque rectangulum unum alteri simile (§. 175); inde generabitur sphæra & cylindrus alteri similis (§. 119. 120). Cum adeo ea utrobique coincident, per quæ a se invicem distingui debebat, quod in utroque casu gignitur (§. 24 *Arith.*); erit cylindrus unus ad suam sphæram ut alter ad suam sphæram (§. 132. *Arithm.*), consequenter sphære sunt inter se ut isti cylindri (§. 173 *Arithm.*). Habent ergo rationem triplicatam diametrorum (§. 575) hoc est, ut cubi earundem existunt (§. 259 *Arithm.*). *Q. e. d.*

THEOREMA XXXVII.

580. *Æqualia parallelepæda, prismata, cylindri, conii & pyramides reciprocant bases & altitudines.*

DEMONSTRATIO.

Si enim hæc corpora fuerint æqualia, facta ex basibus in altitudinem æqualia sunt (§. 536 &c.) Quamobrem altitudo corporis A est ad altitudinem alterius B uti reciproce basis ipsius B ad basin ipsius A (§. 229 *Arithm.*) *Q. e. d.*

THEOREMA XXXVIII.

581. *Cylindrus, cujus altitudo æqualis est diametro baseos, est ad cubum diametri ut 785 ad 1000.*

Tab. X.
Fig.
172.
n. 1.

DEMONSTRATIO.

Si diameter AB 100, erit basis 7850 (§. 429). Et quoniam altitudo DC = AB, per *hypoth.* soliditas cylindri 785000 (§. 541). Sed cubus diametri AB = 1000000 (§. 531). Ergo Cylindrus ad cubum diametri ut 785 ad 1000 (§. 181 *Arithm.*). *Q. e. d.*

CAPUT VI.

De Stereometria Doliorum.

PROBLEMA XXVII.

582. **V**irgulam construere, cujus ope haud difficulter invenitur numerus mensurarum fluidi alicujus, e. gr. vini, cerevisiæ &c. in vase cylindrico contenti.

RESOLUTIO.

Tab. X.
Fig. 872.
Pl. I. 2.

1. Diameter vasis cylindrici ABDE, uni mensuræ qua ad fluida mensuranda utimur æqualis, AB jungatur lineæ indefinitæ A 7 ad angulos rectos (§. 249).
2. Ex A transferatur in I recta AI rectæ AB æqualis; erit BI diameter vasis, quod duas mensuras capit, sed eandem cum vase priori altitudinem habet.
3. Fiat $A_2 = BI$, erit B2 diameter vasis tres mensuras capientis, sed ejusdem denuo altitudinis cum vase, quod nonnisi unam capit. Eodem modo inveniuntur diametri vasorum capaciorum A4, A5, A6, A7 &c.
4. In unum virgulæ latus transferantur divisiones inventæ A1, A2, A3, A4 &c. in alterum vero altitudo cylindri uni mensuræ æqualis, quoties fieri potest. Ita virgula constructa est.

Aliter.

Diametri A2, A3, A4, A5, A6, A7 &c. etiam per calculum inveniri in numeris & in particulis diametri AB per modum scalæ Geometricæ divisæ (§. 277) centesimis aut millesimis determinari possunt. Sit nempe diameter $AB = 1000$; erit ejus quadratum 1000000. Ex hujus duplo extracta radix quadrata (§. 269 *Arithm.*) erit A2. Si ex triplo, quadruplo, quintuplo &c. radix extrahatur; prodibunt diametri A3, A4, A5 &c. quem in usum constructa est tabula sequens:

Mens.	Diam.	Mens.	Diam.	Mens.	Diam.
1	1.000	17	4.123	33	5.744
2	1.414	18	4.242	34	5.831
3	1.732	19	4.359	35	5.916
4	2.000	20	4.472	36	6.000
5	2.236	21	4.582	37	6.082
6	2.449	22	4.690	38	6.164
7	2.645	23	4.796	39	6.244
8	2.828	24	4.898	40	6.324
9	3.000	25	5.000	41	6.403
10	3.162	26	5.099	42	6.480
11	3.316	27	5.196	43	6.557
12	3.464	28	5.291	44	6.633
13	3.605	29	5.385	45	6.708
14	3.741	30	5.477	46	6.782
15	3.873	31	5.567	47	6.855
16	4.000	32	5.657	48	6.928

DEMONSTRATIO.

Cylindri eandem altitudinem habentes sunt inter se ut quadrata diametrorum (§. 574). Ergo quadratum diametri vasis duas, tres, quatuor &c. mensuras capientis est duplum, triplum, quadruplum &c. quadrati diametri vasis mensuram nonnisi unam capientis. Quare si inde radices extrahantur, habebuntur in resolutione altera diametri ipsæ (§. 246 *Arithm.*). Quoniam vero in prima $AB=A_1$, erit ipsius BI quadratum duplum, quadratum ipsius B_2 triplum, quadratum ipsius B_3 quadruplum &c. quadrati ipsius A_1 (§. 417). Unde denuo patet esse rectas A_2, A_3, A_4 &c. diametros vasorum quæsitæ. Quodsi itaque has divisiones ad diametrum vasis cylindrici applices; illico constabit, quot mensuras capiat vas cylindricum eandem cum isto basin, sed altitudinem illius habens, quod unam mensuram capit. Quare si porro ope alterius divisionis in virgula factæ investiges, quoties altitudo unius mensuræ in altitudine vasis dati contineatur & per hunc numerum diametrum modò inventam multiplices; prodibit numerus mensurarum cavitatem vasis dati adimplentium. *Q. e. d.*

SCHOLIION I.

583. *E. gr.* Sit diameter vasis cylindrici 8, altitudo 12.; erit numerus mensurarum, quas capit 96.

SCHOLIION II.

584. *Altitudo cylindri mensuram unam capientis quo minor assumitur, eo diameter basis fit major. Unde tam ipsa, quam dia-*

metri cylindrorum plures mensuras capientium postea facilius in suas minutias subdividuntur. Bayerus (a) suadet, ut altitudo nonnisi unius digiti assumatur.

SCHOLIION III.

585. *Inveniuntur autem diametri vasorum unam vel plures partes decimas mensuræ capientium, si decima vel plures decimæ partes vasis unam mensuram capientis, dividantur per hujus altitudinem, ut habeatur basis cylindri circularis (§. 541): etenim hac data diameter habetur per probl. 58 (§. 434). Eodem modo inveniuntur diametri pro scrupulis vasorum duas & plures mensuras capientium.*

SCHOLIION IV.

586. *Quodsi altitudo vasis constanter eadem retineatur, diametri pro mensuris integris earumque partibus decimalibus hac ratione inveniuntur. Sit e. gr. diameter unius mensuræ 1 seu 1000 partium decimalium; erit ejus quadratum 1000000: cujus pars decima 100000. Inde extracta radix quadrata 316 continet partes decimales diametri unius mensuræ, quæ conveniunt diametro cylindri decimam mensuræ partem continentis, ejusdem tamen cum cylindro integram mensuram capiente altitudinis. Si ex duplo hujus decimæ nempe 200000 radix extrahatur; prodit diameter basis $\frac{7}{10}$ unius mensuræ capientis 447 & ita porro. Quodsi quadrato diametri unius mensuræ 1000000 adjicias partem decimam 100000 & ex summa extrahas radicem quadratam 1.049; erit ea diameter vasis, quæ capit $1\frac{1}{10}$ mensuræ. Ratio patet per demonstrationem problematis præsentis. Atque sic patet, quomodo virgula pithometrica accuratius constructui possit, ut intervalia inter mensuras integras subdividantur in partes decimales.*

(a) In der vollkommnen Visierkunst, c. 25. p. 126.

Diametri pro mensuris integris & earum partibus decimalibus.							
0.1	316	3.0	1.732	6.0	2.449	9.0	3.000
2	447	1	1.761	1	2.469	1	3.016
3	548	2	1.788	2	2.489	2	3.033
4	632	3	1.816	3	2.509	3	3.049
5	707	4	1.844	4	2.529	4	3.066
6	775	5	1.871	5	2.549	5	3.082
7	837	6	1.897	6	2.569	6	3.098
8	894	7	1.923	7	2.588	7	3.114
9	949	8	1.949	8	2.607	8	3.130
		9	1.975	9	2.626	9	3.146
1.0	1.000	4.0	2.000	7.0	2.645	10.0	3.162
1	1.049	1	2.025	1	2.664	1	3.178
2	1.095	2	2.049	2	2.683	2	3.194
3	1.140	3	2.073	3	2.702	3	3.210
4	1.183	4	2.097	4	2.720	4	3.226
5	1.225	5	2.121	5	2.738	5	3.241
6	1.265	6	2.145	6	2.756	6	3.256
7	1.304	7	2.168	7	2.774	7	3.271
8	1.342	8	2.191	8	2.792	8	3.286
9	1.378	9	2.214	9	2.810	9	3.301
2.0	1.414	5.0	2.236	8.0	2.828	11.0	3.316
1	1.449	1	2.258	1	2.846	1	3.331
2	1.483	2	2.280	2	2.864	2	3.346
3	1.517	3	2.302	3	2.881	3	3.361
4	1.549	4	2.324	4	2.898	4	3.371
5	1.581	5	2.345	5	2.915	5	3.391
6	1.612	6	2.366	6	2.932	6	3.406
7	1.643	7	2.387	7	2.949	7	3.421
8	1.673	8	2.408	8	2.966	8	3.436
9	1.703	9	2.429	9	2.983	9	3.451

SCHOLION V.

587. Ceterum me non monente patet, cylindrorum mensuram hic constitui cylindrum, quemadmodum supra solidorum omnium mensura assumtus est cubus. Unde & virgula pithometrica sic constructa virga cylindrica appellatur. Similiter hic circularum mensura constituitur circulus, sicuti supra omnium superficierum mensura quadratum.

PROBLEMA XXVIII.

588. Invenire soliditatem Dolii, hoc est, determinare numerum mensurarum, quas capit.

RESOLUTIO.

1. Virga pithometrica vi probl. præc. Tab.X. (S. 583) decenter applicata, exploretur tam longitudo Dolii AC, quam utraque diameter GH & AB. Fig. 173.
2. Cum experientia non invita, rigore licet Geometrico repugnante, Dolium pro cylindro habeatur, cuius basis inter fundum & ventrem Dolii media æquidifferens; inter AB & GH quæratu numerus medius æquidifferens (S. 348 *Arithm.*), qui *Diameter æquata* dici solet.
3. Numerus inventus multiplicetur per longitudinem Dolii AC, erit factum vi demonstrationis problem. præced. (S. 583) numerus mensurarum, quas capit Dolium.

Sit e. gr. AB = 8 GH = 12	AC = 15 $\frac{1}{2}(AB+GH) = 10$
erit AB + GH = 20	capac. dolii 150 mens.
$\frac{1}{2}(AB+GH) = 10$	

SCHOLION I.

589. Quodsi contingat, fundum non esse perfecte circulare, sed unam diametrum esse altera longiorem, utramque diametrum metiri & earum semisummam pro diametro circuli fundo Dolii æqualis assumere solent.

SCHOLION II.

590. Tabula, ex quibus inter se cofatis Dolia construuntur, ultra fundum prominent. Pro longitudine igitur Dolii non assumenda est recta FE, sed AC, quæ habetur, si quantitas prominentiæ tabularum una

ana cum ejus dimidio, cui fundi crassities æqualis supponitur, a recta FE utrinque subtrahitur. Solent autem quantitates subtrahendas creta notare utrinque in ipsa superficie Dolii, e. gr. in K, si quantitas subtrahenda fuerit IK. Eum in finem peculiarem virgulam parant, in partes minutas æquales divisam.

SCHOLIION III.

591. Alios decepturi ex tabulis in medio gracilibus, circa extrema crassis & orbibus ligneis pariter crassis Dolium construunt: quæ fraus non facile detegitur.

SCHOLIION IV.

592. Possemus equidem soliditatem cavitatis Dolii eodem modo explorare, quo supra corpora cava metiri docuimus (§. 563): si enim per soliditatem unius mensuræ divideretur, prodiret dolii capacitas. Enimvero prolixitas calculi obstat, quo minus ea methodo utantur.

SCHOLIION V.

593. Prostat etiam methodus, qua sine ullo calculo capacitas Dolii invenitur. Uvuntur ea in Batavia & variis Germaniæ locis. Sed cum supponat, omnia Dolia esse inter se similia & longitudinem duplam diametri æquatæ, hoc est, semisummæ diametrorum AB & GH; non tuto ubique adhibetur. Keplerus (a) illam omnibus reliquis præfert, quia omnes cautelas mensuræ in se continet. Virga enim, inquit, introrsum immissa eliminat crassitiem tabularum, circuloꝝ qui vincula sunt, viminumque quibus circuli lignei stringuntur. Eliminat & excessum marginum, quorum in crenis hærent orbis. Hoc autem ratio alia mensurandi una eademque opera præstare nulla potest. Unde ad privatorum securitatem fraudesque eliminandas suadet, ut lex illa Dolii construendi, quæ tertia parte longitudinis tabularum jubet describere circulum orbium ligneorum magistratum autoritate diligentiaque conservetur, pœnisque & proscriptione vasorum, quæ hanc figuram non habent, vindicetur. Ea

(a) In Stereometria doliorum & vinariorum part. 3. art. 3. f. n.3.

nimirum proportio in Doliis Austriacis observatur.

SCHOLIION VI.

594. Sunt, qui assumunt, Dolium ex duobus conis truncatis componi, & ejus soliditatem per probl. 20 (§. 549) quarunt. Alii cum aliis corporibus Geometricis id comparant. Clavius (b) alia pro duobus conis truncatis, alia pro frusto spheroidis Archimedææ habet, quoad prius consentiente, quoad posterius vero contradicente Keplero. (c) Clavio tamen assentitur Oughtredus eumque in finem regulam a se inventam proposuit (d). Wallisius pro frusto fusi parabolici habet (e). Enimvero cum methodus proposita praxi satis respondeat, reliquæ vero quæ ab Anglis potissimum proponuntur (f), utut ex profundiori Geometria derivatæ, molestiores sint nec ex Elementis Geometria demonstrari possunt; illa contenti esse possumus. Pauca attamen adhuc dicemus de Virgæ mensuræ a Keplero tantopere depradicatæ fabrica.

PROBLEMA XXIX.

595. Construere virgulam pithometricam, qua sine calculo capacitatem Dolii explorare licet.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Cum vasa pro quibus virga hæc paratur, esse debeant cylindri, quorum altitudo DC æqualis diametro AB, si fiat ut 785 ad 1000 ita soliditas unius mensuræ ad numerum quartum proportionalem, per probl. 29 (§. 302 Arithm.) invenendum; reperietur cubus diametri cylindri unam mensuram capientis (§. 581).

Tab. X.
Fig.
172.
n. 1.

2. In-

(b) Geom. pract. lib. 5. c. 10. Tom. II. Oper. f. 145.

(c) In Stereometria part. 2. fol. H. 3.

(d) In Clave Mathematica c. 19. p. m. 103.

(e) In Algebra c. 81. Vol. II. Oper. f. 350.

(f) Vid. The general Gauger by Mr. Dougharty p. 141 & seqq.

2. Inde ergo si extrahitur radix cubica (§. 282 *Arithm.*); prodibit diameter vasis cylindrici mensuram unam capientis.
3. Jam cum vas illud habeat altitudinem AE vel CD diametro AB æqualem & diagonalis BE assumatur pro indice capacitatis *per hypoth.* si ex duplo quadrati diametri modo inventæ AB extrahatur radix (§. 269 *Arithm.*); prodibit index vasis BE mensuram unam capientis (§. 417).
4. Ut porro inveniantur diagonales similiarum vasorum, quæ capiunt mensuras duas, tres, quatuor &c. tenendum est, ea esse ut cubos diametrorum (§. 578), consequenter etiam ob similitudinem triangulorum, quale ABE (§. 183) ut cubos diagonalium (*S. cit. & §. 260 Arithm.*). Quare si diagonalis vasis unam mensuram capientis concipiatur in 1000 partes divisa & ex cubi 1000000000 duplo 2000000000, triplo 3000000000: quadruplo 4000000000 &c. extrahantur radices cubicæ (§. 282 *Arith.*); prodibunt diagonales vasorum, quæ duas, tres, quatuor &c. mensuras capiunt.
5. Denique longitudo diagonalis primæ transferatur in virgulam & una dividatur in 1000 partes æquales (§. 277): ita enim ex parata hac scala particulas millesimas diagonalibus reliquis competentes in virgulam transferre licet.

Quoniam itaque Dolium in præsentem casum habetur pro cylindro gemino, cuius altitudo æqualis est semisummæ dia-

metrorum orbis AB & ventris GH est-Tab.X.
que $FB = \frac{1}{2} (AB + GH)$, adeoque GB Fig.
diagonalis in cylindro, cujus diameter 173.
semisumma diametrorum AB & GH;
capacitas ejus statim innotescit, si per
orificium G virgula usque ad B detru-
datur. *Q. e. i. & d.*

SCHOLIUM I.

596. Constructioni virgulæ itaque inser-
vit Tabula sequens.

Mens.	Diag.	Mens.	Diag.	Mens.	Diag.	Mens.	Diag.
1	1000	16	2519	31	3141	46	3583
2	1259	17	2571	32	3174	47	3608
3	1442	18	2620	33	3207	48	3634
4	1587	19	2668	34	3239	49	3659
5	1709	20	2714	35	3271	50	3683
6	1817	21	2758	36	3301	51	3708
7	1912	22	2802	37	3332	52	3732
8	2000	23	2843	38	3361	53	3756
9	2080	24	2884	39	3391	54	3779
10	2154	25	2924	40	3419	55	3802
11	2223	26	2962	41	3448	56	3825
12	2289	27	3000	42	3476	57	3848
13	2351	28	3036	43	3503	58	3870
14	2410	29	3072	44	3530	59	3892
15	2466	30	3107	45	3556	60	3914

SCHOLIUM II.

597. Virgula hæc cubica appellari solet,
quemadmodum præcedens cylindrica. Et fa-
cile ad alia dolia similia construitur, in qui-
bus longitudo dimidia GF fuerit ad diame-
trum æquatam FB in quacunque ratione,
modo in cylindro unam mensuram capiente
altitudo AE ad diametrum AB in eadem
fuerit.

PROBLEMA XXX.

598. *Virgam pithometricam construere ad determinandam quantitatem fluidi in Dolio non pleno.*

RESOLUTIO.

1. Assumatur Dolium aqua plenum, cujus capacitas jam cognita & numerus mensurarum e. gr. per 20 aut numerum alium minorem vel majorem dividatur, prout Dolii capacitatem in partes majores vel minores dividi commodum visum fuerit.

Tab. IV. Fig. 81. 2. Dolio beneficio libellæ Q ita collocato, ut axis ejus sit horizonti parallelus, virga per orificium ventris intrudatur, donec fundum Dolii attingat.

3. Ea quantitate fluidi ex Dolio emissa, quæ numero mensurarum per divisionem paulo ante n. 1. invento respondet, in virgula notetur decrementum altitudinis in fluido, quod exprimit totius capacitatis partem vicesimam.

4. Eodem modo notabis decrementum altitudinis, reliquis particulis vicesimis quantitatis fluidi in Dolio contenti respondens.

5. Horum decrementorum intervallis in una virgulæ facie notatis; altera dividitur in partes quotcumque minuras inter se æquales, ultra vicesimarum intervalla inæqualia continuandas, e. g. in 200 aut plures. Ita virga pro Dolio non pleno metiendo constructa est.

SCHOLIUM.

599. *Quodsi in usum domesticum pro eodem Dolio istiusmodi virgulam parare volueris, sufficit decrementorum intervalla in una ejus facie notari, nec opus est faciem alterius in partes æquales divisione. Decrementa quoque altitudinis fluidi notantur numeris, qui quantitati ex Dolio emissa respondent, e. gr. si integrum Dolium capiat 64 mensuras & una effluxerit, in fine decrementi altitudinis scribitur 63.*

PROBLEMA XXXI.

600. *Determinare quantitatem fluidi in Dolio non pleno.*

RESOLUTIO.

1. Investigetur capacitas totius dolii per probl. 28. (§. 588).

Tab. X. Fig. 173.

2. Dolio libellæ beneficio ita collocato, ut axis ejus sit horizonti parallelus, ne scilicet fluidum in una dolii parte altius sit, quam in altera, virga per problema præcedens (§. 599) parata per orificium Dolii G intrudatur, donec fundum in H attingat.

3. Ea rursus extracta notetur, quot partes in facie æqualium vino madidæ sint.

4. Hinc inferatur: ut numerus partium æqualium in altera virgulæ facie profunditati totius Dolii GH respondentium ad numerum similium partium altitudini fluidi LH convenientium, ita numerus earundem partium, quæ intervallo scrupulorum vicesimorum congruunt, ad numerum quartum proportionalem per probl. 33. *Arithm.* (§. 302) inveniendum.

5. Capiatur circino intervallum tot partium æqualium in virga, quot numerus inventus exprimit & transferatur in scalam scrupulorum vigesimorum, noteturque eorum numerus, quæ ipsi congruunt.
6. Per hunc dividatur numerus mensurarum, quas Dolium integrum capit: quotus erit numerus mensurarum, quas fluidum in Dolio contentum replere potest. *Q. e. i.*

E. gr. sit GH 160, HL 58, numerus partium æqualium, quæ integro scrupulorum vigesimorum intervallo congruunt, 120, capacitas denique Dolii 128 mensurarum.

$$\begin{array}{r} \text{Fiat : } 160 \text{ --- } 58 \text{ --- } 120 \quad +2 \\ 40 \text{) } \quad 4 \quad \underline{3} \quad 3 \quad +7 * (43 \frac{1}{2} \\ \quad \quad \quad 174 \quad \quad \quad ** \end{array}$$

Ponamus partibus $43\frac{1}{2}$ æqualibus respondere in scala inæqualium $\frac{4}{20}$ sive $\frac{1}{5}$. Quodsi

itaque 128 per 5 dividas, quotus $25\frac{3}{5}$ numerum mensurarum indicabit, quas fluidum Dolio contentum replere potest.

SCHOLIUM.

601. Si Dolia omnia essent similia per methodum propositam satis accurate inveniretur quantitas fluidi in dolio non pleno: sed in dissimilibus eadem exacte reperiri hac ratione nequit. Nondum autem inventa est methodus, & rigori geometrico satisfaciens & praxi respondens. Quam enim Keplerus dedit (a), ea nec demonstrativa, nec praxi adaptata. Unde neque ipsi satisfacit. Et quamvis aliam postea eidem substituerit (b); satis tamen intricata est. Intricatiores adhuc sunt, quas Bayerus (c) & Dougharty (d) tradunt.

(a) In Stereometria Doliorum f. O. 2. b.

(b) In dem Auszuge der ubralten Mefse-Kunst Archimedis s. 88. f. 95.

(c) In Conometriae Mauritanæ c. 9. p. 102. & seqq.

(d) The General Gauger p. 164. & seqq.

Finis Elementorum Geometriae.




Fig: Geom: Tab: I.




Fig: Geom: Tab: II.

Fig: 34.




Fig: 35.





Fig: 37.




Fig: 36.




Fig: 40.




Fig: 39.




Fig: 41.





Fig: 38.




Fig: 45.




Fig: 43.




Fig: 42.




Fig: 46.




Fig: 44.




Fig: 47.




Fig: 52.




Fig: 51.




Fig: 49.




Fig: 50.

Fig. Geom. Tab. III.































Fig. 59.














































Fig. Geom. Tab. VI








Fig: 117.



Pyxis magnetica.




Fig: 122.




Fig: 120.




Fig: 122.




Fig: 119.





Fig: 121.

Fig: 118.




Fig: 118.





Fig: 123.






Fig. 124.




Fig. 125.




Fig. 126. N.º 2.





Fig. 127.




Fig. 128.




Fig. 133.




Fig. 129.




Fig. 132.




Fig. 130.




Fig. 131.




Fig. 138.




Fig. 135.




Fig. 136.




Fig. 137.




Fig. 134.



Fig. 140.




Fig. 139.




Fig. 143.




Fig. 141.




Fig. 142.





Fig. Geom. Tab. IX.



















Fig. 162.




Fig. 164.




Fig. Geom. Tab. X

Fig. 165.




Fig. 166.




Fig. 163.





Fig. 171.

Fig. 169.




Fig. 167.





Fig. 168.



V.1

V.2

Fig. 172.




Fig. 173.
























Fig. 170.











ELEMENTA TRIGONOMETRIÆ PLANÆ.

P R Æ F A T I O.

MOMENTI perquam exigui tyronibus videtur Trigonometria, utilitatis prorsus nullius. Enimvero rerum Mathematicarum periti ore unanimi confitentur, quod, sublata Trigonometria, maxima eorum pars pereat, quæ in Mathesi admiramur. Certe Stellarum magnitudinem, distantiam a Terra, motum, Eclipsum tam Solarium, quam Lunarium computum, magnitudinem Globi terraquei & innumera alia prorsus ignoraremus, si nobilissimæ hujus scientiæ auxilio destitueremur. Trigonometria igitur pro arte haberi debet, qua maxime abscondita & a cognitione hominum remota in apricum producuntur. Eam qui nescit, non magnos in Mathesi mixta sentiet progressus: sæpius ipsi in Philosophia naturali hærebit aqua, e. gr. iridis Phænomena ad rationes suas revocatur aliaque meteora emphatica explicatur. Studium igitur Trigonometriæ addiscendæ afferatur indefessum, nec impatiens sit mora, donec in partibus Matheseos subsequenter ineffabilis ejusdem usus ex his ipsis etiam Elementis pateat.

Fides oculata impedit, quo minus in posterum judicia de rerum usu (quod vulgo plerumque fieri solet) præcipitemus. Paucis Problematibus comprehendi, quæ alias per casus plures distribuuntur: In Elementis enim præter necessitatem multiplicanda non sunt, quæ spinosa videntur tyronibus, nec culpatur brevitatis, quæ perspicuitati non officit, memoriæ levamen certissimum existit. Cumque Trigonometria etiam in Geometria practica usum habeat, quam cum Theoretica conjungi consultum duximus; ideo hunc usum sub finem annectere placuit.



E L E M E N T A T R I G O N O M E T R I Æ P L A N Æ .

C A P U T P R I M U M .

*De Constructione Canonis sinuum, tangentium atque secantium
tam naturalium, quam artificialium.*

D E F I N I T I O I .

Tab.I.
Fig.1.

I. **T**rigonometria plana est Scientia ex tribus trianguli rectilinei partibus inveniendi reliquas.

E. gr. Ex duobus lateribus AB & AC atque angulo A inveniuntur anguli reliqui B & C. cum latere tertio BC.

D E F I N I T I O II .

Tab.I.
Fig.2.

2. Sinus rectus AD arcus AE vel AI est chordæ AB arcus dupli AEB vel AIB dimidium. Sinus totus est radius HC, seu sinus Quadrantis HE. Sinus versus est pars radii ED inter sinum rectum AD & arcum AE intercepta.

C O R O L L A R I U M I .

3. Sinus ergo AD ad radium EC perpendicularis (§. 291 Geom.): consequenter sinus omnes eidem radio insistentes inter se paralleli (§. 256. Geom.)

C O R O L L A R I U M II .

4. Quoniam arcus AE est mensura anguli ACE, & AI ejus contigui ACI (§. 57. Geom.); quadrans vero HE mensura anguli recti (§. 143. Geom.): AD

etiam sinus rectus & ED sinus versus est angulorum ACE & ACI; sinus vero totus est sinus anguli recti.

C O R O L L A R I U M III .

5. Duo igitur anguli, qui sunt deinceps, eundem habent sinum.

C O R O L L A R I U M IV .

6. Angulorum adeo obtusorum sinus iidem sunt, quos habent eorum complementa ad duos rectos (§. 147. Geom.).

D E F I N I T I O III .

7. Tangens arcus EA est portio rectæ tangentis circumulum EF inter rectas ex centro C per extrema arcus E & A ductas interceptæ. Recta FC dicitur secans ejusdem arcus.

Tab.I.
Fig.2.

C O R O L L A R I U M I .

8. Tangens EF ad radium EC perpendicularis est (§. 308. Geom.).

C O R O L L A R I U M II .

9. Est etiam FE tangens & FC secans anguli ACE, itemque ACI (§. 57. Geom.).

COROLLARIUM III.

10. Duo igitur anguli, qui sunt deinceps, eandem habent tangentem atque secantem.

DEFINITIO IV.

Tab. I. Fig. 2. II. *Cofinus* est sinus; *Cotangens* tangens; *Cofecans* secans arcus AH, qui est alterius AE complementum ad quadrantem. Ita e. gr. AG sinus arcus AH dicitur *Cofinus* arcus AE. Vocantur etiam *Sinus*, *Tangentes* atque *Secantes complementi*.

THEOREMA I.

12. *Sinus arcuum similium ad radios suos eandem rationem habent.*

DEMONSTRATIO.

Chordæ enim arcuum similium ad radios eandem rationem habent (§. 290. *Geom.*). Sed sinus sunt chordarum dimidia (§. 2.). Ergo & hi ad radios rationem eandem habent (§. 181. *Arithm.*). *Q. e. d.*

HYPOTHESIS.

13. *Sumatur radius pro unitate & per ejus fractiones decimales determinetur quantitas sinuum, tangentium atque secantium.*

SCHOLIUM.

14. *Ex Ptolemæi Almagesto discimus, veteres radium in 60 partes, quas gradus vocabant, divisisse & inde chordas per minuta prima, secunda, tertia &c. hoc est, fractiones radii sexagesimales determinasse, quibus in analysi triangulorum utebantur. Dimidiis chordis seu sinibus primum usi sunt, quantum constat, Saraceni. Johannes Regiomontanus primum radio cum veteribus tribuit 60 gradus & sinus singulorum graduum per ejus fractiones decimales determinavit. Enimvero*

postea animadvertit, commodius fore, si radius sumatur pro unitate, ac ideo hypothesis præsentem in Trigonometriam introduxit. In tabulis sinuum & tangentium ordinariis radius concipitur in 10000000 partes divisus & ultra has fractiones in determinanda sinuum & tangentium quantitate non descenditur. Qui tamen tabulas istas construxerunt, ad fractiones multo minores descenderunt, ne error irreperet in scrupulis primis assignabilis. Secantibus hodie opus non habemus, cum omnia Trigonometriæ problemata absque illarum ope solvi possint.

COROLLARIUM.

15. *Cum latus hexagoni regularis sextam circuli partem subtendat (§. 116. 342. *Geom.*) atque radio æquale sit (§. 356. *Geom.*); sinus graduum triginta est 5000000 (§. 2. *Trigon.* & §. 41. *Geom.*).*

PROBLEMA I.

16. *Dato sinu AD, invenire cofinum AG.* Tab. I. Fig. 2.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Quoniam EC sinus ipsius EH (§. 2.) ad HC & AG sinus arcus AH (§. 2.) perpendicularis ad eandem HC (§. 3.); erit AG parallela ipsi DC (§. 256. *Geom.*) & ad G angulus rectus (§. 78. *Geom.*), adeoque $\triangle AGC$ reſtangulum (§. 91. *Geom.*). Quare cum AD & HC sint ad EC perpendiculares (§. 3.); erit $GC = AD$ (§. 226. *Geom.*). Si ergo

1. Ex quadrato radii AC subtrahatur quadratum sinus AD vel GC; relinquetur quadratum Cofinus AG (§. 417. *Geom.*). Unde si
2. Radix quadrata extrahatur (§. 269. *Arithm.*); prodibit Cofinus AG.

E. gr. Sit AC 10000000; AD 5000000; reperitur AG 8660254, sinus 60°.

PRO-

PROBLEMA II.

Tab. I. 17. Dato sinu AD arcus AE, inve-
Fig. 2. nire sinum arcus dimidii $\frac{1}{2}$ AE.

RESOLUTIO.

Inveniatur chorda arcus AE (§. 423. Geom.). Hujus enim dimidium est ejus sinus (§. 2.).

E. gr. Sint AC & AD ut in probl. præc. reperietur sinus arcus $\frac{1}{2}$ AE seu sinus $15^\circ = 2588190$.

PROBLEMA III.

Tab. I. 18. Dato sinu DG arcus DF, inve-
Fig. 3. nire sinum DE arcus dupli DB.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Cum anguli ad E & G recti sint (§. 3.) & angulus B utriusque triangulo BCG & DEB communis; erit BC:CG = BD:DE (§. 267. Geom.). Quare cum CG inveniri possit, dato sinu DG (§. 16.), & BD sit duplum ipsius DG (§. 2.): invenietur quoque DE (§. 302. Arithm.). Q. e. f. & d.

PROBLEMA IV.

Tab. I. 19. Datis sinibus FG & DE arcuum
Fig. 4. FA & DA, quorum differentia DF 45' major non est, invenire sinum quemcunque intermedium IL.

RESOLUTIO.

1. Quærat ad differentiam arcuum FD, quorum sinus dantur, differentiam arcus, cujus sinus quæritur, AI atque arcus AD sinui dato majori respondentis IF & differentiam sinuum datorum DH quartus numerus proportionalis (§. 302. Arithm.).
2. Is addatur sinui dato minori FG. Erit aggregatum sinus quæsitus IL.

DEMONSTRATIO.

Cum arcus DF & FI paucorum sint minorum, per hypoth. pro lineis rectis citra errorem sensibilem haberi poterunt. Porro FG, IL & DE parallelæ sunt (§. 3.). Quare si ex F ad DE perpendicularis demittatur FH (§. 216. Geom.); erit HE = FG (§. 226. Geom.), adeoque DH differentia sinuum datorum FG & DE (§. 64. Arithm.) Unde ob parallelas IK & DH per demonstratas DF: FI = DH: IK (§. 268. Geom.). Q. e. d.

PROBLEMA V.

20. Datis sinibus BD & FE duorum arcuum quorumcunque AB & AF, invenire sinum arcus semidifferentiæ eorundem BF. Tab. I. Fig. 5.

RESOLUTIO.

1. Sinus minor BD subtrahatur a majore FE, relinquetur differentia FK.
2. Ex datis sinibus BD & FE inveniantur Cofinus BI & FH (§. 16).
3. Cofinus minor FH subtrahatur e majore BI, erit BK differentia.
4. Ex summa quadratorum differentiarum BK & FK extrahatur radix quadrata (§. 269. Arithm.); prodibit chorda arcus differentiæ BF, cujus dimidium est sinus quæsitus (§. 2.). Q. e. i.

DEMONSTRATIO.

BD, FE & GC, tum AC, BI & FH inter se parallelæ & illæ ad AC, hæ ad GC perpendiculares (§. 3.), consequenter FH = KI & BD = EK (§. 226. Geom.) & angulus BKF rectus (§. 230. 78. Geom.) Quamobrem FK differentia

rentia sinuum BD & FE, BK vero differentia cosinuum FH & BI atque FKB triangulum rectangulum (§.91. *Geom.*). Ergo cum sit $BF^2 = BK^2 + FK^2$ (§.417. *Geom.*); reperietur chorda BF, si ex summa quadratorum differentiæ sinuum FK & cosinuum BK radix quadrata extrahitur, (§. 246. *Arithm.*). *Q. e. d.*

PROBLEMA VI.

21. *Invenire sinum 45. graduum.*

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Sit HI circuli quadrans; erit HCI angulus rectus (§. 143. *Geom.*) adeoque Δ cognomine rectangulum (§.91. *Geom.*), consequenter $HI^2 = HC^2 + CI^2$ (§.417. *Geom.*) $= 2 HC^2$ (§. 40. 374. *Geom.*). Quare cum HC sinus totus (§. 2.) sit 10000000 (§. 13); si ex $2HC^2$ quadrato 2000000000000000 extrahatur radix 14142136. (§. 269. *Arithm.*); prodibit chorda HI (§. 246. *Arithm.*), cujus dimidium 7071068 sinus 45° consideratus. *Q. e. i. & d.*

SCHOLIUM.

22. *Inferius in Analyfi docebimus, quomodo ex dato radio latus pentagoni regularis, hoc est, 72° (§.342. *Geom.*), consequenter sinus 36° (§. 2.) inveniatur.*

PROBLEMA VII.

Tab. I. Fig. 4. 23. *Dato sinu unius minuti seu 60° FG, invenire sinum unius vel aliquot secundorum MN.*

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Quoniam arcus AM & AF sunt admodum exigui, AMF pro linea recta haberi potest citra errorem in fractionibus radii decimalibus, quibus sinus exprimimus, assignabilem, hoc est, arcus AM & AF chordis eorum propor-

tionales assumere licet. Quare cum MN sit ipsi FG, parallela (§. 3) erit AF: FG = AM: MN (§. 268 *Geom.*). Datis ergo AF, FG & AM, per *hypoth.* invenitur MN (§. 302 *Arithm.*). *Q. e. i. & d.*

SCHOLIUM.

24. *Eadem ratione, si opus foret, inveniri posset sinus aliquot scrupulorum tertiorum.*

PROBLEMA VIII.

25. *Datis sinibus 30 (§.15.), 15 (§. 17), 45 (§. 21) & 36 graduum (§.22); canonem omnium sinuum construere, non nisi unico minuto aut denis secundis, immo unico secundo inter se differentiibus.*

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Ex sinu 36 graduum inveniatur Sinus 18°, 9°, 4° 30', 2° 15' (§.17); sinus 54°, 72°, 81°, 85° 30', 87° 45' (§. 16); porro sinus 27°, 13° 30', 6° 45'; 40° 30', 20° 15'; 42° 45' (§. 17); inde sinus 63°, 76° 30', 83° 15', 49° 30', 69° 45', 47° 15' (§.16); ulterius sinus 31° 30', 15° 45'; 38° 15'; 24° 45' (§. 17); hinc sinus 58° 30', 74° 15', 51° 45', 65° 15', (§.16); denique sinus 29° 15' (§.17) & ejus cosinus 60° 45' (§. 16).
2. Ex sinu 45° inveniuntur sinus 22° 30' & 11° 15' (§.17), sinus 67° 30' & 78° 45' (§.16), sinus denique 33° 45' (§. 17) & 56° 15' (§. 16).
3. Ex sinu 30° & sinu 54° inveniatur sinus 12° (§. 20).
4. Ex sinu 12° inveniuntur sinus 6°, 3°, 1° 30', 45' (§. 17), sinus 78°, 84°, 87°, 88° 30', 89° 15' (§.16) por-

porro sinus $39^\circ, 19^\circ 30', 9^\circ 45'; 42^\circ, 21^\circ, 10^\circ 30', 5^\circ 15'; 43^\circ 30', 21^\circ 45'; 44^\circ 15'$ (§. 17): ulterius sinus $51^\circ, 70^\circ 30', 80^\circ 15', 48^\circ, 69^\circ, 79^\circ 30', 84^\circ 45', 46^\circ 30', 68^\circ 15', 45^\circ 45'$, (§.16): inde sinus $25^\circ 30', 12^\circ 45'; 35^\circ 15'; 24^\circ; 34^\circ 30', 17^\circ 15'; 39^\circ 45'; 23^\circ 15'$ (§.17): hinc sinus $64^\circ 30', 77^\circ 15', 54^\circ 45', 66^\circ, 55^\circ 30', 72^\circ 45', 50^\circ 15', 66^\circ 45'$ (§.16): hinc porro sinus $32^\circ 15'; 33^\circ, 16^\circ 30', 8^\circ 15'; 27^\circ 45'$ (§. 17): inde ulterius sinus $57^\circ 45', 57^\circ, 73^\circ 30', 81^\circ 45', 62^\circ 15'$ (§. 16): porro sinus $28^\circ 30', 14^\circ 15'; 36^\circ 45'$ (§. 17) & horum cosinus $61^\circ 30', 75^\circ 45', 53^\circ 45'$ (§. 16): denique sinus

$30^\circ 45'$ (§.17) & ejus cosinus $59^\circ 15'$ (§. 16).
 5. Ex sinu 15° inveniuntur sinus $7^\circ 30' & 3^\circ 45'$ (§. 17): hinc sinus $75^\circ, 82^\circ 30', 86^\circ 15'$ (§. 16): inde $37^\circ 30', 18^\circ 45'; 41^\circ 15'$ (§. 17) & horum cosinus $52^\circ 30', 71^\circ 15', 48^\circ 45'$ (§. 16): denique sinus $26^\circ 15'$ (§.17) & ejus cosinus $63^\circ 45'$ (§. 16).
 6. Quodsi sinus hac ratione inventi in ordinem redigantur, numero 120, & differentiam inter duos immediate sibi mutuo succedentes $45'$ deprehendes: quemadmodum ex Tabula, quam cum in finem hic apponimus, primo intuitu apparet:

1	0°45'	21	15°45'	41	30°45'	61	45°45'	81	60°45'	101	75°45'
2	1.30	22	16.30	42	31.30	62	46.30	82	61.30	102	76.30
3	2.15	23	17.15	43	32.15	63	47.15	83	62.15	103	77.15
4	3. 0	24	18. 0	44	33. 0	64	48. 0	84	63. 0	104	78. 0
5	3.45	25	18.45	45	33.45	65	48.45	85	63.45	105	78.45
6	4.30	26	19.30	46	34.30	66	49.30	86	64.30	106	79.30
7	5.15	27	20.15	47	35.15	67	50.15	87	65.15	107	80.15
8	6. 0	28	21. 0	48	36. 0	68	51. 0	88	66. 0	108	81. 0
9	6.45	29	21.45	49	36.45	69	51.45	89	66.45	109	81.45
10	7.30	30	22.30	50	37.30	70	52.30	90	67.30	110	82.30
11	8.15	31	23.15	51	38.15	71	53.15	91	68.15	111	83.15
12	9. 0	32	24. 0	52	39. 0	72	54. 0	92	69. 0	112	84. 0
13	9.45	33	24.45	53	39.45	73	54.45	93	69.45	113	84.45
14	10.30	34	25.30	54	40.30	74	55.30	94	70.30	114	85.30
15	11.15	35	26.15	55	41.15	75	56.15	95	71.15	115	86.15
16	12. 0	36	27. 0	56	42. 0	76	57. 0	96	72. 0	116	87. 0
17	12.45	37	27.45	57	42.45	77	57.45	97	72.45	117	87.45
18	13.30	38	28.30	58	43.30	78	58.30	98	73.30	118	88.30
19	14.15	39	29.15	59	44.15	79	59.15	99	74.15	119	89.15
20	15. 0	40	30. 0	60	45. 0	80	60. 0	100	75. 0	120	90. 0

Inveniantur ergo sinus intermedii per probl. 4. (§. 19).

7. Denique sinus scrupulorum secundorum ab 1 usque ad 60 inveniantur per probl. præc. (§. 13).

Ita Canon sinuum erit constructus. *Q. e. f.*

PROBLEMA IX.

Tab. I. Fig. 2. 26. Dato sinu AD arcus AE invenire tangentem EF & secantem FC ejusdem arcus.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

Quia sinus AD & tangens EF ad radium EC perpendicularis (§. 3. 8); erit ille huic parallelus (§. 256 *Geom.*). Quare ut Cofinus DC ad sinum AD, ita sinus totus ad tangentem EF: item ut Cofinus DC ad sinum totum AC ita sinus totus EC ad secantem CF (§. 268 *Geom.*). Invenietur adeo per illationem primam tangens EF; per alteram secans FC (§. 302. *Arithm.*) *Q. e. i. & d.*

SCHOLIION.

27. Constructio igitur Canonis sinuum (§. 25), haud difficilis est constructio Canonis tangentium atque secantium. Uterque junctim sumtus Canon triangulorum naturalis dici solet, quia triangulorum analysi inservit. Equidem passim apud Authores theorematum non in elegantia occurrunt, quibus multi sinus facilius inveniuntur, quam exposita hactenus methodo. Ursinus (a) præsertim docet, quomodo ex sinu Canonis omnium primi, e. gr. unius secundi, per solam quasi additionem & subtractionem totus Canon derivetur. Enimvero cum ab aliis dudum constructus sit; sufficit utcumque ostendisse, quomodo construi potuerit.

(a) Trigon. lib. 2. c. 5. p. 164.

PROBLEMA X.

28. Invenire sinus cujuscunque dati logarithmum.

RESOLUTIO.

Ut logarithmi eo accuratiores inveniantur, assumendi sunt sinus ad radium 1000000000 constructi. Mulctantur nempe Sinus in Canone *Pitisci* majore 4 ultimis notis. Cum adeo sinus sint numeri 10 ut plurimum notis constantes, in canone autem logarithmorum, qui prostat, maximo numeri naturales ultra 5 notas non ascendunt; logarithmi eorum inveniuntur per probl. 37. *Arithm.* (§. 349). Utendum vero est canone logarithmorum majore.

E. gr. Sit inveniendus logarithmus Sinus 23° qui apud *Pitiscum* 3907311284. Resectis versus sinistram quinque notis 39073, ipsis respondens logarithmus est 4.5918768. consequenter logarithmus numeri 3907300000 est 9.5918768. Differentia tabularis est 111. Quare inferitur: ut 100000 ad 111 ita notæ residuæ sinus dati 11284 ad numerum quartum proportionalem 12: qui si addatur logarithmo 9.5918768, prodit logarithmus quaesitus 9.5918780, qualis in Canone triangulorum artificiali reperitur.

PROBLEMA XII.

29. Invenire logarithmum tangentis, dato logarithmo sinus & cosinus.

RESOLUTIO.

1. Logarithmus sinus addatur logarithmo sinus totius.
2. A summa subtrahatur logarithmus cosinus. Residuum est logarithmus tangentis (§. 26 *Trigon.* & §. 359. *Arithm.*).

E. gr.

E. gr. Inveniri debet logarithmus tangentis 23° .

Addantur Log. Sin. $23^\circ = 9.5918780$

Log. Sin. tot. $= 1.0000000$

a summa $= 19.5918780$

subtrahatur Log. Cos. $= 9.9640261$

relinquitur Log. tang. $= 9.6278519$

PROBLEMA XII.

30. *Invenire logarithmum secantis arcus cujuscunque, dato sinu complementi ejusdem.*

1. Logarithmus sinus totius multiplicetur per 2.
2. Ab ejus duplo subtrahatur sinus complementi datus. Residuum fiet logarithmus secantis (§. 26 *Trigon.* & §. 359. *Arithm.*).

E. gr. Quarendus est logarithmus secantis arcum 23° . Calculi typus talis est:

Log. sin. tot. $= 100000000$

Ejus duplum $= 200000000$

Log. Sin. Compl. $= 99640261$

Log. secant. $23^\circ = 10.0359739$

SCHOLIUM.

31. Johannes Neperus, qui primus logarithmos in Trigonometriam introduxit, sinus totius logarithmum facit 0. Hinc crescunt logarithmi sinuum, sinibus decrescuntibus, & tangentium atque secantium sinu toto majorum logarithmi sunt defectivi seu nihilo mireres. Neperus logarithmos cosinum Antilogarithmos, logarithmos vero tangentium differentiales, Keplerus etiam Mesologarithmos vocat. Dicuntur quoque hi logarithmi Sinus & tangentes artificiales.

CAPUT II.

De Analyfi Triangulorum.

THEOREMA II.

Tab. I. 32. **T** Angens 45° EF aequatur radio EC.

DEMONSTRATIO.

Quoniam arcus AE 45° . per hypoth. erit quoque angulus ACE 45° . (§. 59 *Geom.*), consequenter angulus F 45° (§. 241. *Geom.*). Quare EF = CE (§. 253 *Geom.*). Q. e. d.

THEOREMA III.

Tab. I. 33. In omni triangulo ABC latera Fig. 1. sunt ut sinus oppositorum angulorum.

DEMONSTRATIO.

Cum enim omne triangulum circulo inscriptibile sit (297 *Geom.*); erunt latera AC, CB & AB chordae arcuum cognominum (§. 38 *Geom.*), consequenter latera dimidia sinus arcuum dimidiorum (§. 2). Sed arcus dimidii sunt mensurae angulorum oppositorum B, A & C (§. 314 *Geom.*). Ergo ut latus AC ad sinum anguli sibi oppositi B; ita latus BC ad sinum anguli sibi oppositi A; ita etiam AB ad sinum anguli sibi oppositi C. Q. e. d.

E e 2

SCHO-

SCHOLI ON.

34. Ut vero evidentius appareat, in triangulo obtusangulo pro sinu anguli obtusi utendum esse sinu anguli acuti, qui eidem deinceps ponitur, & quem esse etiam sinum anguli obtusi supra annotavimus (§. 6), sequens addere lubet theorema.

THEOREMA IV.

Tab. I. Fig. 8. 35. In triangulo obtusangulo AGC est ut latus angulo obtuso G oppositum AC ad sinum anguli acuti AGE eidem deinceps positi, ita latus angulo obtuso adjacent GA ad sinum anguli eidem oppositi C.

DEMONSTRATIO.

Demittatur ex A in basin continuatam GC perpendicularis AE; erunt AEG & AEC triangula rectangula (§. 78. 91 Geom.). Cum itaque sit ut sinus totus ad AC ita sinus anguli Cad AE & ut AG ad sinum totum ita AE ad sinum anguli AGE (§. 33); erit etiam ut AG ad AC ita sinus anguli C ad sinum anguli AGE (§. 197 Arith.), consequenter latus angulo obtuso adjacent GA est ad sinum anguli eidem oppositi C sicuti latus angulo obtuso oppositum AC ad sinum anguli acuti eidem deinceps positi AGE (§. 173 Arith.) Q. e. d.

PROBLEMA XIII.

Tab. I. Fig. 1. 36. Datis duobus angulis A & C, una cum latere uni eorum C opposito AB, invenire latus alteri A oppositum EC.

RESOLUTIO.

Inferatur (§. 33):
ut sinus anguli C
ad latus sibi oppositum datum
AB:

Ita Sinus anguli alterius A
ad latus quæsitum BC.

Invenietur adeo Logarithmorum ope BC per probl. 38. Arithm. (§. 351).

E. gr. Sit C = 48° 33', A = 57° 28', AB = 74'. Calculus talis erit:

Log Sin. C	9.8750142
Log. AB	1.8692317
Log. Sin. A	9.9258681

Sum. Log. AB & Sin. A 11.7950998

Log. BC	1.9200856.
---------	------------

cui in Canone logarithmorum pro numeris vulgaribus respondent 83'. Cum vero logarithmus in tabulis non exactus reperitur; inveniri possunt numeri inventi 83' fractiones decimales, hoc est, in casu nostro digiti, si sub char æteristica 2 post 830' denuo logarithmus ipsius BC evolvatur: cui proxime respondet numerus 831". Quodsi præter digitos etiam lineas desideres; eundem logarithmum quare post 8310" & ei quam proxime respondere deprehendes 8319". Immo si canon major ad manus sit, ipsa scrupula quatta expiscari licet, si logarithmus inventus post 83190" evolvatur: ubi eidem quam proxime respondet logarithmus numeri 83192. Est ergo BC 8° 3' 1" 9" 2" (S. 355. Arithm.).

SCHOLI ON.

37. Quid factu opus sit, si logarithmi characteristica fuerit 3, in Arithmetica loco citato docuimus.

PROBLEMA XIV.

38. Datis duobus lateribus AB & BC una cum angulo C uni eorum opposito, invenire angulos reliquos A & B.

RESOLUTIO.

I. Inferatur (§. 33):
ut latus unum AB.
ad sinum anguli dati sibi oppositi C:

Ita

Ita latus alterum BC
ad finem anguli quaesiti sibi opposi-
ti A.

Invenietur adeo logarithmus finus an-
guli A utendo logarithmis *per probl.*
38. *Arithm.* (§. 351).

Tab. I.
Fig. 8.

II. Quodsi latus AG vel AB dato angu-
lo C oppositum fuerit minus latere
AC, quod opponitur angulo quaesito,
quaesitus angulus & obtusus esse po-
test G, & acutus B (§. 234 *Geom.*),
adeoque constare debet, utrum trian-
gulum datum sit obtusangulum, an
acutangulum. In casu posteriori sa-
tisfacit numerus graduum, qui sinui
reperito respondet; in priori pro an-
gulo obtuso sumitur ejus complemen-
tum ad 180°. (§. 35).

Tab. I.
Fig. 8.

III. Quodsi angulus datus G in triangu-
lo GAC fuerit obtusus & datis praete-
rea cruribus AG & AC quaeratur
acutus, in solutione pro sinu obtusi
anguli AGC sumitur deinceps positi
acuti AGE sinus (§. 35).

Tab. I. E. gr. Sit AB = 94', BC = 69', C = 72° 15'.
Fig. 1.

Log.	AB	1. 9731279
Log. Sin.	C	9. 9788175
Log.	BC	1. 8388491

Sum. Log. Sin. C & BC 11. 8176666

Log. Sin. A. 9. 8445387,

eni in canone proxime respondent 44° 21'.
Quo si Canon major non fuerit ad manus &
praeter scrupula prima etiam secunda deside-
rentur *vi probl.* 4. (§. 19) hunc in modum
inveniuntur.

A logarith. invento 98445387 subtrahe
Tabul. prox. min. 98445018

& notetur Differ. I. 389
Simil: ex prox. maj. 98446310 subduc
prox. min. 98445018

& notetur Diff. II. 1292
Inferatur: 1292: 60 = 389
2) 646: 30 30

11 6 7 0 (18
6 4 6:
5 2. 1. 0
5 1 6 8

Eff ergo angulus A = 44° 21' 18''
Sed C = 72 15 0

Quare A + C = 116 36 18
Quon. A + C + B = 179 59 60

erit B = 63° 23' 42''

Similiter dentur in triangulo rectangulo
praeter rectum A hypotenusa BC & cathe-
tus AC pro angulo B. Sit nempe BC 49'
AC 36'. Calculus talis erit: Tab. I.
Fig. 6.

Log. BC 1. 6901961
Log. Sin. tot. 10. 0000000
Log. AC 1. 5563025

Log. Sin. B 9. 8661064, cui in
canone proxime respondent 47° 16'.
Ergo C = 42° 44' (§. 241 *Geom.*)

Quodsi AG = 349'', AC = 382'', angulus
A = 57° 25'; erit Tab. I.
Fig. 8.

Log. AG. 2. 5428254
Log. Sin. C 9. 9256261
Log. AC 2. 5820634

Sum. Log. Sin. C & AC 12. 50716895
Log. Sin. G 9. 9648641,

cui in Canone proxime respondent 67° 15'. Est
igitur angulus acutus B in triangulo ABC
67° 15': quem si subtraxeris ex 180°, re-
linquetur pro obtuso AGC 112° 45'.

Detur denique in triangulo obtusangulo AGC angulus obtusus G $165^{\circ} 17'$, una cum cruribus $AG = 179''$ & $AC = 223''$ pro acuto C. Inferatur (§. 35).

Log. AC	2.3 48 3 0 4 9
Log. Sin. AGE	9.4 0 4 9 0 0 9
Log. AG	2.2 5 2 8 5 3 0
Sum. Log. Sin. G & AG	1 6 5.7 7 5.3 9

Log. Sin. C 9.3 0 9 4 4 9 0
cui in Canone respondent quam proxime $11^{\circ} 46'$.

LEMMA.

39. Si a semisumma duarum quantitatum subtrahatur semidifferentia, relinquitur quantitas minor: Si vero illi hæc addatur, prodit major.

DEMONSTRATIO.

Numerus major componitur ex minore & differentia (§. 64 Arithm.): ergo summa ex minore bis sumta & differentia, consequenter semisumma ex minore & semidifferentia. Quare si a semisumma semidifferentia subtrahatur, minor quantitas relinquitur (§. cit. Arithm.). Quod erat unum.

Quodsi vero semisummæ semidifferentia addatur, aggregatum erit compositum ex quantitate minore & differentia (§. 61 Arithm.), adeoque numerus major, per demonstr. Quod erat alterum.

PROBLEMA XV.

40. Datis duobus lateribus BA & AC cum angulo intercepto A, invenire angulos reliquos.

RESOLUTIO.

I. Si triangulum ABC fuerit rectangulum; assumpto crure uno circa rectum AB pro radio, erit alterum CA tangens anguli oppositi B (§. 7. 8) Inferatur ergo:

Tab. I.
Fig. 6.

ut crus unum AB
ad alterum AC;

Ita sinus totus

ad tangentem anguli B.

E. gr. Sit BA $79'$, AC $54'$: erit

Log. BA 1 8 9 7 6 2 7 1

Log. AC 1 7 3 2 3 9 3 8

Log. Sin. Tot. 1 0 0 0 0 0 0 0

Log. Tang. B 9.8 3 4 7 6 6 7, cui in Canone respondent. quam proxime $34^{\circ} 21'$. Ergo angulus C $55^{\circ} 39'$ (§. 241 Geom.).

II. Si angulus A fuerit obliquus;

Tab. I.
Fig. 7.

I. Inferatur:

ut summa laterum datorum AB & AC

ad differentiam eorundem;

Ita tangens semisummæ angulorum quæstorum C & B.

ad tangentem semidifferentiæ eorundem.

2. Addatur semidifferentia ad semisummam; aggregatum erit angulus major C. Eadem a semisumma subtrahatur, residuus fiet angulus minor B.

E. gr. Sit AB $75'$, AC $58'$, A $108^{\circ} 24'$, erit

AB 75 AB 75 A + B + C 179° 60'

AC 58 AC 58 A 108 24

Sum: 133 Diff. 17 B + C 71 36

$\frac{1}{2}(B+C)$ 35 48

Log. AB + AC 2. 1238516

Log. AB - AC 1. 2304489

Log. Tang. $\frac{1}{2}(B+C)$ 9. 8580694

Summa Logg. 11. 0885183

Log. Tang. $\frac{1}{2}(C-B)$ 8. 9646667, cui in tabulis proxime respondent $5^{\circ} 16'$.

$\frac{1}{2}(B+C) = 35^{\circ} 48'$ $\frac{1}{2}(B+C) = 35^{\circ} 48'$

$\frac{1}{2}(C-B) = 5 16$ $\frac{1}{2}(C-B) = 5 16$

C = 41 4 B = 30 32

DE-

DEMONSTRATIO.

Crure majore dato AB ex vertice anguli dati A describatur circulus (§. 131 *Geom.*), & crus minus AC utrinque continuetur (§. 21 *Geom.*), donec circulo in E & D occurrat. Erit ob $AE = AB = AD$ (§. 40 *Geom.*) CE summa laterum datorum, CD differentia eorundem. Quoniam DE diameter (§. 39 *Geom.*); erit EBD semicirculus (§. 135 *Geom.*), consequenter angulus EBD rectus (§. 317 *Geom.*), adeoque EB ad BD perpendicularis (§. 78 *Geom.*). Quare si BD sumatur pro sinu toto; erit EB tangens anguli EDB (§. 7. 8). Est vero $o = x + y$ (§. 239 *Geom.*) & inde ob $u = \frac{1}{2}o$ (§. 313 *Geom.*), $u = \frac{1}{2}(x + y)$. Ergo EB tangens semisummæ angulorum quæsitorum x & y . Quoniam $x = u + n$ (§. 239 *Geom.*); erit n semidifferentia angulorum x & y (§. 39). Sumto itaque DB denuo pro radio si describatur arcus DG (§. 131 *Geom.*) & in D excitetur perpendicularis DF (§. 249 *Geom.*); erit DF tangens anguli n (§. 7. 8), hoc est, semidifferentiæ angulorum quæsitorum x & y per demonstr. Jam cum anguli EBD & FDB sint recti per demonstr. & hinc FD & EB parallelae (§. 256), adeoque BED & FDE æquales (§. 233 *Geom.*), item verticales ad C æquales (§. 156 *Geom.*): erit $CE : EB = CD : DF$ (§. 266 *Geom.*), consequenter & $CE : CD = EB : DF$ (§. 173 *Aritm.*). Data itaque per tangentem DF angulorum quæsitorum semidifferentia, reliqua in resolutione manifesta sunt per lemma precedens (§. 39). *Q. e. d.*

PROBLEMA XVI.

41. *Datis tribus lateribus AB, BC Tab. I. & CA, invenire angulos A, B & C. Fig. 8.*

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Ex vertice anguli A latere minimo AB describatur circulus (§. 131 *Geom.*); erit ob $AD = AB$ (§. 40 *Geom.*) CD summa crurum AC & AB; CF vero differentia eorundem. Et ideo inferre licet (§. 333 *Geom.*);
ut Basis BC
ad summam crurum CD,
Ita differentia crurum CF
ad segmentum basis CG.
2. Inventum adeo segmentum CG (§. 302 *Aritm.*) si subtrahatur a basi CB; relinquitur chorda GB.
3. Demittatur ex A perpendicularis AE ad chordam GB (§. 216 *Geom.*), erit $BE = EG = \frac{1}{2}GB$ (§. 291 *Geom.*). Datis adeo in triangulo rectangulo AEB lateribus AB & BE, & in altero ACE lateribus AC & CE; inveniuntur anguli B atque A, (§. 38).
Q. e. f. & d.

E. gr. Sit $AB = 36'$, $AC = 45'$, $BC = 40'$;
erit $AC = 45'$ $AC = 45'$
 $AB = 36$ $AB = 36$

$AC + AB = 81.$ $FC = 9.$

Log. BC = 1.6020600

Log. AC + AB = 1.9084850

Log. FC = 0.9542425

Logg. summa = 2.8627275

Log. CG = 1.2606675

cui in tabulis quam proxime respondent
 $18' 2'' 2'''$ (S. 355. *Arithm.*).

$BC = 4000'''$ $EG = 1089'''$
 $CG = 1822$ $CG = 1822$

$BG = 2178$ $CE = 2911$

$BE = 1089$

$\text{Log. AB} = 3.5563025$
 $\text{Log. Sin. tot.} = 10.0000000$
 $\text{Log. EB} = 3.0370279$

$\text{Log. Sin. EAB} = 9.4807254$

cui in tabulis quam proxime respondent $17' 36''$, adeoque angulus ABE $72^\circ 24'$ (S. 241 *Geom.*).

$\text{Log. AC} = 3.6532125$

$\text{Log. Sin. tot.} = 10.0000000$

$\text{Log. CE} = 3.4640422$

$\text{Log. Sin. EAC} = 9.8108297$, cui in tabulis quam proxime respondent $40^\circ 10'$. Ergo ACE $49^\circ 42'$ (S. 241 *Geom.*) & CAB $57^\circ 54'$ (S. 86 *Arithm.*).

CAPUT III.

De usu Trigonometriae Planæ in Geometria Practica.

PROBLEMA XVII.

42. **C**onstruere instrumentum transportatorium rectilinum, hoc est scalam secundum eam proportionem divisam, quam habent subtense arcuum ad radium.

RESOLUTIO.

1. Ex communi canone sinuum excerpantur sinus arcuum $2^\circ 30'$, 5° , $7^\circ 30'$, 10° , $12^\circ 30'$ &c. nempe in progressionem arithmetica progredientium, in qua terminorum differentia est $2\frac{1}{2}$. Eos multiplica per 2; erunt facta chordæ arcuum 5, 10, 15, 20, 25 &c. (S. 2): ut hic in tabella factum vides.

Gr.	Chor. dimid.	Chor. integ.	Gr.	Chor. dimid.	Chor. integ.
5	43.6	87	50	422.6	845
10	87.1	174	55	461.7	923
15	130.5	261	60	500.0	1000
20	173.6	347	65	537.2	1074
25	216.4	433	70	573.5	1147
30	258.8	517	75	608.7	1217
35	300.7	601	80	642.7	1285
40	342.0	684	85	675.5	1351
45	382.6	765	90	707.1	1414

2. Ducatur recta AD & ad eam erigatur perpendicularis AB (S. 212 *Geom.*) pro arbitrio in quinque, decem, viginti, &c. partes æquales dividenda, prout vel solos gradus, vel gradus dimidios, vel par-

Tab.I. Fig.9.

partes quartas &c. indicare debent subtenſæ.

3. Per ſingula diſiſionum puncta agantur rectæ ipſi AD parallelæ (§. 258 *Geom.*).

4. In lineam AD, incipiendo ſemper a puncto A, transfer particulas chordarum integrarum gradibus 5°, 15°, 25°, 35° &c. reſpondentes ex ſcala Geometrica in particulas minutiffimas diſiſa (§. 277 *Geom.*): in linea vero ſuperiori BC eodem modo deſignentur particulæ chordarum reſpondentes gradibus 10, 20, 30, 40, 50 &c. Quodſi ſcala Geometrica non continet particulas adeo minutas, quales deſiderantur; utendum eſt chordis dimidiis: quod perinde ac ſi particulæ in ſcala bifariam dividerentur. Negligenda autem eſt nota puncto a reliquis ſeparata, vel ſi major fuerit, ejus loco addenda eſt unitas ultimæ earum, quæ retinentur. E. gr. loco 258.8 aſſume 259. Ultimas nimirum notas ideo adjecimus, ut appareret, quomodo earum dupla pro chordis computata fuerint.

5. Ducantur tranſverſæ ex B in 5, ex 5 in 10, ex 10 in 15, ex 15 in 20, ex 20 in 25 &c.

Cum enim A 5, B 10 &c. ſint chordæ 5, 10 &c. graduum & chordæ a quinis ad quinos gradus fere arcubus proportionaliter creſcant, erit *c* 1 ſubtenſa arcus 1°, *d* 2 ſubtenſa 2 &c. graduum (§. 268 *Geom.*).

COROLLARIUM I.

43. Quia ſubtenſa 60° eſt radius (§. *Wolffii. Oper. Mathem. Tom. I.*

356 *Geom.*); anguli quantitatem inveſtigaturus intervallo B 60 deſcribat ex vertice anguli intra crura ejus arcum, qui eſt meſura ipſius (§. 57 *Geom.*), & ejus chordam ad ſcalam applicet, quæ, ſi e. gr. ex *d* in 42 pertingat, oſtendit angulum eſſe 42°.

COROLLARIUM II.

44. Angulus datæ quantitatis conſtruetur, ſi radio B 60 deſcribatur ex centro B arcus CF & ſubtenſa gradus dati e. gr. 23, in ſcala reperta transferatur ex C in D. Erit enim DC meſura anguli B (§. 57 *Geom.*), adeoque tot graduum, quot arcus continet (§. 59 *Geom.*).

SCHOLIUM.

45. Hujus instrumenti beneficio quantitatem angulorum etiam in ſcrupulis ſatis accurate explorari experientia loquitur.

PROBLEMA XVIII.

46. Circulo polygonum regulare inſcribere & circumſcribere.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Aſſumto radio 10000 partium, quales in Canone triangulorum habere ſupponitur, inde excerptur ſinus ejus arcus, qui prodit, peripheria integra 360° per duplum numerum laterum polygoni, aut (quod perinde eſt) ſemiperipheria, hoc eſt 180°, per numerum laterum polygoni diſiſa. Illius enim duplum eſt chorda arcus dupli (§. 2), adeoque latus AB polygoni circulo inſcribendi (§. 342 *Geom.*).

2. Quodſi radius circuli, cui e. gr. pentagonum inſcribendum, detur juxta certam aliquam meſuram, e. gr. 345''; latus polygoni in eadem

F f men-

mensura invenitur per regulam trium (§. 302 *Arithm.*), inferendo nempe

$$\begin{array}{r}
 10000 - 1176 - 3450 \\
 \underline{\quad\quad\quad 3450} \\
 58800 \\
 4704 \\
 \underline{\quad\quad\quad 3528}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 4057 \mid 200 (4^\circ 0' 5'' 7''' \text{ Lat.} \\
 1 \quad 0 \mid 000 \text{ Pentag.}
 \end{array}$$

3. Dato radio describatur circulus & in eo applicetur latus polygoni, quoties fieri potest (§. 342 *Geom.*).
4. Polygono regulari circulo inscripto simile circumscribetur (§. 355 *Geom.*).

SCHOLIION.

47. Ne molesta sit rationis lateris polygoni ad radium ex canone sinuum investigatio, in tabula hic exhibemus latera polygonorum istiusmodi particulis expressa, qualium radius habet 10000000: In praxi tot nota versus dextram rescantur, q̄ ot per circumstantias singulares superflue judicabuntur.

Num. Later.	Quantitas Lateris	Num. Later.	Quantitas Lateris
III	17320508	VIII	7653668
IV	14142135	IX	6840402
V	11755705	X	6180339
VI	10000000	XI	5634651
VII	8677674	XII	5176380

PROBLEMA XIX.

Tab. I. 48. Super data recta AB polygonum
Fig. II. regulare describere: & dato polygono regulari ABCDE circumscribere.

RESOLUTIO.

Non alia re opus est, quam ut ratione lateris ad radium ex tabula præcedente assumpta queratur radius in ea mensura, in qua datur latus AB (§. 302 *Arithm.*): dato enim latere AB & radio AL, polygonum describi potest (§. 342 *Geom.*). Si vero intervallo radii ex A & B super latere polygoni uno fiat intersectio in L, habebitur centrum L circumscribendi circuli (§. 37 *Geom.*).

PROBLEMA XX.

49. Datis sinu verso AB & sinu BC Tab. I.
in mensura communi, non in particulis Fig. 12.
radii decimalibus, invenire arcum FAC
in gradibus.

RESOLUTIO & DEMONSTRATIO.

1. Queratur ex his datis semidiameter AD (§. 328 *Geom.*).
2. Datis jam in triangulo DBC præter rectum B (§. 3) lateribus BC & DC, invenitur angulus ADC (§. 40): qui indicat numerum graduum in arcu AC (§. 59 *Geom.*), cujus duplus est arcus FC (§. 291 *Geom.*). Q. e. i. & d.

SCHOLIION.

50. Hujus problematis usus est in inveniundo segmento circuli (§. 436 *Geom.*).

PROBLEMA XXI.

51. Datis in figura rectilinea qua- Tab. I.
cunque omnibus lateribus AB, BC, Fig. 13.
CD, DE, EA & angulis o & y; invenire diagonales.

RESOLUTIO.

1. In Δ ABE datis duobus lateribus AB & AE una cum angulo o invenitur primum angulus A (§. 40); dein diagonalis BE (§. 36).

2. Eo-

2. Eodem modo resolutio triangulo BCD invenitur diagonalis BD. *Q. e. f.*

PROBLEMA XXII.

Tab. I. Fig. 13. 52. *Datis in figura rectilinea qua- cunque duobus lateribus AB & BC, una cum diagonalibus BE & BD at- que angulis o, x & y; invenire late- ra reliqua CD, DE & EA.*

RESOLUTIO.

1. Datis in triangulo ABE duobus la- teribus AB & BE cum angulo in- tercepto *o* invenitur primum angu- lus *u* (§. 40) & deinde porro AE (§. 36).
2. Eodem prorsus modo in triangulis reliquis BED & BCD investigantur latera ED & DC. *Q. e. f.*

PROBLEMA XXIII.

Tab. I. Fig. 13. 53. *Datis in figura rectilinea qua- cunque omnibus lateribus AB, BC, CD, DE, EA & tot angulis quot sunt latera demtis tribus, C & D, invenire diagonales BD & BE.*

RESOLUTIO.

1. In triangulo BCD datis lateribus BC & CD cum angulo intercepto C investigetur angulus *m* (§. 40), quo ex angulo D subducto relin- quitur angulus *n*, atque porro dia- gonalis BD (§. 36).
2. Datis jam in triangulo BDE lateri- bus BD & DE cum angulo intercep- to *n*, eodem prorsus, quo ante, mo- do reperitur diagonalis BE. *Q. e. f.*

PROBLEMA XXIV.

Tab. II. Fig. 22. 54. *Datis in figura rectilinea qua-*

cunque latere AB una cum angulis o, x, y, e, u & n; invenire diago- nales AC, AD, BD & BE una cum lateribus BC & AE.

RESOLUTIO.

1. Datis in triangulo ABC angulis *o* & B (= *e + u + n*) una cum latere AB in- veniuntur latus BC & diagonalis AC (§. 36).
2. Similiter datis in triangulo ABD angulis *o + x* & *e + u* una cum la- tere AB, inveniuntur diagonales BD & AD (§. cit.).
3. Denique datis in triangulo ABE angulis A (= *o + x + y*) & *e* una cum latere AB, inveniuntur latus AE & diagonalis BE. *Q. e. f.*

SCHOLIUM.

55. *Cum Ichnographia arearum optime perficiantur, datis omnibus lateribus item- que diagonalibus (§. 363. Geom.); horum problematum in planimetria usus est non con- temnendus. Qui tamen praxi operam dant molestias calculi fugiunt; lucro magis quam accuracioni inteni.*

PROBLEMA XXV.

56. *Metiri distantiam duorum lo- corum BC ex eodem tertio A accesso- rum.*

Tab. I. Fig. 14.

RESOLUTIO.

1. Investigetur quantitas anguli A, puncto A ad arbitrium assumpto (§. 152 *Geom.*), nec non rectorum AB & AC (§. 126 *Geom.*).
2. Datis in Δ BAC duobus lateribus AB & AC cum angulo intercepto A, inveniatur primum angulus B (§. 40) & hinc porro distantia BC (§. 36). *Q. e. f.*

S C H O L I O N.

57. *Exempla non addimus, cum problema-
ta, quibus triangula in hac trigonometria ap-
plicatione solvuntur, jam in superioribus fue-
rint exemplis illustrata. Ut tamen de commo-
da stationis electione A judicari possit, qua-
dam adhuc addenda sunt. Nimirum lineas AB
& AC, quæ sunt latera trianguli resolvendi
BAC satis accurate in campo metiri licet (S.
126): sed in metiendo angulo facile aliquot
scrupulis primis vel in excessu, vel in defectu
peccamus: cum tamen hoc angulo erroneo in
calculo utamur tanquam vero, fieri omnino
non potest quin distantia erronea obtineatur.
Quamobrem de quantitate erroris admittendi
hic nobis dispiciendum.*

T H E O R E M A V.

Tab. II. Fig. 15. 58. *Si error aliquot scrupulorum in
quantitate anguli A admittatur, late-
rum vero BA & AC magnitudo fuerit
accurata; erit arcûs CD errorem CAD
metientis quantitas, ad DE differentiam
distantiæ veræ BC ab erronea per calcu-
lum producta BD; ut sinus totus, ad si-
num anguli BCA, qui lateri AB oppo-
nitur.*

D E M O N S T R A T I O.

Etenim si in angulo BAC metiendo
peccetur, ut prodeat tantillo major
BAD, ob rectarum AC & AD æqua-
litate per hypoth. triangulum BAC de-
generat in alterum BAD. Describatur
ex A intervallo AC tanquam radio ar-
cus CD, qui per punctum D ob $AC = AD$
(S. 40 Geom.) necessario transit.
Quoniam angulus CAD non nisi aliquot
scrupulorum est, arcus exiguus CD,
qui eum metitur (S. 57 Geom.), pro
recta haberi, & si ejus ad periphe-
riam detur ratio, in eadem mensura
determinari potest, in qua datur latus

AC (S. 435 Geom.). Describatur simi-
liter ex centro B intervallo BC arcus
CE, qui ex eadem ratione pro recta
haberi poterit, critque ob $BC = BE$
(S. 40 Geom.) ED differentia inter dis-
tantiam veram BC & erroneam BD:
anguli vero ACD, BCE & CLD sunt
recti (S. 308 Geom.), consequenter
 $BCE = ACD$ (S. 145 Geom.), atque
adeo $BCA = ECD$ (S. 91 Arithm.).
Est vero ut sinus totus ad CD ita sinus
anguli ECD sive BCA per demonstr. ad
ED (S. 33): ergo etiam ut sinus totus
ad sinum, anguli BCA ita CD ad ED
(S. 173 Arithm.). Q. e. d.

C O R O L L A R I U M I.

59. Eodem ergo manente errore CD in
Angulo A metiendo admissio, error in dis-
tantiâ admissus ED major est, si angulus
BCA major fuerit; minor autem, si hic
quoque minor fuerit (S. 205. 206 Arithm.).

C O R O L L A R I U M II.

60. Statio itaque in A ea eligenda, quæ
acutum valde efficit angulum BCA (S. 59):
quod obtinetur, si angulus A fuerit major
recto (S. 240 Geom.) & latus $AC > AB$
(S. 189 Geom.).

C O R O L L A R I U M III.

63. Cum angulus BAD major sit angulo
BMD (S. 288 Geom.); præstat eligi statio-
nem A viciniorem, quam remotiorem
(S. 59).

S C H O L I O N.

61. *Supponimus hic parti lateris AB con-
gruere semidiametrum instrumenti goniome-
trici, dum angulum metimur, lateri vero
AC respondere regulam mobilem (S. 152.
Geom.).*

C O R O L L A R I U M IV.

63. Quoniam error ED in distantia desi-
nienda admissus major est, si quantitas ar-
cus CD major fuerit (S. 58), quantitas autem
arcus.

arcus CD major prædest, eodem errore CAD admissio si litus AC longius, quam si brevius fuerit, ideo hinc quoque patet, stationem viciniorē præstare remotiori.

SCHOLIUM.

64. Ceterum hinc apparet, præses accuratissimas esse, quæ solis lineis in campo mensuratis nituntur, ubi in earum positione ob errorem in angulorum quantitate commissum aberrari nequit. Dedimus hic speciem aliquod eorum, quæ circa præsin Geometriæ accuratam expendi merentur, ut ostenderemus, theoriam accuratam parere præsin accuratam, & ad theoriam perfectè ad discendam excitemus, qui olim præsi operam daturi. Falluntur enim, qui sibi persuadent, per theoriam addisci non posse certas præsin accuratarum circumstantias, tum demum observandas, ubi manum præsi admoveris. Etenim plurimque tantum confuse observantur; per theoriam vero accurate determinantur.

PROBLEMA XXVI.

Tab. I. 65. Invenire distantiam duorum locorum AC, quorum unus A tantum accessibilis.

RESOLUTIO.

1. Investigetur quantitas angulorum A & B, statione in B electa (§. 152 Geom.), itemque rectæ AB (§. 126 Geom.).
2. Inveniatur AC (§. 36). Q. e. f.

THEOREMA VI.

Tab. II. 66. Si in distantia AB ex duobus angulis A & ACB una cum latere AC investiganda nonnisi in angulo uno ACB metiendo aberretur; arcus BE, qui errorem in angulo ECD admissio metitur, erit ad BD differentiam inter distantiam veram AB & erroneam AD ut sinus anguli tertii o distantie stationum AC oppositi ad sinum totum.

DEMONSTRATIO.

Illud per se patet in hoc casu distantiam erroneam calculo productam AD continuo in directum jacere veræ AB, consequenter latus CD terminans angulum erroneum ACD secare distantiam veram in præsentē casu productam in D. Describatur ergo ex centro C radio CB arcus BE, qui est mensura erroris BCD (§. 57 Geom.), cumque nonnisi paucorum minorum sit ex hypothese, pro recta haberi potest. Quamobrem cum anguli BED & CBE sint recti (§. 309 Geom.), erunt anguli o & u (§. 147 Geom.), itemque u & x æquales recto (§. 241 Geom.), consequenter $o + u = x + u$ (§. 145 Geom.), atque ideo $o = x$ (§. 91 Arithm.). Est vero ut sinus anguli x (sive o per demonstr.) ad arcum BE; ita sinus totus ad BD (§. 33). Ergo BE est ad BD ut sinus anguli o ad sinum totum (§. 173 Arithm.). Q. e. d.

COROLLARIUM I.

67. Cum sinus anguli o majorem habeat ad sinum totum rationem, si major, quam ubi minor fuerit (§. 203 Arithm.); eodem errore in metiendo angulo ACB admissio, hoc est, arcu BE existente eodem, minor erit error in distantia determinanda admissus BD, ubi angulus o major, quam ubi minor fuerit (§. 206 Arithm.).

COROLLARIUM II.

68. Unde consequitur, talem hoc in casu fieri debere stationum A & C electionem, ut anguli A & C sint admodum obliqui, angulus vero o evadat recto proximus; id quod obtinetur, si anguli A & C junctim sumti tantillo excedant rectum (§. 240 Geom.).

COROLLARIUM III.

69. Anguli obtusi eundem sinum habent cum acutis, qui ipsis deinceps ponuntur (§. 5). Quamobrem si recto fuerint multo majores, perinde est in presenti casu, ac si angulus θ esset valde acutus. Quodsi autem angulum θ in electione stationum obtusum desideres, tantillo rectum excedere debet, consequenter anguli A & C simul a recto tantillo deficient necesse est.

COROLLARIUM IV.

70. Si angulus θ fuerit rectus, arcus BE cum ipsa BD coincidit, atque adeo errori in distantia admissio æqualis reperitur, ubi in eadem mensura determinatur, in qua datur distantia stationum AC ex radio nempe CB (§. 435 Geom.).

COROLLARIUM V.

71. Errore adeo in angulo C existente eodem, qui in distantia admittitur minimus omnium est, ubi angulus θ fuerit rectus.

THEOREMA VII.

Tab. II. Fig. 23. 72. Si in dimetienda distantia locorum AB ex duobus angulis A & C & uno latere AC error etiam in altero angulo metiendo A admittatur præter eum, qui in angulo C committitur; erit errorem in angulo A commissum metiens arcus DI distantia uno errore implicita AD tanquam radio descriptus ad errorem inde in distantia productum IH ut sinus anguli tertii θ quantitate erroris primi in diminuti ad ejus cosinum.

DEMONSTRATIO.

Etenim si AH fuerit recta positione data, in quam ob errorem in angulo A metiendo admissum promovetur distantia AB, recta errorem primum m terminans CD continuanda, donec illi

in H occurrat, eritque AH distantia ex duplici errore m & k admissio. Jam distantia uno errore implicita AD tanquam radio describatur arcus DI mensura erroris k (§. 57 Geom.); erit istum ad AD. tum ad AI perpendicularis (§. 309 Geom.), consequenter anguli DIH & ADI recti (§. 75 Geom.), cumque arcus DI sit paucorum minorum (§. 59 Geom.) pro recta haberi potest. Hinc porro ut in demonstratione præcedente colligitur esse $y = x = \theta - m$ (§. 239 Geom.). Est vero ut sinus anguli y ad DI ita sinus anguli z ad IH (§. 36). Ergo DI ad IH ut sinus anguli y ad sinum anguli z (§. 173 Arithm.), si ve cosinum anguli y (§. 241 Geom.). Q. e. d.

SCHOLIUM.

73. Si in dimetiendo angulo peccetur in defectu, error in distantia admissus eodem modo determinatur, nisi quod tum fiat subtractivus, atque adeo unus alterum imminuere, immo prorsus compensare possit, ubi alter additivus, alter subtractivus fuerit. Sed plura non addimus ob rationem paulo ante dictam.

PROBLEMA XXVII.

74. Invenire distantiam duorum locorum inaccessorum AB. Tab. II. Fig. 17.

RESOLUTIO.

1. Statione commoda in C electa investigetur quantitas anguli ACB, itemque angulorum D & E atque BCE (§. 152 Geom.), punctis D & E cum C in eadem linea designatis (§. 125 Geom.).
2. Investigetur etiam quantitas rectarum DC & CE (§. 126 Geom.).

3. Sum-

3. Summa angulorum ACB & BCE, itemque BCE & E subtrahatur ex 180° , ut relinquatur anguli ACD & CBE (§. 148 *Geom.*): eodemque modo inveniatur angulus DAC.
4. Datis jam in triangulis DAC & CBE angulis cum latere uno, nempe DC in primo, CE in altero, inveniuntur AC & CB (§. 36) & hinc porro angulus CAB (§. 40), tandemque AB (§. 36).

PROBLEMA XXVIII.

Tab. II. Fig. 18. *75. Invenire altitudinem accessibilem AB.*

RESOLUTIO.

1. Statione in E electa instrumentoque (§. 284 *Geom.*) rite collocato, investigetur quantitas anguli ADC (§. 152 *Geom.*).
2. Quæraturn porro distantia stationis ab altitudine DC (§. 126 *Geom.*), quæ erit ad AC perpendicularis (§. 227 *Geom.*).
3. Cum adeo C sit rectus (§. 78 *Geom.*), in triangulo ACD inveniatur AC (§. 36).
4. Huic si addatur BC; prodibit altitudo integra AB. *Q. e. i.*

THEOREMA VIII.

Tab. II. Fig. 19. *76. Si in quantitate anguli A investiganda aberretur, erit altitudo vera BD ad falsam BC ut tangens anguli veri DAB ad tangentem anguli erronei CAB.*

DEMONSTRATIO.

Assumpto AB pro sinu toto, erit DB tangens anguli DAB; CB autem tangens anguli CAB (§. 7). Sunt itaque

altitudines BD & BC ut tangentes angulorum DAB & BAC. *Quod erat unum.*

Eodem modo se habet demonstratio, si angulus erroneus sit minor vero.

COROLLARIUM I.

77. Quoniam posita eadem quantitate anguli veri atque erronei eadem est ratio altitudinis veræ ad erroneam (§. 76); error plurimum pedum committitur in altitudine majore quam in minore.

COROLLARIUM II.

78. Quia tangentes arcuum majorum & valde exiguorum seu recto vel minuto proximorum minorem rationem inter se habent quam tangentes mediocrium seu semirecto vicinorum, minore nempe ad majorem relata, canone tangentium teste; si idem error committitur in angulo majore aut valde exiguo & mediocri; error in altitudine admittus major erit in casu priore, quam in posteriore.

SCHOLIUM.

79. Sit e. gr. angulus verus BAD 30° , AB $67'$: erit altitudo vera $5^\circ 8' 6''$. Ponamus assumi angulum erroneum BAC 31° : is producet altitudinem erroneam BC $4^\circ 0' 2''$ (§. 36). Sit in distantia minore DE angulus DEB recto proximus 86° & assumatur per errorem angulus 87° : reperietur altitudo erronea $5^\circ 1' 6''$, quæ erroneam supra inventam excedit $1^\circ 1' 4''$.

COROLLARIUM III.

80. Quoniam itaque in distantia minore EB angulus E major est quam DAB in majore AB (§. 188 *Geom.*), in distantia autem valde remota difficulter anguli admodum exigui quantitas exacte determinatur: in metiendis altitudinibus distantia stationis ab altitudine assumenda est mediocris, ita ut angulus DEB non multum abeat a semirecto.

THEO-

THEOREMA IX.

Tab.II. 81. Si instrumentum in *A* non fuerit horizontaliter collocatum, sed vel Fig.20. quantitate anguli *BAD* versus horizontem inclinatum vel quantitate anguli *EAB* ab eodem reclinatum; erit altitudo vera ad falsam ut tangens anguli veri *CAB* ad tangentem erronei *CAD* vel *CAE*.

DEMONSTRATIO.

Sumto enim *AB* pro radio, *CB* est tangens anguli veri *CAB* (§. 7). Inferendum ergo: ut sinus totus ad tangentem *CAB* ita *AB* ad altitudinem veram. Inferitur autem per errorem: ut sinus totus ad tangentem *CAD* ita *AB* ad altitudinem erroneam. Quamobrem ut tangens *CAB* ad tangentem *CAD* ita altitudo vera ad erroneam (§. 196 *Arithm.*). Quod erat primum.

Idem eodem modo ostenditur, si instrumentum quantitate anguli *EAB* a situ horizontali reclinetur. Quod erat alterum.

SCHOLIUM.

82. Eadem ergo hic locum habent corollaria, qua modo theoremati precedenti subiecimus. Caterum patet altitudines exactas non inveniri ob duplicem errorem, ex vitioso

nempe situ tam linea *AC*, quam *AB* commissum.

PROBLEMA XXIX.

83. Metiri altitudinem inaccessam Tab.II. *AB*. Fig.21.

RESOLUTIO.

1. Eligantur duæ stationes *G* & *E* cum altitudine *AB* in eadem recta (§. 284 *Geom.*) tanto intervallo *DF* distantes, ut angulus *FAD* non sit nimis exiguus, nec altera statio *G* nimis vicina altitudini *AB* (§. 78. 80).
2. Investigetur quantitas angulorum *ADC*, *AFC* & *CFB* (§. 152 *Geom.*), itemque distantiae *FD* longitudo (§. 126 *Geom.*).
3. Inveniatur primum in triangulo *AFD*, ex datis angulo *D* per observationem, & angulo *AFD* (§. 149 *Geom.*) & latere *FD*, latus *AF* (§. 36); dein, ex notis in triangulo *ACF* præter rectum *C* angulo *F* & latere *AF*, latus *AC* itemque *CF* (§. 36); tandem, ex cognitis in triangulo *FCB* præter rectum *C* angulo *CFB* & latere *CF*, latus *CB* (§. 36).
4. Addantur *AC* & *CB*. Ita prodit altitudo quaesita *AB* (§. 86 *Arithm.*).

Finis Trigonometriae planæ.

Fig: Trigonometr. Tab: I.


















Fig: 15.




Fig: 23.





Fig: 17.




Fig: 18.




Fig: 21.




Fig: 19.




Fig: 20.





Fig: 22.



E L E M E N T A
ANALYSEOS MATHEMATICÆ
TAM FINITORUM QUAM INFINITORUM.

P R Æ F A T I O.



PICEM totius Eruditionis humanæ conscendimus Analyſin tradituri : eſt enim Ars , per calculum quantitatum generalem , proprio Marte inveniendi veritates in Matheſi non minus pura , quam applicata. Elementis Arithmeticæ communis atque Geometriæ hæcenus expoſitis inſtructus & Analyſi adjutus multa inveniet , quæ ex aliorum ſcriptis non ſine tædio alias haurire deberet ; immo omnibus adhuc ignorata detegit. Ea vero perfectiſſima eſt ſtudioſorum noſtrorum ratio , quæ paucis memoriæ mandatis aptos reddit ad inveniendum quodlibet , eo maxime tempore , quo ejus cognitione opus. Nec major intellectus perfectio concipitur promptitudine , ex datis quibusdam , alia incognita eliciendi. Accedit , in moderna Analyſi , artis ratiocinandi perfectiſſima occurrere exempla. Notiones enim ſignis expreſſæ imaginationi præſentia ſiſtunt , quæ alias ultra ejus ſphæram aſcenderent : longa ratiociniorum ſeries , quibus non ſine multa attentione ac circumſpectione notionum nexus detegitur , in artem ſignorum combinatoriam convertitur , conſtanter eandem & principiis paucis ac manifeſtis ſuperſtructam. Illud autem proſus mirabile exiſtit , ope Analyſeos unica ſæpius linea tot veritates exprimi , quas juxta communem methodum exponendas ac demonſtrandas volumina integra non caperent. Hinc , unius lineæ intuitu ,

integras fere disciplinas, paucorum minorum spatio, addiscere licet, quibus, juxta communem methodum comprehendendis, anni complures vix sufficerent. Solidam ergo in Mathesi eruditionem consecuturus Analyfi studeat opus est. Ne autem, non tam difficultate (ea enim revera nulla est), quam novitate rei deterritus a præstantissimo studiorum genere arceatur; Arithmeticam speciosam familiarem sibi reddat, neglectis sub initium regularum rationibus, sicubi difficultatem faceffant, & exemplis numericis in locum earundem substitutis. Ubi ad exempla Algebraica pervenerit, non inutile judicamus, ut tyrones data per numeros variis modis explicent & idem problema in casibus specialibus aliquoties solvant: ita enim futurum, ut calculo facilius adsuescant & ejus rationes simplices perspiciant. Neque vero putandum est, integram Analyfin jamdum esse inventam; quin potius tenendum, plurima adhuc subsidia deesse posterorum industria detegenda. Certe quæ in elementis Geometriæ docuimus, per modernam Analyfin non omnia eruuntur, inprimis si a linearum & superficierum situ pendent. Quamobrem *Leibnitius*, vir in omni eruditione summus, pro ea, quæ ipsi est, ingenii perspicacitate novam quandam *Analyfin situs* excogitavit, peculiari calculi generi (quem *calculus situs* appellat) superstructam, a calculo magnitudinum, quibus in nostra Analyfi utimur, toto cœlo differentis. Immo qui hæctenus reperta animo comprehenderit & ad solvenda problemata cum cura adhibuerit, pluribus regulis inveniendi artem ipse locupletabit. Ceterum quæ vel in Arithmetica, vel in Geometria elementari studio prætermiffa, ea per Analyfin eruimus, ex Geometria quoque sublimiori investigantes, quæ præ reliquis scitu necessaria.



E L E M E N T A
ANALYSEOS MATHEMATICÆ.

P A R S P R I M A,

E L E M E N T A A N A L Y S E O S
F I N I T O R U M T R A D I T.

S E C T I O P R I M A,

D E A R I T H M E T I C A S P E C I O S A.

C A P U T P R I M U M.

De Arithmetica Rationalium.

DEFINITIO I.

1. **A**NALYSIS *Mathematica* est
Methodus resolvendi proble-
mata *Mathematica*.

DEFINITIO II.

2. *Arithmetica speciosa* est, quæ
computum quantitatum seu numero-
rum indeterminatorum docet. Voca-
tur etiam *Logistica speciosa*.

HYPOTHESIS I.

3. *Quantitatum datarum signa sint*
literæ alphabeti priores, a, b, c, d
&c. quesitarum postremæ z, y, x &c.
Quantitates æquales eadem litera in-
digitentur.

SCHOLION I.

4. *Nempe cum quantitates datæ ac qua-*
sitæ tanquam distinctæ intellectui represen-
tentur per diversas notiones; eadem quoque
tanquam distinctæ representandæ sunt imagi-
nationi per signa diversa.

SCHOLION II.

5. *Nos Cartesium sequimur in Geome-*
tria. Angli nonnulli, exemplo Harrioti in
Artis Analyticæ praxi, incognitas quantitates
vocalibus; cognitæ consonantibus designant.
Vieta hujus Logisticæ inventor usus est literis
majoribus; qui eam primus perfecit Har-
riotus & ipsum secutus Cartesius literas mi-
nores substituerunt.

HYPOTHESIS II.

6. Si quantitatū denominandarū quaedam relationes mutue dantur, aut aliunde tanquam cognitæ supponi possunt; eas quoque in denominatione exprimi consultum est.

E. gr. Si fuerint duæ quantitates quæsitæ, quarum una alterius tripla, & una vocetur x , major rectius dicetur $3x$, quam y . Similiter cum quantitas major sit aggregatum ex semisumma duarum quantitatū & earundem semidifferentia; minor vero differentia inter semisummam & semidifferentiam earundem quantitatū (§. 39 Trigon.) consultum sæpius est, ut semisumma dicatur x & semidifferentia y , atque hinc quantitas major $x + y$, minor $x - y$, quam ut ipsa major x & minor y vocetur.

SCHOLIUM.

7. Quinam fructus ex commoda quantitatū denominatione expectandi, ex subsequenibus patebit. Breviatur calculus idemque facilitatur: resolutiones problematum sæpe magis genuinæ inveniuntur. Alii suo loco sese offerent. Plura circa denominationem moneri possent, nisi consultius iudicarem ea per exemplum, quam per præcepta doceri.

HYPOTHESIS III.

8. Signa operationum arithmeticarum retineantur, quæ in Arithmetica communi tradidimus (§. 63. 65. 68. 71. 254. 295.), nisi quod quantitates se mutuo dividentes, ubi commodum fuerit, instar fractionum scribantur.

E. gr. $\frac{a}{b} = a : b$; $\frac{3}{4} = 3 : 4$.

SCHOLIUM.

9. Vulgo multiplicationis signum est \times .

E. gr. ab scribitur $a \times b$. Sed cum hoc signum facile cum litera x a typhetis confundatur; usus ejus merito improbat.

HYPOTHESIS IV.

10. Si vel unus, vel ambo factores ex pluribus literis componuntur; compositi parenthesi () includuntur.

E. gr. factum ex $a + b - c$ in d ita scribitur: $(a + b - c)d$. Similiter factum ex $a + b - c$ in $d - g$ hunc in modum: $(a + b - c)(d - g)$.

SCHOLIUM.

II. Vulgo hæc facta ita scribunt.

$d \times a + b - c$ & $a + b - c \times d - g$. Sed cum hæc scriptio typhetis molestias creet, imprimis si ex alio capite linearum supra literas ducendarum numerus multiplicatur, signis Leibnitianis utendum esse iudicamus, quæ non inutiliter in Actis Eruditorum Lipsiensibus usurpantur & ab admodum R. P. Guidone Grando (a) in Italia primum introducta.

HYPOTHESIS V.

12. Si quantitatū se mutuo dividendum una, vel ambæ ex literis pluribus componuntur; signo parenthesos () similiter utimur, nisi circumstantiæ singulares suadeant, eas fractionum instar scribi.

E. gr. Quotus ex $a + b$ per c ita scribitur; $(a + b) : c$. Quotus vero ex $a + b$ per $c - d$ ita exprimitur; $(a + b) : (c - d)$. Similiter $a : (a + b)$ designat quotum ipsius a per $a + b$ divisi. Iidem quoti communiter ita scribuntur: $\frac{a+b}{c}$, $\frac{a+b}{c-d}$, $\frac{a}{a+b}$.

HYPO-

(a) In Quadratura circuli & Hyperbolæ part. 2. p. m. 58.

HYPOTHESIS VI.

13. *Exponentes indeterminati tam rationum, quam dignitatum indicentur per m, n, r, s, t &c.*

E. gr. x^m, y^n, z^r &c. designant potentias indeterminatas diversi generis (S. 254 Arith.); mx, ny, rz multipla vel submultipla diversa quantitatum x, y, z , prout m, n, r vel numeros integros, vel fractos designant (S. 136 Arithm.).

HYPOTHESIS VII.

14. *Si radix ex pluribus literis componitur, parenthesi includitur & exponens ipsi suffigitur, ut ante.*

E. gr. $(a + b - c)^2$ designat quadratum ex $a + b - c$; $(a + b - c)^n$ potentiam quamlibet seu indeterminatam ipsius $a + b - c$.

SCHOLIION.

15. *Communiter ita scribunt $\frac{a+b-c}{a+b-c}^m$*

DEFINITIO III.

16. *Quantitas signo + affecta dicitur positiva, item affirmativa atque nihilo major: quæ vero signo — afficitur, privativa, item negativa atque nihilo minor, a nonnullis absurda.*

COROLLARIUM I.

17. Quoniam + est signum additionis (S. 63 Arithm.); — vero signum subtractionis (S. 65 Arithm.): quantitas positiva prodit, si vera aliqua nihilo additur, e. gr. $0 + 3 = +3, 0 + a = +a$; privativa relinquitur, si quantitas aliqua vera ex nihilo subtrahitur. e. gr. $0 - 3 = -3, 0 - a = -a$.

SCHOLIION.

18. *Ponamus, te habere nummorum nihil, tibi que donari 100: habebis ergo 100 nummos, adeoque plus nihilo. Plus nempe habes quam ante. Hi nummi quantitatem positivam constituunt. Ponamus e contrario, te nihil habentem solvere debere 100 nummos, 200 ergo nummorum debitum contrahes,*

adeoque, antequam solutio fiat, minus nihilo habebis. Solvendi enim sunt 100 nummi, ut nihil habeas. Hoc debitum quantitas negativa est. Notandum vero quantitates positivas initio vel solitarie positas signo nullo affici. Cur vero positivæ dicantur nihilo majores, negativæ nihilo minores; ex corollario patet.

COROLLARIUM II.

19. Sunt adeo quantitates privativæ verarum, per quas intelliguntur, defectus; consequenter non quantitates veræ.

SCHOLIION II.

20. *Defectum per eam quantitatem metimur, quæ deficit, & sic intelligibilis evadit.*

COROLLARIUM III.

21. Si residuo additur, quod fuerat ablatum, ea prodit quantitas, ex qua subtractio facta (S. 106 Arithm.). Ergo $-a + a = 0, -3 + 3 = 0$ (S. 17): hoc est, $-a$ & $+a$, itemque -3 & $+3$ se mutuo destruant.

COROLLARIUM IV.

22. Quoniam defectus unus alterum excedere potest (e. gr. si 7 deficiunt, plura desunt, quam ubi 3 deficiunt), quantitates vero privativæ sunt verarum defectus (S. 19); ideo quantitas una privativa aliquoties sumpta alteram superare potest. Quamobrem quantitates privativæ inter se homogeneæ sunt (S. 32 Arithm.).

COROLLARIUM V.

23. Sed quia defectus positivæ quantitatis aliquoties sumtus positivam superare nequit, cum potius multo magis ab ea deficiat (S. 17); quantitates privativæ positivis heterogeneæ sunt (S. 32 Arithm.).

COROLLARIUM VI.

24. Cum adeo quantitates privativæ positivis heterogeneæ (S. 23), privativis homogeneæ sint, (S. 22); inter privativam & positivam ratio intercedere nequit, inter privativas vero ratio datur (S. 126 Arithm.). E. gr. $-3 a : -5 a = 3 : 5$.

SCHOLIION III.

25. Non mirum videri debet inter quantitates privativas $-3a$ & $-5a$ eandem esse rationem, que est inter positivias $+3a$ & $+5a$. Quod enim quantitates quatuor, quarum binæ binis heterogeneæ sunt, proportionales esse possint, tum ex rationum doctrina intelligitur, tum ex Geometria manifestum est, in qua eandem rationem inter lineas esse demonstravimus, que inter superficies datur. E. gr. Parallelogramma æqualium basium rationem altitudinum habent (§. 389 Geom.) & in praxi regulæ trium pretia sumuntur ut mercium quantitates; licet pretia mercibus heterogenea sint. Falluntur autem, qui inter 1 & -1 atque inter -1 & 1 rationem eandem esse sibi persuadent (§. 24).

THEOREMA I.

26. Quantitas qualibet pro unitate assumi potest.

DEMONSTRATIO.

Quantitas enim quælibet in se una est (§. 3 Arithm.), nec ad aliam determinatam tanquam ad unitatem jam refertur (§. 13 Arithm.). Ergo ipsa pro unitate assumi potest (§. 4 Arithm.). Q. e. d.

PROBLEMA I.

27. Quantitates tam eodem, quam diversis signis affectas addere.

RESOLUTIO.

1. Si quantitates eadem litera notatæ eodem signo afficiuntur; numeri iis præfixi adduntur ut in Arithmetica communi.
2. Si signis diversis afficiuntur, additio mutatur in subtractionem & residuo præfigitur signum majoris.
3. Quantitates diversis literis notatæ junguntur mediante signo $+$ (§. 3).

$$\begin{array}{r} 4a + 2b - 2c - 5d - g \quad a - b \\ 5a - 2b + 6c + 2d - 3g \quad c \end{array}$$

$$9a \quad + 4c - 3d - 4g. \quad a - b + c$$

DEMONSTRATIO.

Cum litera quælibet, qua quantitas aliqua indigitatur, pro unitate assumi possit (§. 26); erit $a + a + a + a = 4a$, consequenter $4a + 5a = 9a$ (§. 96 Arithm.). Eodem modo patet esse $-g - 3g = -4g$. Quod erat unum.

Quoniam $6c = 4c + 2c$, per demonstr. erit $6c - 2c = 4c + 2c - 2c$ (§. 91 Arithm.). Sed $2c - 2c = 0$ (§. 21). Ergo $6c - 2c = 4c$. Similiter $-5d = -3d - 2d$, per demonstr. Sed $-5d + 2d = -3d - 2d + 2d$ (§. 88 Arithm.) & $-2d + 2d = 0$ (§. 21). Ergo $-5d + 2d = -3d$. Quod erat alterum. Tertium per se patet (§. 8).

SCHOLIION.

28. Ut hic calculus facilius intelligatur, ponamus a denotare thalerum, b grossum, c nummum; habebimus

$$\begin{array}{r} 7a - 9b + 5c = 7 \text{ th.} - 9 \text{ gr.} + 5 \text{ num.} \\ 3a + 5b - 9c = 3 \quad + 5 \quad - 9 \end{array}$$

$$10a - 4b - 4c = 10 \text{ th.} - 4 \text{ gr.} - 4 \text{ num.}$$

Atque per idem exemplum facilius quoque capitur ratio, cur in casu diversitatis signorum additio in subtractionem mutetur & residuo signum majoris quantitatis relinquatur. Nimirum in summa 10 thalerorum deficiunt 9 grossi: quamobrem si quinque addantur, defectus minuitur & ad 4 reducitur. Quoniam vero non 5 grossi integri, sed demtis 9 nummis, summa adficiendi, summa 10 th. - 4 gr. excedit genuinam 9 nummis, qui adeo auferendi. Jam cum in nume-

numero superiori, cui inferior additur, occurrant 5 nummi, hi quidem actu auferri possunt: qui vero adhuc desiderantur 4, tanquam defectus notandi. Et hęc quidem ratione regula a primo inventore detecta.

THEOREMA II.

29. In subtractione quantitatum compositarum signa subtrahendę mutantur in contraria, nempe + in — & — in +.

DEMONSTRATIO.

Si $c + d$ fuerit subtrahenda ex $a + b$; differentiam esse debere $a + b - c - d$, adeoque signa + in quantitate subtrahenda in — mutari, ex *hypoth.* 3 (§.8) patet. Sed si $c - d$ subtrahenda ex $a + b$ & integrum c subtrahitur, quantitas major subducta, quam fieri debebat. Ergo quod plus iusto subtractum est d , iterum addendum. Prodit ergo $a + b - c + d$. Q. e. d.

PROBLEMA II.

30. Quantitates tam eodem, quam diversis signis affectas a se invicem subtrahere.

RESOLUTIO.

1. Si quantitates eadem litera notatę signa eadem habent & minor e maiore subtrahenda; subtractio ut in Arithmetica communi (§.103 *Arith.*) absolvitur.
2. Si vero major e minori subducenda; contraria ratione minor e maiore subtrahitur & residuo præfigitur signum —, si quantitates signo + afficiuntur; signum vero +, si signo — gaudent.
3. Si quantitates diversa signa habent; in additionem mutatur subtractio & aggregato præfigitur signum ejus

quantitatis, ex qua subtractio facta est.

4. Si quantitates diversis literis notatę, signa subtrahendę tantum in contraria mutantur.

$$8a - 5c + 9d = 8th. - 5gr. + 9num.$$

$$6a - 8c - 7d = 6 - 8 - 7$$

$$2a + 3c + 16d = 2th. + 3gr. + 16num.$$

$$9b + 15c - 7d + 8e - f$$

$$6b + 20c - 9d - 9e + 7f$$

$$3b - 5c + 2d + 17e - 8f$$

$$a + b - c$$

$$a + d$$

$$d - e + f$$

$$c - e - g$$

$$a + b - c - d + e - f \quad a + d - c + e + g$$

DEMONSTRATIO.

Cum quantitates eadem litera notatę sint vel unitates eadem, vel ejusdem unitatis multiplę aut submultiplę (§.26); erit $8a - 6a = 2a$ (§.35. 103 *Arithm.*). Quod erat unum.

Si quantitas major $20c - 9d$ ex minore $15c - 7d$ subtrahenda; erit residuum $15c - 7d - 20c + 9d$ (§.29). Sed $15c - 20c = -5c$ & $-7d + 9d = 2d$ (§.27). Ergo $15c - 7d - 20c + 9d = -5c + 2d$. Quod erat alterum.

Si $-9e + 7f$ subtrahi debent ex $8e - f$; erit residuum $8e - f + 9e - 7f$ (§.29). Sed $-f - 7f = -8f$ & $8e + 9e = 17e$ (§.27). Ergo $8e - f + 9e - 7f = 17e - 8f$. Quod erat tertium.

Quantum patet per theor. 2. (§.29).

Aliter.

1. Signa quantitatis subtrahendę mutantur in contraria (§.29): quo facto
2. Additio fiat (§.27), seu quę se mutuo destruunt deleantur.

E. gr.

E. gr. ex $9b + 15c - 7d + 8e - f$ subtrahi debet $6b + 20c - 9d - 9e + f$ fiat (§. 29) $+ 6b - 20c + 9d + 9e - f$; erit (§. 27) residuum $3b - 5c + 2d + 17e - 8f$. Nimirum $+ 6b - 6b, + 15c - 15c, - 7d + 7d$, se mutuo destruunt (§. 21).

S C H O L I O N.

31. Mirum videri poterat, quod cum quantitates privativæ positivis heterogeneæ sint (§. 23), heterogeneæ autem nec addi (§. 61 Arithm.), nec a se invicem subtrahi possint (§. 64 Arithm.), privativæ tamen positivis addantur & ab iis subtrahantur. Enim vero rem curatius perpendens animadvertes proprie loquendo, privativam nunquam addi positivæ, nec ab eadem subtrahi: sed in additione subtrahi, quod plus justo fuerat additum (§. 27); in subtractione addi, quod plus justo fuerat subductum (§. 30).

T H E O R E M A III.

32. Si quantitas positiva per positivam multiplicetur aut dividatur, in utroque casu quantitas prodit positiva.

D E M O N S T R A T I O.

Est enim in multiplicatione ut unitas ad factorem unum; ita alter ad productum (§. 66 Arithm.). Sed uterque factor est positivus, per hypoth. Ergo & factum positivum esse debet (§. 24). Quod erat unum.

Si $+a$ ducitur in $+b$, factum est $+ab$, per demonstr. Ergo si $+ab$ dividitur per $+a$, quotus erit $+b$; si per $+b$, quotus $+a$ (§. 210 Arithm.). Quod erat alterum.

T H E O R E M A I V.

33. Si quantitas negativa per positivam multiplicetur aut dividatur, in

utroque casu quantitas prodit negativa.

D E M O N S T R A T I O.

Multiplicare idem est ac quantitatem aliquam aliquoties sibi metipsum addere (§. 67 Arithm.). Est vero summa quantitatum negativarum negativa (§. 27). Ergo factum ex negativa in positivam negativum est. Quod erat unum.

Factum ex $-a$ in $+b$ est $-ab$ per demonstr. Ergo si $-ab$ dividitur per $+b$, quotus est $-a$ (§. 210 Arithm.). Quod erat alterum.

T H E O R E M A V.

34. Si quantitas negativa per negativam multiplicetur aut dividatur, quantitas positiva prodit.

D E M O N S T R A T I O.

Quantitas privativa per privativam proprie loquendo multiplicari nequit (§. 66 Arithm.): id quod ipsa notio quantitatis privativæ insinuat (§. 19), utpote quæ repugnat actui positivo, qualis est iterata ejusdem quantitatis additio, in qua multiplicatio consistit (§. 67 Arithm.). Quare hæc multiplicatio proprie tantum locum habet, ubi privativæ positivis junguntur, ita ut addi rursus debeat, quod plus justo fuerat subtractum: id quod evidentissime modo demonstramus.

Sit ACDB parallelogrammum rectangulum & in eo $AC = a$, $CD = b$. Ducatur EF ipsi CD parallela (§. 258 Geom.); erit ob rectos ad E & F (§. 230 Geom.) & $EF = AB$, itemque $AE = BF$ (§. 238 Geom.), ABFE rectangulum (§. 100 Geom.). Eodem modo ostenditur, ducta HG ipsi BD parallela; fo-

re GHBD & BHIF, consequenter AEIH rectangula. Sit ergo $AE=c$, $GD=d$: erit $EC=a-c$, $CG=b-d$, atque hinc $ACDB=ab$, $AEIH=bc-dc$ & $HGDB=ad$ (§. 375 *Geom.* & §. 33 *Analys.*). Quodsi areas rectangulorum AI, & HD subtrahas ab area rectanguli AD; relinquitur area rectanguli ECGI, hoc est, factum ex $a-c$ in $b-d$ (§. 375 *Geom.*). Repertur adeo $(a-c)(b-d)=ab-bc+cd$ (§. 30). Unde apparet, factum ex $a-c$ in $b-d$ esse $+cd$. *Quod erat unum.*

In divisione quærimus, quoties quantitas una in altera contineatur (§. 69 *Arithm.*). Dividurus ergo quantitatem privativam per privativam quærit, quoties defectus unus in altero contineatur (§. 19): quotus adeo qui idem indicat (§. 69 *Arithm.*), utique quantitas positiva esse debet. *Quod erat alterum.*

SCHOLIUM.

35. Possunt etiam theorema 3 & 4 operæ rectanguli demonstrari.

THEOREMA VI.

36. Si quantitas positiva per negativam multiplicatur aut dividitur, quantitas privativa prodit.

DEMONSTRATIO.

Cum in multiplicatione quantitas multiplicanda toties sibimetipsum addatur, quoties multiplicans unitatem continet (§. 66 *Arithm.*); quantitas vero privativa sit defectus alicujus quantitatis (§. 19): proprie loquendo positiva per privativam multiplicari nequit. Hinc denuo multiplicatio tantum locum habet, ubi privativæ positivis jungun-

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

tur, ita ut subtrahatur, quod plus justo fuit additum: id quod ita demonstramus.

Sint LMON & PMOQ rectangula Tab. I. & in iis $NO=a$, $MO=b$, $QO=c$, Fig. 2. erit $NQ=a-c$, area $PQOM=bc$, $LNOM=ab$, (§. 368 *Geom.*), consequenter $LNQ=ab-bc$. Ergo b ductum in $a-c$ efficit bc . *Quod erat unum.*

Factum ex $a-c$ in $b-d$ est $+cd$ (§. 34). Ergo si $+cd$ dividis per $b-c$, quotus esse debet $-d$ (§. 210 *Arithm.*). *Quod erat alterum.*

THEOREMA VII.

37. In multiplicatione ac divisione eadem signa efficiunt +, diversa —.

DEMONSTRATIO.

Si quantitates se mutuo multiplicantes aut dividentes fuerint positivæ vel privativæ; quantitas prodit in utroque casu positiva (§. 32. 34): si vero altera privativa, altera positiva, quantitas prodit privativa (§. 33. 36). Ergo eadem signa efficiunt +, diversa —. *Q. e. d.*

PROBLEMA III.

38. Quantitates tam eodem, quam diversis signis affectas in se invicem ducere.

RESOLUTIO.

Omnia hic fiunt ut in Arithmetica communi (§. III *Arithm.*), nisi quod notetur regula: eadem signa faciunt +; diversa — (§. 37).

$$\begin{array}{r}
 a + c \\
 b + d \\
 \hline
 + ad + cd \\
 ab + bc \\
 \hline
 ab + ad + bc + cd \quad - ad - bd + dd \\
 \quad - ab - bb + bd \\
 \quad na + ab - ad \\
 \hline
 aa - bb - 2ad \quad + dd \\
 \hline
 10 = 8 + 4 - 2 \\
 2 = 8 - 4 - 2 \\
 \hline
 \quad - 16 - 8 + 4 \\
 - 32 - 16 + 8 \\
 64 + 32 - 16 \\
 \hline
 20 = 64 \quad - 48 \quad + 4 \\
 \hline
 \text{Item} \quad \quad 8 = 10 - 2 \\
 \quad \quad \quad 7 = 10 - 3 \\
 \quad \quad \quad \hline
 \quad \quad \quad - 30 + 6 \\
 \quad \quad \quad 100 - 20 \\
 \quad \quad \quad \hline
 56 = 100 - 50 + 6 = 50 + 6
 \end{array}$$

SCHOLIUM.

39. Exemplum posterius demonstrationem exhibet ocularem multiplicationis per digitos. Nimirum 2 & 3 sunt distantia factorum a denario per digitos in utraque manu erectos representari solita; quod relinquitur, factis ex distantibus istis in denarium a 100 subductis, indicatur digitis residuis in utraque manu &, ut ab erectis distinguantur, depressis, singulis nempe pro totidem denariis sumtis. Ita in nostro casu in altera manu deprimuntur digiti 2, in altera 3, simul 5, adeoque quinque numerantur decades. Summae adjicitur factum ex digitis in utraque manu erectis in se invicem.

PROBLEMA IV.

40. Quantitates compositas dividere.

RESOLUTIO.

Si quantitas una per alteram actu dividi potest, orta nempe ex divifore in

aliam (§. 210 *Arithm.*); divisio instituitur ut in numeris (§. 117 *Arithm.*), notata tamen regula: eadem signa faciunt +, diversa - (§. 37).

In aliis casibus tantum observanda, quæ supra præcepimus (§. 8).

E. gr. dividere jubemur $aa - bb - 2ad + dd$ per $a - b - d$.

$$\begin{array}{r}
 aa - bb - 2ad + dd(a + b - d) \\
 a - b - d) aa - ab - ad \\
 \hline
 + ab - bb - ad + dd \\
 + ab - bb - bd \\
 \hline
 + bd - ad + dd \\
 - ad + bd + dd \\
 \hline
 0 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

PROBLEMA V.

41. Fractionem fractioni addere, aut unam ex altera subtrahere.

RESOLUTIO.

Omnia hic fiunt ut in Arithmetica communi (§. 236. 237. *Arithm.*).

E. gr. sint fractiones addendæ $\frac{a}{b}$ & $\frac{c}{d}$. Reductæ ad eandem denominationem erunt $\frac{ad}{bd}$ & $\frac{bc}{bd}$, (§. 235 *Arithm.*). Ergo summa $\frac{ad + bc}{bd}$ (§. 27).

Similiter fit fractio $\frac{a}{b}$ subtrahenda ex $\frac{c}{d}$ Reductæ erunt $\frac{ad}{bd}$ & $\frac{tc}{bd}$, ut ante. Ergo differentia $\frac{bc - ad}{bd}$ (§. 30).

PROBLEMA VI.

42. Fractionem per fractionem multiplicare aut dividere.

RESOLUTIO.

Denuo hic omnia fiunt ut in Arithmetica communi (§. 239. 243 *Arithm.*).

E. gr.

E. gr. Sint fractiones se mutuo multiplicaturæ $\frac{a}{b}$ & $\frac{c}{d}$: erit factum $\frac{ac}{bd}$.

Sint fractiones se mutuo divisuræ $\frac{ac}{db}$ & $\frac{a}{b}$; erit quotus $\frac{ac}{bd} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ac}{abd} = \frac{c}{d}$ (§. 231 *Arithm.*).

COROLLARIUM I.

43. Cum $a = \frac{a}{1}$ (§. 59 *Arithm.*); erit factum ex a in $\frac{c}{d}$, hoc est, ex integra quantitate in fractam, $\frac{c}{d} \cdot \frac{a}{1} = \frac{ac}{d}$. Unde patet, numeratorem fractæ multiplicandum esse per integram, si fractio per integrum multiplicari debet: quemadmodum fit in Arithmetica communi (§. 242 *Arithm.*).

COROLLARIUM II.

44. Ergo quotus ex $\frac{c}{a}$ per a , hoc est, ex quantitate fracta per integram divisa, $\frac{c}{a} \cdot \frac{1}{a} = \frac{c}{a^2}$. Unde patet, denominatorem dividendi multiplicandum esse per divisorem & factum subscribendum numeratori immutato, si fractio per integrum dividenda.

PROBLEMA VII.

45. *Quantitatem quamcunq̄ue per divisorem compositum dividere, utut divisionem exactam non admittat.*

RESOLUTIO.

Divisio instituatutur ut in Arithmetica communi (§. 117 *Arithm.*), tandiu continuanda, donec quotus legem manifestet juxta quam termini ejus in infinitum progrediuntur, observata sub-

tractionis, itemque multiplicationis ac divisionis lege de signorum mutatione (§. 29. 37).

E. gr. Si quantitas dividenda b , dividens $a + c$, erit:

$$\begin{array}{r}
 a+c) b \quad \left(\frac{b}{a} - \frac{bc}{a^2} + \frac{bc^2}{a^3} - \frac{bc^3}{a^4} \text{ \&c.} \right. \\
 \underline{b + \frac{bc}{a}} \qquad \qquad \qquad \text{in infin.} \\
 \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad \frac{bc}{a}} \\
 \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad \frac{bc}{a} - \frac{bc^2}{a^2}} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \frac{bc^2}{a^2}} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \frac{bc^2}{a^2} + \frac{bc^3}{a^3}} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \underline{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \frac{bc^3}{a^3}} \text{ \&c. in inf.}
 \end{array}$$

Nimirum si b per a dividitur, quotus est $\frac{b}{a}$ (§. 8). Factum ex $\frac{b}{a}$ in $a + c$ est $\frac{ab}{a} + \frac{bc}{a}$ (§. 43), hoc est, $b + \frac{bc}{a}$ (§. 223 *Arithm.*): quod ex dividenda b subductum relinquit $-\frac{bc}{a}$ (§. 29). Si porro $-\frac{bc}{a}$ per a dividitur, erit quotus $-\frac{bc}{a^2}$ (§. 44). Factum ergo ex $a + c$ in $-\frac{bc}{a^2}$, hoc est, $-\frac{abc}{a^2} - \frac{bc^2}{a^2}$ (§. 43. 37), seu $-\frac{bc}{a} - \frac{bc^2}{a^2}$ (§. 223 *Arithm.*), ex dividenda $-\frac{bc}{a}$ subtractum relinquit $+\frac{bc^2}{a^2}$ (§. 29). Unde patet quomodo divisio continuanda. Inventis autem vel quinque terminis, tum quotus, tum ipsa divisionis ratio insinuat, quorum constare ex infinita terminorum serie, quorum numeratores sunt potentia ipsius

c , quarum exponentes a numero ordinis unitate differunt, per b multiplicata; denominatores vero potentia ipsius a , quarum exponentes aquantur numero ordinis terminorum. E. gr. in termino tertio potentia ipsius c in numeratore secunda est potentia vero ipsius a in denominatore tertia.

COROLLARIUM I.

46. Si $b = 1$ & $a = 1$, substituto valore hoc in quoto, prodit $1 - c + c^2 - c^3$ &c. in infin. Quare $\frac{1}{1+c} = 1 - c + c^2 - c^3$ &c. in infin.

COROLLARIUM II.

47. Quodsi termini in quoto continuo decrescant, series dat quotum vero quantumlibet propinquum. E. gr. si $b = 1$, $c = 1$ & $a = 2$; valribus his substitutis in serie generali, aut divisione ut in exemplo universalis instituta, reperietur $\frac{1}{3} = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{32} - \frac{1}{64} + \frac{1}{128}$ &c. Ponamus jam seriem terminari in termino quarto; in defectu quidem peccabitur, sed qui minor quam $\frac{1}{32}$. Si eadem terminetur in sexto; denuo peccabitur in defectu, sed qui minor $\frac{1}{128}$. Series igitur quo longius continuatur; eo propius ad verum quotum accedit.

SCHOLIUM.

48. Similiter invenietur $\frac{1}{4} = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{24} + \frac{1}{48}$ &c. in infin. $\frac{1}{5} = \frac{1}{4+1} = \frac{1}{4} - \frac{1}{10} + \frac{1}{20} - \frac{1}{40} + \frac{1}{80}$ &c. in infin. $\frac{1}{6} = \frac{1}{5+1} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} + \frac{1}{15} - \frac{1}{30} + \frac{1}{60}$ &c. in infin. En legem constantem, juxta quam omnes fractiones, quarum numerator unitas, per series infinitorum terminorum exprimere licet. Sunt

nampe illa series progressionis geometrica decrescens, ita quidem ut numerator semper sit unitas, denominator termini primi idemque exponens rationis unitate differat a denominatore fractionis resolvenda.

COROLLARIUM III.

49. Si termini in quoto continuo crescunt, series a quoto tanto magis discedit, quo longius continuatur, nec quoto aequalis fit, nisi terminetur ultimumque residuum sub signo suo adjiciatur. E. gr.

Sit $\frac{1}{3} = \frac{1}{1+2}$; reperietur quotus $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 64 + 128$ &c. Terminus unus 1 superat $\frac{1}{3}$ excessu $\frac{2}{3}$; termini duo deficient $\frac{4}{3}$. Termini tres excedunt $\frac{8}{3}$, quatuor deficient $\frac{16}{3}$. Et ita porro. Ponamus seriem terminari in -8 ; erit $\frac{1}{1+2} = 1 - 2 + 4 - 8 + \frac{16}{3}$. Sed $1 - 2 + 4 - 8 = -5 = -\frac{15}{3}$. Ergo $\frac{1}{1+2} = \frac{16}{3} - \frac{15}{3} = \frac{1}{3}$. Similiter si sit $\frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$; reperietur quotus $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1$ &c. ubi termini numero pares $= 0$ deficient continuo $\frac{1}{2}$; termini autem numero impares conficiunt 1 , consequenter excessus $= \frac{1}{2}$. Ergo $\frac{1}{1+1} = 1 - \frac{1}{2}$, vel $= 0 + \frac{1}{2}$. Ponamus seriem universalem

(S. 46) terminari in $-c^3$; erit $\frac{1}{1+c} = 1 - c + c^2 - c^3 + \frac{c^4}{1+c} = (1 + c - c^2 + c^2 - c^3 + c^4) : (1 + c)$ (S. 235 Arithm.) $= \frac{1}{1+c}$ (S. 21).

SCHOLIUM I.

50. Tyrones, hoc problema cum suis corollariis sub initium pratermittere possunt, donec inferius ad illud provocetur.

SCHOLIUM II.

51. Quoniam $f\frac{1}{2} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}}$ in seriem resolvitur, quotus a fractione proposita, quantumlibet continuatus, continuo differt $\frac{1}{2}$ (§. 49), resolutio in presenti casu irrita evadit. Unde patet fons erroris, quem commisit Guido Grandus in Tractatu de quadratura circuli & hyperbolæ cor. 3. prop. 7. part. 1. p. m. 29, ubi insert ob $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1$ &c. in infinitum $= 0$ summam infinitarum nullitatum esse $\frac{1}{2}$. Nec veritatem attingisse liquet Leibnitium in Actis Eruditorum Tom. 5. Supplement. p. 264. & seqq.

DEFINITIO IV.

52 Series que ad verum valorem continuo appropinquant, dicuntur convergentes: que ab eodem continuo recedunt, divergentes.

COROLLARIUM I.

53. Ergo series fractionum continuo decrescentium (§. 47. 48) sunt convergentes: ceteræ vero, quarum termini continuo crescunt (§. 49), divergentes.

PROBLEMA VIII.

54. Potentiam quamcunque per aliam ejusdem radicis multiplicare vel dividere.

RESOLUTIO.

I. In multiplicatione addantur exponentes, summa est exponentis facti.

$$\begin{array}{cccccc} x^3 & y^m & y^n & a^n & x^n & \\ x^4 & y^m & y^n & a^r & x^s & \\ \hline x^7 & y^{2m} & y^{m+n} & a^{m+r} & x^{n+s} & \end{array}$$

II. In divisione exponentis dignitatis dividendæ subtrahatur ab exponen-

te dividendæ; residuum est exponentis quoti

$$x^7 \left(x^3 \quad y^{m+n} \left(y^m \quad a^m x^n \left(a^{m-r} x^{n-s} \right. \right. \right. \right.$$

DEMONSTRATIO.

Cum exponentes dignitatum in progressionem Arithmetica (§. 251. 333 Arithm.), dignitates in Geometrica (§. 250. 332 Arithm.) progrediantur; illi pro harum Logarithmis recte habentur (§. 334 Arithm.). Ergo summa exponentium, quos habent dignitates se mutuo multiplicantes, est exponentis facti (§. 337 Arithm.); differentia exponentium, quos habent dignitates se mutuo dividentes, est exponentis quoti (§. 343 Arithm.). Q. e. d.

SCHOLIUM.

55. Progressiones istæ hæc sunt: $x^0. x^1. x^2. x^3. x^4. x^5. x^6. x^7. \&c.$

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. &c.

Nempe $x : x = x^1 : x^1 = x^0$ (§. 54). Sed $x : x = 1$ (§. 69 Arithm.). Ergo $x^0 = 1$ (§. 87 Arithm.).

PROBLEMA IX.

56. Potentiam quamcunque datam ad aliam dati exponentis evehere, aut ex eadem dati similiter exponentis radicem extrahere.

RESOLUTIO.

I. Quoniam potentia data, intuitu ejus ad quam evehenda, radix est (§. 246 Arithm.) & exponentes logarithmi dignitatum existunt per demonstr. in probl. præc. (§. 54): exponentis

potentiæ novæ habebitur, potentiæ datæ exponente in exponentem ejus, ad quam evehi debet, ducto (§. 341 *Arithm.*).

E. gr. Potentia x^m evecta ad dignitatem n est x^{mn} . Potentia y^3 evecta ad dignitatem 2 est y^6 .

II. Non absimili modo liquet, Exponentem radice haberi, si exponent dignitatis datæ dividatur per exponentem radice datum (§. 341. *Arithm.*).

E. gr. Radix quadrata ex x^6 est x^3 : radix n ex x^{mn} est x^m : radix n ex x^m est $x^{m:n}$.

COROLLARIUM.

57. Est itaque $\sqrt{x} = x^{1:2}$, $\sqrt[3]{x} = x^{1:3}$
 $\sqrt[n]{x^m} = x^{m:n}$ (§. 341 *Arithm.*), consequenter quantitates irrationales ad expressionem rationalem reduci possunt.

SCHOLIUM.

58. *Quantum in Analysis commodi afferat hæc reductio ex capite subsequente elucescet Etenim si quantitates irrationales ad formam rationalium reducantur; peculiari pro iis calculo opus non est, sed rationalium instar tractari possunt: quemadmodum primi docuerunt Leibnitius aique Newtonus.*

CAPUT II.

De Arithmetica Irrationalium.

PROBLEMA X.

59. **Q**uantitates irrationales diverse denominationis reducere ad eandem.

RESOLUTIO.

Sint quantitates reducendæ $\sqrt[m]{x^n}$ & $\sqrt[r]{y^s}$. Quoniam $\sqrt[m]{x^n} = x^{n:m}$ & $\sqrt[r]{y^s} = y^{s:r}$ (§. 57) diversitas denominationis ab exponentibus diversis pendet, exponentes vero fractiones sunt, quæ ad alias ipsas æquales, sed ejusdem denominationis reduci possunt (§. 235 *Arithm.*). Ergo quantitates surdæ reducuntur ad eandem denominationem, exponentibus earundem ad eandem reductis. Erit adeo $x^{n:m} = x^{ns:ms}$ & $y^{r:s} = y^{mr:ms}$ seu $x^{n:m} = \sqrt[ms]{x^{ns}}$ & $y^{r:s} = \sqrt[ms]{y^{mr}}$ (§. 57).

E. gr. Sint quantitates reducendæ $\sqrt{2}$ & $\sqrt[3]{5}$. Quoniam $\sqrt{2} = 2^{1:2}$ & $\sqrt[3]{5} = 5^{1:3}$ (§. 57); erunt reductæ $2^{3:6}$ & $5^{2:6}$ (§. 235 *Arithm.*), hoc est, $\sqrt[6]{2^3}$ & $\sqrt[6]{5^2}$ (§. 57), seu, 2 actu ad potentiam tertiam & 5 ad secundam evehendo, $\sqrt[6]{8}$ & $\sqrt[6]{25}$.

SCHOLIUM.

60. *Quodsi quis ægre admisit reductiorem ad eandem denominationem in exponentibus quantitatum irrationalium factam; is easdem formulas, quas ejus ope clicimus, per ægebram investigare potest, quemadmodum inferius docebimus.*

PROBLEMA XI.

61. *Quantitates irrationales ad simpliciore expressionem reducere.*

RESO-

R E S O L U T I O.

Sit quantitas reducenda $\sqrt[m]{a^n x^m}$. Quoniam ea æqualis est ipsi $a^n : m x^{m:n}$ (§. 57) & $x^{m:m} = x$ (§. 56.) erit $\sqrt[m]{a^n x^m} = a^{n:m} x = x \sqrt[m]{a^n}$. Locum ergo habet reductio, si quantitas sub signo radicali per istiusmodi potentiam, quæ eundem cum radicali signo exponentem habet, divisibilis. Divisio nempe actu instituenda, quoto sub signo radicali relicto & divisoris radice eidem præfixa.

E. gr. Sit reducenda $\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{8 \cdot 2}$. Quoniam 8 est cubus perfectus, cujus radix 2: habebimus $\sqrt[3]{16} = 2 \sqrt[3]{2}$. Eodem modo reperitur $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = 2 \sqrt[3]{3}$; $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3 \sqrt{2}$; $\sqrt[4]{48} = \sqrt[4]{16 \cdot 3} = 2 \sqrt[4]{3}$.

C O R O L L A R I U M I.

62. Si quantitates irrationales ejusdem gradus ad simpliciorum expressionem reductæ sub signis radicalibus eandem quantitatem relinquant; erunt inter se ut quantitates rationales signis præfixæ (§. 178 Arith.), consequenter quantitates irrationales inter se commensurabiles esse possunt (§. 160 Arithm.).

E. gr. $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2 \sqrt{2}$ & $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3 \sqrt{2}$. Ergo $2 \sqrt{2} : 3 \sqrt{2} = 2 : 3$, hoc est, $\sqrt{8} : \sqrt{18} = 2 : 3$. In casu reliquo sunt incommensurabiles.

S C H O L I O N I.

63. *Istud quantitatum irrationalium genus communicantium nomine venire solet.*

C O R O L L A R I U M II.

64. Per præfens adeo problema invenitur ratio rationalis irrationalium, si qua datur.

C O R O L L A R I U M III.

65. Quia $\sqrt[m]{a^n x^m} = x \sqrt[m]{a^n}$ (§. 61); quantitas ex parte rationalis, ex parte irrationalis ad pure irrationalem reducitur, si quantitas rationalis ad eam dignitatem evehitur, cujus gradum indicat exponens signo radicali præfixus, & dignitas per quantitatem sub signo radicali multiplicatur. E. gr. $5 \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 25} = \sqrt{50}$ & $5 \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3 \cdot 5^3} = \sqrt[3]{3 \cdot 125} = \sqrt[3]{375}$.

S C H O L I O N II.

66. *Quodsi quasiveris, quomodo in resolutione innotescat, utrum quantitas sub signo radicali posita per potentiam aliquam requisitam sit divisibilis nec ne, & quænam sit ista potentia; in divisores resolvenda est, inter quos locum obtineant necesse est omnes potentie a prima usque ad requisitam, si cum numeris nobis res fuerit. E. gr. Queritur an $\sqrt[4]{368}$ sit divisibilis per aliquam potentiam quarti gradus. Resoluturus numerum 368 in suos divisores, reperiet*

2	1 8 4
4	9 2
8	4 6
1 6	2 3

tentando nempe divisionem per numeros minores & quotos majores a latere ponendo. Invenies hic 2 potentiam primi gradus, 4 potentiam secundi, 8 potentiam tertii & 16 potentiam quarti. Ergo 16 est divisor quæsitus, consequenter $\sqrt[4]{368} = 2 \sqrt[4]{23}$.

P R O B L E M A XII.

67. *Quantitates irrationales addere aut unam ex altera subtrahere.*

R E S O L U T I O.

Si quantitates irrationales fuerint communicantes, adeoque reductæ (§. 61) fuerint

fuerint commensurabiles (§. 63); quantitates rationales extra vinculum adduntur & a se invicem subtrahuntur, ibique summa, hic differentia denuo præfigitur signo radicali. Reliqua omnia sunt ut in additione & subtractione rationalium.

$$\begin{aligned} \text{Ita reperietur } \sqrt{8} + \sqrt{18} &= 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} (\text{§. 61}) = 5\sqrt{2} = \sqrt{50} (\text{§. 65}) \text{ \&} \\ \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} &= \sqrt[3]{3 \cdot 8} + \sqrt[3]{3 \cdot 27} = \\ 2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} &= 5\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{375}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Similiter } \sqrt{18} - \sqrt{8} &= 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ \&} \sqrt[3]{375} - \sqrt[3]{81} = 5\sqrt[3]{3} \\ - 3\sqrt[3]{3} &= 2\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{24}. \end{aligned}$$

Contra $\sqrt{7}$ & $\sqrt{5}$ cum sint incommensurabiles (§. 62); summa erit $\sqrt{7} + \sqrt{5}$ (§. 27), & differentia $\sqrt{7} - \sqrt{5}$ (§. 30).

Hinc & intelliguntur exempla in compositis tum in additione:

$$\begin{aligned} 4\sqrt{3} - 5\sqrt{2} + 7\sqrt{7} + 8\sqrt{5} \\ \sqrt{3} + 9\sqrt{2} + 3\sqrt{7} - 4\sqrt{5} \end{aligned}$$

$5\sqrt{3} + 4\sqrt{2} + 10\sqrt{7} + 4\sqrt{5}$ summa;
hoc est $\sqrt{5 \cdot 25} + \sqrt{2 \cdot 16} + \sqrt{7 \cdot 100} + \sqrt{5 \cdot 16}$
feu $\sqrt{75} + \sqrt{32} + \sqrt{700} + \sqrt{80}$
tum in subtractione

$$\begin{aligned} 5\sqrt{2} - 7\sqrt{3} + 8\sqrt{10} \\ 3\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 9\sqrt{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\sqrt{2} - 12\sqrt{3} + 17\sqrt{10} \text{ different.} \\ \text{hoc est } \sqrt{2 \cdot 4} - \sqrt{3 \cdot 144} + \sqrt{10 \cdot 289} \\ \text{feu } \sqrt{8} - \sqrt{432} + \sqrt{28900} \end{aligned}$$

DEMONSTRATIO.

Omnia manifesta sunt ex demonstratione probl. I & 2 (§. 27. 30).

PROBLEMA XIII.

68. *Quantitates irrationales per irrationales multiplicare ac dividere.*

RESOLUTIO.

Multiplicentur aut dividantur quantitates sub signo radicali; ibi facto, hic quoto præfigatur signum idem radicale cum suo exponente. Quodsi radicales quantitates fuerint diversæ denominationis ante omnia reducantur ad eandem (§. 59).

E. gr. in multiplicatione $\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{15}$ & $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{36} = 6$. Item in compositis

$$\begin{array}{r} \sqrt{3} + \sqrt{2} \quad \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \sqrt{3} - \sqrt{2} \quad \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \hline -\sqrt{6} - 2 \quad +\sqrt{6} + 3 \\ 3 + \sqrt{6} \quad 2 + \sqrt{6} \\ \hline 3 - 2 = 1 \quad 2\sqrt{6} + 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7\sqrt{3} - 5\sqrt{2} \\ 5\sqrt{8} + 3\sqrt{6} \\ \hline + 21\sqrt{18} - 15\sqrt{12} \\ 35\sqrt{24} - 100 \end{array}$$

hoc est $35\sqrt{24} + 21\sqrt{18} - 15\sqrt{12} - 100$
 $70\sqrt{6} + 63\sqrt{2} - 30\sqrt{3} - 100$

$$\begin{array}{r} \sqrt{8} + \sqrt{2} + \sqrt{32} \\ \sqrt{8} + \sqrt{2} + \sqrt{32} \\ \hline + 16 + 8 + 32 \\ + 4 + 2 + 8 \\ 8 + 4 + 16 \end{array}$$

98

Similiter in divisione $\sqrt{8} : \sqrt{2} = \sqrt{4} = 2$ & $\sqrt{12} : \sqrt{6} = \sqrt{2}$. Item in compositis.

$$\begin{array}{r} \sqrt{3} \sqrt{15} - \sqrt{6} + \sqrt{12} (\sqrt{5} - \sqrt{2} + 2) \\ \sqrt{15} \\ \hline -\sqrt{6} + \sqrt{12} \\ -\sqrt{6} \\ \hline \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \\ 2\sqrt{3} \\ \hline 0 \end{array}$$

SCHOLIION I.

69. Interdum etiam divisio locum habet, si divisor compositus est. Sed cum rarissimus sit ejus usus & ea divisione ignorata maxime praeclaros in Analysis progressus facere detur, nec difficultate res careat; eam hic exponi superfluum judicamus. Docet ipsam Ozanamus in Novis Elementis Algebrae (a).

SCHOLIION II.

70. Ceterum ex tradito haecenus caleulo liquet, si quantitatem duplici signo radicali affici contingat, e. gr. si fuerit $(3\sqrt{2})\sqrt{2}$, operationes omnes eodem modo peragi, modo notetur, quantitatem sub primo vinculo eodem modo tractari debere, quo rationalem in antecedentibus tractavimus. E. gr.

$$\sqrt{8\sqrt{3}} = 2\sqrt{2\sqrt{3}} \text{ (S. 61)}$$

$$\sqrt{9\sqrt{12}} = \sqrt{2 \cdot 9\sqrt{3}} = 3\sqrt{2\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{8\sqrt{3}} + \sqrt{9\sqrt{12}} = 5\sqrt{2\sqrt{3}}$$

$$= \sqrt{50\sqrt{3}}$$

$$= \sqrt{7500}$$

Similiter in multiplicatione

$$\begin{array}{r} 3\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ \hline 3\sqrt{2} + \sqrt{2} \end{array} \quad \begin{array}{r} \sqrt{5} + \sqrt{2} \\ \sqrt{5\sqrt{5}} \end{array}$$

hoc est $\sqrt{9\sqrt{2}} + \sqrt{2\sqrt{2}}$ seu $\sqrt{162} + \sqrt{8}$

$$\begin{array}{r} \sqrt{3\sqrt{2}} \\ \sqrt{5-\sqrt{3}} \\ \hline -3\sqrt{3} - \sqrt{6} \\ 15 + 5\sqrt{2} \end{array} \quad \begin{array}{r} \sqrt{3\sqrt{2}} \\ \sqrt{3-\sqrt{2}} \\ \hline -3\sqrt{2} - 2 \\ 9 + 3\sqrt{2} \\ \hline \sqrt{7} \end{array}$$

$$\sqrt{15 + 5\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - \sqrt{6}}$$

Dicuntur istiusmodi Radices, qualis est $\sqrt{3\sqrt{2}}$, universales.

(a) Nouveaux Elemens d'ALGEBRE, Lib. I. Probl. 4. & seqq. p. 7. & seqq.

SCHOLIION III.

71. Radices vero imaginariae dicuntur, si quantitas sub signo radicali fuerit negativa, veluti $\sqrt{-2}$, cum quadratum -2 sit quantitas impossibilis, propterea quod omne quadratum sit positivum (S. 246 Arithm. & S. 37 Anal.). Facile autem patet additionem & subtractionem radicum imaginariarum eodem modo fieri debere ac realium. Ita $\sqrt{-18} + \sqrt{-8} = 3\sqrt{-2} + 2\sqrt{-2} = 5\sqrt{-2} = \sqrt{-50}$ & $\sqrt{-18} - \sqrt{-8} = \sqrt{-2}$. Quoniam vero quantitas privativa sub signo radicali consideratur instar positivae in multiplicatione signum non mutatur, sed factio perinde ac factoribus praefigitur signum $-$; alias enim factores imaginarii efficerent factum reale, quod utique absurdum. Quamobrem regula de signis tantummodo observatur respectu radicum, minime vero respectu quantitatum sub signo radicali positarum.

$$\begin{array}{r} \text{E. gr. } \sqrt{-5} - \sqrt{-7} \\ \sqrt{-3} \\ \hline \sqrt{-15} - \sqrt{-21} \end{array} \quad \begin{array}{r} \sqrt{-3\sqrt{-2}} \\ + \sqrt{-3} \\ \hline -3 + \sqrt{-6} \\ \sqrt{-8\sqrt{-2}} \\ \sqrt{-8\sqrt{-2}} \\ \hline +4 + 2 \\ -8 - 4 \\ \hline -6 \end{array}$$

Nimirum $\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-2} = -2$ & $\sqrt{-1} \cdot -\sqrt{-1} = -1$. Ergo $-1 - 2 = -3$

$$\begin{array}{r} 3\sqrt{-5} + 2\sqrt{-3} \\ 3\sqrt{-5} - 2\sqrt{-2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -6\sqrt{-10} - 4\sqrt{-6} \\ -45 + 6\sqrt{-15} \\ \hline -45 - 6\sqrt{-10} + 6\sqrt{-15} - 4\sqrt{-6} \end{array}$$

C A P U T III.

De usu Calculi Litteralis in inveniendis Theorematis.

PROBLEMA XIV.

72. **I**nvenire, qualis numerus prodeat ex parium additione, subtractione ac multiplicatione.

Quoniam numerus par per 2 dividi potest (§. 72. Arithm.), dicatur $2a$. Similiter alius numerus par sit $= 2c$. Erit

$$\begin{array}{r} 2a \\ 2c \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 2a \\ 2c \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 2a \\ 2c \\ \hline \end{array}$$

Summa $2a + 2c$ Diff. $2a - 2c$ Fact. $4ac$

Theorema: Summa, item differentia atque factum duorum numerorum parium est numerus par.

PROBLEMA XV.

73. Invenire, qualis numerus prodeat, si parem impari addas, vel parem ab impari subtrahas, vel denique parem per imparem multiplices.

Numerus par sit $2a$ (§. 72 Arithm.), impar $2c + 1$ (§. 73 Arithm.). Erit

$$\begin{array}{r} 2c + 1 \\ 2a \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 2c + 1 \\ 2a \\ \hline \end{array}$$

Summa: $2c + 1 + 2a$ Diff. $2c + 1 - 2a$

$$\begin{array}{r} 2c + 1 \\ 2a \\ \hline 4ac + 2a \text{ Factum.} \end{array}$$

Theorema. Si parem impari addas aut unum ex altero subtrahas; ibi aggregatum, hic differentia est numerus impar. Si vero numerus par & impar se mutuo multiplicent, factum est numerus par.

PROBLEMA XVI.

74. Invenire, qualis prodeat numerus, si impar impari addatur, aut unus ex altero subtrahatur, aut si impar imparem multiplicet.

Sint numeri impares $2a + 1$ & $2b + 1$ (§. 73 Arithm.): erit

$$\begin{array}{r} 2a + 1 \\ 2b + 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 2a + 1 \\ 2b + 1 \\ \hline \end{array}$$

Summa. $2a + 2b + 2$ Different. $2a + 1 - 2b + 1$

$$\begin{array}{r} + 2a + 1 \\ 4ab + 2b \\ \hline 4ab + 2a + 2b + 1 \text{ Factum.} \end{array}$$

Theorema: Si numerus impar impari additur aut ab eo subtrahitur, ibi summa, hic differentia est numerus par. Si vero impar imparem multiplicet, factum est numerus impar.

PROBLEMA XVII.

75. Invenire, qualis numerus prodeat, si meros numeros pares, aut numeros impares multitudine pari, aut denique numeros impares multitudine impari addas.

Sint numeri pares $2a, 2b, 2c, 2d, \&c.$ erit summa $2a + 2b + 2c + 2d \&c.$ numerus par (§. 72 Arithm.).

Theorema: Summa numerorum parium quotcunque est numerus par.

Sint:

Sint numeri impares $2a + 1, 2b + 1, 2c + 1, 2d + 1$ &c. (§. 73 *Arithm.*) numerus eorundem $2m$ (§. 72 *Arithm.*). Erit summa $2a + 2b + 2c + 2d$ &c. $+ 2m$, numerus par (§. 72 *Arithm.*). Tot scilicet sunt unitates, quot termini.

Theorema. Summa numerorum imparium quotcumque multitudine pari est numerus par.

Sint numeri impares ut ante $2a + 1, 2b + 1, 2c + 1, 2d + 1$ &c. numerus eorundem $2m + 1$. Erit summa $2a + 2b + 2c + 2d$ &c. $+ 2m + 1$, numerus impar (§. 73 *Arithm.*).

Theorema. Summa numerorum imparium quotcumque, si numero impares fuerint, est numerus impar.

SCHOLIION.

76. Notetur in his problematibus denominandi artificium, quod consistit in analytica expressione numeri paris & imparis, quæ eorum definitiones repræsentat.

PROBLEMA XVIII.

77. *Invenire qualis sit numerus, per quem impar parem metitur.*

Quodsi numerus impar parem metitur, erit par factum ex impari per parem, (§. 74 *Arithm.*), adeoque $(2a + 1) 2b = 4ab + 2b$. Est igitur $(4ab + 2b) : (2a + 1) = 2b$ (§. 210 *Arithm.*).

Theorema. Impar metiens parem eum metitur per parem.

COROLLARIUM I.

78. Patet simul, numerum, qui metitur parem per imparem, esse parem.

COROLLARIUM II.

79. Et quoniam $(2ab + b) : (2a + 1) = b$; liquet porro, si impar metiatur parem, illum quoque hujus dimidium metiri.

PROBLEMA XIX.

80. *Invenire qualis sit numerus, per quem impar imparem metitur.*

Quodsi impar imparem metitur, erit hic factum ex impari in imparem (§. 73. 74), adeoque $(2a + 1) (2b + 1)$ seu $4ab + 2a + 2b + 1$. Est igitur $(4ab + 2a + 2b + 1) : (2a + 1) = 2b + 1$ numerus impar (§. 210. *Arithm.*).

Theorema. Impar metiens imparem eum metitur per imparem.

PROBLEMA XX.

81. *Determinare differentiam quadratorum, quorum radices unitate differunt.*

Sit radix una $= n$, erit altera $n + 1$: quadratum majoris $n^2 + 2n + 1$ (§. minoris n^2 246 *Arith.*).

Differentia $2n + 1$

Theorema. Differentia duorum quadratorum, quorum radices unitate differunt, est numerus impar duplo radice minoris unitate aucto æqualis, seu summa radicum.

COROLLARIUM I.

82. Facillime ergo construuntur Tabulæ numerorum quadratorum pro radicibus in serie naturali progredientibus. Summa nempe radice antecedentis & consequentis continuo additur quadrato antecedenti, ut prodeat consequens.

COROLLARIUM II.

83. Si $n = 1$, erit $2n + 1 = 3$; si $n = 2$, erit $2n + 1 = 5$; si $n = 3$ erit $2n + 1 = 7$; si $n = 4$, erit $2n + 1 = 9$ &c. Differentiæ itaque numerorum quadratorum sunt numeri impares in continua serie progredientes: unde ex continua numerorum imparium additione nascuntur numeri quadrati.

Radic.	Num. impar.	Num. Quadr.
1	1	1
2	3	4
3	5	9
4	7	16
5	9	25
6	11	36
7	13	49
8	15	64
9	17	81
10	19	100

PROBLEMA XXI.

84. Determinare differentiam duorum cuborum, quorum radices unitate differunt.

Sint radices n & $n + 1$: erit
 Cubus major $n^3 + 3n^2 + 3n + 1$ (248
 minor n^3 *Arithm.*)

Differentia $3n^2 + 3n + 1$,
 hoc est, $n^2 + 2n + 1 + 2n^2 + n$. Sed
 $n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$. Ergo differ-
 entia inventa $(n + 1)^2 + 2n^2 + n$.

Theorema. Differentia duorum numero-
 rum cubicorum, quorum radices unitate dif-
 ferunt, est aggregatum ex quadrato radice
 majoris, duplo quadrato minoris & radice
 minore.

COROLLARIUM.

85. Constructo itaque numerorum qua-
 dratorum canone (§. 82), per solam ad-
 ditionem inde porro constituitur canon nu-
 merorum cubicorum.

PROBLEMA XXII.

86. Determinare quantitatem rectan-
 guli ex summa duarum quantitatum in

majorem vel in minorem, itemque in dif-
 ferentiam eorundem.

Sit quantitas major Q , minor q :
 erit summa $Q + q$, differentia $Q - q$.
 Hinc (§. 375 *Geom.*)

$$\begin{array}{r} Q+q \quad Q+q \quad Q+q \\ \underline{Q} \quad \underline{q} \quad \underline{Q-q} \\ Q^2 + Qq \quad Qq + q^2 \quad -Qq - q^2 \\ \hline Q^2 + Qq \end{array}$$

Theorema. Rectangulum ex summa dua-
 rum quantitatum (e. gr. linearum) in alter-
 utram æquatur rectangulo partis unius in
 alteram atque quadrato partis alterutrius.
 Rectangulum vero ex summa in differen-
 tiam æquale est differentie quadratorum
 partium.

COROLLARIUM.

87. Quodsi rectangula $Q^2 + Qq$ & Qq
 + q^2 addantur; prodit $Q^2 + 2Qq + q^2$ qua-
 dratum ipsius $Q + q$ (§. 261 *Arithm.*).
 Quare rectangulum ex toto in partem alter-
 utram simul æquatur quadrato totius.

PROBLEMA XXIII.

88. Si totum sit divisum in duas
 partes æquales & in duas inæquales,
 determinare rectangulum partium inæ-
 qualium.

Sint partes æquales a & a , differen-
 tia inter partem æqualem & inæqualem
 b ; erit inæqualium major $a + b$, minor
 $a - b$; consequenter $(a + b)(a - b)$
 $= a^2 - b^2$. Ergo si addatur b^2 , habe-
 bitur a^2 .

Theorema. Si totum sit divisum in duas
 partes æquales & inæquales; erit rectangu-
 lum partium inæqualium una cum quadrato
 differentie partis æqualis ab inæquali, æqua-
 le quadrato partis æqualis.

COROL-

COROLLARIUM.

89. Quoniam $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ & $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (§. 261 Arithm.); erit summa $2a^2 + 2b^2$, hoc est, summa quadratorum partium inæqualium æqualis est duplo quadrato partis dimidiæ & duplo quadrato differentiæ partis æqualis ab inæquali.

PROBLEMA XXIV.

90. *Determinare alia rectangula ex partibus duabus, in quas totum aliquod divisum.*

Sint partes Q & q : erit totum $Q + q$, hujus quadratum $Q^2 + 2Qq + q^2$. Quodsi Q_2 addas; prodibit $2Q^2 + 2Qq + q^2 = 2Q(Q + q) + q^2$.

Theorema. Quadratum totius una cum quadrato partis unius æquale est rectangulo ex duplo ejusdem partis in totum atque quadrato partis alterius.

Quodsi $2Q + q$ in seipsum ducas; prodibit $4Q^2 + 4Qq + q^2$.

Theorema. Quadratum ex toto & parte una æquatur quadrato partis alterius una cum quadruplo quadrato partis illius & quadruplo rectangulo partium in se invicem.

PROBLEMA XXV.

91. *Determinare quantitatem rectanguli ex toto in partes tres inæquales divisio atque parte una.*

Sit totum $a + b + c$; erit $(a + b + c)c = ac + bc + c^2$.

Theorema. Rectangulum ex toto in tres partes inæquales divisio in partem unam æquatur quadrato ejusdem partis atque rectangulo ex eadem in summam duarum reliquarum.

PROBLEMA XXVI.

92. *Determinare quantitatem rectanguli ex linea in partes quotcunque divisæ & infecta altera.*

Sint partes lineæ sectæ $a, b, c, \&c.$ erit linea secta $= a + b + c \&c.$ Sit porro linea infecta $= d$: erit $(a + b + c \&c.)d = ad + bd + cd \&c.$

Theorema. Si linea recta fuerit in partes quotcunque divisa & præterea alia infecta, erit rectangulum sub iis comprehensum æquale rectangulis sub infecta & singulis sectæ partibus contentis.

PROBLEMA XXVII.

93. *Determinare quantitatem rectangulorum ex toto in duas partes divisio in partes singulas.*

Sit totum $= a \& b$, erit $(a + b)a = a^2 + ab$ & $(a + b)b = ab + b^2$. Ergo Summa $= a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ (§. 261 Arithm.),

Theorema. Si recta secta sit utcumque, erunt rectangula sub tota & partibus comprehensa quadrato totius æqualia.

PROBLEMA XXVIII.

94. *Determinare quantitatem rectanguli ex toto in duas partes æquales divisio & adjecto in adjectum.*

Sit totum in duas partes æquales divisum $= 2a$ & adjectum $= c$; erit compositum $= 2a + c$ consequenter $(2a + c)c = 2ac + c^2$. Sed $(a + c)^2 = a^2 + 2ac + c^2$. Ergo differentia $= a^2$.

Theorema. Rectangulum sub toto & adjecto in adjectum una cum Quadrato partis dimidiæ est æquale Quadrato compositi ex dimidio & adjecto.

PROBLEMA XXIX.

95. *Invenire theorema generale pro binomio ad dignitatem quamcunque evahendo.*

Sit $a + b$ radix binomia. Ducatur ea in se ipsam, erit $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

&c. (§. 229 *Arith.*): ceu videre est ex Tabula, quam hic exhibemus.

$1a$	$1b$																		
$1a^2$	$2ab$	$1b^2$																	
$1a^3$	$3a^2b$	$3ab^2$	$1b^3$																
$1a^4$	$4a^3b$	$6a^2b^2$	$4ab^3$	$1b^4$															
$1a^5$	$5a^4b$	$10a^3b^2$	$10a^2b^3$	$5ab^4$	$1b^5$														
$1a^6$	$6a^5b$	$15a^4b^2$	$20a^3b^3$	$15a^2b^4$	$6ab^5$	$1b^6$													
$1a^7$	$7a^6b$	$21a^5b^2$	$35a^4b^3$	$35a^3b^4$	$21a^2b^5$	$7ab^6$	$1b^7$												
$1a^8$	$8a^7b$	$28a^6b^2$	$56a^5b^3$	$70a^4b^4$	$56a^3b^5$	$28a^2b^6$	$8ab^7$	$1b^8$											
$1a^9$	$9a^8b$	$36a^7b^2$	$84a^6b^3$	$126a^5b^4$	$126a^4b^5$	$84a^3b^6$	$36a^2b^7$	$9ab^8$	$1b^9$										
$1a^{10}$	$10a^9b$	$45a^8b^2$	$120a^7b^3$	$210a^6b^4$	$252a^5b^5$	$210a^4b^6$	$120a^3b^7$	$45a^2b^8$	$10ab^9$	$1b^{10}$									

Ex Tabulae hujus consideratione manifestum est; terminos potentiarum componi ex quibusdam factis litteralibus & numeris praefixis, quos *Uncias* cum *Oughtredo* (*a*) vocant. Patet autem ulterius, facta reperiri, si fiant duae progressionis Geometricae, quarum prima a potentia desiderata partis primae radices incipiat & in unitate desinat, altera vero ab unitate incipiat & in desiderata potentia partis secundae radices desinat, atque termini ejusdem ordinis in utraque serie in se invicem ducantur. E. gr. quarenda potentia sexta: scribe

$a^6. a^5. a^4. a^3. a^2. a.$ I. series I.
 $1. b. b^2. b^3. b^4. b^5. b^6$ series II.

erunt $a^6 + a^5b + a^4b^2 + a^3b^3 + a^2b^4 + ab^5$

$+ b^6$ facta, ex quibus componitur potentia sexta ipsius $a + b$.

Apparet denique, uncias reperiri, si exponentes potentiarum secundae seriei seu ipsius b sub exponentibus potestatum primae seriei seu ipsius a scribantur & nota prima ex serie superiore sumatur pro numeratore, prima ex inferiore pro denominatore fractionis, quae vicem subit unciae termini secundi potestatis; similiter factum ex nota prima in secundam ex serie superiore sumatur pro numeratore, factum ex prima in secundam ex serie inferiori pro denominatore fractionis, quae unciae termini tertii potentiae aequalis &c. E. gr. pro potentia sexta erit:

6. 5.

(a) Clavis Mathematicae c. 12. §. 6. p. m. 38.

6. 5. 4. 3. 2. 1.

I. 2. 3. 4. 5. 6.

Hinc $\frac{6}{1} = 6$ uncia termini secundi potentiae sextae; $\frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} = \frac{30}{2} = 15$ uncia termini tertii; $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{120}{6} = 20$ uncia termini quarti; $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{360}{24} = 15$ uncia termini quinti; $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{720}{120} = 6$ uncia termini sexti; $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = 1$ uncia termini ultimi.

Habemus adeo methodum datam radicem binomiam ad quamcunque potentiam determinatam evehendi. Quodsi vero regulam pro potentia indeterminata desideres, non alia re opus est, quam ut exponens dicatur m : ita habebimus

$$a^m. a^{m-1}. a^{m-2}. a^{m-3}. a^{m-4}. a^{m-5} \\ I. b. b^2. b^3. b^4. b^5 \text{ \&c.}$$

$$\text{adeoque } a^m + a^{m-1} b + a^{m-2} b^2 + a^{m-3} b^3 + a^{m-4} b^4 + a^{m-5} b^5 \text{ \&c.}$$

quae sunt facta pro terminis potentiae indeterminatae in infinitum continuandae. Similiter inveniuntur unciae, ut ante. Cum enim exponentes sint:

$$\frac{m. m-1. m-2. m-3. m-4. m-5}{1. 2. 3. 4. 5. 6} \text{ \&c.}$$

erit $\frac{m}{1}$, uncia termini secundi potentiae;

$$\frac{m \cdot m-1}{1 \cdot 2}, \text{ uncia tertii;}$$

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \text{ uncia quarti;}$$

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}, \text{ uncia quinti;}$$

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}, \text{ uncia sexti;}$$

$$\frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}, \text{ uncia septimi \&c.}$$

Quare si has uncias in facta ipsis respondentia & paulo ante reperta

ducas; prodibit formula binomii ad potentiam indeterminatam elevati;

$$a^m \\ + \frac{m}{1} a^{m-1} b \\ + \frac{m \cdot m-1}{1 \cdot 2} a^{m-2} b^2 \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{m-3} b^3 \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^{m-4} b^4 \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} a^{m-5} b^5 \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} a^{m-6} b^6 \\ \text{\&c. in infinitum}$$

Quoniam vero $a^{m-1} = a^m : a$; $a^{m-2} = a^m : a^2$; $a^{m-3} = a^m : a^3$; $a^{m-4} = a^m : a^4$; $a^{m-5} = a^m : a^5$; &c. in infinit. (§. 54) his valoribus substitutis (§. 15 *Arithm.*) formula in sequentem degenerat:

$$a^m \\ + \frac{m \cdot a^m b}{1 \cdot a} \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot a^m b^2}{1 \cdot 2 \cdot a^2} \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot a^m b^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot a^3} \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot a^m b^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot a^4} \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot a^m b^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot a^5} \\ + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot a^m b^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot a^6} \\ \text{\&c. in infinitum.}$$

Quodsi jam porro cum viro summo *Isaaco Newtono* (a) ponamus $a = P$ & $b = Q$; erit $a^m = P^m$; $b^2 = Q^2$; $b^3 = Q^3$; $b^4 = Q^4$; $b^5 = Q^5$ &c.

(a) In epistola A. 1676 ad *Leibnizium* data apud *Wassivum* Operum Vol. III. f. 622.

&c. consequenter his valoribus substitutis formula :

$$\begin{aligned}
 &P^m \\
 &+ \frac{m}{1} P^m Q \\
 &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} P^m Q^2 \\
 &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} P^m Q^3 \\
 &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} P^m Q^4 \quad \&c.
 \end{aligned}$$

Ponatur porro $P^m = A$; erit $\frac{m}{1} P^m Q = \frac{m}{1} A Q$.

Sit $\frac{m}{1} P^m Q = B$; erit $\frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} P^m Q^2 = \frac{m - 1}{2} B Q$.

Sit $\frac{m - 1}{2} B Q = C$; erit $\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} P^m Q^3 = \frac{m - 2}{3} C Q$.

Sit $\frac{m - 2}{3} C Q = D$; erit $\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} P^m Q^4 = \frac{m - 3}{4} D Q$.

Sit $\frac{m - 3}{4} D Q = E$; erit $\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} P^m Q^5 = \frac{m - 4}{5} E Q$.

Sit $\frac{m - 4}{5} E Q = F$; erit $\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} P^m Q^6 = \frac{m - 5}{6} F Q$.

&c. in infinitum

Habetur ergo tandem

$$\begin{aligned}
 (a + b)^m &= (P + PQ)^m = P^m + \frac{m}{1} A Q \\
 &+ \frac{m - 1}{2} B Q + \frac{m - 2}{3} C Q + \frac{m - 3}{4} D Q \\
 &+ \frac{m - 4}{5} E Q + \frac{m - 5}{6} F Q \quad \&c. \text{ in infinit.}
 \end{aligned}$$

SCHOLIION I.

96. Equidem hoc theorema nonnisi per inductionem erimus, que inter demonstrandi methodos locum minime habet: sed cum hac inductio fundetur in observatione legis constantis atque necessaria, in inveniundo tuto

adhibetur, etsi consultum sit, reperta alio postea modo demonstrari.

SCHOLIION II.

97. Ut vero theorema facilius intelligatur, exemplo numerico id illustrare lubet. Ponamus ergo inveniri debere dignitatem quartam radicis 18 seu 10 + 8: erit $m = 4$, $P = 10$, $Q = 8$: $10 = \frac{4}{5}$, consequenter

$$\begin{aligned}
 P^m &= 10^4 = 10000 = A \\
 m A Q &= 4 \cdot 10000 \cdot \frac{4}{5} = \frac{160000}{5} = 32000 = B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{m - 1}{2} B Q &= \frac{3}{2} \cdot 32000 \cdot \frac{4}{5} = \frac{6}{5} \cdot 32000 = 6 \cdot 6400 = 38400 = C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{m - 2}{3} C Q &= \frac{2}{3} \cdot 38400 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15} \cdot 38400 \\
 &= \frac{307200}{15} = 20480 = D
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{m - 3}{4} D Q &= \frac{1}{4} \cdot 20480 \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{5} \cdot 20480 \\
 &= \frac{20480}{5} = 4096 = E
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{m - 4}{5} E Q &= 0 \cdot 4096 \cdot \frac{4}{5} = 0. \\
 10000 &= A \\
 32000 &= B \\
 38400 &= C \\
 20480 &= D \\
 4096 &= E
 \end{aligned}$$

103976 Dignitas quarta ipsius 18.

Eadem dignitas invenitur, si 18 in duas quascunque partes alias, e. gr. in 6 & 12 secetur: quo in casu erit $P = 6$ & $Q = 12$: $6 = 2$, consequenter

$$\begin{aligned}
 P^m &= 6^4 = 1296 = A \\
 m A Q &= 4 \cdot 1296 \cdot 2 = 8 \cdot 1296 = 10368 = B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{m - 1}{2} B Q &= \frac{3}{2} \cdot 10368 \cdot 2 = 3 \cdot 10368 = 31104 = C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{m - 2}{3} C Q &= \frac{2}{3} \cdot 31104 \cdot 2 = \frac{4}{3} \cdot 31104 = \frac{124416}{3} = 41472 = D
 \end{aligned}$$

$m - 3$

$$\frac{m-3}{4} DQ = \frac{1}{4} \cdot 41472 \cdot 2 = \frac{2}{4} \cdot 41472 = \frac{41472}{2} = 20736 = E$$

$$\frac{m-4}{5} EQ = 0 \cdot 20736 = 0$$

- 1 2 9 6 = A
- 1 0 3 6 8 = B
- 3 1 1 0 4 = C
- 4 1 4 7 2 = D
- 2 0 7 3 6 = E

1 0 4 9 7 6 Dignitas quarta
iplius 18.

Patet adeo seriem terminari, si m explicetur per numerum determinatum.

COROLLARIUM I.

98. Si m explicetur per numerum fractum, series $P^m + \frac{m}{1}AQ + \frac{m-1}{2}BQ$ &c. exprimet radicem indeterminatam ipsius $P \pm PQ$ (§. 57), adeoque idem theorema extractioni radicis infervit. E.gr. Sit ex $aa - xx$ extrahenda radix quadrata; erit $m = \frac{1}{2}$ (§. cit.) $\therefore P = x^2$ & $Q = -x^2: a^2$.

Unde

$$P^m = a^{1/2} = a = A$$

$$\frac{m}{1}AQ = \frac{1}{2}a \cdot \frac{-x^2}{a^2} = \frac{-x^2}{2a} = B$$

$$\frac{m-1}{2}BQ = \left(\frac{1}{2} - 1\right) : 2 \cdot \frac{-x^2}{2a} \cdot \frac{-x^2}{a^2} = \frac{1-2 \cdot \frac{\lambda^4}{2a^3}}{4} = \frac{-x^4}{8a^3} = C$$

$$\frac{m-2}{3}CQ = \left(\frac{1}{2} - 2\right) : 3 \cdot \frac{-x^4}{8a^3} \cdot \frac{-x^2}{a^2} = \frac{1-4 \cdot \frac{\lambda^6}{8a^5}}{6} = \frac{-3 \cdot \frac{\lambda^6}{8a^5}}{6} = \frac{-x^6}{16a^5} = D$$

$$\frac{m-3}{4}DQ = \left(\frac{1}{2} - 3\right) : 4 \cdot \frac{-x^6}{16a^5} \cdot \frac{-x^2}{a^2} = \frac{1-6 \cdot \frac{\lambda^8}{8 \cdot 16 \cdot 7}}{8} = \frac{-5 \cdot \frac{\lambda^8}{128 \cdot 4^7}}{8} = E$$

$$\frac{m-4}{5}EQ = \left(\frac{1}{2} - 4\right) : 5 \cdot \frac{-5 \cdot \frac{\lambda^8}{128 \cdot 4^7}}{8} \cdot \frac{-x^2}{a^2}$$

$$= \frac{1-8 \cdot \frac{5 \cdot \lambda^{10}}{128 \cdot 4^9}}{10} = \frac{-7 \cdot \frac{\lambda^{10}}{256 \cdot 4^9}}{10} \text{ \&c. in infin.}$$

Est adeo $\sqrt{(a^2 - x^2)} = a - \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} - \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128 \cdot 4^7} - \frac{7x^{10}}{256 \cdot 4^9} \text{ \&c. in infinit.}$

SCHOLIUM III.

99. Si cui molestus evadit fractionum calculus, is cum Newtono in formula generali substituat pro m exponentem fractum m : n formulam sequentem obtenturus :

$$(P \pm PQ)^{m:n} = P^{m:n} \pm \frac{m}{n}AQ \pm \frac{m-1}{2n}BQ \pm \frac{m-2n}{3n}CQ \pm \frac{m-3n}{4n}DQ \pm \frac{m-4n}{5n}EQ$$

&c. Hac vero formula ubi utetur quantitates ad potentiam everturus, pro n assumet 1.

SCHOLIUM IV.

100. Ex numerorum determinatorum potentis radicem extracturus adhibeat formulam

$$a^m \pm \frac{m}{1}a^{m-1}b \text{ \&c. quam in dato casu de-$$

terminet, numero pro m substituto. E.gr. Sit ex 104976 extrahenda radix quartana; erit m = 4 : unde habetur $a^4 \pm 4a^3b \pm 6a^2b^2 \pm 4ab^3 \pm b^4$ & juxta hoc theorema extractio radicis quartanae eodem modo peragitur, quo quadratam & cubicam (§. 269. 270 Arithm.) inquisivimus. Nimirum cum preter a^4 seu quadratoquadratum partis primae radicis quatuor auferri debeant facta, resercentur versus dexteram nota quatuor & potentia quarta proxime accedens ad 10 nempe 1, erit a^4 . En calculi typum :

10	4976(18	$4a^3 = 4$
1	_____	$b = 8$
9	* 976	$4a^3b = 32$
$4a^3 =$	* . . .	$b^2 = 64$
$4a^3b = 3$	2 . . .	$a^2 = 1$
$6a^2b^2 = 3$	8 4 . .	$a^2b^2 = 64$
$4ab^3 = 2$	0 4 8 .	6
$b^4 =$	4096	$6a^2b^2 = 384$
_____	9*976	$b^3 = 512$
0	_____	$4a = 4$
_____	_____	$4ab^3 = 2048$

Si radix plures, quam tres notas habuerit ; operatio altera repetenda , ut in extractione radicum quadratarum ac cubicarum (S. cit. Arithm.). Quodsi numerus, ex quo radix extrahenda, non sit dignitas perfecta ; dignitas proxime minor sit = P & residuum post extractionem more vulgari institutam per eandem divisum = Q, m = 1 & n exponens dignitatis, cujus radix desideratur. Ita ope theorematis in Schol. præc. obtinetur series infinita certa progressionis lege residuam partem radicis exhibens.

E. gr. Queratur $\sqrt{2}$. Quoniam quadratum proxime minus = 1 & residuum hoc ex 2 subducto = 1 ; erit P = 1, Q = 1. Præterea m = 1 & n = 2. Hinc

$$P^{m:n} = 1 = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} = B$$

$$\frac{m-n}{2^n} BQ = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cdot 4} = C$$

$$\frac{m-2n}{3^n} CQ = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{2 \cdot 4} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} = D$$

$$\frac{m-3n}{4^n} DQ = \frac{5}{8} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} = E$$

$$\frac{m-4n}{5^n} EQ = \frac{7}{10} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} =$$

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} \&c.$$

$$\text{Est ergo } \sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} - \&c.$$

$$= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{5}{128} + \frac{7}{256} - \&c. \text{ in infinitum.}$$

Ubi series fractionum denotat partem radicis unitate minorem. Ceterum cum $\sqrt{2}$ sit diagonalis quadrati, posito ejus latere = 1 (S. 420 Geom.); habetur jam valor diagonalis in terminis rationalibus, unde rationes prope veræ ad praxin quantumlibet sufficientes duci possunt. E. gr. si pro diagonali sumatur $1 + \frac{1}{2}$, erit ratio $1 + \frac{1}{2} : 1$ (= 3 : 2) justo major quam diagonalis ad latus, sed excessus consistet infra $\frac{1}{8}$. Si pro diagonali sumatur $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$ seu $\frac{11}{8}$; erit ratio $\frac{11}{8} : 1$ (= 11 : 8) justo minor quam diagonalis ad latus, sed defectu infra $\frac{1}{16}$ existente : & ita porro.

COROLLARIUM II.

101. Quoniam polynomium pro binomio haberi potest, sumtis pluribus partibus pro una; eadem formula polynomiis ad datam dignitatem evehendis inservit.

E. gr. Si trinomium $c + d + g$ ad dignitatem aliquam, e. gr. quartam evehendum; ponatur in formula $a^m + \frac{m}{1} a^{m-1} b$ &c. $c = a$ & $d + g = b$: erit

$$(c + d + g)^4 = c^4 + 4c^3(d + g) + 6c^2(d + g)^2 + 4c(d + g)^3 + (d + g)^4.$$

Nempe $a^m = c^4$, $ma^{m-1}b = 4c^3(d + g)$,

$$\frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} a^{m-2} b^2 = 6c^2(d + g)^2,$$

$$\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{m-3} b^3 = 4c(d + g)^3,$$

$$\frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^m - 4b^4 = (d + g)^4.$$

Est vero vi ejusdem theorematis $(d+g)^2 = d^2 + 2dg + g^2$, $(d+g)^3 = d^3 + 3d^2g + 3d^2g + g^3$, $(d+g)^4 = d^4 + 4d^3g + 6d^2g^2 + 4dg^3 + g^4$. Ergo $(c+d+g)^4 = c^4 + 4c^3d + 4c^3g + 6c^2d^2 + 12c^2dg + 6c^2g^2 + 4cd^3 + 12cd^2g + 12cdg^2 + 4cg^3 + d^4 + 4d^3g + 6d^2g^2 + 4dg^3 + g^4$.

COROLLARIUM III.

102. Quare si infinitinomium fuerit $a + by + cy^2 + dy^3 + ey^4 + fy^5 + gy^6$ &c. in infinit. & in formula pro a substituaturs a , pro b autem $by + cy^2 + dy^3 + ey^4 + fy^5 + gy^6$ &c. in infinit. prodibit formula generalis pro infinitinomio ad datam potentiam evehendo aut ex eadem radicem extrahendo. Est enim

$$b^2 = b^2 y^2 + 2bcy^3 + c^2y^4 + 2cdy^5 + 2bdy^4 + 2bey^5 + d^2y^6 \text{ \&c.}$$

$$+ 2cy^6 \text{ \&c.}$$

$$+ 2bfy^6 \text{ \&c.}$$

$$b^3 = b^3 y^3 + 3b^2cy^4 + 3bc^2y^5 + c^3y^6 \text{ \&c.}$$

$$+ 3bdy^5 + 6bcdy^6 \text{ \&c.}$$

$$+ 2b^2ey^6 \text{ \&c.}$$

$$b^4 = + b^4 y^4 + 4b^3cy^5 + 6b^2c^2y^6 \text{ \&c.}$$

$$+ 4b^3dy^6 \text{ \&c.}$$

$$b^5 = + b^5 y^5 + 5b^4cy^6 \text{ \&c.}$$

$$b^6 = + b^6 y^6 \text{ \&c.}$$

Hos ergo valores si in formula $a^m + \frac{m}{1} a^{m-1} b + \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} a^{m-2} b^2 + \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{m-3} b^3$ &c. substituas & terminos homogeneos, in quibus nempe eadem potentia ipsius y occurrit, decenter coordines; prodibit formula pro infinitinomio:

$$a^m + \frac{m}{1} a^{m-1} by$$

$$\left. \begin{aligned} &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} a^{m-2} b^2 \\ &+ \frac{m}{1} a^{m-1} c \end{aligned} \right\} y^2$$

$$\left. \begin{aligned} &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{m-3} b^3 \\ &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 1} a^{m-2} bc \\ &+ \frac{m}{1} a^{m-1} d \end{aligned} \right\} y^3$$

$$\left. \begin{aligned} &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^m - 4b^4 \\ &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 1} a^{m-3} b^2 c \\ &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} a^{m-2} c^2 \\ &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 1} a^{m-2} bd \\ &+ \frac{m}{1} a^{m-1} c \end{aligned} \right\} y^4$$

$$\left. \begin{aligned} &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} a^{m-5} b^5 \\ &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1} a^{m-4} b^3 c \\ &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 1} a^{m-3} b^2 d \\ &+ \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 1} a^{m-3} b c^2 \\ &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 1} a^{m-2} cd \\ &+ \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 1} a^{m-2} be \\ &+ \frac{m}{1} a^{m-1} f \end{aligned} \right\} y^5$$

$$\begin{aligned} & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4 \cdot m - 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} a^{m-6} b^6 \\ & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1} a^{m-5} b^4 c \\ & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4} a^{m-4} b^2 c^2 \\ & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1} a^{m-4} b^3 d \\ & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{m-3} c^3 \\ & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 1 \cdot 1} a^{m-3} bcd \\ & \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 1 \cdot 3} a^{m-3} b^2 e \\ & \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} a^{m-2} d^2 \\ & \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 1} a^{m-2} ce \\ & \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 1} a^{m-2} bf \\ & \frac{m}{1} a^{m-1} g \end{aligned}$$

&c. &c. in infinit.

COROLLARIUM IV.

103. Eodem modo patet, si infinitinomialium fuerit $ay + by^2 + cy^3 + dy^4 + ey^5 + fy^6$ &c. ad dignitatem m evehendum; in serie antecedente tantum omnes terminos multiplicandos esse per y^m , ita ut uncia retineantur eadem iidemque coefficientes, dignitates vero ipsius y sint $y^m + y^{m+1} + y^{m+2} + y^{m+3} + y^{m+4} + y^{m+5} + y^{m+6}$ &c.

SCHOLIUM V.

104. Constat adeo idem theorema; quod pro binomio dedimus, etiam infinitinomialio ad dignitatem desideratam evehendo sufficere. Tyrones illud sub initium studii analytici

pretermittant, donec inferius in analysi infinitorum eodem opus habuerint. Immo infinitinomialium ad potestatem determinatam facile evehitur per formulas speciales superius allatas. E. gr. Sit $hx + ix^2 + kx^3 + lx^4 + mx^5$ &c. evehenda ad dignitatem secundam: cum $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, erit $h^2x^2 + 2hix^3 + i^2x^4$

$$\begin{aligned} & + 2hix^4 + 2ikx^5 + k^2x^6 \text{ \&c.} \\ & + 2hlx^5 + 2ilx^6 \text{ \&c.} \\ & + 2hmix^6 \text{ \&c.} \end{aligned}$$

(S. 265 Arithm.). Nimirum primo sumuntur duo tantummodo termini, veluti hic $hx + ix^2$ & queritur ejus potentia desiderata, veluti hic secunda. Deinde $hx + ix^2$, habentur pro termino uno, kx^3 pro altero, atque sic de novo per formulam binomiali determinatur potentia desiderata, veluti hic secunda. Porro $hx + ix^2 + kx^3$ sumuntur pro termino uno & lx^4 pro altero, & ita porro. Quae eadem series invenitur, si in generali (S. 102) fiat $m = 2$, $y = x$, $a = h$, $b = i$, $c = k$, $d = l$, $e = m$, &c. Est enim:

$$a^m y^m = h^2 x^2$$

$$\frac{m}{1} a^{m-1} b y^{m+1} = 2hix^3$$

$$\frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} a^{m-2} b^2 y^{m+1} = \frac{2}{2} h^2 i^2 x^4 = i^2 x^4$$

$$\frac{m}{1} a^{m-1} c y^{m+2} = 2hix^4 \text{ \&c.}$$

SCHOLIUM VI.

105. Ceterum notetur artificium, quo casus infiniti, immo infinities infiniti, ad regulam eandem reducuntur.

PROBLEMA XXV.

106. Determinare summam termini primi & ultimi in progressionem arithmetica.

Sit

Sit terminus primus, differentia terminorum sive crescentium, sive decrefcentium d , erit (§. 333 *Arithm.*).

$a \pm d.$	$a \pm 2d.$	$a \pm 3d.$	$a \pm 4d.$	$a \pm 5d.$
$a \pm 4d.$	$a \pm 2d.$	$a.$		
$2a \pm 5d.$	$2a \pm 5d.$	$2a \pm 5d.$		

Item

$a.$	$a \pm d.$	$a \pm 2d.$	$a \pm 3d.$	$a \pm 4d.$
	$a \pm 3d.$	$2.$	$a.$	
$2a \pm 4d.$	$2a \pm 4d.$			$2a \pm 4d.$

Theorema. In progressionem arithmetica tam crescente, quam decrefcente, summa termini primi & ultimi æqualis est summæ duorum quorumlibet mediorum ab extremis æquidistantium aut medii duplo, si numerus terminorum impar.

E. gr. 3.	6.	9.	12.	15.	18.	21.
		12	9	6	3	
$24 = 24 = 24 = 24$						

COROLLARIUM I.

107. Habetur ergo summa progressionis arithmeticæ, si summa termini primi & ultimi ducatur in dimidium terminorum numerum.

COROLLARIUM II.

108. Quodsi adeo sit terminus primus a , differentia d , numerus terminorum n , erit ultimus $a \pm (n-1)d$ (§. 333 *Arithm.*), consequenter summa progressionis $\frac{1}{2} n (2a \pm$

$(n-1)d)$ (§. 107) $= an \pm \frac{1}{2} (n^2 - n) d$.
 Ex datis itaque termino primo a , differentia d & numero terminorum n invenitur summa progressionis, si facto ex termino primo in numerum terminorum addatur factum ex differentia eorundem in semidifferentiam numeri terminorum a quadrato ejusdem. E. gr. Sit $a = 3$, $n = 7$, $d = 3$, erit summa $= 21 \pm \frac{49-7}{2} \cdot 3 = 21 \pm \frac{42}{2} \cdot 3 = 21 \pm 21 \cdot 3 = 21 \pm 63 = 84$.

SCHOLIUM.

109. Notent tyrones regulas ex symbolis eruturi, ab initio gradatim esse progredendum, exprimendo nempe sigillatim quodlibet symbolum per rem denotatam & quamlibet operationem signis representatam per nomina convenientia. E. gr. in an est a terminus primus & n numerus terminorum, ex hypoth. Sed an est factum ex a in n (§. 8). Ergo pro an substituitur in regula factum ex termino primo in numerum terminorum. Porro n^2 est quadratum ipsius n (§. 254 *Arithm.*). Sed n est numerus terminorum ergo n^2 quadratum numeri terminorum. Signum — indicat subtractionem (§. 8). Quare $n^2 - n$ differentia numeri terminorum ab ejus quadrato & $\frac{1}{2} (n^2 - n)$ semidifferentia ista. Porro d est differentia terminorum ex hypoth. adeoque $\frac{1}{2} (n^2 - n) d$ factum ex illa semidifferentia in differentiam terminorum. Denique signum + indicat facta hætenus explicata esse addenda. Hac quidem syllabizatione opus habent, qui sine mora symbolicas expressiones quantitatum sibi familiares reddere gestiunt.

COROLLARIUM III.

110. Sit $a = 1$, $d = 2$, hoc est, sit series numerorum imparium 1. 3. 5. 7 &c. erit sum.

summa $= n + ni - n$ (S. 108) $= n^2$ (S. 21). Patet adeo numeros quadratos prodire continua numerorum imparium additione, consequenter differentias numerorum quadratorum esse numeros impares: id quod supra alia ratione fuit demonstratum (S. 83).

COROLLARIUM IV.

111. Sit $a = n = \frac{1}{2}d$, erit summa $= n^2 + n^3 - n^2$ (S. 108) $= n^3$ (S. 21). Quilibet adeo cubus resolvitur in progressionem arithmeticam, cujus terminus primus, semidifferentia & numerus terminorum sunt radici ejus æquales. Ita $8 = 2 + 6$, $27 = 3 + 9 + 15$, $64 = 4 + 12 + 20 + 28$.

SCHOLIUM.

112. Patet modus ex formulis algebraicis eruendi theoremata specialia, qui continetur sub problemate logico de specierum notionibus ex notione generis formandis (S. 712 Log.).

DEFINITIO IV.

113. Denominator rationis est quotus ex divisione termini majoris per minorem emergens.

COROLLARIUM I.

114. Major ergo prodit, minore per denominatorem multiplicato (S. 212 Arithm.): minor vero habetur, majore per denominatorem diviso (S. 210 Arithm.). Unde si terminus minor a , denominator m , erit major ma ; si terminus major a , minor erit $\frac{a}{m}$. Quare $a : m$ a exprimit rationem minoris inæqualitatis; $a : \frac{1}{m}$ vero rationem majoris (S. 133 Arithm.). Immo quotiam $\frac{a}{m} = a \cdot \frac{1}{m}$ (S. 43); si m explicetur per

fractionem, cujus numerator unitas denominator idem cum denominatore rationis, $a : m$ a rationem quamcunque designat.

COROLLARIUM II.

115. Quia in ratione majoris inæqualitatis antecedens major consequente (S. 133 Arithm.); ejus denominator idem est cum exponente (S. 136 Arithm.).

COROLLARIUM III.

116. In ratione minoris inæqualitatis exponens rationis $\frac{a}{ma}$ (S. 136. Arithm. & S.

114 Analys.): hoc est, $\frac{1}{m}$ (S. 231 Arithm.).

Æquatur ergo fractioni, cujus numerator unitas, denominator idem cum denominatore rationis.

SCHOLIUM.

117. Exponens & denominator rationis Autoribus voces synonymæ sunt. Aliter vero veteres, aliter recentiores exponentem definiunt. Nos veterum definitionem retinimus in Arithmetica (S. 136), tum quod naturam rationum clare explicet, tum quod ad demonstrandum utilis. Etenim si rationis $2 : 3$ exponens dicatur $\frac{2}{3}$; inde intelligitur, antecedentem terminum esse æqualem duabus tertiis consequentis, adeoque pro mensura, qua utrumque metimur, assumi tertiam consequentis partem. Hinc vero clarius cognoscitur rationis hujus natura, quam si cum recentioribus nonnullis dicas exponentem esse $1\frac{1}{2}$: quod innuit, antecedentem in consequente contineri $1\frac{1}{2}$. Recentiores vero exponentem rationis eodem modo definiunt, quo denominatorem definimus, ideo eundem exponentem constituunt rationum majoris & minoris inæqualitatis (S. 115), quod nomen etiam in casu posteriori suggerat (S. 147 Arithm.) & demonstr-

demonstrationibus analyticis commodior videatur : quem in finem nos exponentis loco nunc denominatorem assumimus.

PROBLEMA XXX.

118. Determinare factum ex termino primo in ultimum progressionis geometricæ.

Sit terminus primus a , denominator m ; erit progressio (§. 332 Arithm. & §. 114 Analysf.).

$$\begin{array}{r} a. m a. m^2 a. m^3 a. m^4 a. m^5 a. m^6 a. \\ m^5 a \quad m^3 a. m^2 a \quad a \\ \hline m^6 a^2 = m^6 a^2 = m^6 a^2 = m^6 a^2 \end{array}$$

Theorema. In progressionē geometricā factum extremorum æquatur factio mediorum ab extremis æquidistantium, itemque medii quadrato, si numerus terminorum impar.

E. gr. 3. 6. 12. 24. 48. 96
 $\frac{12 \quad 6 \quad 3}{288 = 288 = 288}$

PROBLEMA XXXI.

119. Determinare quotum ex divisione differentia terminorum primi ac ultimi per denominatorem unitate multiplicatum emergentem.

Sit terminus primus a , denominator m , numerus terminorum n ; erit terminus ultimus $m^{n-1} a$, differentia primi $m^{n-1} a - a$. Hæc si dividatur per $m-1$, erit quotus $m^{n-2} a + m^{n-3} a + m^{n-4} a + m^{n-5} a + m^{n-6} a + m^{n-7} a$ &c.

$$\begin{array}{r} (1) m^{n-1} a - a \\ \hline m^{n-1} a - m^{n-2} a \\ + m^{n-2} a - a \\ \hline m^{n-2} a - m^{n-3} a \\ + m^{n-3} a - a \\ \hline m^{n-3} a - m^{n-4} a \\ + m^{n-4} a - a \\ \hline m^{n-4} a - m^{n-5} a \\ + m^{n-5} a - a \\ \hline m^{n-5} a - m^{n-6} a \\ + m^{n-6} a - a \\ \hline m^{n-6} a - m^{n-7} a \\ + m^{n-7} a - a \\ \hline m^{n-7} a - m^{n-8} a \\ + m^{n-8} a - a \\ \hline \dots \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + m^{n-3} a - a \\ \hline m^{n-3} a - m^{n-4} a \\ + m^{n-4} a - a \\ \hline m^{n-4} a - m^{n-5} a \\ + m^{n-5} a - a \\ \hline m^{n-5} a - m^{n-6} a \\ + m^{n-6} a - a \\ \hline \dots \end{array}$$

Quodsi n determinetur, e. gr. per 7, erit $n-7=0$, consequenter $m^{n-7} a = m^0 a = a$, adeoque divisio terminatur. Unde patet

Theorema 1. Si differentia termini primi & ultimi progressionis geometricæ dividatur per denominatorem unitate multiplicatum, quotus est summa omnium terminorum excepto maximo.

Et cum sit $m-1 : 1 = m^{n-1} a - a : m^{n-2} a + m^{n-3} a$ &c. $+ a$ (§. 174 169 Arithm.); patet porro

Theorema 2. In progressionē geometricā est ut denominator unitate multiplicatus ad unitatem ita differentia termini maximi & minimi ad summam omnium terminorum excepto maximo.

COROLLARIUM I.

120. Quodsi ergo quotus ex divisione differentie termini maximi & minimi per denominatorem unitate multiplicatum emergenti maximus addatur; summa totius progressionis habetur.

COROLLARIUM II.

121. Sit adeo terminus primus a denominator m , numerus terminorum n , erit terminus ultimus seu maximus $m^{n-1} a$, adeoque summa $m^{n-1} a + (m^{n-1} a - a) : (m-1) = (m^n a - m^{n-1} a + m^{n-1} a - a) : (m-1)$ (§.

(*S. 235 Arithm.*) $\equiv (m^n a - a) : (m - 1)$ (*S. 21*), consequenter si eadem summa dicatur f , $m - 1 : m^n - 1 \equiv a : f$, (*S. 302 Arithm.*). Est adeo terminus primus (seu minimus) progressionis ad ejus summam ut denominator unitate multiplicatus ad ejus dignitatem, cujus exponens numero terminorum æqualis, unitate itidem multiplicata. Sit e. gr. $m = 2$, $a = 1$, $n = 8$, erit summa $(256 - 1) : 1 = 255$.

COROLLARIUM III.

122. Quoniam si terminus primus a , denominator m ; terminus ultimus $m^{n-1} a$, summa $(m^n a - a) : (m - 1)$ (*S. 121*): erit differentia inter terminum ultimum & summam $(m^n - 1 a - a) : (m - 1)$ & differentia inter primum & summam $\frac{m^n a - a}{m - 1} - a$
 $= \frac{m^n a - a - ma + a}{m - 1}$ (*S. 235 Arithm.*)
 $= \frac{m^n a - ma}{m - 1}$. Est ergo differentia prior ad posteriorem ut $(m^n - 1 a - a) : (m - 1)$ ad $(m^n a - ma) : (m - 1)$, hoc est, ut $m^n - 1 a - a$ ad $m^n a - ma$ (*S. 178 Arithm.*), hoc est, ut 1 ad m (*S. 181 Arithm.*), seu ut unitas ad denominatorem.

COROLLARIUM IV.

123. Quare si differentia inter terminum primum & summam dividatur per differentiam inter summam & terminum ultimum; quotus est denominator (*S. 69 Arithm.*).

PROBLEMA XXXII.

124. Investigare rationum symptomatica.

Non alia re opus est, quam ut termini analytice exprimentur (*S. 114*)

& tentatis quotlibet mutationibus exploretur, utrum duarum rationum exponentes sint æquales nec ne, (*S. 149 Arithm.*). Sint itaque duæ quantitates a & ma ; erit

$$\begin{array}{l} \text{I. } a : ma \\ \quad \frac{c}{c} \\ ac : mac = a : ma \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{II. } a : ma \\ \quad \frac{c}{c} \\ \frac{a}{c} : \frac{ma}{c} = a : ma \end{array}$$

$$\text{III. } \begin{array}{l} a : ma \\ b : mb \end{array}$$

$$\frac{a - b}{a} : \frac{ma - mb}{ma} = a : ma = b : mb$$

$$\text{IV. } \begin{array}{l} a : ma \\ b : mb \end{array}$$

$$a + b : ma + mb = a : ma = b : mb.$$

Sit porro

$$a : ma = b : mb$$

erit alternatim $a : b = ma : mb$

$$\text{inverse } ma : a = mb : b$$

conversim $a + ma : a = b + mb : b$

compositæ $a + ma : ma = b + mb : mb$

Divisim $ma - a : a = mb - b : b$

$$ma - a : ma = mb - b : mb$$

Item : $a^n : m^n a^n = b^n : m^n b^n$

$$a : mac = b : mbc$$

$$a : \frac{ma}{c} = b : \frac{mb}{c}$$

$$ac : ma = bc : mb$$

$$\frac{a}{c} : ma = \frac{b}{c} : mb$$

$$ac : mac = b : mb$$

$$\frac{a}{c} : \frac{ma}{c} = b : mb$$

$$ac : mac = bd : mbd$$

$$\frac{a}{c} : \frac{ma}{c} = \frac{b}{d} : \frac{mb}{d}$$

$$ac : mad$$

$$ac : mad = bc : mbd$$

$$\frac{a}{c} : \frac{ma}{d} = \frac{b}{c} : \frac{mb}{d}$$

Sit ordinate $a : ma = b : mb$

$$\& \quad ma : mna = mb : mnb$$

erit ex æquo $a : mna = b : mnb$

Sit perturbate $a : ma = b : mb$

$$\& \quad ma : mna = \frac{b}{n} : b$$

erit ex æquo $a : mna = \frac{b}{n} : mb$

Ipsæ nimirum expressiones, si quoti reducentur per regulas fractionum, rationum similitudinem in omnibus loquantur. E. gr. $ac : mac = 1 : m$ & $b : mb = 1 : m$. En utrobique exponentem eundem $1 : m$!

COROLLARIUM.

125. Cum sit in progressionem geometricam $\times m - 1 : 1 = m^{n-1} a - a : m^n - 2 a + m^{n-3} a$ & $m^{n-4} a$ &c. $+ a$ (ib. 2. §. 119), sit verum $- 1 : 1 = ma - a : a$ (§. 124 n. 1.); $ma - a : a = m^{n-1} a - a : m^n - 2 a + m^{n-3} a + m^{n-4} a$ &c. $\times a$, hoc est, excessus termini secundi supra primum est ad primum ut excessus ultimi sive maximi supra primum ad summam omnium terminorum demto maximo.

PROBLEMA XXXIII.

126. Investigare symptomata progressionum geometricarum ab unitate incipientium.

Si terminus primus est unitas, secundus idem est cum denominatore rationis (§. 114). Est vero terminus secundus vel numerus primus, vel compositus & in casu altero vel quadratus, vel potentia alia cujuscunque ordinis vel nulla.

Cum numerus primus in se non possit
Wolffii. Oper. Mathem. Tom. I.

dividi nisi per unitatem solam (§. 75 *Arithm.*), caractere primitivo m recte exprimitur. Unde emergit series in ratione geometrica progredientium:

$$1. m^1. m^2. m^3. m^4. m^5. m^6, \&c.$$

Quoniam termini omnes procedunt continuata multiplicatione secundi in seipsum (§. 334 *Arith.*); per nullum quoque numerum primum dividi possunt exacte nisi per secundum, seu nullus numerus primus terminos metitur præter secundum. In formula generali idem ad oculum patet: etenim $m^2 m^3 m^4 m^5 m^6$ &c. non posse dividi nisi per m , patet (§. 54). Et cum terminus secundus in hoc casu sit potentia prima, termini sequentes sint potentia continuo ordine progredientes ejusdem numeri (§. 254 *Arithm.*); terminus quilibet major dividi potest per quemlibet minorem, sed per nullum alium (§. 54). Habemus adeo

Theorema 1. Si numerorum ab unitate continue proportionalium proximus unitati primus est, maximum nullus alius metitur præter eos, qui sunt in serie, consequenter nec primus alius, nisi secundus seu ab unitate proximus.

Et quoniam in omni casu numerorum ab unitate continue proportionalium termini ultra secundum sunt potentia continuo ordine progredientes ejusdem termini secundi, qui communis omnium radix est (§. 334. 254 *Arithm.*); igitur in genere patet

Theorema 2. In serie numerorum ab unitate continue proportionalium minor quilibet quemlibet majorem metitur per aliquem numerum, qui est in serie.

Cum terminus compositus exacte dividi possit per numerum alium præter unitatem (§. 76 *Arith.*); exprimetur idem per mn . Quare si in progressionem geometricam ab unitate incipiente terminus secundus sit mn ; erit series

$$I. mn. m^2 n^2. m^3 n^3. m^4 n^4. m^5 n^5. m^6 n^6. \&c.$$

atque adeo patet numeros primos m & n , qui metiuntur secundum terminum, metiri quoque ceteros omnes, nec præter eos alium quendam numerum primum ceterorum quemcunque metiri. Unde habemus

Theorema 3. Si ab unitate fuerint numeri quotcunque continue proportionales, primus numerus, qui metitur ultimum, metietur & unitati proximum ac omnes intermedios.

In utraque serie exponentis termini secundi est 1, tertii 2, quarti 3, quinti 4 &c. consequenter exponentis in loco impari est numerus par, in loco pari est impar, & quidem in loco quarto seu a secundo tertio exponentis est ternarius, & duobus locis intermissis sequitur continuo numerus per ternarium divisibilis, seu quem ternarius metitur. Similiter in loco septimo seu a secundo sexto exponentis ternarius est & quinque locis intermissis continuo sequitur exponentis, quem ternarius metitur. Singula hinc intuitive patent, quod exponentes ex continua unitatis additione nascantur. Hisce vero notatis prodit

Theorema 4. Si numeri quotcunque fuerint ab unitate continue proportionales, secundus (unitate seclusa) quadratus erit & uno intermisso omnes: tertius autem cubus est, & duobus intermissis omnes: sextus vero cubus simul & quadratus & quinque intermissis omnes.

Si terminus primus fuerit unitas, secundus numerus quadratus, vel cubus, vel potentia cujuscunque gradus, erunt series

$$I. m^2. m^4. m^6. m^8. m^{10}. m^{12} \&c.$$

$$I. m^3. m^6. m^9. m^{12}. m^{15}. m^{18} \&c.$$

$$I. m^n. m^{2n}. m^{3n}. m^{4n}. m^{5n}. m^{6n} \&c.$$

Quoniam in qualibet serie termini continuo prodeunt multiplicatione per secundum, exponentis secundi continuo additur exponenti termini cujuscunque dati, ut prodeat proxime sequens (§. 54), consequenter cum exponentes omnium terminorum, qui a secundo sequuntur, sint multipli exponentis termini secundi, per secundi quoque termini exponentem dividi possunt, consequenter omnes termini sunt dignitates ejus gradus, cujus dignitas est secundus (§. 56). Habemus itaque

Theorema 5. Si in serie continue proportionalium ab unitate numerorum terminus secundus seu ab unitate primus est quadratus, reliqui omnes quadrati erunt; si idem fuerit cubus, reliqui etiam omnes cubi erunt; si idem fuerit dignitas cujuscunque gradus, quarti, quinti, sexti &c. reliqui etiam omnes erunt dignitates ejusdem gradus, quarti, quinti, sexti &c.

SCHOLIION.

127. Patet adeo, per calculum literalem facillime symptomata rationum & progressionum geometricarum ab unitate incipientium vel ignorata, vel oblivioni tradita reperiri.

PROBLEMA XXXIV.

128. Invenire rationem superficierum atque corporum in geometria elementari explicatorum.

Sit parallelogrammorum & triangulorum altitudo communis a , bases sint b & c : erunt illorum areae ab & ac (§. 375. 387 *Geom.*), horum $\frac{1}{2}ab$ & $\frac{1}{2}ac$ (§. 392 *Geom.*). Sunt ergo ut ab ad ac , hoc est, ut b ad c (§. 181 *Arithm.*).

Theorema 1. Parallelogramma & triangula æque alta basium rationem habent.

Eodem modo invenitur

Theorema 2. Parallelogramma & triangula æqualium basium sunt in ratione altitudinum.

Sit diameter circuli a , peripheria ma (§. 114): erit quadratum diametri a^2 , area circuli $\frac{1}{4}ma^2$ (§. 429 *Geom.*). Est ergo illud ad hanc ut a^2 ad $\frac{1}{4}ma^2$, hoc est, ut a ad $\frac{1}{4}ma$ (§. 181 *Arithm.*).

Theorema 3. Quadratum diametri est ad aream circuli, ut diameter ad quartam peripheriæ partem.

Sint bases parallelogrammorum & triangulorum similium a & b , altitudines ma & mb (§. 114 *Anal.* & §. 396 *Geom.*): erunt areae ut ma^2 ad mb^2 (§. 375. 387. 392 *Geom.*), hoc est, ut a^2 ad b^2 (§. 124).

Theorema 4. Parallelogramma & triangula similia sunt ut quadrata basium; seu (quia quodlibet latus pro basi assumi po-

test §. 113 *Geom.*) ut quadrata laterum homologorum.

Sint bases parallelepipedorum, prismatum, cylindrorum, pyramidum, conorum, a & b , altitudo communis c : erunt corpora ista ut ac ad bc (§. 536. 539. 541. 548 *Geom.*), hoc est, ut a ad b (§. 113). Eodem modo c assumi potest pro basi communi ita ut a & b sint altitudines.

Theorema 5. Parallelepipeda, prismata, cylindri, pyramides & conij ejusdem altitudinis basium rationem habent; eandem vero basium habentes sunt in ratione altitudinum.

Non absimili modo alia hujus generis theoremata investigantur.

PROBLEMA XXXV.

129. Invenire, quoties quantitates quotlibet permutari queant, hoc est, ordo earum variari possit.

Sint quantitates duæ a & b . Cum aut scribi possit ab , aut ba ; patet esse numerum variationum $2=2$. I. Sint tres quantitates a, b, c . Ordines earum erunt

$c a b$
$a c b$
$a b c$
$c b a$
$b c a$
$b a c$

id quod patet, c primum cum ab , dein cum ba combinando. Unde numerus variationum $3 \cdot 2 = 6$.

Quodsi quantitates fuerint quatuor; una quælibet quatuor modis combinari

nari potest cum quolibet ordine trium :
unde numerus variationum emergit
 $6 \cdot 4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

Similiter si quantitates fuerint quinque, unaquælibet junctæ cum quolibet ordine quatuor quantitatum pariet variationes 5. Unde numerus omnium variationum $24 \cdot 5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Quare si numerus quantitatum fuerit n ; erit numerus variationum $n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3 \cdot n - 4 \cdot n - 5$ &c.

Si eadem quantitas bis occurrat; reperietur variatio duorum bb ; trium bab, abb, bba , quatuor $cbab, bcab, babc$ &c. adeoque numerus variationum in casu primo $1 = (2 \cdot 1) : 2 \cdot 1$, in secundo $3 = (3 \cdot 2 \cdot 1) : 2 \cdot 1$, in tertio $12 = (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 2 \cdot 1$. Quodsi litera quinta accedat, in quolibet ordine quantitatum quatuor pariet variationes quinque: unde numerus omnium variationum $60 = (5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 2 \cdot 1$. Hinc intelligitur, si numerus quantitatum sit n ; fore omnium variationum numerum $(n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3 \cdot n - 4$ &c.) : $2 \cdot 1$.

Si eadem quantitas ter occurrat, erit in tribus nulla variatio; in quatuor variationes sunt $baaaa, abaaa, aabaa, aaab$, adeoque numerus variationum $4 = (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 3 \cdot 2 \cdot 1$. Quinta si accedat, in quolibet ordine quatuor quantitatum quinque variationes pariet: unde numerus omnium variationum $(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 3 \cdot 2 \cdot 1$. Eodem modo, si sexta assumatur, reperietur numerus variationum $(6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 3 \cdot 2 \cdot 1$. Unde colligitur, si numerus quantitatum sit n , fore numerum omnium varia-

tionum $(n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3 \cdot n - 4 \cdot n - 5$ &c.) : $3 \cdot 2 \cdot 1$.

Si eadem quantitas quater occurrat, erit in quatuor variatio nulla. Quodsi vero quinta accedat, variationes sunt $baaaaa, abaaaa, aabaaa, aaabaa, aaaaab$. Quare numerus variationum est $5 = (5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Si sexta assumatur, in quolibet ordine quantitatum quinque variationes sex pariet, adeoque numerus variationum $30 = (6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) : 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Unde constat, si numerus quantitatum sit n , fore numerum omnium variationum $(n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3 \cdot n - 4 \cdot n - 5 \cdot n - 6$ &c.) : $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Ex his formulis specialibus colligitur generalis. Nempe si n denuo sit quantitatum numerus, m numerus qui indicat quoties eadem quantitas occurrit: erit $(n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3 \cdot n - 4 \cdot n - 5 \cdot n - 6 \cdot n - 7 \cdot n - 8 \cdot n - 9$ &c.) : $(m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4 \cdot m - 5 \cdot m - 6$ &c.). Nimirum series continuanda, donec continua unitatis subtractio ex n & m relinquat 0.

Eodem modo ulterius progredi licet, tandemque reperietur, si numerus quantitatum fuerit n , numeri qui indicant quoties earum aliquæ reperiuntur, sint l, m, r &c. formula universalissima $(n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3 \cdot n - 4 \cdot n - 5 \cdot n - 6 \cdot n - 7 \cdot n - 8 \cdot n - 9$ &c.) : $(l \cdot l - 1 \cdot l - 2 \cdot l - 3 \cdot l - 4$ &c. $m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3$ &c. $r \cdot r - 1 \cdot r - 2 \cdot r - 3 \cdot r - 4 \cdot r - 5$ &c.). E. gr. fit $n = 6, l = 3, m = 3, r = 0$; erit numerus variationum
(6.

$$(6.5.4.3.2.1) : (3.2.1.3.2.1) \\ = (6.5.4) : (3.2) = 2.5.2 = 20.$$

SCHOLIION I.

130. Ponamus mensæ assidere 13 personas. Quodsi queratur, quoties loca permutare possint; reperietur numerus variationum 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 = 6, 227¹, 020, 800.

SCHOLIION II.

131. Si vox aliqua ex literis non nimis multis componatur; eadem methodo, qua in

resolutione problematis usi sumus, inveniri possunt sine meditatione omnia anagrammata in omnibus linguis possibilia. E. gr. inveniri debent anagrammata vocis amor. Erunt variationes possibiles.

amor	mora	oram	ramo
amro	moar	orma	raom
aomr	mroa	oarm	rima
aorm	maoa	oamr	rmoa
armo	maor	omra	roam
arom	maro	omar	roma

Sunt adeo anagrammata vocis amor in lingua latina Roma, mora, Maro, oram, ramo, armo.

SECTIO SECUNDA.

DE ALGEBRA.

CAPUT PRIMUM.

De Algebra ad Problemata Arithmetica eaque determinata applicata.

DEFINITIO V.

132. **A**lgebra est methodus resolvendi problemata per æquationes.

DEFINITIO VI.

133. Æquatio est expressio ejusdem quantitatis per duos valores diversos, sed æquales, e. gr. $2.3 = 2+4$. *Stifelius* (a) definit eam per rationem æqualitatis inter duos terminos diversimode denominatos.

(a) In Arithmet. integra lib. 3. c. 1. p. 228. b.

DEFINITIO VII.

134. Radix æquationis est valor quantitatis incognitæ, quæ æquationem ingreditur. E. gr. si fuerit $a^2 + b^2 = x^2$; radix erit $\sqrt{(a^2 + b^2)}$.

DEFINITIO VIII.

135. Si valor ipsius x fuerit positivus, e. gr. $x=3$; Radix dicitur vera.

DEFINITIO IX.

136. Si valor ipsius x fuerit negativus, e. gr. $x=-5$, dicitur falsa.

DEFINITIO X.

137. Si valor ipsius x fuerit *radix* quantitatis negativæ, e. gr. $\sqrt{-5}$, *imaginaria* appellatur (§. 71).

DEFINITIO XI.

138. *Æquatio* dicitur *simplex* si quantitas incognita fuerit unius dimensionis, e. gr. si $x = (a+b) : 2$.

DEFINITIO XII.

139. *Æquatio* dicitur *quadratica*, si quantitas incognita ad duas dimensiones affurgit, ut $x^2 = a^2 + b^2$: *cubica*, si ad tres, ut $x^3 = a^3 - b^3$ &c.

SCHOLIION.

140. In hac sectione tantum de æquatione simplici & quadratica agimus.

PROBLEMA XXXVI.

141. *Problema datum Algebraice resolvere.*

RESOLUTIO.

1. Quantitates datæ a quæsitis distinguantur & datæ primis, quæsitæ ultimis Alphabeti litteris denominentur (§. 3).
2. Quærantur tot æquationes, quot quantitates incognitæ occurrunt: quod si fieri nequeat, id indicio est, *problema non esse determinatum*, sed unam vel plures quæsitaram pro arbitrio assumi posse. Inveniuntur autem æquationes, nisi in ipso *problemate* contineantur per theoremata de æqualitate quantitatum agentia.
3. Quoniam in æquatione quantitates incognitæ cognitæ sunt permixtæ; ea reducenda est, ita ut ex una parte tantum compareat quantitas incognita una, ex altera vero mera

cognitæ deprehendantur. Instituitur autem hæc reductio, si quantitates subductæ addantur, additæ subtrahantur, multiplicatæ dividantur, divisæ multiplicentur, e potentiis radices extrahantur, radices ad potentias evehantur, ut perpetua æqualitas conservetur (§. 88. 91. 93. 94. 256 *Arith.*).

SCHOLIION.

142. Hæc sufficiunt pro æquationibus simplicibus reducendis; sed ad altiores aliis ad hoc subsidiis opus est, quæ suo loco exponemus, nunc nonnisi extractionem radices ex æquatione quadratica addituri.

PROBLEMA XXXVII.

143. *Ex æquatione quadratica radicem extrahere.*

RESOLUTIO.

- I. Si æquatio fuerit pura, ut $x^2 = ab$; evidens est esse $x = \sqrt{ab}$.
- II. Si æquatio fuerit affecta, ut $x^2 + ax = +b^2$; tum x assumatur pro una parte radices, erit a quantitas cognita secundi termini duplum partis alterius (§. 261 *Arithm.*), adeoque $\frac{1}{2} a$ pars altera. *Complebitur adeo quadratum, si addatur $\frac{1}{4} aa$ (§. cit.): quo factò, radix extrahi potest, ut hic factum esse apparet:

Casus I.

$$x^2 + ax = b^2$$

$$\frac{1}{4} aa \quad \frac{1}{4} aa \text{ add.}$$

$$x^2 + ax + \frac{1}{4} a^2 = \frac{1}{4} a^2 + b^2$$

$$x + \frac{1}{2} a = \sqrt{\left(\frac{1}{4} a^2 + b^2\right)}$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{1}{4} a^2 + b^2\right)} - \frac{1}{2} a$$

Casus

Casus 2.

$$x^2 - ax = b^2$$

$$x^2 - ax + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 + b^2$$

$$\left. \begin{array}{l} x - \frac{1}{2}a \\ \frac{1}{2}a - x \end{array} \right\} = \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 + b^2\right)}$$

$$x = \frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 + b^2\right)}$$

$$\text{vel } x = \frac{1}{2}a - \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 + b^2\right)}$$

Quoniam $\sqrt{\frac{1}{4}a^2} = \frac{1}{2}a$, adeoque $\sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 + b^2\right)} > \frac{1}{2}a$, erit $\frac{1}{2}a - \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 + b^2\right)}$ valor ipsius x negativus, consequenter radix falsa (§. 136), atque adeo solus valor $\frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 + b^2\right)}$ est radix vera (§. 135).

Casus 3.

$$x^2 - ax = -b^2$$

$$\frac{1}{4}a^2 \quad \frac{1}{4}a^2 \text{ add.}$$

$$x^2 - ax + \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2 - b^2$$

$$\left. \begin{array}{l} x - \frac{1}{2}a \\ \frac{1}{2}a - x \end{array} \right\} = \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - b^2\right)}$$

$$x = \frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - b^2\right)}$$

$$\& x = \frac{1}{2}a - \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - b^2\right)}$$

Quoniam $\sqrt{\frac{1}{4}a^2} = \frac{1}{2}a$, adeoque $\sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - b^2\right)} < \frac{1}{2}a$, erit $\frac{1}{2}a - \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - b^2\right)}$ valor ipsius x positivus, consequenter radix vera (§. 135). Habet adeo in praesente casu æquatio duas radices veras: cujus rei ratio paulo post ex exemplis patebit.

Ceterum ex multiplicatione patet esse $\left(\frac{1}{2}a - x\right)^2$ perinde ac $\left(x - \frac{1}{2}a\right)^2 = x^2 - ax + \frac{1}{4}a^2$.

PROBLEMA XXXVIII.

144. *Invenire numerum, cujus pars dimidia cum tertia & quarta numerum integrum unitate superat.*

Sit numerus quaesitus x , erit per conditionem problematis

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}x = x + 1$$

hoc est $(12x + 8x + 6x) : 24 = x + 1$
 seu $\frac{26}{24}x = x + 1$

$$\frac{26x}{24x} = \frac{24x + 24}{24x} \quad \text{Subtr.}$$

$$2x = 24$$

$$x = 12 \quad \text{2 div.}$$

Exam. $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}x = 6 + 4 + 3 = 13 = 12 + 1$

PROBLEMA XXXIX.

145. *Invenire numerum, cujus partes aliquotæ qualescunque & quotcunque simul sumtæ ipsum superant numero dato.*

Sit numerus datus f , quaesitus x , partes aliquotæ $\frac{a}{b}x$, $\frac{c}{d}x$, $\frac{e}{g}x$ &c. Erit per conditionem problematis

$$\frac{a}{b}x + \frac{c}{d}x + \frac{e}{g}x \&c. = f + x$$

h.e. $(adg + bgc + bde)x = f + x$ (§. 235)

$$\frac{bdg}{bdg} = \frac{f + x}{bdg} \quad \text{Arithm.}$$

$$(adg + bgc + bde)x = fbdg + bdx$$

$$(adg + bgc + bde - bdx)x = fbdg$$

$$x = fbdg : (adg + bgc + bde - bdx)$$

seu $adg + bgc + bde - bdx : bdx = f : x$
 Æquatio ultima hanc suppeditat

Regulam: 1. Fractiones datæ reducantur ad eandem denominationem. 2. A summa numeratorum subtrahatur denominator communis. 3. Per residuum dividatur factum ex eodem denominatore in numerum datum. Quotus est numerus quaesitus. E. gr. sit

fit $a : b = \frac{1}{2}, c : d = \frac{1}{3}, e : g = \frac{1}{4}, f = 1$: erit $x = 24 : (12 + 8 + 6 - 24) = 24 : 2 = 12$.

In analogia, in quam æquationem resolvimus, continetur hoc

Theorema. Si plures fractiones ad eandem denominationem reducuntur, erit numerus integer, cujus partes sunt fractiones istæ, ad harum supra illum excessum ut communis denominator ad differentiam ejus a summa numeratorum.

PROBLEMA XL.

146. *Quantitatis irrationales diversæ denominationis reducere ad eandem.*

RESOLUTIO.

Sint quantitates irrationales reducendæ $\sqrt[m]{x^n}$ & $\sqrt[r]{y^r}$, quemadmodum supra (§. 59). Fiat

$$\begin{array}{r} \sqrt[m]{x^n} = t \quad \sqrt[r]{y^r} = v \\ \hline x^n = t^m \quad y^r = v^r \\ \hline x^{sn} = t^{sm} \quad y^{rm} = v^{sm} \\ \hline \sqrt[ms]{x^{sn}} = t \quad \sqrt[ms]{y^{rm}} = v \end{array}$$

Habemus adeo $\sqrt[m]{x^n} = \sqrt[ms]{x^{sn}}$ & $\sqrt[r]{y^r} = \sqrt[ms]{y^{rm}}$, ut supra (§. cit.); quo ipso patet, quod dubium videri poterat (§. 60), in exponentibus quantitatum irrationalium locum habere reductionem ad eandem denominationem, si iidem fuerint fractiones diversæ denominationis.

SCHOLIUM.

147. *Hoc artificio reductionis uti possumus in aliis casibus similibus. Ita multiplicationem ac divisionem fractionum atque irrationalium eadem methodo investigare licet.*

PROBLEMA XLI.

148. *Datis summa duarum quanti-*

tatum & earundem factæ, invenire numeros.

Sit summa = a Semidiffer. = x
Fact. = b , erit Quant. maj. = $\frac{1}{2} a + x$
min. = $\frac{1}{2} a - x$ (§. 6).

Ergo per conditionem probl.

$$\frac{1}{4} aa - xx = b \quad (\text{§. 38}).$$

xx xx add.

$$\frac{1}{4} aa = b + xx$$

b b Subtr.

$$\frac{1}{4} aa - b = xx$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4} aa - b\right)} = x$$

Regula I. A quadrato semisummae duarum quantitarum subtrahatur factum earundem. 2. Ex residuo extrahatur radix, quæ erit semidifferentia earundem. Sit e. gr. $a = 14$, $b = 48$: erit $\sqrt{\left(\frac{1}{4} aa - b\right)} = \sqrt{(49 - 48)} = 1$. Adeoque $\frac{1}{2} a + x = 7 + 1 = 8$; $\frac{1}{2} a - x = 7 - 1 = 6$. Sunt adeo numeri quaesiti 8 & 6. Nam $8 \cdot 6 = 48$ & $8 + 6 = 14$.

COROLLARIUM.

149. Quoniam $\frac{1}{2} a$ est dimidium totius a , x differentia partis æqualis ab inæquali, b rectangulum partium inæqualium, æquatio secunda hoc continet *theorema* : Si totum dividatur in duas partes æquales & in duas inæquales, quadratum partis æqualis æquale est rectangulo inæqualium una cum quadrato differentia partis æqualis ab inæquali.

SCHOLIUM.

150. *Patet adeo, quod sæpius casu in theorematâ incidamus dum problemata algebraice resolvimus; qualia subinde annotabimus. Regulas vero, quas quilibet proprio Marte ex ultima æquatione eruere valet, in posterum prætermittemus.*

PROBLEMA XLII.

151. *Data summa dignitatum similium duarum quantitatum & differentia earum-*

earundem invenire quantitatem utramque.

Sit summa = a Quantit. maj. = y
 differentia = b min. = x

erit per conditionem probl.

$$\begin{array}{r} x^m + y^m = a \quad y^m - x^m = b \\ \hline x^m \quad \quad \quad x^m \text{ subtr.} \quad x^m \quad x^m \text{ add.} \end{array}$$

$$y^m = a - x^m \quad y^m = b + x^m$$

Quare (§. 87 *Arithm.*)

$$a - x^m = b + x^m$$

$$+ x^m \quad + x^m \text{ add.}$$

$$a = b + 2x^m$$

$$\begin{array}{r} b \quad b \quad \text{subtr.} \\ \hline a - b = 2x^m \end{array}$$

$$(a - b) : 2 = x^m \quad (2 \text{ div.})$$

$$\sqrt[m]{\left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b\right)} = x$$

Sit $m = 2$, $a = 97$, $b = 65$: erit $x = \sqrt{(48\frac{1}{2} - 32\frac{1}{2})} = \sqrt{16} = 4$ & hinc $y = \sqrt{(b + x^2)} = \sqrt{(65 + 16)} = \sqrt{81} = 9$.

Examen: $x^2 + y^2 = 16 + 81 = 97$ & $y^2 = b = 81 - 16 = 65$.

Æquatio antepenultima resolvitur in hanc analogiam,

$a - b : x^m = 2 : 1$ (§. 299 *Arithm.*), quæ sequens suppeditat.

Theorema. Excessus summæ duarum dignitatum similium supra differentiam earundem est ad dignitatem minorem in ratione dupla.

PROBLEMA XLIII.

152. Dato itinere diurno viatoris alicujus una cum itinere diurno alterius ipsum dato tempore sequentis, invenire tempus, quo illum hic assequetur.

Sit iter diurnum primi = a

secundi = b

tempus datum = c

tempus quæs. = x

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

erit inter itra tempus datum a primo confectum = ac , quod vero idem intra quæsitum emensus est = ax : iter posterioris intra tempus quæsitum reperietur = bx (§. 302 *Arithm.*). Quare per conditionem problematis

$$ac + ax = bx$$

$$\begin{array}{r} ax \quad ax \text{ subtr. quia } bx > ax \\ \hline ac = bx - ax \end{array}$$

$$\hline b - a \text{ div.}$$

$$ac : (b - a) = x$$

Sit $a = 6$, $b = 8$, $c = 4$: erit $x = 24 : 2 = 12$.

Examen. Quoniam primus itineri impendit 16, alter vero 12 dies antequam conveniunt, & iter diurnum primi sit 6, secundi 8; via primi est $6 \cdot 16 = 96$, secundi $8 \cdot 12 = 96$.

Æquatio penultima in hanc analogiam resolvitur (§. 299 *Arithm.*).

$$b - a : a = c : x$$

quæ sequens suppeditat

Theorema: Si quidam viator alterum insequitur, tempore aliquo clapsō, differentia viarum, quas eodem tempore iterque emetitur, est ad viam primi, quem alter insequitur, ut tempus ab itinere primi usque ad initium itineris secundi clapsū ad tempus, quo alter ipsum assequitur.

SCHOLIION.

153. Facile apparet, cum viatoris notio problematis resolutionem non ingrediat, problema universalius de mobilibus quibuscunque concipi posse.

PROBLEMA XLIV.

154. Dato itinere diurno alicujus viatoris una cum tempore ab initio itineris elapsō, invenire iter diurnum ab alio viatore consociendum, ut in dato tempore illum assequatur.

M m

Sit

Sit iter diurnum primi $= a$
 tempus elapsum $= b$
 tempus datum $= c$

iter diurnum alterius $= x$

Erit per conditionem problematis ut in
 probl. preced.

$$\frac{ab + ac = cx}{(ab + ac) : c = x} \quad c \text{ div.}$$

Sit e. gr. $a = 6, b = 4, c = 12$: erit $x =$
 $(24 + 72) : 12 = 96 : 12 = 8.$

Æquatio penultima in hanc resolvitur
 analogiam (§. 299 *Arithm.*)

$$c : b + c = a : x$$

quæ sequens suppeditat.

Theorema. Si quidam viator alterum in-
 sequitur tempore aliquo elapso, erit tempus,
 intra quod ipsum assequitur, ad tempus ab
 initio itineris hujus elapsum, ut iter diur-
 num primi ad iter diurnum secundi.

PROBLEMA XLV.

155. *Dato intervallo locorum, ex
 quibus eodem tempore duo viatores egre-
 diuntur, una cum itinere diurno unius-
 cujuslibet, invenire tempus, quo sibi
 mutuo occurrent.*

Sit intervallum locorum $= a$
 iter diurnum primi $= b$
 secundi $= c$
 tempus occurfus $= x$

erit via a primo intra tempus x confec-
 ta $= bx$, via quam alter eodem tem-
 pore emetitur $= cx$ (§. 302 *Arithm.*).
 Quare cum ambo junctim emensi sint
 totum intervallum locorum, unde egre-
 diebantur; habebimus

$$\frac{bx + cx = a}{x = a : (b + c)} \quad b + c \text{ div.}$$

Sit $a = 120, b = 6, c = 4$: erit $x =$
 $120 : (6 + 4) = 120 : 10 = 12.$ Duode-
 cimo igitur die sibi mutuo occurrent.

SCHOLIUM.

156 *Problemata istiusmodi specialia sub
 initium difficiliora sunt solutu, quam abstra-
 cta, quoniam in his æquatio plerumque continetur,
 aut ex theorematibus arithmeti-
 cis facile cruitur, in illis autem ex circumstan-
 tiis problematis elicienda. Quodsi enim plu-
 res circumstantiæ occurrunt, tyrones non sta-
 tim eas pervident, quæ æquationem suppeditant.
 Discant igitur consultius esse ut pro-
 blematis abstractis solvendis primas studii Al-
 gebraici partes consecrent: insuperque noient
 velim, facilius problemata specialia ad abstra-
 cta seu generalia, quam vice versa abstra-
 cta ad specialia revocari, quia ista conditiones
 generales, unde solutio pendet, actu conti-
 nent, in his vero circumstantiæ speciales, quæ
 ad solutionem nil conferunt, minime com-
 parent. E. gr. problema præsens in abstra-
 cto istiusmodi est. Invenire numerum, qui
 in summam duorum datorum ductus produ-
 cit numerum datum. Similiter problema
 (§. 152) in abstracto tale est: Datis tribus
 quantitibus invenire quartam, ita ut factum
 ex quarto in secundam æquale sit facto ex
 prima in aggregatum ex tertia & quarta. Hinc
 apparet ratio, cur theorematum usus non sta-
 tim in oculos occurrat. Nocent igitur qui
 inveniri ac addisci prohibent ea, quorum usus
 nondum constat, vel non statim primo inui-
 tu in oculos occurrit.*

PROBLEMA XLVI.

157. *Data summa duarum quantita-
 tum & differentia quadratorum, inve-
 nire quantitates.*

Sit summa Quant. $= a$
 differentia Quadr. $= b$
 Semidiff. Quant. $= y$
 erit Quant. maj. $= \frac{1}{2}a + y$
 minor $= \frac{1}{2}a - y$ (§. 5.).
 Qua

Quare
 Quadratum maj. $\frac{1}{4} a^2 + ay + y^2$
 min. $\frac{1}{4} a^2 - ay + y^2$

Differ. (§. 30) $2ay = b$ per condit.
 $2a$ div. _____ probl.

$y = b : 2a$

Sit $b = 40, a = 10$: erit $y = 40 : 20 = 2$. Hinc $\frac{1}{2} a + y = 5 + 2 = 7$ & $\frac{1}{2} a - y = 5 - 2 = 3$.

Examen: $49 - 9 = 40$.

PROBLEMA XLVII.

158. Data summa duarum quantitatum una cum summa quadratorum, invenire quantitatem utramque.

Sit summa = a

Summa Quadr. = b

Semidiff. Quant. = y

erit major = $\frac{1}{2} a + y$ } (§. 5.)
 minor = $\frac{1}{2} a - y$ }

Quare

Quadrat. maj. $\frac{1}{4} a^2 + ay + y^2$
 minoris $\frac{1}{4} a^2 - ay + y^2$

Summa $\frac{1}{2} a^2 + 2y^2 = b$
 $\frac{1}{2} a$ $\frac{1}{2} a^2$ Subtr.

$2y^2 = b - \frac{1}{2} a^2$

 2 div.

$y^2 = \frac{1}{2} b - \frac{1}{4} a^2$ Ext.Rad.
 $y = \sqrt{(\frac{1}{2} b - \frac{1}{4} a^2)}$

Sit $a = 10, b = 58$: erit $y = \sqrt{(29 - 25)} = \sqrt{4} = 2$. Hinc $\frac{1}{2} a + y = 5 + 2 = 7$ & $\frac{1}{2} a - y = 5 - 2 = 3$.

Examen: $7 + 3 = 10$ & $49 + 9 = 58$.

PROBLEMA XLVIII.

159. Invenire duos numeros ejus conditionis, ut factum ex unoquoque in radicem quadratam alterius sit equale numero dato.

Sit factum unum = a
 alterum = b
 numerus unus = x
 alter = y

erit per conditionem problematis

$x \sqrt{y} = a$ $y \sqrt{x} = b$
 _____ Quad. _____ Quad.
 $x^2 y = a^2$ $y^2 x = b^2$
 _____ y div. _____ y^2 div.
 $x^2 = a^2 : y$ $x = b^2 : y^2$
 _____ $x^2 = b^4 : y^4$ Quad.
 $a^2 : y = b^4 : y^4$
 _____ y^4 mult.

$a^2 y^3 = b^4$
 _____ a^2 div.

$y^3 = b^4 : a^2$
 $y = \sqrt[3]{(b^4 : a^2)}$

Sit $a = 18, b = 12$: erit $y = \sqrt[3]{(20736 : 324)} = \sqrt[3]{64} = 4$. Ergo $x = b^2 : y^2 = 144 : 16 = 9$.

Examen. $9 \sqrt{4} = 2 \cdot 9 = 18$ & $4 \sqrt{9} = 4 \cdot 3 = 12$.

PROBLEMA XLIX.

160. Invenire duos numeros, quorum factum equale est numero dato, quadratum vero summe ad quadratum differentie habet rationem datam.

Sit factum = a Summa = $2x$
 ratio = $b : c$ different. = $2y$
 erit major = $x + y$
 minor = $x - y$

Ergo per condiciones problematis

$xx - yy = a$ $b : c = 4x^2 : 4y^2$ (§. 297
 yy y^2 add. $4cx^2 = 4by^2$ Arith.)
 _____ $x^2 = by^2 : c$ 4^o div.
 $xx = a + y^2$

Quare (S. 87 *Arithm.*)

$$a + y^2 = by^2 : c$$

c mult:

$$ac + cy^2 = by^2$$

cy^2 cy^2 Subtr.

$$ac = by^2 - cy^2$$

$b - c$ div:

$$ac : (b - c) = y^2$$

$$\sqrt{ac} : \sqrt{(b - c)} = y$$

Sit $a = 96$, $b : c = 25 : 1$. Erit $y = \sqrt{96} : \sqrt{(25 - 1)} = \sqrt{4} = 2$ & $x = \sqrt{(a + y^2)} = \sqrt{(96 + 4)} = \sqrt{100} = 10$, consequenter numerus major $x + y = 10 + 2 = 12$ & minor $x - y = 10 - 2 = 8$.

Examen. 12. $8 = 96$ & $100 : 4 = 25 : 1$.

PROBLEMA L.

161. Dato pretio unius mensuræ vini invenire quantitatem aquæ commiscendæ, ut una mensura dato alio pretio minore vendi queat.

Sit pretium majus $= a$
minus $= b$.

quantitas aquæ $= x$

Cum aquæ pretium nullum sit; erit

$1 + x : 1 = a : b$ consequenter

$$b + bx = a \quad (\text{S. 297 } \textit{Arithm.}).$$

b subtr.

$$bx = a - b$$

b div.

$$x = (a - b) : b = a : b - 1$$

Sit $a = 16$, $b = 10$: erit $x = 1\frac{6}{10} - 1 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Theorema. Si vino pretiosiori aqua commiscenda, ut viliori pretio constet; quantitas aquæ commiscendæ est ad quantitatem vini, ut differentia pretiorum ad pretium minus.

Nempe vi æquationis penultimæ $x : 1 = a - b : b$.

Examen. Etenim si integra mensura veniat 10 grossis, tres ipsius quintæ veneunt 6 grossis (S. 302 *Arithm.*), quos si addas pretio unius mensuræ, quod est 10 grossorum, prodibunt 16 grossi pretium unius mensuræ vini generosioris.

PROBLEMA LI.

162. Dato pretio vini generosi & pretio vilioris, determinare quantitatem vini vilioris generoso commiscendi, ut dato aliquo pretio medio venire queat.

Sit pretium unius mensuræ vini

generosi $= a$

vilioris $= b$

medium $= c$

quantitas unius mensuræ $= 1$

quantitas vilioris commiscendi $= x$

erit pretium ejus $= bx$

quantitas generosi commiscendi $= 1 - x$

erit ejus pretium $= a - ax$.

Quare per conditionem problematis

$$a - ax + bx = c$$

ax ax add. ob $ax > bx$

$$a + bx = c + ax$$

bx bx subtr.

$$a = c + ax - bx$$

c c subtr.

$$a - c = ax - bx$$

$a - b$ div.

$$(a - c) : (a - b) = x$$

Sit $a = 16$, $b = 10$, $c = 12$; erit $x = (16 - 12) : (16 - 10) = 4 : 6 = \frac{2}{3}$.

Examen. Pretium $\frac{2}{3}$ vilioris $= 6\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ generosi $= 5\frac{1}{3}$, adeoque mensuræ mixti $= 6\frac{2}{3} + 5\frac{1}{3} = 12$.

PROBLEMA LII.

163. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut factum, summa & differentia quadratorum sint inter se equalia.*

Sit numerus major = x , minor = y :
erit per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} x^2 - y^2 = xy \\ x + y = xy \\ \quad \quad \quad y \quad \quad y \text{ subtr.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x = xy - y \\ \hline \quad \quad \quad x - 1 \text{ div.} \\ x : (x - 1) = y \end{array}$$

Quodsi valor ipsius y jam inventus in æquatione dexteriore substituatur, habebimus

$$\begin{array}{r} x^2 \quad \quad \quad x^2 \quad \quad \quad x^2 \\ x^2 - 2x + 1 \quad \quad \quad x - 1 \\ \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x^2 - 2x + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^4 - 2x^3 + x^2 - x^2 = x^3 - x^3 \\ x^4 - 2x^3 = x^3 - x^3 \\ \quad \quad \quad x^3 \quad \quad x^3 \quad \quad \quad \text{subtr.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 = -x^2 \\ \hline \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad x^2 \text{ div.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x = -1 \\ \quad \quad \quad \frac{2}{4} \quad \quad \quad \frac{2}{4} \quad \quad \quad (\S. 143) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x + \frac{2}{4} = \frac{2}{4} - 1 = \frac{2}{4} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x - \frac{3}{2} \quad \quad \quad \left. \begin{array}{l} \frac{3}{2} - x \end{array} \right\} - \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{5} \end{array}$$

$$x = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{5}$$

Est vero $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{5}$ radix vera; sed $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{5}$ non est numerus minor y , quia, si numerus minor diceretur y , ad aliam æquationem deveniretur, quemadmodum apparet, si valore ipsius x per æquationem $xy - x = y$ reperto & in æquatione $x^2 - y^2 = xy$ substituto, reductio legitime instituat. Tunc

enim reperitur $y = 1 + \frac{1}{2} \sqrt{5}$, ubi $1 - \frac{1}{2} \sqrt{5}$ est radix falsa, quia $\frac{1}{2} \sqrt{5} > 1$.

Examen. Est enim $x + y = 2 + \sqrt{5}$, $xy = 2 + \sqrt{5}$ & $x^2 - y^2 = 2 + \sqrt{5}$.

PROBLEMA LIII.

164. *Datis in progressionem arithmetica termino primo & ultimo atque differentia terminorum, invenire numerum terminorum & summam progressionis.*

Sit terminus primus = a
ultimus = b
differentia = d
numerus terminorum = x
summa = y

erit (§. 333 *Arithm.* & §. 170

Analys.)

$$b = a + dx - d \quad y = \frac{1}{2} (b + a) x$$

$$\begin{array}{r} d \quad \quad \quad d \text{ add.} \\ b + d = a + dx \\ \quad \quad \quad a \quad \quad a \quad \quad \quad \text{subtr.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} b + d - a = dx \\ (b + d - a) : d = x \quad (d \text{ div.}) \end{array}$$

Quodsi hic valor in æquatione dextera substituatur, habebimus

$$\begin{array}{l} y = \frac{1}{2} (b + a) (b + d - a) : d = \\ (b^2 + bd - ab + ab + ad - a^2) : 2d = \\ (b^2 + bd + ad - a^2) : 2d = \frac{1}{2} (b + a) \\ + (b^2 - a^2) : 2d. \end{array}$$

Sit $a = 2$, $b = 17$, $d = 3$: erit $x = (17 + 3 - 2) : 3 = 18 : 3 = 6$ & $y = \frac{1}{2} (17 + 2) + (189 - 4) : 6 = \frac{19}{2} + \frac{285}{6} = 9\frac{1}{2} + 47\frac{1}{2} = 57$.

PROBLEMA LIV.

165. *Datis termino primo; differentia terminorum & summa progressionis arithmetica, invenire numerum terminorum & terminum ultimum.*

Sit terminus primus = a
 differentia = d
 Summa = c
 ultimus = y
 terminorum numerus = x
 erit (§. 333 *Arithm.* & §. 170 *Analyf.*)

$$\frac{1}{2}x(a + y) = c \quad a + dx - d = y$$

$$\frac{ax + xy = 2c}{ax} \quad 2 \text{ mult.}$$

$$xy = 2c - ax$$

$$\frac{xy = 2c - ax}{x} \quad x \text{ div.}$$

Ergo (§. 87 *Arithm.*)
 $(2c - ax) : x = a + dx - d.$

$$\frac{2c - ax = ax + dx^2 - dx}{ax} \quad x \text{ mult.}$$

$$\frac{2c = dx^2 + 2ax - dx}{d} \quad d \text{ div.}$$

$$\frac{2c}{d} = x^2 + \frac{2a-d}{d}x$$

hoc est, si fiat $(2a - d) : d = m$

$$2c : d = x^2 + mx$$

$$\frac{\frac{1}{4}m^2}{\frac{1}{4}m^2} \quad \text{add.}$$

$$\frac{\frac{1}{4}m^2 + 2c : d = x^2 + mx + \frac{1}{4}m^2}{\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + 2c : d)}} = x + \frac{1}{2}m$$

$$\frac{\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + 2c : d)}}{\frac{1}{2}m} = x + \frac{1}{2}m \quad \text{subt.}$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + 2c : d)} - \frac{1}{2}m = x$$

Sit $a = 2, d = 3, c = 57$: erit $m = (4 - 3) : 3 = \frac{1}{3}$, consequenter $x = \sqrt{(\frac{1}{36} + \frac{114}{3})} - \frac{1}{6} = \sqrt{1\frac{369}{36}} - \frac{1}{6} = \frac{37}{6} - \frac{1}{6} = \frac{36}{6} = 6$ & $y = 2 + 18 - 3 = 2 + 15 = 17.$

PROBLEMA LV.

166. Datis termino primo & ultimo una cum summa progressionis arithmetica invenire numerum & differentiam terminorum.

Sit terminus primus = a
 ultimus = b
 Summa = c
 differentia = y

numerus terminorum = x

erit (§. 333 *Arithm.* & §. 107 *Analyf.*)

$$\frac{1}{2}x(a + b) = c \quad a + xy - y = b$$

$$\frac{x(a + b) = 2c \quad xy - y = b - a}{x = 2c : (a + b) \quad y = \frac{b - a}{x - 1}}$$

$$x - 1 = \frac{2c}{a + b} - 1 = \frac{(b + a)(b - a)}{2c - a - b}$$

$$\frac{2c - a - b}{a + b} = \frac{(b + a)(b - a)}{2c - a - b}$$

Sit $a = 2, b = 17, c = 57$: erit $x = 114 : 19 = 6$ & $y = (19 \cdot 15) : (114 - 19) = 285 : 95 = 3.$

Theorema. In progressionem Arithmetica est ut differentia summae ex termino primo & ultimo a duplo summae progressionis ad differentiam termini primi ab ultimo, ita summa termini primi & ultimi ad differentiam progressionalem.

PROBLEMA LVI.

167. Datis differentia & numero terminorum una cum summa progressionis arithmetica, invenire terminum primum & ultimum.

Sit numerus terminorum = n

differentia = d

Summa = c

term. I = x

ultimus = y

erit (§. 333 *Arithm.* & §. 107 *Analyf.*)

$$\frac{1}{2}nx + \frac{1}{2}ny = c \quad x + nd - d = y$$

$$h. c. \frac{nx + \frac{1}{2}n^2d - \frac{1}{2}nd = c}{\frac{1}{2}n \text{ div.}}$$

$$\frac{2x + nd - d = 2c : n}{2x = 2c : n - nd + d} \quad nd - d \text{ subt.}$$

$$\frac{2x = 2c : n - nd + d}{2 \text{ div.}}$$

$$x = c : n - \frac{1}{2}nd + \frac{1}{2}d$$

Sit

Sit $n = 6$, $d = 3$, $c = 57$: erit $x = 9\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} - 9 = 2$ & $y = 2 + 18 - 3 = 17$.

PROBLEMA LVII.

168 *Datis differentia terminorum, termino ultimo & summa progressionis arithmetica, invenire terminum primum & numerum terminorum.*

Sit terminus ultimus = b
 terminorum differ. = d
 Summa = c
 terminus primus = x
 numerus termin. = y
 erit (§. 333 *Arithm.* & §. 107 *Analyf.*)

$$\frac{1}{2}y(x+b) = c \quad b = x + dy - d$$

$$y(b+x) = 2c \quad b+d-x = dy$$

$$y = 2c : (b+x) \quad (b+d-x) : d = y$$

Quamobrem (§. 87 *Arithm.*)

$$2c : (b+x) = (b+d-x) : d$$

$$2cd : (b+x) = b+d-x$$

$$2cd = b^2 + bd - bx + bx + dx - x^2$$

$$x^2 - dx = b^2 + bd - 2cd$$

$$\frac{1}{4}d^2 \quad \frac{1}{4}d^2 \text{ (§. 143).}$$

$$x^2 - dx + \frac{1}{4}d^2 = \frac{1}{4}d^2 + b^2 + bd - 2cd$$

$$x - \frac{1}{2}d \left. \begin{matrix} \frac{1}{2}d \\ -x \end{matrix} \right\} = \sqrt{(\frac{1}{4}d^2 + b^2 + bd - 2cd)}$$

Quodsi $\frac{1}{2}d > x$, erit $\frac{1}{2}d - x$ quantitas positiva, adeoque $x = \frac{1}{2}d - \sqrt{(\frac{1}{4}d^2 + b^2 + bd - 2cd)}$: si vero $\frac{1}{2}d < x$, quantitas $\frac{1}{2}d - x$ aequivaleret privativo, sed $x - \frac{1}{2}d$ positivo adeoque $x = \frac{1}{2}d + \sqrt{(\frac{1}{4}d^2 + b^2 + bd - 2cd)}$.

Sit $b = 17$, $d = 3$, $c = 57$: erit $x = \frac{3}{2} +$

$$\sqrt{(2\frac{1}{2} + 289 + 51 - 342)} = \frac{3}{2} + \sqrt{(2\frac{1}{4} - 2)} = \frac{3}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2, \text{ \& } y = (17 + 3 - 2) : 3 = \frac{18}{3} = 6.$$

PROBLEMA LVIII.

• 169. *Datis summa progressionis arithmetica, numero terminorum & facto ex primo in ultimum, invenire terminos singulos.*

Sit factum = a
 numerus terminorum = n
 Summa = c
 terminus I = x
 ultimus = y

erit (§. 107 & per condit. probl.)

$$\frac{1}{2}n(x+y) = c \quad xy = a$$

$$x+y = 2c : n \quad y = a : x$$

h.e. $x + \frac{a}{x} = \frac{2c}{n}$ x mult.

$$x^2 + a = \frac{2}{n}cx$$

$$x^2 - 2cx : n = -a$$

$$+ c^2 : n^2 \quad + c^2 : n^2$$

$$x^2 - 2cx : n + c^2 : n^2 = c^2 : n^2 - a$$

$$\left. \begin{matrix} x - c : n \\ c : n - x \end{matrix} \right\} = \sqrt{(c^2 : n^2 - a)}$$

$$x = \frac{c}{n} + \sqrt{(c^2 : n^2 - a)}$$

Signum + valet pro termino ultimo; signum autem - pro primo.

Sit $c = 57$, $n = 6$, $a = 34$: erit $x = \frac{57}{6} - \sqrt{(\frac{3249}{36} - 34)} = 9\frac{1}{2} - \sqrt{(90\frac{1}{4} - 34)} = 9\frac{1}{2} - \sqrt{56\frac{1}{4}} = 9\frac{1}{2} - \sqrt{22\frac{5}{4}} = 9\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 17$ & $y = 9\frac{1}{2} - 7\frac{1}{2} = 2$.

PROBLEMA LIX.

170. *Invenire numerum terminorum in serie imparium summandorum, ut prodeat potentia data numeri dati.*

RESOLUTIO.

Sit numerus datus = n
 erit dignitas ejus = n^m
 term. I. progr. = 1
 differ. Term. = 2

Sit Num. term. = x
 erit summa progress. = x^2 (§. 108).

Ergo per conditionem probl.

$$\frac{x^2 = n^m}{x = n^{m:2}} \text{Ext.Rad.}$$

Patet adeo, problema non esse possibile nisi in iis casibus, ubi exponens dignitatis m est numerus par, ut per 2 dividi possit.

E. gr. Sit $m = 2$, erit $x = n$, hoc est, numerus terminorum est idem cum radice quadrata, quemadmodum supra reperimus (§. 110). Sit $m = 4$; erit $x = n^2$, hoc est, numerus terminorum summatorum est radice quadrata, si potentia quarti gradus desideretur, veluti si $n = 2$, erit $2^4 = 16$ $3 + 5 + 7 = 16$.

PROBLEMA LX.

171. Invenire numeros impares totidem numero, quot numerus datus habet unitates, & quorum additione prodit potentia data numeri hujus dati.

RESOLUTIO.

Sit numerus datus = n
 dignitas ejus = n^m
 terminus primus = x

Quoniam in serie numerorum imparium differentia terminorum = 2 & numerus terminorum est n per hypoth. erit summa progressionis = $nx + n^2 - n$ (§. 108), consequenter per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} nx + n^2 - n = n^m \\ \hline x + n - 1 = n^{m-1} \\ n - 1 \quad n - 1 \text{ subtr.} \\ \hline x = n^{m-1} - n + 1 \end{array}$$

Patet adeo problema esse possibile in omni casu.

Sit e. gr. $m = 2$, erit $x = n - n + 1 = 1$, ut supra (§. 110).

Sit $m = 3$, erit $x = n - n + 1$, sit porro $n = 2$, erit $x = 4 - 1 = 3$, adeoque $2^3 = 3 + 5 = 8$. Sit $n = 3$, erit $x = 9 - 2 = 7$, adeoque $3^3 = 7 + 9 + 11 = 27$.

Patet adeo quomodo numeri cubici ex additione numerorum imparium procreentur.

Sit $m = 4$, erit $x = n^2 - n + 1$. Sit porro $n = 2$, erit $x = 8 - 1 = 7$, adeoque $2^4 = 7 + 9 = 16$. Sit $n = 3$, erit $x = 27 - 2 = 25$, adeoque $3^4 = 25 + 27 + 29 = 81$.

Sit $m = 5$, erit $x = n^4 - n + 1$. Sit porro $n = 2$, erit $x = 16 - 1 = 15$, adeoque $2^5 = 15 + 17 = 32$. Sit $n = 3$, erit $x = 81 - 2 = 79$, adeoque $3^5 = 79 + 81 + 83 = 243$.

SCHOLIUM.

172. Mira igitur facilitate ostendimus ad captum tyronum, quomodo potentia cujuscunque gradus ex additione numerorum imparium procreentur, quod imperfectius multoque intricatius proponitur in Miscellaneis Berolinensibus p. 327. & seqq.

PROBLEMA LXI.

173. Invenire tres numeros continue proportionales, dato facto ex quadrato tertii in primum una cum denominatore rationis.

Sit factum = a
 denominator = m
 terminus primus = x
 erit secundus = mx
 tertius = m^2x } (§. 114).

Quare per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} a = m^4 x^3 \\ \hline a : m^4 = x^3 \\ \hline \sqrt[3]{a : m^4} = x \end{array}$$

Sit

Sit e. gr. $a = 648$, $m = 3$: erit $x = \sqrt[3]{(648:81)} = \sqrt[3]{8} = 2$.

Quare cum $1:m^4$ sit ratio quadruplicata $1:m$ (§. 159 *Arithm.*); sequens enascitur

Theorema: Cubus termini primi in proportione geometrica continua est ad factum ex quadrato tertii in primum in ratione quadruplicata primi ad secundum.

PROBLEMA LXII.

174. Numerum datum in tres partes continue proportionales dividere, dato denominatore rationis.

Sit numerus datus $= a$
 denominator $= b$
 pars prima $= x$
 erit secunda $= bx$
 tertia $= b^2x$

& per conditionem problematis.

$$b^2x + bx + x = a$$

$$x = a : (b^2 + b + 1) \text{ div.}$$

Sit $b = 4$, $a = 42$: erit $x = 42 : (16 + 4 + 1) = 42 : 21 = 2$.

PROBLEMA LXIII.

175. Numerum datum in terminos quotcunque proportionales resolvere, dato denominatore rationis.

Sit numerus datus $= a$
 denominator $= m$
 terminus I $= x$
 erit secundus $= mx$
 tertius $= m^2x$
 quartus $= m^3x$ &c.

Ergo per conditionem problematis.
 $x + mx + m^2x + m^3x + m^4x$ &c. $= a$
 $x = a : (1 + m + m^2 + m^3 + m^4 \text{ &c.})$

Sit $a = 364$, $m = 3$ & termini sint numero sex: erit $x = 364 : (1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243) = 364 : 364 = 1$. Ergo 1.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

3. 9. 27. 81. 243 est series proportionalium quaesita.

PROBLEMA LXIV.

176. Inter duos numeros datos invenire quotcunque medios continue proportionales.

RESOLUTIO.

Sit primus datorum $= a$
 ultimus $= b$
 mediorum primus $= x$
 numerus mediorum $= m$
 erit per conditionem problematis (§. 302 *Arithm.*)

$$a. x. \frac{x^2}{a} \frac{x^3}{a^2} \frac{x^4}{a^3} \text{ \&c. } \frac{x^m}{a^{m-1}} b$$

consequenter (§. 118)

$$x^{m+1} : a^{m-1} = ab$$

$$x^{m+1} = a^{m-1} m.$$

$$x^{m+1} = a^m b$$

Ext. Rad.

$$x = \sqrt[m+1]{a^m b}$$

Sit $a = 1$, $b = 243$, $m = 4$: erit $m + 1 = 5$, adeoque $x = \sqrt[5]{243} = 3$, consequenter termini intermedii sunt 3. 9. 27. 81.

SCHOLION.

177. Ad manus esse debet tabula dignitatum superiorum pro digitis singulis, qualis extat pro quadratis & cubis (§. 257 *Arithm.*).

COROLLARIUM.

178. Quodsi numerus, qui exprimit terminum desideratum, fuerit n : erit medius proportionalis $= x^n : a^{n-1}$. Quare si pro x

substituatur valor modo inventus $\sqrt[m+1]{a^m b} =$
 $a^m : (m+1) b^1 : (m+1)$, prodibit numerus quaesitus $= a^{mn} : (m+1) b^n : (m+1) : a^{n-1} =$
 $a^{mn} : (m+1) b^n : (m+1) : a^{(mn - m + n - 1)} :$
 $(m+1) = a^{(n-1)} : (m+1) b^n : (m+1)$.

N n

SCHO-

SCHOLIUM.

179. Cadant e. gr. inter 1 & 243 quatuor medii proportionales continue & queratur eorum secundus : erit $a = 1$, $b = 243$, $m = 4$, $n = 2$, adeoque $(m - n + 1) : (m + 1) = \frac{2}{5}$, $n : (m + 1) = \frac{2}{5}$, consequenter numerus quæsitus $\sqrt[3]{a^3 b^2} = \sqrt[3]{59049} = 9$.

PROBLEMA LXV.

180. Data summa termini primi & ultimi, itemque summa secundi & tertii in proportione sive continua, sive discreta, una cum denominatore rationis, invenire terminos singulos.

Sit summa I = a
 II = b
 denominator = m
 terminus primus = x
 erit quartus = $a - x$
 secundus = mx
 tertius = $b - mx$

Quare per conditionem problematis.

$$x : mx = b - mx : a - x$$

$$\text{Hinc } ax - x^2 = mbx - m^2 x^2$$

$$\begin{array}{r} \underline{ax - x^2 = mbx - m^2 x^2} \quad x \text{ div.} \\ a - x = mb - m^2 x \\ \underline{m^2 x - x = mb - a} \\ m^2 - 1 \end{array}$$

$$x = \frac{mb - a}{m^2 - 1}$$

Sit $a = 13$, $b = 11$, $m = 2$: erit $x = (22 - 13) : (4 - 1) = 9 : 3 = 3$.

Analogia, in quam æquatio penultima resolvitur, $m - 1 : m^2 - 1 = x : b - a$ hoc suppeditat

Theorema : Denominator rationis unitate minutus est ad quadratum suum unitate pariter multiplicatum, ut terminus primus

proportionis sive continuæ, sive discretæ ad differentiam summæ secundi & tertii a summa primi & ultimi.

PROBLEMA LXVI.

180. Invenire tres numeros continue proportionales ejus conditionis, ut differentia primi & secundi æquetur numero dato & differentia secundi atque tertii æqualis sit eidem numero dato.

Sit differ. I = a
 differ. II = b
 terminus I = x
 erit II = $x + a$
 III = $x + a + b$

Per conditionem problematis:

$$x : x + a = x + a : x + a + b$$

$$\begin{array}{r} \underline{x^2 + ax + bx = x^2 + 2ax + a^2} \\ x^2 + ax \quad \quad x^2 + ax \quad \quad \text{subt.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \underline{bx = ax + a^2} \\ \underline{bx - ax = a^2} \\ \text{---} \quad \quad \quad (b - a) \text{ div.} \\ x = a^2 : (b - a) \end{array}$$

Sit $a = 8$, $b = 24$: erit $x = 64 : (24 - 8) = 64 : 16 = 4$.

Analogia, in quam resolvitur æquatio antepenultima, $b - a : a = a : x$, sequens continet

Theorema : Si fuerint tres numeri continue proportionales, erit differentia primi & secundi numerus medius proportionalis inter differentiam differentiæ termini primi & secundi a differentia secundi ac tertii & terminum primum.

PROBLEMA LXVII.

181. Datis in progressionem geometricam termino primo & ultimo atque terminorum numero, invenire denominatorem rationis.

Sit

Sit terminus primus = a
 ultimus = b
 numerus terminorum = n
 denominator = x
 Erit (§. 121)
 $b = x^{n-1} a$
 $\frac{b}{a} = x^{n-1}$ a div.
 $b : a = x^{n-1}$
 $b^1 : (n-1) : a^1 : (n-1) = x$
 Sit $a = 2, b = 486, n = 6$: erit $x = \sqrt[5]{(486 : 2)} = \sqrt[5]{243} = 3$.

PROBLEMA LXVIII.

182. Datis denominatore rationis, terminorum numero & summa progressionis geometrica, invenire terminum primum.

Sit denominator = m
 numerus terminorum = n
 summa progress. = c
 terminus I = x
 erit ultimus = $m^{n-1} x$
 consequenter (§. 121)
 $c = (m^n x - x) : (m - 1)$

$$\frac{mc - c = m^n x - x}{m - 1} = m^{n-1} x$$

$$(mc - c) : (m^n - 1) = x$$

Sit $m = 3, n = 6, c = 728$: erit $x = 2$.
 $728 : 728 = 2$

Analogia, in quam aequatio penultima resolvitur, $c : x = m^n - 1 : m - 1$, suppeditat hoc

Theorema: Summa progressionis geometricae est ad terminum primum ut dignitas denominatoris rationis, cujus exponens numero terminorum aequalis est, unitate multiplicata ad denominatorem ipsum unitate imminutum.

PROBLEMA LXIX.

183. Datis in progressionem geometricam termino primo & ultimo una cum denominatore rationis, invenire nume-

rum terminorum.

Sit terminus primus = a
 ultimus = b
 denominator rationis = m
 numerus terminorum = x
 erit (§. 121)

$m^{x-1} a = b$, hoc est, si logarithmus ipsius a ponatur la & logarithmus ipsius $m = lm$.

$$xlm - lm + la = lb \quad (\text{§. 341 Arithm.})$$

$$xlm = lb - la + lm$$

$$\frac{\quad}{\quad} = lm \text{ div.}$$

$$x = (lb - la) : lm + 1$$

Sit $a = 2, b = 486, m = 3$, erit

$$lb = 2.6866363$$

$$la = 0.3010300$$

$$lb - la = 2.3856063$$

$$lb - la = 23856063 \quad (5)$$

$$lm = 4774243 \quad (1)$$

$$6 = x$$

PROBLEMA LXX.

184. Datis summa progressionis geometricae, termino primo atque ultimo, invenire numerum terminorum ac denominatorem rationis.

Sit summa = c
 terminus primus = a
 ultimus = b

denominator rationis = y
 numerus terminorum = x
 erit (§. 121).

$$\frac{c = (by - a) : (y - 1)}{cy - c = by - a} \quad y^1 \quad b = y^{x-1} a$$

$$\frac{cy - by = c - a}{\quad} = c - b$$

$$y = (c - a) : (c - b)$$

N n 2

Aequa-

Æquatio altera adhibitis logarithmis in sequentem degenerat (§. 307 Arithm.).

$$\begin{aligned} lb &= xly - ly + la \\ lb + ly - la &= xly \\ \hline &ly \text{ div.} \\ (lb - la) : ly + 1 &= x \end{aligned}$$

Quodsi substituatur valor ipsius *ly* paulo ante inventus, qui est, $l(c-v)$ $- l(c-b)$; habebimus.

$$\begin{array}{r} lb - la \\ \hline l(c-a) - l(c-b) \end{array} + 1 = x$$

Sit $c = 728$, $a = 2$, $b = 486$: erit	
$lb = 2.6866363$	$c = 728$
$la = 0.3010300$	$b = 486$
$lb - la = 2.3856063$	$c - b = 242$
$l(c-a) = 28609366$	$c = 728$
$l(c-b) = 23838154$	$a = 2$
Differ. = 4771212	$c - a = 726$
23856063	(5
4771212	1
	6 = x.

PROBLEMA LXXI.

185. Datis in progressionē geometrica factō ex primo in ultimum, numero terminorum & denominatore rationis, invenire terminum primum & ultimum.

Sit factum = f
 numer. termin. = n
 denominator = m
 terminus primus = x
 ultimus = y
 erit per conditiones problematis:
 $xy = f$ $m^{n-1} x = y$
 $\frac{xy}{m^{n-1} x} = \frac{f}{m^{n-1}}$ x div.
 $y = f : x$

Quare (§. 87 Arithm.)

$$\begin{aligned} f : x &= m^{n-1} x \\ \hline &x \text{ mult.} \\ f &= m^{n-1} x^2 \\ \hline &m^{n-1} \text{ div.} \\ f : m^{n-1} &= x^2 \\ \hline &\text{Ext. Rad.} \\ \sqrt{f} : \sqrt{m^{n-1}} &= x \end{aligned}$$

Sit $m = 3$, $n = 6$, $f = 972$: erit $x = \sqrt[6]{972} : \sqrt[6]{243} = \sqrt[6]{4} = 2$.

DEFINITIO XIII.

186. Tres vel quatuor *quantitates* dicuntur *Harmonice proportionales*, si in priore casu differentia primi & secundi fuerit ad differentiam secundi atque tertii, ut primus ad tertium; in casu posteriore differentia primi & secundi ad differentiam tertii & quarti ut primus ad quartum:

E. gr. 10, 16 & 40 sunt in proportione harmonica: est enim $6 : 24 = 10 : 40$.

Si termini proportionales in casu priore continentur; oritur *Progressio Harmonica*.

PROBLEMA LXXII.

187. Datis duabus quantitatibus, invenire tertiam harmonice proportionalem.

Sit prima = a
 secunda = b
 tertia = x
 erit (§. 186)

$$\begin{aligned} b : a &= x : b = a : x \\ \hline ax - ab &= bx - ax \quad (\text{§. 297 Arith.}) \\ 2ax - bx &= ab \\ \hline &(2a - b) \text{ div.} \\ x &= ab : (2a - b) \end{aligned}$$

E. gr. Sit $a = 10$, $b = 16$: erit $x = 160 : (20 - 16) = 160 : 4 = 40$.

Æquatio penultima in hanc resolvitur analogiam $2a - b : a = b : x$, unde sequens nascitur *Theor.*

Theorema. Si fuerint tres numeri harmonice proportionales, erit differentia secundi a duplo primi ad primum, ut secundus ad tertium.

COROLLARIUM I.

188. Si $2a = b$; erit $x = ab$; o, consequenter $1. 0 = x : ab$ (§. 174 *Arithm.*). Quare cum non sit $1 = 0$, nec erit $x = ab$, adeoque in hoc casu nullus numerus harmonice proportionalis ipsis a & b inveniri potest. E. gr. si $a = 12$, $b = 24$: juxta regulam $x = 12. 24 : (24 - 12) = 12. 24 : 12 = 24$. Sed non licet $12. 24$ seu 288 pro termino tertio assumere: alias enim foret $12 : 264 = 12 : 288$ (§. 186): Quod absurdum. Multo minus inveniri poterit, si $b > 2a$:

COROLLARIUM II.

189. Quod si ex tribus proportionalibus 6. 8. 12. terminus secundus sumatur pro a ; tertius pro b , inveniatur quartus continue proportionalis $= 8. 12 : (16 - 12) = 8. 12 : 4 = 8. 3 = 24$.

COROLLARIUM III.

190. Cum eodem modo, si tertius pro a , quartus pro b sumatur, quintus inveniri queat & ita porro in infinitum; datis duobus terminis progressio; si possibile (§. 188), continuatur per regulam inventam. E. gr. si $a = 10$, $b = 12$, erit tertius $12. 10 : (20 - 12) = 15$. Inde quartus $12. 15 : (24 - 15) = 20$, quintus $15. 20 : (30 - 20) = 30$; sextus $20. 30 : (40 - 30) = 60$. Sed ulterius continuari nequit ob $60 = 2. 30$ (§. 188).

PROBLEMA LXXIII.

191. *Datis duabus quantitibus, invenire mediam harmonice proportionalem.*

Sit prima $= a$
 secunda $= x$
 tertia $= b$

erit $x = a : b = x = a : b$ (§. 186)

$$\frac{bx - ab = ab - ax}{\text{Arithm.}}$$

$$\frac{ax + bx = 2ab}{a + b \text{ div.}}$$

$$x = 2ab : (a + b)$$

E. gr. Sit $a = 10$, $b = 40$: erit $x = 500 : 50 = 10$.

Æquatio penultima in hanc resolvitur analogiam, $a + b : 2a = b : x$, unde

Theorema: Si fuerint tres numeri harmonice proportionales, erit summa primi & ultimi ad primi duplum ut ultimus ad medium.

PROBLEMA LXXIV.

192. *Datis tribus quantitibus, invenire quartam harmonice proportionalem.*

Sit prima $= a$
 secunda $= b$
 tertia $= c$
 quarta $= x$
 erit (§. 186)

$$\frac{b - a : x - c = a : x}{\text{Arithm.}}$$

$$\frac{ac = 2ax - bx}{(2a - b) \text{ div.}}$$

$$ac : (2a - b) = x$$

Sit e. gr. $a = 6$, $b = 8$, $c = 12$: erit $x = 72 : (12 - 8) = 72 : 4 = 18$.

Æquatio penultima in hanc resolvitur analogiam: $2a - b : a = c : x$.

Theorema. Si fuerint quatuor quantitates harmonice proportionales, erit ut differentia secundæ a duplo primæ ad primam, ita tertia ad quartam.

DEFINITIO XIV.

193. *Proportio Contraharmonica* est ea terminorum trium relatio, in qua differentia primi & secundi est ad differentiam

N. n. 3. fe

secundi & tertii ut tertius ad primum.
E. gr. 3, 5 & 6 sunt numeri contraharmonice
proportionales: est enim $2 : 1 = 6 : 3$.

PROBLEMA LXXV.

194. Datis duabus quantitibus invenire tertiam contraharmonice proportionalem.

Sit prima $= a$
secunda $= b$
tertia $= x$
erit (§. 193)
 $b - a : x - b = x : a$

$$\frac{ab - aa = x^2 - bx}{\frac{1}{4}b^2 \quad \frac{1}{4}b^2 \text{ add.}} \quad (\S. 297 \text{ Arithm.})$$

$$\frac{\frac{1}{4}b^2 + ab - a^2 = x^2 - bx + \frac{1}{4}b^2}{\text{Ext. Rad.}} \quad \sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab - a^2\right)} = x - \frac{1}{2}b \text{ ob } x > b$$

$$\frac{\frac{1}{2}b + \sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab - a^2\right)}}{\quad} = x$$

E. gr. Sit $a = 3, b = 5$: erit $x = \frac{5}{2} + \sqrt{\left(\frac{25}{4} + 15 - 9\right)} = \frac{5}{2} + \sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{5}{2} + \frac{7}{2} = \frac{12}{2} = 6$.

PROBLEMA LXXVI.

195. Datis duabus quantitibus invenire mediam contraharmonice proportionalem.

Sit prima $= a$ media $= x$
tertia $= b$
erit (§. 193)

$$\frac{x - a : b - x = b : a}{ax - a^2 = b^2 - bx} \quad (\S. 297 \text{ Arithm.})$$

$$\frac{ax + bx = a^2 + b^2}{\quad} \quad a + b \text{ div.}$$

$x = (a^2 + b^2) : (a + b)$
E. gr. sit $a = 3, b = 6$: erit $x = (9 + 36) : (3 + 6) = 45 : 9 = 5$.

Theorema. Si summa 2 quadratorum dividitur per summam radicem, quotus est

inter radices medius contraharmonice proportionalis.

DEFINITIO XV.

196. Numerus pronicus est, qui aggregato ex radice & quadrato ejusdem æqualis.

COROLLARIUM I.

197. Si in progressionem arithmetica terminus primus fuerit 2, differentia terminorum itidem 2, numerus terminorum $= n$; erit summa progressionis $= 2n + \frac{1}{2}(n^2 - n)2$ (§. 108), $= 2n + n^2 - n = n^2 + n$, adeoque numerus pronicus, cujus radix numero terminorum æqualis.

COROLLARIUM II.

198. Patet adeo numeros pronicos prodire per summationem progressionis numerorum parium. Sit enim progressio 2, 4, 6, 8, 10 &c. erunt pronicus 2, 6, 12, 20, 30, &c.

PROBLEMA LXXVII.

199. Ex dato numero radicem pronicam extrahere.

RESOLUTIO.

Sit numerus datus $= a$, radix pronica $= x$
erit (§. 196)

$$\frac{x^2 + x = a}{\frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} (\S. 143)}$$

$$\frac{x^2 + x + \frac{1}{4} = a + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + x = \sqrt{\left(a + \frac{1}{4}\right)} = \sqrt{\frac{4a + 1}{4}}} = \frac{1}{2} \sqrt{4a + 1}$$

$$x = \frac{1}{2} \sqrt{4a + 1} - \frac{1}{2}$$

Theorema. Si quadruplo numeri pronicus addatur unitas & radix unitate multa bifariam dividatur, quotus est radix pronica.

Sit $a = 72$, erit $x = \frac{1}{2} \sqrt{4 \cdot 72 + 1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{289} - \frac{1}{2} = \frac{17}{2} - \frac{1}{2} = 8$.

Examem. Nam $64 + 8 = 72$.

PRO-

PROBLEMA LXXVIII.

200. Invenire summam quadratorum & cuborum, quorum radices in serie numerorum naturali progrediuntur.

Sit $0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$ &c. $= sn^0$
 $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$ &c. $= sn^1$
 $0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25$ &c. $= sn^2$
 $0 + 1 + 8 + 27 + 64 + 125$ &c. $= sn^3$
 &c. &c.

$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$ &c. $= f(n+1)^0$
 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ &c. $= f(n+1)^1$
 $1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36$ &c. $= f(n+1)^2$
 $1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216$ &c. $= f(n+1)^3$
 &c. &c.

Nimirum sn^0 denotat summam quotlibet unitatum seriei a cyphra incipientis; $f(n+1)^0$ summam quotlibet unitatum seriei ab unitate incipientis, quia 0 est exponens unitatis (§. 55). Sed n representat unamquamque unitatem in serie prima; $n+1$ in altera. Ergo si numerus terminorum in utraque serie idem; erit $f(n+1)^0 - sn^0 = (n+1)^0 = 1$. Similiter sn^1 denotat summam seriei numerorum naturalium a cyphra incipientis & n quemlibet ejus terminum: $f(n+1)^1$ summam seriei eorundem numerorum ab unitate incipientium & $n+1$ quemlibet ejus terminum 1, 2, 3 &c. quia 1 est exponens radicum, seu dignitatis primæ (§. cit.). Quare si in utraque serie fuerit idem terminorum numerus, erit $f(n+1)^1 - sn^1 = (n+1)^1$, ubi $n+1$ terminum ultimum seriei ab unitate incipientis denotat, quo scilicet ea differt a serie, quæ a cyphra inchoatur. Eodem modo patet, esse $f(n+1)^2 - sn^2 = (n+1)^2$, $f(n+1)^3 - sn^3 =$

$(n+1)^3$, $f(n+1)^4 - sn^4 = (n+1)^4$
 &c. & in genere $f(n+1)^{m+1} - sn^{m+1} = (n+1)^{m+1}$.

Jam $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ (§. 81)
 $f(n+1)^2 = sn^2 + 2sn^1 + sn^0 + 1$
 $f(n+1)^2 - sn^2 - sn^0 - 1 = 2sn^1$

hoc est, ob $f(n+1)^2 - sn^2 = (n+1)^2$ per
 $(n+1)^2 - sn^0 - 1 = 2sn^1$ (dem.

$\frac{1}{2}(n+1)^2 - \frac{1}{2}sn^0 - \frac{1}{2} = sn^1$

E. gr. $n = 5$, erit $\frac{1}{2}(n+1)^2 = \frac{36}{2} = 18$,
 $\frac{1}{2}sn^0 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$, adeoque sn^1 summa omnium radicum ab 0 usque ad 5 $= 18 - 3 = 15$. Similiter sit $n = 3$, erit $\frac{1}{2}(n+1)^2 = 8$, $\frac{1}{2}sn^0 = 1\frac{1}{2}$, adeoque $sn = 6$.

Est porro

$(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$ (§. 84)
 $f(n+1)^3 = sn^3 + 3sn^2 + 3sn^1 + sn^0 + 1$

$f(n+1)^3 - sn^3 - 3sn^1 - sn^0 - 1 = 3sn^2$
 h. e. ob $f(n+1)^3 - sn^3 = (n+1)^3$ per de-
 $(n+1)^3 - 3sn^1 - sn^0 - 1 = 3sn^2$ (monst.

$\frac{1}{3}(n+1)^3 - sn^1 - \frac{1}{3}sn^0 - \frac{1}{3} = sn^2$

E. gr. Sit $n = 5$, erit $\frac{1}{3}(n+1)^3 = \frac{216}{3} = 72$,
 $sn^1 = 15$, $\frac{1}{3}sn^0 = 1\frac{2}{3}$, adeoque $sn^2 = 72 - 17 = 55$. Similiter sit $n = 3$, erit
 $\frac{1}{3}(n+1)^3 = 21\frac{1}{3}$, $sn = 6$, $\frac{1}{3}sn^0 = 1$, adeoque
 $sn^2 = 21\frac{1}{3} - 7\frac{1}{3} = 14$.

Sit denique

$(n+1)^4 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1$
 $f(n+1)^4 = sn^4 + 4sn^3 + 6sn^2 + 4sn^1 + sn^0 + 1$

$f(n+1)^4 - sn^4 - 6sn^2 - 4sn^1 - sn^0 - 1 = 4sn^3$
 h. e. ob $f(n+1)^4 - sn^4 = (n+1)^4$ per
 demonst.

$(n+1)^4 - 6sn^2 - 4sn^1 - sn^0 - 1 = 4sn^3$
 $\frac{1}{4}(n+1)^4 - \frac{3}{2}sn^2 - sn^1 - \frac{1}{4}sn^0 - \frac{1}{4} = sn^3$

Sit. e. gr. $n = 5$, erit $\frac{1}{4}(n+1)^4 = 324$,
 $\frac{3}{2}sn^2 = 82\frac{1}{2}$, $sn^1 = 15$, $\frac{1}{4}sn^0 = 1\frac{1}{4}$,
 adeoque $sn^3 = 324 - 99 = 225$.

SCHOLIION I.

201. Quod in summationibus, quibus in resolutione problematis usi sumus, semper addenda sit unitas, exempla singularia palam loquuntur. Si enim in equatione $(n+1)^2 = n^2 + 2n + n^0 + 1$ fuerit $n=4$ erit:

$$n^0 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$n^1 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

$$n^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16$$

$$f(n+1)^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25$$

Unde cum differentia inter $f(n+1)^2$ & $f n^2$ sit 25, & $2n^1 + n^0$ tantum 24; patet, ad conservandam aequalitatem addendam esse unitatem.

SCHOLIION II.

202. Eadem methodo, qua numerorum naturalium quadrata & cubos summare docuimus, altiores quoque dignitates summantur. Sed cum potentia in infinitum asurgant, ideo Problema generale pro casibus infinitis inveniendum.

PROBLEMA LXXIX.

203. Summare potentias quascunque numerorum naturalium.

Quoniam $(n+1)^{m+1} = n^{m+1} + \frac{m+1}{1} n^m + \frac{m+1.m}{1.2} n^{m-1} + \frac{m+1.m.m-1}{1.2.3} n^{m-2} + \frac{m+1.m.m-1.m-2}{1.2.3.4} n^{m-3}$ &c. in infinit.

(§. 95); erit

$$f(n+1)^{m+1} = f n^{m+1} + \frac{m+1}{1} f n^m + \frac{m+1.m}{1.2} f n^{m-1} + \frac{m+1.m.m-1}{1.2.3} f n^{m-2} + \frac{m+1.m.m-1.m-2}{1.2.3.4} f n^{m-3}$$
 &c. in inf. + I.

Hinc $f(n+1)^{m+1} - f n^{m+1} = \frac{m+1.m}{1.2} f n^{m-1} - \frac{m+1.m.m-1}{1.2.3} f n^{m-2} - \frac{m+1.m.m-1.m-2}{1.2.3.4} f n^{m-3}$ &c. — I = $\frac{m+1}{1} f n^m$.

Sed $f(n+1)^{m+1} - f n^{m+1} = (n+1)^{m+1}$ (§. 200): Ergo $(n+1)^{m+1} - \frac{m+1.m}{1.2} f n^{m-1} - \frac{m+1.m.m-1}{1.2.3} f n^{m-2} - \frac{m+1.m.m-1.m-2}{1.2.3.4} f n^{m-3}$ &c. in infin. — I = $\frac{m+1}{1} f n^m$:

consequenter $f n^m = \frac{1}{m+1} (n+1)^{m+1} - \frac{m}{1.2} f n^{m-1} - \frac{m.m-1}{1.2.3} f n^{m-2} - \frac{m.m-1.m-2}{1.2.3.4} f n^{m-3}$ &c. in infinit. = $\frac{1}{m+1}$

E. gr. sit $m=3$, erit $m+1=4$, $m-1=2$, $m-2=1$, $m-3=0$, a deoque $\frac{1}{4} (n+1)^4 - \frac{3}{2} f n^2 - f n^1 - \frac{1}{4} f n^0 = \frac{1}{4} f n^3$, ut ante (§. 200).

SCHOLIION.

204. Theorema generale terminis quidem constat infinitis; in casibus tamen specialibus numerus terminorum finitus evadit, quia reliqui evanescent, quando numerus ab m subtrahendus fit ipsi m aequalis: quemadmodum ex allato exemplo speciali apparet. Ita vero summationem potentiarum via vere analytica cruimus, eaque perfacili, ad captum tyronum. Semper tamen utendum est termino ultimo $\frac{1}{m+1}$: cujus ratio ante allata (§. 201).

COROLLARIUM.

205. Cum summatio potentiarum superiorum a summatione omnium inferiorum pendeat; si in formulis altioribus pro $f n^{m-1}$, $f n^{m-2}$, $f n^{m-3}$ &c. valores ex inferioribus substituantur, prodibunt formulæ per solum n summas Potentiarum determinantes, non præsuppositis summationibus anterioribus: E. gr.

f n^0

$$\begin{aligned}
 \text{fn}^0 &= n. (\S. 200) \\
 \hline
 2\text{fn}^1 &= (n+1)^2 - \text{fn}^0 - 1 (\S. 200) \\
 &= nn + 2n + 1 \\
 &\quad \quad \quad - n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad - 1 \\
 \hline
 &= nn + n \\
 \text{Hinc } \text{fn}^1 &= (nn + n) : 2. \\
 \hline
 3\text{fn}^2 &= (n+1)^3 - 3\text{fn}^1 - \text{fn}^0 - 1 (\S. 200) \\
 &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 \\
 &\quad \quad \quad - \frac{3}{2}n^2 - \frac{3}{2}n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad - n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - 1 \\
 \hline
 &= n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \\
 \text{Hinc } \text{fn}^2 &= (n^3 + \frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n) : 3 = (2n^3 + 3n^2 + n) : 6. \\
 \hline
 4\text{fn}^3 &= (n+1)^4 - 6\text{fn}^2 - 4\text{fn}^1 - \text{fn}^0 - 1 (\S. 200) \\
 &= n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 \\
 &\quad \quad \quad - 2n^3 - 3n^2 - n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad - 2n^2 - 2n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - 1 \\
 \hline
 &= n^4 + 2n^3 + n^2 \\
 \text{Hinc } \text{fn}^3 &= (n^4 + 2n^3 + n^2) : 4. \\
 \hline
 5\text{fn}^4 &= (n+1)^5 - 10\text{fn}^3 - 10\text{fn}^2 - 5\text{fn}^1 - \text{fn}^0 - 1 \\
 &= n^5 + 5n^4 + 10n^3 + 10n^2 + 5n + 1 \\
 &\quad \quad \quad - \frac{10}{3}n^4 - \frac{20}{3}n^3 - \frac{10}{3}n^2 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad - \frac{20}{6}n^3 - \frac{30}{6}n^2 - \frac{10}{6}n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - \frac{5}{2}n^2 - \frac{5}{2}n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - n \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad - 1 \\
 \hline
 &= n^5 + \frac{5}{2}n^4 + \frac{10}{6}n^3 - \frac{1}{6}n \\
 &= (6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n) : 6 \\
 \text{Hinc } \text{fn}^4 &= (6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n) : 30. \\
 \hline
 \text{\&c.} & \quad \quad \quad \text{\&c.} \quad \quad \quad \text{\&c.}
 \end{aligned}$$

DEFINITIO XVI.

206. *Numeri Polygони* sunt summæ progressionum arithmeticarum ab unitate incipientium. Dicuntur in specie *Triangulares*, si differentia terminorum fuerit 1; *Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.*

Quadrati, si 2; *Pentagoni*, si 3; *Hexagoni*, si 4; *Heptagoni*, si 5; *Octogoni*, si 6 &c.

Progr. Arithm.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Num. Triang.	1.	3.	6.	10.	15.	21.	28.	36
Progr. Arithm.	1.	3.	5.	7.	9.	11.	13.	15
Num. Quadr.	1.	4.	9.	16.	25.	36.	49.	64
Progr. Arithm.	1.	4.	7.	10.	13.	16.	19.	22
Num. Pentag.	1.	5.	12.	22.	35.	51.	70.	92
Progr. Arithm.	1.	5.	9.	13.	17.	21.	25.	29
Num. Hexag.	1.	6.	15.	28.	45.	66.	91.	120

SCHOLIUM.

207. *Numeri polygони nomina* sortiuntur a figuris geometricis, in quas puncta unitatibus respondentia disponi possunt. E. gr. *Triapuncta* numeri triangularis 3 unitatibus respondentia disponuntur in triangulum: & idem tenendum est de reliquis numeris triangularibus.

DEFINITIO XVII.

208. *Latus numeri polygони* est numerus terminorum progressionis arithmetice, qui summantur. *Numerus vero angulorum* est, qui indicat, quot angulos figura habet, unde numerus polygonus nomen suum fortitur.

COROLLARIUM.

209. Numerus adeo angulorum in triangularibus 3; in tetragonis 4; in pentagonis 5 &c. consequenter differentiam terminorum, qui summantur, excedit duabus unitatibus (§. 206).

PROBLEMA LXXX.

210. *Dato latere numeri polygони & numero angulorum; invenire numerum polygони.*

Sit latus = n
 numerus angulorum = a
 terminus primus progressionis = 1 (§. 206).
 differentia terminorum = $a - 2$ (§. 209).
 terminus ultimus $1 + (a - 2)(n - 1)$
 primus 1 (§. 333 *Arith.*)

$$\begin{aligned}
 \text{Summa primi \& ult.} &= 2 + (a - 2)(n - 1) \\
 \text{hoc est} &= 4 + na - 2n - a \\
 \text{dimid. term. num.} &= \frac{1}{2}n \\
 \hline
 \text{O o} & \quad \quad \quad \text{Num.}
 \end{aligned}$$

Num. polyg. $2n + \frac{1}{2}n^2 a - n^2 - \frac{1}{2}an$
 (§. 106. 107)

$= (n^2 a - 2n^2 - an + 4n) : 2$
 $= (n^2(a-2) - n(a-4)) : 2$

Theorema. Numerus polygonus est semi-differentia factorum ex quadrato lateris in numerum angulorum duabus unitatibus multatum & ex ipso latere in numerum angulorum quaternario multatum.

COROLLARIUM I.

211. Sit $n=3$, erit triangularis, $= \frac{1n^2 + 1n^2}{2}$
 Sit $a=4$, erit quadratus $= \frac{2n^2 - 0n}{2} = n$
 Sit $a=5$, erit pentagonus $= \frac{3n^2 - 1n}{2}$
 Sit $a=6$, erit hexagonus $= \frac{4n^2 - 2n}{2} = n^2 - n$
 Sit $a=7$, erit heptagonus $= \frac{5n^2 - 3n}{2}$
 Sit $a=8$, erit octogon. $= \frac{6n^2 - 4n}{2} = 3n^2 - 2n$
 &c. &c.

COROLLARIUM II.

212. Quoniam numerus polygonus (§. 210).
 $\frac{n^2(a-2) - n(a-4)}{2}$ erit summa seriei cujuscunque numerorum polygonorum
 $\frac{(a-2)sn^2 - (a-4)sn^1}{2}$. Nempe quia $a-2$
 & $a-4$ sunt numeri constantes, qui in casu speciali sunt determinati, non summantur. Sed
 $sn^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$ & $sn^1 = \frac{n^2 + n}{2} = \frac{3n^2 + 3n}{6}$
 (§. 205.) Ergo summa polygonorum
 $\frac{(a-2)(2n^3 + 3n^2 + n) - (a-4)(3n^2 + 3n)}{12}$
 $= \frac{(2an^3 + 3an^2 + an - 4n^3 - 6n^2 - 2n - 3an^2 - 3an + 12n^2 + 12n)}{12} = \frac{(an^3 - an - 2n^3 + 3n^2 + 5n)}{6} = \frac{(a-2)n^3 + 3n^2 - (a-5)n}{6}$
 unde porro theoremata specialia eliciuntur, determinato numero angulorum a . Nempe
 summa triangularium $(n^3 + 3n^2 + 2n) : 6$
 pentagonorum $(n^3 + n^2) : 2$
 hexagonorum $(4n^3 + 3n^2 - n) : 6$
 heptagonorum $(5n^3 + 3n^2 - 2n) : 6$
 octogonorum $(2n^3 + n^2 - n) : 2$ &c. &c.

Est enim pro triangularibus $a=3$, pro pentagonis $a=5$, pro hexagonis $a=6$, pro heptagonis $a=7$, pro octogonis $a=8$, &c. (§. 208).

PROBLEMA LXXXI.

213. Dato numero polygono & numero angulorum invenire latus.

Sit numerus polygonus $= p$, latus $= x$
 numerus angulorum $= a$
 erit differentia terminor. $= a - 2$ (§. 209)
 terminus primus $= 1$ (§. 206)
 adeoque ultimus $= 1 + (x-1)(a-2)$
 hoc est $3 + ax - 2x - a$ (§. 333.)
 terminus primus I *Aritm.*

summa pr. & ult. $\frac{4 + ax - 2x - a}{2}$
 dimid. num. term. $\frac{\frac{1}{2}x}{2}$
 numerus polygon. $\frac{2x + \frac{1}{2}ax - x^2 - \frac{1}{2}ax}{2}$
 (§. 108).

Quare $\frac{\frac{1}{2}ax^2 - x^2 + 2x - \frac{1}{2}ax = p}{ax^2 - 2x + 4x - ax = 2p}$

$x^2 + \frac{4-a}{a-2}x = \frac{2p}{a-2}$

hoc est, si fiat $(a-4) : (a-2) = m$
 $x^2 - mx = 2p : (a-2)$
 $\frac{\frac{1}{4}m^2}{4} \quad \frac{\frac{1}{4}m^2}{4}$

$\frac{x^2 - mx + \frac{1}{4}m^2 = \frac{1}{4}m^2 + 2p : (a-2)}{x - \frac{1}{2}m} \left. \vphantom{\frac{x^2 - mx + \frac{1}{4}m^2 = \frac{1}{4}m^2 + 2p : (a-2)}} \right\} = \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + 2p : (a-2))}$
 $m - \frac{1}{2}x \left. \vphantom{m - \frac{1}{2}x} \right\}$

$x = \frac{1}{2}m + \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + 2p : (a-2))}$
 hoc est, substituto valore ipsius m ,
 $x = \frac{a-4}{2a-4} + \sqrt{(\frac{a^2-8a+16}{4a^2-16a+16} + \frac{4p}{2a-4})}$
 $\frac{a-4 + \sqrt{(8ap - 16p + a^2 - 8a + 16)}}{2a-4}$
 $\frac{a-4 + \sqrt{(8(a-2)p + (a-4)^2)}}{2a-4}$

obti-

obtinet nimirum signum +, quia radix major est quam $a-4$

Sit e. gr. $a=3$, erit latus numeri triangularis $\frac{-1 + \sqrt{(8p+1)}}{2}$

Sit $a=5$, erit latus pentagoni $\frac{1 + \sqrt{(24p+1)}}{6}$

Sit $a=6$, erit latus hexagoni $\frac{2 + \sqrt{(32p+4)}}{8}$

Sit $a=7$, erit latus heptag. $\frac{3 + \sqrt{(40p+9)}}{10}$

&c. &c.

DEFINITIO XVIII.

214. Summæ numerorum polygonorum eodem modo collectæ, quo ex progressionibus arithmetiis ipsi polygoni eliciuntur, dicuntur *Pyramidales primi*: Summæ pyramidalium primorum *Pyramidales secundi*: summæ pyramidalium secundorum *Pyramidales tertii* &c. in infinitum. Speciatiim *Pyramidales triangulares primi* vocantur, si ex triangularibus ortum ducant; *Pyramidales pentagoni primi*, si ex pentagonis oriuntur &c.

E. gr. Num. triang. = 1. 3. 6. 10. 15. 21
 Pyram. triang. pr. = 1. 4. 10. 20. 35. 56
 secundi = 1. 5. 15. 35. 70. 126
 tertii = 1. 6. 21. 56. 126. 252
 &c. &c.

COROLLARIUM.

215. Cum igitur summare docuerimus numeros polygonos (§. 212), evidens jam est, quomodo numeri pyramidales primi inveniuntur. Nempe $\frac{(a-2)n^3 + 3n^2 - (a-5)n}{6}$

exprimit numeros pyramidales primos *vi §. cit.*

PROBLEMA LXXXII.

216. *Invenire summam numerorum pyramidalium superioris ordinis cujuscunque, seu dato quolibet inferiore proxime superiorem.*

Non alia re opus est, quam ut juxta methodum superius traditam (§. 200) numeri pyramidales proxime inferioris ordinis summentur: ita enim habentur eorum summæ. Quare cum numerus pyramidalis primi ordinis sit $\frac{(a-2)n^3 + 3n^2 - (a-5)n}{6}$ (§. 215):

erit summa pyramidalium primi ordinis $\frac{(a-2)n^3 + 3n^2 - (a-5)n}{6}$

Sed $\frac{n^3}{6} = (n^4 + 2n^3 + n^2) : 4$, $\frac{n^2}{6} = (2n^3 + 3n^2 + n) : 6$, $\frac{n}{6} = (n^2 + n) : 2$, (§. 205). Ergo summa pyramidalium primi ordinis, seu numerus pyramidalis secundi ordinis = $((a-2)(n^4 + 2n^3 + n^2) + 2(2n^3 + 3n^2 + n) - (a-5)(n^2 + n)) : 24 = (an^4 + 2an^3 - an^2 - 2an - 2n^4 + 14n^2 + 12n) : 24 = ((a-2)n^4 + 2an^3 - (a+14)n^2 - (2a+12)n) : 24$

Sit e. gr. $a=3$, hoc est quærat summa pyramidalium triangularium primi ordinis; erit ea $\frac{n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n}{24}$. Quoniam vero

summa inventa generalis exprimit numerum quemcunque pyramidalem secundi ordinis (§. 214), si ea porro eundem in modum summetur, prodibit summa pyramidalium secundi ordinis seu numerus pyramidalis ordinis tertii (§. cit.). Et ita progredi licet, quousque libet.

COROLLARIUM I.

217. Cum summa unitatum sit n , summa laterum $\frac{n^2 + n}{2} = \frac{n \cdot n + 1}{1 \cdot 2}$ (§. 205), summa

triangularium $\frac{n^3 + 3n^2 + 2n}{6} = \frac{n \cdot n + 1}{1 \cdot 2} \cdot \frac{n + 2}{3}$ (§. 215), summa pyramidalium pri-

mi ordinis $\frac{n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n}{24} = \frac{n \cdot n + 1}{1 \cdot 2}$

$\frac{n + 2 \cdot n + 3}{3 \cdot 4}$ (§. 216). &c. evidens est lex,

qua numeri pyramidales ex triangularibus orti in infinitum sumuntur. Nimirum numerus fractionum in se invicem ducendarum excedit numerum ordinis tribus unitatibus, fractionum earundem numeratores progrediuntur in serie naturali numerorum, sed terminus primus progressionis est latus numeri figurati, denominatores sunt numerorum naturalium progressio ab unitate incipiens. Nempe dato lateri n , erit numerus pyramidalis triangularis indeterminatus $\frac{n + 0 \cdot n + 1}{1 \cdot 2}$

$\frac{n + 2 \cdot n + 3}{3 \cdot 4} \cdot \frac{n + 4 \cdot n + 5}{5 \cdot 6}$ &c. in infinit.

COROLLARIUM II.

218. Hinc apparet, quales numeri sint unciarum potentiarum (§. 95).

PROBLEMA LXXXIII.

219. Dato numero quantitatum una cum numero indicante, quot earum invicem combinari debeant, invenire numerum combinationum.

Quantitas una nullam; duæ a & b nonnisi unam combinationem ab admittunt. Trium combinationes sunt tres, nempe ab, ac, bc ; quatuor vero sex ab, ac, ad, bc, bd, cd ; quinque decem $ab, ac, bc, ad, bd, cd, ae, be, ce, de$, & ita porro. Unde apparet, numeros combinationum progredi ut 1. 3. 6. 10 &c. hoc est, esse numeros triangulares (§. 206), quorum latus differt unitate a numero quantitatum datarum. Si nempe hic foret q , erit latus numeri combinationum $q - 1$, adeoque numerus combinationum $\frac{q - 1 \cdot q + 0}{1 \cdot 2}$ (§. 217).

Si quantitates tres invicem combinan-

dæ & numero itidem tres fuerint, erit combinatio tantum unica abc . Si quarta accedat, combinationes reperies quatuor abc, abd, bcd, acd ; si quinta, decem $abc, abd, bcd, acd, abc, bde, bce, ace, ade$; si sexta, viginti & ita porro. Numeri ergo combinationum progrediuntur, ut 1. 4. 10. 20 &c. hoc est, sunt numeri pyramidales triangulares primi (§. 214), quorum latus a numero quantitatum datarum differt duabus unitatibus, seu exponente unitate multato. Hinc si numerus quantitatum datarum fuerit q , erit latus $q - 2$, adeoque numerus combinationum $\frac{q - 2 \cdot q - 1 \cdot q + 0}{1 \cdot 2 \cdot 3}$ (§. 271).

Si quantitates quatuor invicem combinandæ, numeros combinationum progredi deprehendimus ut numeros pyramidales triangulares secundi ordinis 1. 5. 15. 35 &c. (§. 214), quorum latus a numero quantitatum differt tribus quantitibus seu exponente unitate multato. Quare si numerus quantitatum fuerit q , erit latus $q - 3$, adeoque numerus combinationum $\frac{q - 3 \cdot q - 2 \cdot q - 1 \cdot q + 0}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$ (§. 217.)

Hinc facile abstrahitur regulâ generalis determinandi numerum combinationum in casu quocunque. Sit nempe numerus quantitatum combinandarum q , exponens combinationis n , erit numerus combinationum $\frac{q - n + 1 \cdot q - n + 2 \cdot q - n + 3 \cdot q - n + 4 \cdot q - n + 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$ &c. donec numerus addendus sit ipsi n æqualis.

E. gr. Sit numerus quantitatum combinandarum = 6, exponens combinationis 4; erit:

$$\begin{array}{r} \text{erit numerus combinationum } \frac{6 - 4 + 1.}{1.} \\ \frac{6 - 4 + 2. \quad 6 - 4 + 3. \quad 6 - 4 + 4. \quad 6 - 3.}{2. \quad 3. \quad 4. \quad 1.} \\ \frac{6 - 2. \quad 6 - 1. \quad 6 + 0 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 15.}{2. \quad 3. \quad 4.} \end{array}$$

COROLLARIUM.

220. Quodsi quantitatum datarum omnes combinationes possibiles scire desideres, incipiendo nempe a combinationibus singularum binarum; addi oportet $\frac{q - 1. q + 0.}{1. \quad 2.}$

$$\frac{q - 2. q - 1. q + 0. q - 3. q - 2. q - 1. q + 0}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.}$$

&c. Unde numerus omnium combinationum possibilium erit $\frac{q \cdot q - 1. q \cdot q - 2}{1. \quad 2. \quad 1. \quad 2. \quad 3.} + \frac{q \cdot q - 3. q - 4}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5.}$

&c. Quæ est summa unciarum binomii ad dignitatem q eveci multata exponente dignitatis unitate aucto $q + 1$ (§. 95). Quare cum hæ unicæ prodeant $1 + 1$ ad dignitatem q evehendo per probl. 29. (§. cit.), sit vero $1 + 1 = 2$; erit $2^q - q - 1$ numerus omnium combinationum possibilium. E. gr. Si numerus quantitatum 5 erit numerus combinationum possibilium $2^5 - 6 = 32 - 6 = 26$.

SCHOLIUM.

221. Uncias prodire debere pro binomio, $1 + 1$ ad eam dignitatem elevando, ad quam elevatur binomium $a + b$: patet exinde, quod uncia partium a & b sit 1 , atque adeo ut facta litteralia ex a & b , ita uncie ex 1 & 1 in se invicem ductis prodire debeant. Vide calculum:

$$\begin{array}{r} 1 + 1 \quad \text{Unc. Rad.} \\ 1 + 1 \\ \hline + 1 + 1 \\ 1 + 1 \\ \hline 1 + 2 + 1. \quad \text{Unc. Quadr.} \\ 1 + 1 \quad \text{Unc. Rad.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 1 + 2 + 1 \\ 1 + 2 + 1 \\ \hline 1 + 3 + 3 + 1 \quad \text{Unc. Cubi.} \\ \text{\&c. \&c.} \end{array}$$

PROBLEMA LXXXIV.

222. Dato numero quantitatum, invenire numerum omnium variationum, quas quantitates omnibus modis possibilibus combinatae ac permutatae subire possunt.

Sint quantitates duæ a & b , erunt variationes permutationum 2 (§. 129), consequenter cum earum qualibet etiam cum seipsa combinari possit, istis addendæ adhuc sunt variationes 2. Ergo numerus omnium est, $2 + 2 = 4$.

Quodsi tres fuerit & exponens variationis 2, combinationes erunt 3 & permutationes 3, nempe ab, ac, bc , & ba, ca, cb . (§. 129): quibus si addas combinationes tres uniuscujusque quantitatis cum seipsa aa, bb, cc ; habebis numerum variationum $3 + 3 + 3 = 9$.

Eodem modo patet, si quantitates fuerint quatuor & exponens 2, numerum combinationum fore 6, & numerum permutationum itidem 6, numerum combinationum cum seipsa 4, adeoque numerum variationum 16; si manente exponente quantitates fuerint quinque, numerum variationum fore 25 &c. & in genere si numerus quantitatum fuerit n , numerum variationum fore n^2 .

Sint quantitates tres & exponens variationis 3; reperitur numerus variationum $27 = 3^3$, nempe $aaa, aab, aba, baa, aac, aka, caa, abb, bab, bba, abc, bac, bca, acb, cab, cba, acc, cac, cca, bbb, bbc, cbb, bcb, bcc, cbc, ccb, ccc$.

Nec ab simili modo constabit, si quantitates fuerint quatuor & exponents 3, fore numerum variationum $64 = 4^3$: & in genere, si fuerit quantitatum numerus $= n$, exponents 3, fore numerum variationum n^3 .

Quodsi ita progredi libuerit, reperietur tandem, si quantitatum numerus fuerit n , & exponents n , fore numerum variationum n^n .

Quare si antecedentes omnes addas, ubi exponents minor; reperietur numerus omnium variationum possibilem $n^n + n^{n-1} + n^{n-2} + n^{n-3} + n^{n-4} + n^{n-5} + n^{n-6}$ &c. donec numerus ex n subtractus relinquat 1,

quia initium fit a quantitatibus singulis semel positis.

Cum adeo numerus omnium variationum possibilem fit progressio geometrica, cujus terminus primus seu minimus n^1 , maximus n^n , denominator n (§. 332 *Arithm.* & 314 *Analyf.*); erit is $= (n^{n+1} - n) : (n - 1)$, (§. 122).

Sit e. gr. $n = 4$. erit numerus variationum possibilem $(4^5 - 4) : (4 - 1) = 1020 : 3 = 340$. Sit $n = 24$, erit numerus omnium variationum possibilem $(24^{25} - 24) : (24 - 1) = 32009658644406818986777955348250600 : 23 = 1391724288887252999425128493402200$. Tot ergo modis 24 literæ inter se componi possunt.

C A P U T I I.

De Algebra ad Problemata Arithmetica indeterminata applicata.

PROBLEMA LXXXV.

223. **I**nvenire duos numeros, quorum summa una cum facto eorundem æquatur numero dato.

Sit numerus datus $= a$, quasitorum unus $= x$, alter $= y$: erit per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} xy + x + y = a \\ \hline y \text{ sub.} \\ xy + x = a - y \\ \hline y + 1 \text{ div.} \\ x = (a - y) : (y + 1) \end{array}$$

Sit $a = 30, y = 2$: erit $x = (30 - 2) : (2 + 1) = 28 : 3 = 9\frac{2}{3}$. Sit $a = 20, y = 2$: erit $x = (20 - 2) : (2 + 1) = 18 : 3 = 6$. Sit $a = 19, y = 4$: erit $x = (19 - 4) : (4 + 1) = 15 : 5 = 3$.

Sit numerus datus $= a$, quasitorum unus $= x + y$, alter $= x - y$ (§. 6), erit per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} x^2 - y^2 + 2x = a \\ \hline y^2 \text{ add.} \\ x^2 + 2x = y^2 + a \\ \hline I \quad I \text{ (§. 143)} \\ \hline x^2 + 2x + 1 = y^2 + a + 1 \\ \hline \text{Ext. Rad.} \\ x + 1 = \sqrt{y^2 + a + 1} \\ \hline I. \text{ sub.} \\ x = \sqrt{y^2 + a + 1} - 1 \end{array}$$

Unde apparet, ut ex $y^2 + a + 1$ radix extrahi possit, $a + 1$ esse debere differentiam duorum quadratorum, quorum unum est y^2 . E.gr.

E. gr. Sit $a = 19$, $y = \frac{1}{2}$; erit $x = \sqrt{(\frac{1}{4} + 19 + 1)} - 1 = \sqrt{\frac{81}{4}} - 1 = \frac{9}{2} - 1 = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$. Ergo $x + y = 3\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 4$ & $x - y = 3\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 3$. Sit $a = 20$, $y = 2$; erit $x = \sqrt{(4 + 20 + 1)} - 1 = \sqrt{25} - 1 = 5 - 1 = 4$. Ergo $x + y = 4 + 2 = 6$ & $x - y = 4 - 2 = 2$.

PROBLEMA LXXXVI.

224. *Invenire quatuor numeros ejus conditionis, ut summa primi & secundi aequetur tertio, differenti vero primi & secundi quarto.*

Sit numerus primus $= x$, secundus $= y$; tertius $= z$, quartus $= t$, erit per conditiones problematis

$$\begin{array}{r} y + x = z \qquad x - y = t \\ \hline \qquad \qquad \qquad y \text{ sub} \qquad \qquad \qquad y \text{ sub} \\ x = z - y \qquad x = t + y \\ \text{Quare (§. 87 Arithm.)} \\ t + y = z - y \\ \hline \qquad \qquad \qquad y. \text{ add.} \\ t + 2y = z \\ \hline \qquad \qquad \qquad t. \text{ sub.} \\ 2y = z - t \\ \hline \qquad \qquad \qquad 2 \text{ div.} \\ y = (z - t) : 2 \end{array}$$

Ergo $x = (z - t) : 2 + t = (z + t) : 2$.

Unde apparet, si numeri integri desiderentur, pro z & t assumi debere vel numeros pares, vel impares: nequaquam alterum parem, alterum imparrem (§. 72. 74).

Sit $z = 8$, $t = 2$: erit $y = (8 - 2) : 2 = 6 : 2 = 3$ & $x = (8 + 2) : 2 = 4 + 1 = 5$. Similiter sit $z = 5$, $t = 1$: erit $x = (5 + 1) : 2 = 3$ & $y = (5 - 1) : 2 = 2$.

PROBLEMA LXXXVII.

225. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut unusquisque cum partibus suis aliquotis efficiat unam summam.*

Sit unus $= mx$, alter $= ny$; erit per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} 1 + m + mx + x = 1 + n + ny + y \\ \hline mx + x = 1 + n + (n + 1)y - (1 + m) \\ \hline x = (1 + n + (n + 1)y - 1 - m) : (m + 1) \end{array}$$

Apparet ergo, $1 + n$ denotare summam partium aliquotarum denominatoris multipli ipsius y , & $1 + m$ summam partium aliquotarum denominatoris multipli ipsius x : posse autem non modo y , sed & utrumque denominatorem pro arbitrio assumi, sed ut y sit numerus impar, isque primus.

Sit e. gr. $m = 1$, $n = 2$, $y = 3$. Erunt partes aliquotae ipsius n , 1 & 2 , ipsius m autem 1 : consequenter $x = 2 + 1 + (2 + 1)y - 1 = 2 + 3y = 2 + 9 = 11$. Sit $m = 4$, $n = 8$, $y = 13$: erit $1 + n = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$ & $1 + m = 1 + 2 + 4 = 7$, consequenter $x = (15 + 15y - 7) : 7 = (210 - 7) : 7 = 203 : 7 = 29$.

PROBLEMA LXXXVIII.

226. *Invenire duos numeros, quorum summa aequetur quadrato minoris.*

Sit numerus major $= x$, minor $= y$; erit per conditionem problematis,

$$\begin{array}{r} x + y = y^2 \\ \hline \qquad \qquad \qquad y \text{ sub.} \\ x = y^2 - y = (y - 1)y \end{array}$$

Unde apparet, numerum majorem esse factum ex minore in eundem minorem unitate multatum.

Sit $y = 3$; erit $x = 2$. $3 = 6$. Sit $y = 5$; erit $x = 4$. $5 = 20$. Sit $y = 9$; erit $x = 8$. $9 = 72$.

PROBLEMA LXXXIX.

227. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut summa quadratorum aequetur cubo minoris.*

Sit numerus major $= x$, minor $= y$; erit per conditionem problematis

$$x^2 +$$

$$\begin{array}{r} x^2 + y^2 = y^3 \\ \hline \dots\dots\dots y^2 \text{ subtr.} \\ x^2 = y^3 - y^2 = y^2 (y - 1) \\ \hline x = y\sqrt{y - 1} \end{array}$$

Apparet adeo, pro y assumendum esse numerum, qui unitate quadratum excedit, hoc est, quadratum quodlibet unitate auctum.

E. gr. Sit $y = 5$, erit $x = 5\sqrt{5 - 1} = 5\sqrt{4} = 5 \cdot 2 = 10$. Sit $y = 17$, erit $x = 17\sqrt{17 - 1} = 17\sqrt{16} = 17 \cdot 4 = 68$.

PROBLEMA XC.

228. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut factum equale sit cubo, cujus radix facta ex numero primo in quadratum secundi aequatur.*

Sit numerus primus $= x$, secundus $= y$, radix cubica $= v$, erit per conditiones problematis

$$\begin{array}{r} v = xy^2 \quad xy = v^3 \\ \hline \dots\dots\dots y^2 \text{ div.} \quad \dots\dots\dots y \text{ div.} \\ v : y^2 = x \quad x = v^3 : y \\ v : y^2 = v^3 : y \\ \hline \dots\dots\dots y^2 \text{ mult.} \\ v = yv^3 \\ \hline \dots\dots\dots v \text{ div.} \\ 1 = yv^2 \\ \hline \dots\dots\dots v^2 \text{ div.} \\ 1 : v^2 = y \end{array}$$

Ergo $x = v^3 : \frac{1}{v^2} = v^5$
 Sit $v = 2$, erit $x = 32$, $y = \frac{1}{4}$. Sit $v = 3$, erit $x = 243$, $y = \frac{1}{9}$.

PROBLEMA XCI.

229. *Invenire duos numeros quorum quadrata differunt quadrato.*

Sit numerus unus $= x + y$, alter $= x - y$: erit per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} x^2 + 2xy + y^2 \\ x^2 - 2xy + y^2 \text{ subtr.} \\ \hline 4xy = v^2 \\ \hline \dots\dots\dots 4y \text{ div.} \\ x = v^2 : 4y \end{array}$$

Patet adeo, pro y assumendum esse numerum per cujus quadruplum dividi potest quadratum aliquod.

Sit e. gr. $v^2 = 16$, $y = 1$: erit $x = 16 : 4 = 4$. Ergo $x + y = 4 + 1 = 5$ & $x - y = 4 - 1 = 3$. Sit $v^2 = 36$, $y = 3$: erit $x = 36 : 12 = 3$. Ergo $x + y = 6$ & $x - y = 0$. Sit $v^2 = 36$, $y = 9$: erit $x = 36 : 36 = 1$. Ergo $x + y = 10$ & $x - y = 8$.

PROBLEMA XCII.

230. *Summam duorum quadratorum in duo alia quadrata dividere.*

Sit latus quadrati majoris $= a$, minoris $= b$. Sit porro latus quadrati unius ex quaesitis minus quam a , adeoque $a - z$; erit quadrati alterius latus majus quam b . Poterat itaque dici $y - b$. Enimvero ut in calculo irrationalitas evitetur, rectius id nuncupatur $yz - b$. Quare per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} a^2 - 2az + z^2 + y^2 z^2 - 2byz + b^2 = a^2 + b^2 \\ \hline \dots\dots\dots a^2 + b^2 \text{ subtr.} \\ z^2 + y^2 z^2 - 2az - 2byz = 0 \\ \hline \dots\dots\dots z \text{ div.} \\ z + y z - 2a - 2by = 0 \\ \hline \dots\dots\dots 2a + 2by \text{ add.} \\ y^2 z + z = 2a + 2by \\ \hline \dots\dots\dots y^2 + 1 \text{ div.} \end{array}$$

$z = (2a + 2by) : (y^2 + 1)$
 Sit e. gr. $a = 3$, $b = 2$, $y = 2$: erit $z = (6 + 8) : (4 + 1) = 14 : 5 = 2\frac{2}{5}$. Ergo $a - z = 3 - 2\frac{2}{5} = \frac{13}{5}$ & $yz - b = \frac{28}{5} - 2 = \frac{28}{5} - \frac{10}{5} = \frac{18}{5} = 3\frac{3}{5}$.

SCHOLIUM.

231. *Dum quadratorum quaesitorum latera assumuntur, valores eorum quantitates a & b in-*

ingredi debent, ut in utroque æquationis membro sit $a^2 + b^2$. Porro vero in valore lateris alterius y multiplicari debet per z , ut sublato utrinque $a^2 + b^2$ residuum sit divisibile per z . Ita enim z reducitur ad unam dimensionem, sicque æquatio in terminis rationalibus est reducibilis.

PROBLEMA XCIII.

232. Invenire duos quadratos numeros, qui differunt numero dato.

Sit latus quadrati minoris $= x$, majoris $= y + x$, differentia quadratorum $= d$: erit quadratum majus $= x^2 + 2xy + y^2$, minus $= x^2$, consequenter per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} 2xy + y^2 = d \\ \hline 2xy = d - y^2 \\ \hline x = (d - y^2) : 2y \end{array}$$

Unde apparet, pro y assumi debere numerum, qui sit minor quam \sqrt{d} .

Sit e. gr. $d = 10, y = 3$: erit $x = (10 - 9) : 6 = \frac{1}{6}$ & $x + y = 3 + \frac{1}{6} = \frac{19}{6}$. Sit $d = 11, y = 1$: erit $x = (11 - 1) : 2 = 10 : 2 = 5$ & $x + y = 5 + 1 = 6$. Sit $d = 48, y = 4$: erit $x = (48 - 16) : 8 = 6 - 2 = 4$ & $x + y = 4 + 4 = 8$.

PROBLEMA XCIV.

233. Numerum datum dividere, in duos alios, quorum factum est numerus quadratus.

Sit numerus datus $= 2a$, differentia $= 2y$: erit major $a + y$, minor $a - y$ (S. 5), factum $= aa - yy$. Ut calculus ab irrationalitate liberetur, pro latere quadrati assumendus est valor, quem ingreditur y & qui diversis gaudet signis. Sit ergo $= xy - a$: erit per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} aa - y^2 = aa - 2axy + x^2y^2 \\ \hline -y^2 = -2axy + x^2y^2 \\ \hline y = -2ax + x^2y \\ \hline 2ax = x^2y + y \\ \hline 2ax : (x^2 + 1) = y \end{array}$$

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

Sit e. gr. $2a = 10, x = 2$: erit $y = 20 : (4 + 1) = 20 : 5 = 4$ Ergo $a + y = 5 + 4 = 9$; $a - y = 5 - 4 = 1$. Sit $2a = 10, x = 3$: erit $y = 30 : (9 + 1) = 30 : 10 = 3$.

PROBLEMA XCV.

234. Datum numerum dividere in duos numeros, quorum differentia est numerus quadratus.

Sit numerus datus $= a$, quæditorum major $= x$, minor $= y$: erit per conditiones problematis.

$$\begin{array}{r} x + y = a \\ \hline x - y = v^2 \\ \hline x = a - y \\ \hline a - y = v^2 + y \\ \hline a = v^2 + 2y \\ \hline a - v^2 = 2y \\ \hline (a - v^2) : 2 = y \end{array}$$

Pro v^2 itaque assumendus est numerus quadratus, qui ex numero dato a subductus parem relinquit.

Sit e. gr. $a = 40, v^2 = 16$: erit $y = (40 - 16) : 2 = 24 : 2 = 12$. Ergo $x = 40 - 12 = 28$. Sit $a = 40, v^2 = 4$: erit $y = (40 - 4) : 2 = 36 : 2 = 18$. Ergo $x = 40 - 18 = 22$. Sit $a = 35, v^2 = 9$: erit $y = (35 - 9) : 2 = 26 : 2 = 13$ & $x = 35 - 13 = 22$.

PROBLEMA CXVI.

235. Invenire duos numeros ejus conditionis, ut unus additus quadrato alterius efficiat numerum quadratum, cujus radix æquatur summa numerorum.

Sit numerus unus $= x$, alter $= y$: erit per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} x^2 + y = x^2 + 2xy + y^2 \\ \hline y = 2xy + y^2 \\ \hline 1 = 2x + y \\ \hline 1 - y = 2x \\ \hline (1 - y) : 2 = x \end{array}$$

P p

Nume-

Numeri adeo quaesiti unitate minores, consequenter fracti esse debent, & y numerus quilibet fractus esse potest.

Sit $y = \frac{1}{2}$; erit $x = (1 - \frac{1}{2}) : 2 = \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$.
 Sit $y = \frac{1}{3}$; erit $x = (1 - \frac{1}{3}) : 2 = \frac{2}{3} : 2 = \frac{1}{3}$.
 Sit $y = \frac{1}{4}$; erit $x = (1 - \frac{1}{4}) : 2 = \frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{8}$.

PROBLEMA XCVII.

236. Invenire duos numeros ejus conditionis, ut differentia ipsorum habeat ad differentiam quadratorum rationem datam.

Sit numerus major = x, minor = y, ratio data = a : b; erit per conditionem problematis

h. e. $x - y : x^2 - y^2 = a : b$ (§. 124).

$$\frac{ax + ay = b}{x + y = b : a} \xrightarrow{a \text{ div.}} \frac{x + y = b : a}{x = b : a - y}$$

Sit b : a = 9, y = 4; erit x = 5. Vel sit y = 3; erit x = 6.

PROBLEMA XCVIII.

237. Invenire numerum, qui, si multiplicetur per duos numeros datos, quadrata duo producat.

Sit numerus datus unus = a, alter = b, quaesitus = x, erit per conditiones problematis.

$$\frac{ax = y^2}{x = y^2 : a} \quad \frac{bx = v^2}{x = v^2 : b} \xrightarrow{a \text{ div.}} \frac{y^2 : a = v^2 : b}{y^2 = av^2 : b} \xrightarrow{a \text{ mult.}} \frac{y^2 = av^2 : b}{y = v \sqrt{(a : b)}} \xrightarrow{\text{ext. Rad.}}$$

Quodsi ergo numerus rationalis desideretur, a : b quadratum esse debet.

Sit a = 32, b = 8; erit $\sqrt{(a : b)} = 2$. Sit porro v = 5, erit y = 10, consequenter $x = \frac{25}{8}$

PROBLEMA XCIX.

238. Invenire duos numeros ejus conditionis, ut, si unus quadrato alterius addatur, summa sit latus quadrati aggregato numerorum aequale.

Sit numerus unus = x, alter = y; erit

$$\frac{x^2 + y = \sqrt{(x + y)}}{x^4 + 2yx^2 + y^2 = x + y} \xrightarrow{\text{Quad.}} \frac{2x^2y - y + y^2 = x - x^4}{(x^2 - \frac{1}{2})^2} \xrightarrow{x^4 + y \text{ subt.}} \frac{yy + (2x^2 - 1)y = x - x^4}{x^4 - x^2 + \frac{1}{4}} \xrightarrow{\text{ad.}}$$

$$\frac{y^2 + (2x^2 - 1)y + (x^2 - \frac{1}{2})^2 = x - x^2 + \frac{1}{4}}{y + x^2 - \frac{1}{2} = \sqrt{(x + \frac{1}{4} - x^2)}} \xrightarrow{\text{ext. Rad.}} \frac{y = \sqrt{(x + \frac{1}{4} - x^2)} + \frac{1}{2} - x^2}{x^2 - \frac{1}{2} \text{ subt.}}$$

Quodsi numerus rationalis desideratur; $\frac{1}{4} + x - x^2$ numerus quadratus esse debet. Sit itaque hujus latus ob rationes in schol. probl. 92 (§. 231) allatas = $2x - \frac{1}{2}$; erit

$$\frac{2^2x^2 - 2x + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + x - x^2}{2^2x^2 - 2x = x - x^2} \xrightarrow{\frac{1}{4} \text{ subt.}} \frac{2^2x^2 - 2x = 1 - x}{2^2x + x = 1 + 2} \xrightarrow{x \text{ div.}} \frac{2^2x^2 - 2x = 1 - x}{2^2x + x = 1 + 2} \xrightarrow{x + 2 \text{ add.}} \frac{2^2x + x = 1 + 2}{2^2 + 1 \text{ div.}}$$

$$\frac{x = (1 + 2) : (2^2 + 1)}{\text{Sit } z = 2, \text{ erit } x = (1 + 2) : (4 + 1) = \frac{3}{5}, \text{ consequenter } y = \frac{1}{2} - \frac{2}{25} + \sqrt{(\frac{3}{5} + \frac{1}{4} - \frac{3}{25})} = \frac{25 - 18}{50} + \sqrt{\frac{60 + 25 - 36}{100}} = \frac{7}{50} + \sqrt{\frac{49}{100}} = \frac{7}{50} + \frac{7}{10} = \frac{7 + 35}{50} = \frac{42}{50} = \frac{21}{25}}$$

PRO-

PROBLEMA C.

239. *Invenire duos numeros quadratos ejus conditionis, ut, si unus addatur facto eorundem, aggregatum utrumque sit numerus quadratus.*

Sit numerus quadratus unus = x^2 , alter = y^2 , erit factum = x^2y^2 . Quare $x^2y^2 + x^2$ & $x^2y^2 + y^2$ sunt numeri quadrati; consequenter & $y^2 + 1$ & $x^2 + 1$ sunt numeri quadrati: numerus enim quadratus efficit quadratum, si in quadratum ducitur. Sit latus quadrati primi $z - y$; secundi $t - x$: erit

$$\frac{y^2 + 1 = z^2 - 2zy + y^2}{y^2 \text{ subtr.}}$$

$$\frac{1 = z^2 - 2zy}{2zy - 1 \text{ add.}}$$

$$\frac{2zy = z^2 - 1}{2z \text{ div.}}$$

$$y = (z^2 - 1) : 2z$$

$$\frac{x^2 + 1 = t^2 - 2tx + x^2}{x^2 \text{ subtr.}}$$

$$\frac{1 = t^2 - 2tx}{2tx - 1 \text{ add.}}$$

$$\frac{2tx = t^2 - 1}{2t \text{ div.}}$$

$$x = (t^2 - 1) : 2t$$

Sit $z = 2$, $t = 3$; erit $y = (4 - 1) : 4 = \frac{3}{4}$ & $x = (9 - 1) : 6 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. Sit $z = 3$, $t = 4$; erit $y = (9 - 1) : 6 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ & $x = (16 - 1) : 8 = \frac{15}{8}$.

PROBLEMA CI.

240. *Invenire duos numeros quadratos ejus conditionis, ut summa addita facto efficiat quadratum.*

Sit quadratus numerus unus = x^2 , alter = y^2 : erit $x^2y^2 + x^2 + y^2$ numerus quadratus. Quoniam vero $x^2y^2 + x^2 = x^2(y^2 + 1)$: fiat primum $y^2 + 1$ æquale quadrato, cujus latus $t - y$, ut ablato ex utroque æquationis membro y^2

perveniat ad unam ipsius y dimensionem, cum valor rationalis desideretur, nempe

$$\frac{t^2 - 2ty + y^2 = y^2 + 1}{y^2 \text{ sub.}}$$

$$\frac{t^2 - 2ty = 1}{2ty - 1 \text{ add.}}$$

$$\frac{t^2 - 1 = 2ty}{2t \text{ div.}}$$

$$(t^2 - 1) : 2t = y$$

Ponatur porro $\sqrt{y^2 + 1} = t - y = t - (t^2 - 1) : 2t = (t^2 + 1) : 2t = v$; erit $x^2y^2 + x^2 + y^2 = v^2x^2 + y^2$.

Atque adeo problema præfens reductum est ad casum similem præcedentis.

Sit ergo quadrati, cui $v^2x^2 + y^2$ æquale esse debet, latus = $z - vx$, erit

$$\frac{v^2x^2 + y^2 = z^2 - 2zvx + v^2x^2}{v^2x^2 \text{ d.}}$$

$$\frac{y^2 = z^2 - 2zvx}{2zvx - y^2 \text{ add.}}$$

$$\frac{2zvx = z^2 - y^2}{2zv \text{ div.}}$$

$$x = (z^2 - y^2) : 2zv$$

Hic valores z & t pro lubitu determinari possunt.

Sit e. gr. $z = 2$, $t = 3$; erit $y = (9 - 1) : 6 = 8 : 6 = \frac{4}{3}$ & hinc $v = t - y = 3 - \frac{4}{3} = \frac{9 - 4}{3} = \frac{5}{3}$, consequenter

$$x = (4 - \frac{16}{9}) : \frac{4 \cdot 5}{3} = \frac{(36 - 16)}{9} : \frac{20}{3} = \frac{20}{9} : \frac{20}{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

PROBLEMA CII.

241. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut, si factum addatur aggregato quadratorum, numerus quadratus prodeat.*

Sit summa numerorum quaesitorum = $2x$, differentia = $2y$, erit major $x + y$, minor $x - y$ (§. 5). Sit latus quadrati ipsi $3x^2 + y^2$ æqualis = $t + y$: erit

per conditionem problematis.

$$\begin{array}{r} x^2 + 2xy + y^2 \\ x^2 - 2xy + y^2 \\ \hline 3x^2 + y^2 = t^2 + 2ty + y^2 \\ \hline 3x^2 = t^2 + 2ty \quad y^2 \text{ sub.} \\ \hline 3x^2 - t^2 = 2ty \quad t^2 \text{ sub.} \\ \hline 3x^2 - t^2 = 2ty \quad 2t \text{ div.} \\ \hline (3x^2 - t^2) : 2t = y \end{array}$$

Sit $x = 4$, $t = 6$, erit $y = (48 - 36) : 12 = 12 : 12 = 1$, consequenter $x + y = 4 + 1 = 5$, $x - y = 4 - 1 = 3$.

PROBLEMA CIII.

242. *Invenire duos numeros quadratos, quorum summa est numerus quadratus.*

Sint numeri quadrati quaesiti x^2 & y^2 ; latus quadrati, cui isti junctim sumti aequantur $v x - y$: erit

$$\begin{array}{r} x + y^2 = v^2 x^2 - 2vxy + y^2 \\ \hline x^2 = v^2 x^2 - 2vxy \quad y^2 \text{ sub.} \\ \hline x = v^2 x - 2vy \quad x \text{ div.} \\ \hline x = v^2 x - 2vy \quad 2vy - x \text{ add.} \\ \hline 2vy = v^2 x - x \quad v^2 - 1 \text{ div.} \\ \hline 2vy : (v^2 - 1) = x \end{array}$$

Sit $v = 2$, $y = 3$; erit $x = 12 : (4 - 1) = 12 : 3 = 4$.

PROBLEMA CIV.

243. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut, si unus ducatur in cubum alterius, productum sit numerus quadratus.*

Sint duo numeri x & y : erit per conditionem problematis xy^3 , consequenter etiam $x y$ numerus quadratus. Habemus ergo

$$\begin{array}{r} xy = z^2 \\ \hline x = z^2 : y \quad y \text{ div.} \end{array}$$

Pro z itaque assumendum est quadratum per y divisibile, si numeri integri desiderentur.

Sit e. gr. $z = 6$, $y = 3$: erit $x = 36 : 3 = 12$.

PROBLEMA CV.

244. *Invenire duos numeros ejus conditionis, ut, si factum quadratorum addatur facto ex cubo unius in alterum, summa sit numerus quadratus.*

Sit numerus unus $= x$, alter $= y$, erit $xy^3 + x^2 y^2$, consequenter & $xy + x^2$ numerus quadratus. Ponatur latus hujus quadrati $= yv - x$: erit

$$\begin{array}{r} xy + x^2 = y^2 v^2 - 2xyv + x^2 \\ \hline xy = y^2 v^2 - 2xyv \quad x^2 \text{ sub.} \\ \hline xy = y^2 v^2 - 2xyv \quad y \text{ div.} \\ \hline x = yv^2 - 2xv \quad 2xv \text{ add.} \\ \hline 2xv + x = yv^2 \quad 2v + 1 \text{ div.} \\ \hline x = yv^2 : (2v + 1) \end{array}$$

Sit e. gr. $y = 6$, $v = 1$: erit $x = 6 : 3 = 2$.
Sit $y = 15$, $v = 2$: erit $x = 15 \cdot 4 : (4 + 1) = 15 \cdot 4 : 5 = 3 \cdot 4 = 12$.

PROBLEMA CVI.

245. *Invenire duos numeros, quorum unus subductus ex facto eorundem relinquat cubum.*

Sit numerus unus x , alter y : erit per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} xy - y = v^3 \\ \hline y = v^3 : (x - 1) \quad x - 1 \text{ div.} \end{array}$$

Assumendus ergo est cubus, qui sit per $x - 1$ divisibilis.

E. gr. Sit $x = 6$, $v = 10$: erit $y = 1000 : 5 = 200$. Sit $x = 3$, $v = 6$: erit $y = 216 : 2 = 108$.

PROBLEMA CVII.

246. *Invenire duos numeros, quorum unus in quadratum alterius ductus cubum efficit.*

Sit numerus unus y , alter x : erit per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} yx^2 = z^3 x^3 : v^3 \\ \hline y = z^3 x : v^3 \quad x^2 \text{ div.} \\ \hline yv^3 = z^3 x \quad v^3 \text{ mult.} \\ \hline yv^3 z^3 = x \quad z^3 \text{ div.} \end{array}$$

Si adeo numeri integri desiderantur, assumendus est valor ipsius y per cubum aliquem z^3 divisibilis, seu cubi multiplus.

Sit e. gr. $y = 16$, $v = 3$, $z = 2$; erit $x = 16 \cdot 27 : 8 = 2 \cdot 27 = 54$.

PROBLEMA CVIII.

247. Numerum datum in duas partes dividere, ita ut earundem factum equale sit cubo radice sua multiplicato.

Sit numerus datus $= a$, pars una $= x$ erit altera $= a - x$. Sit latus cubi cui factum partium $ax - x^2$ æquatur, $yx - 1$: erit cubus $= y^3x^3 - 3y^2x^2 + 3yx - 1$, unde si subtrahatur $yx - 1$, relinquitur

$$\frac{y^3x^3 - 3y^2x^2 + 2yx = ax - x^2}{x \text{ div.}}$$

$$\frac{y^3x^2 - 3y^2x + 2y = a - x}{x - 2y \text{ add.}}$$

$$y^3x^2 - 3y^2x + x = a - 2y$$

Facile jam apparet, si valor ipsius x rationalis desideretur, fieri debere $2y = a$: quo facto erit.

$$\frac{ax^3 - \frac{3a^2x}{4} + x = 0}{8 \text{ mult.}}$$

$$\frac{a^3x^2 - 6a^2x + 8x = 0}{x \text{ div.}}$$

$$\frac{a^3x - 6a^2 + 8 = 0}{6a^2 - 8 \text{ add.}}$$

$$\frac{a^3x = 6a^2 - 8}{a \text{ div.}}$$

$$x = (6a^2 - 8) : a^3$$

Apparet adeo, si numeri rationales desiderantur, problema ex indeterminato fieri determinatum.

Sit $a = 6$, erit $x = (216 - 8) : 216 = 208 : 216 = \frac{26}{27}$ & $a - x = 6 - \frac{26}{27} = \frac{162 - 26}{27} = \frac{136}{27}$.

PROBLEMA CIX.

248. Invenire numerum perfectum, hoc est omnibus suis partibus aliquotis æqualem.

Sit numerus quaesitus $y^n x$, ut nempe in partes aliquotas seu factores resolvi possit: erunt partes aliquotæ $1 + y + y^2 + y^3$ &c. donec exponens evadat $= n$, & $x + yx + y^2x + y^3x$ &c. donec exponens fiat $= n - 1$. Quamobrem ex natura numeri perfecti

$$\frac{1 + y + y^2 + y^3 \text{ \&c. } + x + yx + y^2x + y^3x \text{ \&c. } = y^n x}{}$$

$$\frac{1 + y + y^2 + y^3 \text{ \&c. } = y^n x - x}{- yx - y^2x - y^3x \text{ \&c.}}$$

$$\frac{1 + y + y^2 + y^3 \text{ \&c.}}{y^n - 1 - y - y^2 - y^3 \text{ \&c.}} = x$$

Jam ut x sit numerus integer, nec in casu speciali, si y per numerum explicetur, numerus partium aliquotarum diversus sit a numero earundem in formula generali; necesse est ut $y^n - 1 - y - y^2 - y^3$ &c. $= 1$: quod cum non alio in casu contingat, nisi cum $y = 2$ (§. 121); erit $x = 1 + 2 + 2^2 + 2^3$ &c. $= 1 + 2 + 4 + 8$ &c. & numerus perfectus $2^n x$. Quoniam vero x est numerus primus, necesse est ut $1 + 2 + 2^2 + 2^3$ &c. in omni casu sit numerus primus, consequenter series terminetur prope terminum, qui unitate multiplicatus est numerus primus (§. cit.) & n notat numerum terminorum, qui istiusmodi terminum præcedunt. Quare problema, quod speciem indeterminati mentiebatur, determinatum est.

Patet autem simul:

Theorema 1. Si numerorum series in ratione dupla ab unitate continue proportionalium continuetur, donec eorum summa

fit numerus primus; summa in maximum multiplicata faciet numerum perfectum.

Theorema 2. Si in numerorum serie in ratione dupla ab unitate continue proportionalium occurrat terminus, qui unitate mulctatus est numerus primus; numerus iste primus in proxime præcedentem ductus efficit numerum perfectum.

In serie numerorum ab unitate in ratione dupla continue proportionalium

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512.

1024. 2048. 4096.

$4 - 1 = 3$, $8 - 1 = 7$, $32 - 1 = 31$, $128 - 1 = 127$, $512 - 1 = 511$, $2048 - 1 = 2047$ &c. sunt numeri primi. Ergo $2 \cdot 3 = 6$, $4 \cdot 7 = 28$, $31 \cdot 16 = 496$, $127 \cdot 64$

$= 8128$, $511 \cdot 256 = 130816$, $2047 \cdot 1024 = 2096128$ &c. &c. sunt numeri perfecti.

SCHOLIUM.

249. *Problemata indeterminata, qualia plurima solvit Diophantus, difficiliora sunt determinatis, nisi simplicia fuerint. Unde tyrones sub initium ea prætermittere possunt, quæ difficultatem creant, ad sequentia pedem promoventes. Non tamen prorsus negligenda sunt, cum maximus eorum sæpe sit usus in problematibus Geometriæ sublimioris solvendis. Ceterum ars resolvendi problemata indeterminata numerica Analysis Diophantea appellari solet.*

C A P U T III.

De Algebra ad Geometriam Elementarem applicata.

PROBLEMA CX.

250. **P**roblema Geometricum Algebraice resolvere:

RESOLUTIO.

1. Observentur ea omnia, quæ in probl. 36. (§. 141) fieri præcepimus.
2. Cum vero rarissime ad æquationem eodem modo in problematis geometricis perveniatur, quo in numericis usi sumus; hic ulterius quædam peculiariora notanda sunt. Nempe
 - a) Concipiatur jam factum, quod ad faciendum proponitur.
 - b) Omnium linearum in schemate de-

pietarum relationes, nullo habito discrimine inter cognitæ & incognitæ, excutiantur; ut appareat, quomodo aliæ ab aliis dependeant, seu quibus datis, aliæ una dentur, sive per triangula similia (§. 175 *Geom.*), sive per rectangula (§. 417 *Geom.*), sive per alia (quod tamen raro fieri solet) theoremata.

- 2) Ut igitur triangula similia & rectangula obtineas, sæpius producendæ sunt lineæ, donec vel directe datis fiant æquales, vel alias fecerint, sæpius lineæ parallelæ atque perpendiculares ducendæ, sæpius puncta quædam connectenda, sæpius anguli

anguli datis æquales construendi : quæ fieri posse, ex Geometria elementari manifestum est. Eum in finem probe tenenda sunt theoremata de æqualitate angulorum & similitudine triangulorum (§. 156. 183. 201. 207. 233. 267. 268. 269. 329 *Geom.*).

- f) Quodsi in æquationem non satis concinnam incideris; alio adhuc modo excutiendæ sunt linearum relationes, ac interdum sufficit, non directe quærere eam, quæ quæritur, sed aliam, qua data ipsa quoque innotescit.
3. Reductione æquationis facta ex ultima, quæ prodit, elicienda est constructio geometrica variis quidem modis pro diversitate æquationum.

SCHOLIION.

251. Quoniam nunc tantum simplicissimos regulæ Algebra casus exemplis geometricis illustramus; suffecerit nobis ostendisse, quomodo æquationes simplices & quadraticæ construantur.

PROBLEMA CXI.

252. Æquationem simplicem construere.

RESOLUTIO.

Omne artificium in eo consistit, ut fractiones, quibus quantitas incognita æqualis, in terminos proportionales resolvantur: id quod exemplis rectius ostenditur, quam multis regulis docetur.

1. Sit nempe $x = \frac{ab}{c}$; erit $c : a = b : x$ (§. 302 *Arithm.*). Reperietur adeo x (§. 271 *Geom.*)

2. Sit $x = \frac{abc}{ae}$, fiat $d : a = b : \frac{ab}{d}$. Hæc quarta proportionabilis inventa (§. 271 *Geom.*) dicatur g ; erit $x = \frac{gc}{e}$: quæ adeo ut in casu primo invenitur.

3. Sit $x = \frac{aa-hb}{c}$. Quoniam $aa-hb = (a+b)(a-b)$, (§. 86); erit $c : a + b = a - b : x$ (§. 302 *Arithm.*).

4. Sit $x = \frac{a^2b-bcc}{ad}$. Invenitur per casum 1. $g = \frac{ab}{d} = \frac{a^2b}{ad}$ & $h = \frac{bc}{d}$, ut sit $\frac{bcc}{ad} = \frac{hc}{a}$; denique per casum 1. $i = \frac{hc}{a}$: erit $x = g - i$, differentia nempe linearum g & i .

5. Sit $x = \frac{ab}{c} + \frac{adc}{bc}$. Inveniatur ut in casu præcedente $g = \frac{ab}{c}$ & $f = \frac{adc}{bc}$: erit $x = g + f$, summa linearum g & f .

6. Sit $x = \frac{a^2b+bad}{af+cg} = \frac{ab+bd}{f+cg} = \frac{(a+d)b}{f+cg} = a$. Quæritur $\frac{cg}{a}$ & fiat $f + \frac{cg}{a} = b$; erit $f + b : a + d = b : x$, consequenter $x = \frac{(a+d)b}{f+b}$. Reductus adeo est casus præsens ad primum.

7. Sit $x = \frac{a^2b-bad}{af+bc}$. Quæritur $\frac{af}{b}$ & fiat $\frac{af}{b} = b$, erit $x = \frac{a(a-d)}{b+c}$, consequenter $b + c : a - d = a : x$.

8. Sit $x = (a^2 + b^2) : c$ Construatur triangulum ABC, cujus crus AB = a, BC = b, Fig. 3. (§. 180 *Geom.*); erit AC = $\sqrt{(a^2 + b^2)}$, (§. 417 *Geom.*). Dicatur AC = m, erit $a^2 + b^2 = m^2$, adeoque $x = \frac{m^2}{c}$, consequenter $c : m = m : x$.

9. Sit $x = \frac{a^2-b^2}{c}$. Super AB = a describatur semicirculus & in eo applicetur AC = b. Tab. I. Cum triangulum ACB sit rectangulum (§. 317 *Geom.*); erit CB = $\sqrt{(a^2 - b^2)}$, (§. 417 *Geom.*). Dicatur CB = m; erit $x = m^2 : c$, consequenter $c : m = m : x$

10. Sit

10. Sit $x = \frac{a^2 b + bcd}{af + bc} = \frac{a^2 + cl}{c + af} : b$ Infera-

Tab. I. Fig. 5. tur $b : a = f : \frac{f^2}{b}$ & fiat $\frac{f^2}{b} = b$: erit $x = \frac{a^2 + cd}{b + c}$.

Quærat inter $AC = c$ & $CB = d$ media proportionalis $CD = \sqrt{cd}$, (§. 327 Geom.). Fiat $CE = a$: erit $DE = \sqrt{(a^2 + cd)}$.

Dicatur hæc m : erit $x = \frac{m^2}{b+c}$, consequenter $b + c : m = m : x$.

PROBLEMA CXII.

253. *Æquationem quadraticam geometricè construere.*

RESOLUTIO.

Cum æquationes quadraticæ ad simplices reduci possint (§. 143); ipsas quoque per probl. præced. (§. 253) construere licet.

Tab. I. Fig. 5. Sit enim æquatio pura $x^2 = ab$; erit $a : x = x : b$, (§. 299 Arithm.). Invenitur adeo $x = \sqrt{ab}$, si inter $AC = a$ & $CB = b$ quærat mediæ proportionalis DC (§. 327 Geom.).

Si æquatio affecta $x^2 + ax = b^2$; erit $x = \frac{1}{2}a + \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + b^2)}$, hoc est, vel $x = \frac{1}{2}a + \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + b^2)}$, vel $x = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + b^2)} - \frac{1}{2}a$, vel $x = \frac{1}{2}a + \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - b^2)}$, vel $x = \frac{1}{2}a - \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - b^2)}$.

Omne igitur artificium construendi has æquationes huc redit, ut inveniatur valor ipsius $\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + b^2)}$, itemque ipsius $\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - b^2)}$.

Tab. I. Fig. 3. Utrumque vero jam docuimus in problemate præcedente. Nimirum si in triangulo rectangulo fiat $AB = \frac{1}{2}a$ & $BC = b$; erit $AC = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + b^2)}$ (§. 417 Geom.).

Fig. 4. si super $AB = \frac{1}{2}a$, describatur semicirculus & in eo applicetur $AC = b$; erit $CB = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - b^2)}$ ut in problemate præcedente demonstratum.

SCHOLIUM.

254. *Quamvis omnes æquationes simplices & quadratica eum in modum construere possint, quo eas construere docuimus: minime tamen consultum est, ut iis stricte inhærea-*

mus. Hac enim ratione in constructiones parum commodas sæpe incideremus, cum singulares problematis specialis circumstantie multo concinniores meditati insinuent. Immo in genere notandum est, ex calculo analytico difficillime erui constructiones concinnas, cum tamen in iis unice ingenium spectetur, solutione arithmetica ad praxim sufficiente. Ratio hæc est, quod in algebraica solutione problema tanquam unicum in rerum possibilium regione consideretur, independens ab omnibus reliquis cum tamen ex veterum methodo appareat & ipsa ratio suadeat, solutionem unius a solutione alierius pendere.

PROBLEMA CXIII.

255. *Data perimetro $AB + BC + CA$ & area trianguli rectanguli, invenire hypotenusam.*

Tab. I. Fig. 3.

Sit $AB + BC + CA = a$ $AC = x$
 $area = b^2$ erit $BC + BA = a - x$

Jam cum sit $AC^2 = AB^2 + BC^2$ (§. 417 Geom.) & $AB^2 + BC^2 = (AB + BC)^2 - 2AB \cdot BC$ (§. 261 Arithm.): erit $AC^2 = (AB + BC)^2 - 2AB \cdot BC$ (§. 91 Arithm.). Est vero $AC^2 = x^2$ & $(AB + BC)^2 = a^2 - 2ax + x^2$, $2AB \cdot BC = 4b^2$ (§. 392 Geom.). Quare

$$x^2 = a^2 - 2ax + x^2 - 4b^2$$

$$2ax = a^2 - 4b^2$$

$$x = \frac{1}{2}a - 2b^2 : a$$

Quodsi triangulum construi debet, dicatur altitudo BD , hoc est perpendiculum in hypotenusam AC demissum (§. 227 Geom.), y ; erit (§. 392 Geom.).

$$\frac{1}{2}xy = b^2$$

$$y = b^2 : \frac{1}{2}x$$

Constructio. Erigatur ad $BD = a$ perpendicularis $AB = 2b$, fiatque $BG = b$ & quæ-

Tab. XII. Fig. 113.

ratur (§. 271 Geom.) quarta proportionalis BH = 2b² : a. Fiat CB = ½a & CI = BH, erit BI = ½a - 2b² : a = x. Dividatur BI bifariam in O, quæratque ad BO = ½x, & BE = BG = b tertia proportionalis BK, quæ erit altitudo trianguli quæsitæ = b² : ½x. Quare si super BI describatur semicirculus & ex K agatur eidem parallela KL secans semicirculum in L; ductis rectis BL & LI erit BLI triangulum quæsitum.

Æquatio secunda in hanc resolvitur analogiam :

$$2a : a + 2b = a - 2b : x$$

seu a : ½a + b = ½a - b : x (§. 185 Arithm.). Habetur adeo

Theorema. In omni triangulo rectangulo est ut perimetro ad compositam ex dimidia perimetro & quadrati latere, quod triangulo æquale, ita differentia hujus lateris a perimetro dimidia ad hypothenusam.

SCHOLI ON.

256. Cum areas figurarum in Geometria metiamur investigando earum rationem ad quadratum aliquod datum (§. 118. Geom.); ideo quoque tum in Geometria, tum in Algebra dantur per latus quadrati ipsis æquale.

PROBLEMA CXIV.

Tab. I. Fig. 3. 257. Data area trianguli rectanguli, cujus latera AC, AB & BC in proportione continua; invenire latera.

Sit area = a² BC = x
 AB = y
 erit AC = y² : x

Ergo

(§. 417 Geom.) (§. 392 Geom.)

$$y^4 : x^2 = x^2 + y^2 \qquad \frac{1}{2}xy = a^2$$

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

$$\begin{aligned} y^4 &= x^4 + x^2 y^2 & xy &= 2a^2 \\ y^4 &= \frac{16a^8}{y^4} + 4a^4 & x &= 2a^2 : y \\ \hline y^8 &= 16a^8 + 4a^4 y^4 & x^2 &= 4a^4 : y^2 \\ \hline y^8 - 4a^4 y^4 &= 16a^8 & x^4 &= 16a^8 : y^4 \\ + 4a^8 + 4a^8 & & x^2 y^2 &= 4a^4 \\ \hline y^8 - 4a^4 y^4 + 4a^8 &= 20a^8 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} y^4 - 2a^4 \\ 2a^4 - y^4 \end{aligned} \right\} = 2a^4 \sqrt{5}$$

$$y^4 = 2a^4 + 2a^4 \sqrt{5} = a^4 (2 + 2\sqrt{5})$$

$$y = a \sqrt[4]{(2 + 2\sqrt{5})}$$

Nempe quia 2a⁴ < 2a⁴√5, radix 2a⁴ - y⁴ est falsa.

Similiter reperitur valor ipsius x. Est enim, vi æquationis xy = 2a², y = 2a² : x, adeoque y⁴ = 16a⁸ : x⁴ & hinc ob y⁴ = x² y² + x⁴ porro

$$\begin{aligned} 16a^8 : x^4 &= 4a^4 + x^4 \\ \hline 16a^8 &= 4a^4 x^4 + x^8 \\ \hline 20a^8 &= 4a^8 + 4a^4 x^4 + x^8 \\ \hline 2a^4 \sqrt{5} &= 2a^4 + x^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^4 &= 2a^4 \sqrt{5} - 2a^4 \\ x &= a \sqrt[4]{(2\sqrt{5} - 2)} \end{aligned}$$

Constructio. Jungantur AB = a & AC = 2a ad angulos rectos, erit BC = a√5. Fiat BD = AB, erit DC = a√5 - a. Fiat porro CE = CD, & ducta per C recta NL ad AK perpendiculari describatur super AE semicirculus; erit CN = √(2a²√5 - 2a²) = a√(2√5 - 2). Factis CH = a & CG = CN, descriptoque semicirculo super HG; erit CI = √(a²√(2√5 - 2))(= a√√(2√5 - 2)) = a√[4]{(2√5 - 2)}.

Tab. XII. Fig. 114.

Qq

Simi-

Similiter fiat $CK = CB + CH = a + a\sqrt{5}$; erit, descripto super AK semicirculo, $= \sqrt{(2a^2 + 2a^2\sqrt{5})} = a\sqrt{(2 + 2\sqrt{5})}$. Fiat porro $CO = CL$, erit descripto super HO semicirculo $CM = \sqrt{(a^2\sqrt{5})} (2 + 2\sqrt{5}) = a\sqrt{(2 + 2\sqrt{5})}$.

Quodsi itaque tandem fiat $CF = CI$; ducta FM erit CMF triangulum quæsitum.

Quodsi exponens rationis $= y$, $BC = x$, erit $AB = xy$, $AC = xy^2$, adeoque (§. 417 Geom.):

$$\begin{array}{r} x^2y^4 = x^2y^2 + x^2 \\ \hline = x^2 \text{ div.} \\ y^4 = y^2 + 1 \\ \hline = y^2 \text{ subtr.} \\ y^2 - y^2 = 1 \\ \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \text{add.} \\ \hline y^4 - y^2 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \\ \hline y^2 - \frac{1}{2} \quad \left. \vphantom{y^2} \right\} = \sqrt{\frac{5}{4}} \\ \frac{1}{2} - y^2 \quad \left. \vphantom{\frac{1}{2}} \right\} \\ \hline y^2 = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{5}{4}} \\ \hline y = \sqrt{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}\right)} \end{array}$$

Patet adeo rationem laterum esse constantem.

PROBLEMA CXV.

Tab. I. 258. *Datam rectam AB media & extrema ratione secare in C, hoc est, ut sit AB : AC = AC : CB.*

Sit $AB = a$, $AC = x$; erit $CB = a - x$, consequenter per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} a : x = x : a - x \\ \hline x^2 = a^2 - ax \quad (\text{§. 297 Arith.}) \\ = ax \text{ add.} \\ x^2 + ax = a^2 \\ + \frac{1}{4}a^2 \text{ add.} \\ x^2 + ax + \frac{1}{4}a^2 = \frac{5}{4}a^2 \text{ Ext.Rad.} \\ x + \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{5}{4}a^2} \\ x = \sqrt{\frac{5}{4}a^2} - \frac{1}{2}a \end{array}$$

Constructio. 1°. Jungantur $AB = a$ & $BD = \frac{1}{2}a$ ad angulos rectos; erit $AD = \sqrt{\frac{5}{2}}a$. 2°. Fiat $DF = \frac{1}{2}a$ & $AF = AC$; erit $AC = x$.

Alia ex æquatione tertia elicitur constructio. Nimirum radio $AC = \frac{1}{2}a$ describitur Tab. I. circulus & in A erigatur perpendicularis $= a$. Fig. 7. Si enim porro ducatur BD per centrum C; erit $ED = a$ & $BE = x$. Quare si fiat $BF = BE$; recta AB erit in F media & extrema ratione secta. Etenim $BD = a + x$, adeoque $BE \cdot BD = ax + x^2$, consequenter $ax + x^2 = a^2$ (§. 379 Geom.).

PROBLEMA CXVI.

259. *Rectam datam AC utcumque Tab. I. divisam in B iterum secare in D, ita Fig. 8. ut sit AD : DC = DC : BD.*

$$\begin{array}{ll} \text{Sit } AB = a & BD = x \\ BC = b & \text{erit } DC = b - x \\ & AD = a + x \end{array}$$

Quare per conditionem problematis

$$\begin{array}{r} a + x : b - x = b - x : x \\ \hline ax + x^2 = b^2 - 2bx + x^2 \\ \hline ax + 2bx = b^2 \\ \hline = a + 2b \text{ Div.} \\ x = b^2 : (a + 2b) \end{array}$$

Invenitur adeo x ob analogiam

$$a + 2b : b = b : x \quad (\text{§. 272 Geom.}).$$

Aliter.

Analogia prima, ex qua æquatio elicitur: etiam per leges rationum ad eam reduci potest, a qua constructio pendet. Quoniam enim.

$$\begin{array}{r} a + x : b - x = b - x : x \\ \hline \text{erit } a + b : b - x = b : x \quad (\text{§. 190 Arithm.}) \\ \hline a + b : b = b - x : x \quad (\text{§. 173 Arithm.}) \\ \hline a + 2b : b = b : x \quad (\text{§. 190 Arithm.}). \\ \text{PRO-} \end{array}$$

PROBLEMA CXVII.

Tab. I. Fig. 8. 260. *Datam rectam AC divisam in B denuo secare in D, ita ut sit CB: DB=DA: BA.*

Sit $CB=a$ $DB=x$
 $BA=b$ erit $DA=b+x$

Quare per conditionem problematis

$$a : x = b + x : b$$

$$ab = bx + x^2$$

$$\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{4}b^2 \text{ add. (}\mathcal{S}. 143\text{).}$$

$$\frac{1}{4}b^2 + ab = \frac{1}{4}b^2 + bx + x^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab\right)} = \frac{1}{2}b + x \quad \text{Ext. Rad.}$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab\right)} - \frac{1}{2}b = x \quad \frac{1}{2}b \text{ subtr.}$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab\right)} - \frac{1}{2}b = x$$

Tab. I. Fig. 9. *Constructio.* Inter $EG=b$ & $GF=a$ quaratur media proportionalis HG , quæ erit $=\sqrt{ab}$. Fiat $GI=\frac{1}{2}b$ & ducatur HI : erit $HI=\sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab\right)}$ Fiat denique $KI=GI$: erit $KH=\sqrt{\left(\frac{1}{4}b^2 + ab\right)} - \frac{1}{2}b$. Invenitur etiam $\sqrt{\left(\frac{1}{4}bb + ab\right)}$, si inter $\frac{1}{4}b + a$ & b quaratur media proportionalis ($\mathcal{S}. 327. 330 \text{ Geom.}$).

Tab. I. Fig. 4. *Item* quia $\frac{1}{4}bb + ab$ est differentia quadratorum $\frac{1}{4}bb + ab + a^2$ & a^2 , super $AB=\frac{1}{2}b + a$ describatur semicirculus & in eo applicetur $AC=a$; erit $CB=\sqrt{\left(\frac{1}{4}bb + ab\right)}$, ($\mathcal{S}. 317. 417 \text{ Geom.}$).

DEFINITIO XIX.

261. Si quatuor fuerint *lineæ* proportionales, extremæ mediis, mediæ extremis *reciproca* dicuntur.

PROBLEMA CXVIII.

Tab. I. Fig. 10. 262. *Datam rectam AB ita secare in C, ut partes AC & CB sint duabus datis DE & FG reciproca.*

Sit $AB=a$ $AC=x$
 $DE=b$ $CB=a-x$
 $FG=c$

Ergo ($\mathcal{S}. 261$).

$$x : b = c : a - x$$

$$ax - x^2 = cb$$

mut. fig.

$$cb = x^2 - ax$$

$$\frac{1}{4}aa \quad \frac{1}{4}aa \text{ add. (}\mathcal{S}. 143\text{).}$$

$$\frac{1}{4}aa - cb = \frac{1}{4}a^2 - ax + x^2$$

Ext. Rad.

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - cb\right)} \begin{cases} = \frac{1}{2}a - x \\ = x - \frac{1}{2}a \end{cases}$$

$$x = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - cb\right)}$$

Constructio. Quaratur inter $HI=b$ & $IK=c$ media proportionalis $MI=\sqrt{cb}$ ($\mathcal{S}. 327 \text{ Geom.}$). Radio $IL=\frac{1}{2}a$ describatur arcus & ducatur PM ipsi IK parallela ($\mathcal{S}. 258 \text{ Geom.}$), erit $NM=x$ & $MP=a-x$. Nam demisso ex centro L perpendiculo LO , erit $NO=OP$ ($\mathcal{S}. 291 \text{ Geom.}$) & $OL=MI=\sqrt{cb}$ ($\mathcal{S}. 226 \text{ Geom.}$). Sed $NL=LI$ ($\mathcal{S}. 40 \text{ Geom.}$) $=\frac{1}{2}a$. Ergo $NO=\sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - cb\right)}$ ($\mathcal{S}. 417 \text{ Geom.}$), consequenter ob $MO=IL$ ($\mathcal{S}. 238 \text{ Geom.}$) $=\frac{1}{2}a$, $MN=\frac{1}{2}a - \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - cb\right)}=x$ & $PM=\frac{1}{2}a + \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - cb\right)}=a-x$. Tab. I. Fig. 11.

COROLLARIUM.

263. Construere ergo æquationem quadraticam affectam $ax - x^2 = cb$ idem est, ac datis duabus rectis c & b , vel si $c=b$, eidem rectæ b reciprocas x & $a-x$ invenire.

PROBLEMA CXIX.

264. *Datis duabus rectis DE & FG reciprocas invenire, quarum differentia sit data rectæ AC equalis.* Tab. I. Fig. 10.

Sit $DE=a$ Reciproca minor
 $FG=b$ $=x$
 $AC=c$ erit major $=c+x$

Ergo (§. 261)

$$\begin{aligned} x : a = b : c + x \\ ab = cx + x^2 \\ \frac{\frac{1}{4}cc}{\frac{1}{4}cc} \\ \frac{\frac{1}{4}cc + ab = \frac{1}{4}cc + cx + x^2}{\sqrt{(\frac{1}{4}cc + ab) = \frac{1}{2}c + x}} \\ \sqrt{(\frac{1}{4}cc + ab) = \frac{1}{2}c + x} \end{aligned}$$

Tab. I. *Constructio.* Quærat inter $AC = b$ & $Fig. 5.$ $CB = a$ media proportionalis DC . Fiat $CE = \frac{1}{2}c$: erit $DE = \sqrt{(\frac{1}{4}cc + ab)}$. Unde si subtrahitur $\frac{1}{2}c = EF$ relinquitur $DF = x$.

Tab. I. *Fig. 12.* Alia magis ingeniosa ex æquatione $ab = cx + x^2$ eruitur. Describatur nimirum ex centro C radio arbitrario, majori tamen quam c & $a - b$, circulus. In eo applicentur chordæ $IQ = c$ & $IP = a - b$. Prolongetur PI in O donec $PO = b$. Tandem per O describatur circulus priori concentricus: erit $HI = x$. Demissa enim ex centro C perpendiculari CL ; erit $LI = LQ$ & $LH = LM$ (§. 291 *Geom.*), adeoque $QM = IH$ (§. 91 *Arithm.*). Eodem modo ostenditur, esse $NI = PO = b$. Ergo $NI \cdot IO = ab$, consequenter $ab = HI \cdot IM = HI \cdot (c + HI)$ (§. 381 *Geom.*). Est vero etiam $ab = x(c + x)$. Ergo $HI = x$.

Sint omnia ut ante, & pars major $= x$, erit minor $x - c$ consequenter (§. 261)

$$\begin{aligned} x : a = b : x - c \\ x^2 - cx = ab. \end{aligned}$$

Constructio. Eadem est, quæ precedens. Sec hic $MI = x$, ita enim $HI = QM = x - c$, consequenter $NI \cdot NO = ab$ & $HI \cdot IM = x^2 - cx$.

COROLLARIUM.

265. Construere ergo æquationes quadraticas $x^2 + cx = ab$ & $x^2 - cx = ab$ idem est ac: datis duabus rectis a & b , vel, si $a = b$, eidem rectæ b reciprocas ibi x & $x + c$, hic x & $x - c$. reperire.

PROBLEMA CXX.

266. *Datam rectam AB ita secare in Tab. I. C ut rectangulum sub tota AB & seg- Fig. 10. mento minore AC equale sit rectangulo sub majore CB & differentia utriusque CB - AC.*

$$\begin{aligned} \text{Sit } AB = a \quad AC = x \\ \text{erit } CB = a - x \\ CB - AC = a - 2x \end{aligned}$$

Quare per conditionem problematis

$$\begin{aligned} ax = a^2 - 3ax + 2x^2 \\ - a^2 = - 4ax + 2x^2 \\ - \frac{1}{2}a^2 = x^2 - 2ax \\ + a^2 \quad + a^2 \\ \frac{1}{2}a^2 = x^2 - 2ax + a^2 \\ \sqrt{\frac{1}{2}a^2} = a - x \\ x + \sqrt{\frac{1}{2}a^2} = a \\ x = a - \sqrt{\frac{1}{2}a^2} \end{aligned}$$

Constructio. Quærat inter $\frac{1}{2}a$ & a media proportionalis, quæ erit pars major $a - x$, adeoque subducta ex a relinquit minorem x .

Aliter.

Quoniam per conditionem problematis.

$$\begin{aligned} ax = (a - x)(a - 2x) \\ \text{erit (§. IO4). } a : a - 2x = a - x : x \\ \frac{2a - 2x : a = a : a - x}{a - x : \frac{1}{2}a = a : a - x} \\ \frac{1}{2}a : a - x = a - x : a \end{aligned}$$

SCHOLIUM.

267. *His resolutionibus per analogias & reductionibus æquationum quadraticarum ad lineas reciprocas opus est, si geometricas more veterum mediteris demonstrationes.*

PROBLEMA CXXI.

Tab. I. 268. Dato radio circuli ED, inve-
Fig. 13. nire latus trigoni regularis ipsi inscri-
n. 1. bendi AB.

Ducatur latus hexagoni EB, & sit BD=BE (§. 356 Geom.)=a, AB=x; erit BF= $\frac{1}{2}x$ (§. 291 Geom.). Et quoniam anguli ad F recti (per §. cit.) BE=BD, per demonstr. BF=BF: erit EF=FD (§. 235 Geom.)= $\frac{1}{2}a$. Quare (§. 417 Geom.) $BD^2 - DF^2 = EB^2$, hoc est

$$\frac{\frac{3}{4}aa = \frac{1}{4}x^2}{3aa = x^2}$$

$$\sqrt{3aa} = x^2$$

Est ergo x media proportionalis inter 3a & a. Et si fiat a=1, erit $x = \sqrt{3}$.

Tab. I. Constructio Concinnior hæc est: super
Fig. 13. diametro AB construatur triangulum æquila-
n. 2. terum AFB & centrum C cum puncto F connectatur recta CF; erit CF latus trigoni. Cum enim FCB sit triangulum rectangulum (§. 184 Geom.) & FB=2a, CB=a; erit FC= $\sqrt{3}aa$ (§. 417 Geom.)=x.

Theorema. Quadratum lateris trigoni est ad quadratum radii ut 3 ad 1.

Aliter.

$$\frac{\frac{3}{4}aa = \frac{1}{4}x^2}{\frac{3}{4}a : \frac{1}{4}x = x : a}$$

$$3a : x = x : a$$

COROLLARIUM I.

269. Si dato latere trigoni regularis b inveniri debet radius circuli circumscribendi y; erit $3y^2 = b^2$, consequenter $y = \sqrt{\frac{1}{3}b^2}$, quæ est media proportionalis inter $\frac{1}{3}b$ & b.

COROLLARIUM II.

270. Quoniam dimidium latus trigoni regularis est sinus 60° (§. 2. Trigon.); per problema præsens invenitur sinus 60°.

SCHOLIUM.

271. Hujus problematis solutio usum potius respicit arithmeticum, quam geometricum. Geometrica enim constructio ex Elementis faciliior & elegantior deducitur, quamvis eadem ex calculo etiam pateat. Est enim diameter AB=2a. Quare si fiat AD=a, Tab. I. ducaturque DB, cum angulus ad D rectus sit Fig. 13. (§. 317 Geom.), adeoque $AB^2 - AD^2 = DB^2$ n. 2. (§. 417 Geom.); erit $DB = \sqrt{3}a^2$

PROBLEMA CXXII.

272. Dato radio circuli AE inve- Tab. I.
nire latus octogoni regularis circulo inf- Fig. 17.
cribendi.

Sit AE=r, AF=y; erit latus quadrati AB= $\sqrt{2}r^2$ (§. 21. Trig.) & AG= $\sqrt{\frac{1}{2}r^2}$ (§. 291 Geom.). Porro cum AEF=45° (§. 342 Geom.), & angulus ad G rectus (§. 291 Geom.) erit quoque EAG=45° (§. 241 Geom.), consequenter EG=AG (§. 253 Geom.)= $\sqrt{\frac{1}{2}r^2}$. Hinc FG=r - $\sqrt{\frac{1}{2}r^2}$. Quare (§. 417 Geom.).

$$yy = \frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{2}r^2 - r\sqrt{2}r^2$$

hoc est $yy = 2r^2 - r\sqrt{2}r^2$

$$y = \sqrt{(2r^2 - r\sqrt{2}r^2)}$$

Quod si fiat r=1; erit $y = \sqrt{(2 - \sqrt{2})}$.

COROLLARIUM.

273. Cum dimidium latus octogoni sit sinus 22° 30' (§. 2 Trigon.); per hoc ipsam problema invenitur sinus 22° 30'.

PROBLEMA CXXIII.

274. Dato latere Octogoni AF in- Tab. I.
venire radium circuli circumscriben- Fig. 17.
di AE.

193.

Sit

Sit $AF = b$, $AE = y$, erit (§. 272)

$$\begin{aligned} b^2 &= 2y^2 - \sqrt{2y^4} \\ \sqrt{2y^4} &= 2y^2 - b^2 \\ 2y^4 &= 4y^4 - 4b^2y^2 + b^4 \\ 0 &= 2y^4 - 4b^2y^2 + b^4 \\ 0 &= y^4 - 2b^2y^2 + \frac{1}{2}b^4 \\ \frac{1}{2}b^4 & & \frac{1}{2}b^4 \quad (\text{§. 261} \\ \frac{1}{2}b^4 &= y^4 - 2b^2y^2 + b^4 \quad \text{Arith.}) \\ b\sqrt{\frac{1}{2}b^2} &= y^2 - b^2 \\ b^2 + b\sqrt{\frac{1}{2}b^2} &= y^2 \\ \sqrt{(b^2 + b\sqrt{\frac{1}{2}b^2})} &= y \end{aligned}$$

Est igitur $b : y = y : b + \sqrt{\frac{1}{2}b^2}$
 consequ. $\frac{1}{2}b : y = y : 2b + 2\sqrt{\frac{1}{2}b^2}$

Hinc elicitur sequens geometrica.

Tab. X II. Fig. 115. *Constructio.* Super latere octogoni $AB = b$ describatur semicirculus & ex centro C erigatur perpendicularis indefinita CF, erit recta $DB = \sqrt{\frac{1}{2}b^2}$ (§. 417 *Geom.*). Fiat $AE = 2b + 2\sqrt{\frac{1}{2}b^2}$, descriptoque semicirculo AFE; erit $AF = \sqrt{(b^2 + b\sqrt{\frac{1}{2}b^2})}$, (§. 327 *Geom.*), consequenter radius circuli octogono circumscripti: quod adeo super recta AB constructur, si radio AF describatur circulus transiens per A & B.

PROBLEMA CXXIV.

Tab. I. Fig. 14. 275. Dato radio circuli AC, invenire latus decagoni regularis inscribendi AB.

Quoniam AB est $\frac{1}{10}$ totius peripheriæ, angulus $ACB = 36^\circ$ (§. 57. 59 *Geom.*), consequenter ob $AC = BC$ (§. 40 *Geom.*), $ABC = CAB = 72^\circ$ (§. 248 *Geom.*), adeoque $DAC = 108$ (§. 149 *Geom.*). Fiat $AD = AC$, erit $ADC = ACD = 36^\circ$ (§. 248 *Geom.*), conse-

quenter $DCB = 72^\circ$. Sunt ergo triangula ABC & BDC æquiangula & hinc $BD : BC = BC : AB$ (§. 267 *Geom.*).

Sit jam $AC = BC = a$, $AB = x$; erit $BD = a + x$, consequenter *per demonstrata.*

$$\begin{aligned} a + x : a &= a : x \\ \hline ax + x^2 &= a^2 \end{aligned}$$

Est ergo a media & extrema ratione secunda, cujus pars major x (§. 258). Vel radio a quærendæ sunt reciprocae a + x & x (§. 265).

Theorema. Latus decagoni regularis circulo inscripti est pars major radii media & extrema ratione secti. Tab. I. Fig. 15.

Constructio. Quoniam $x = \sqrt{\frac{5}{4}a^2} - \frac{1}{2}a$ (§. 258; radio a describatur circulus & in centro E erigatur perpendicularis $IE = a$. Fiat $EF = \frac{1}{2}a$: erit $FI = \sqrt{\frac{5}{4}a^2}$. Quare si ex F radio IF describatur arcus KI; erit $KE = \sqrt{\frac{5}{4}a^2} - \frac{1}{2}a$.

SCHOLIUM.

276. Hanc ipsam constructionem tradit Ptolemæus in suo *Almagesto*.

COROLLARIUM.

277. Invenitur ergo per problema præfens sinus 18° (§. 2. *Trigon.*).

PROBLEMA CXXV.

278. Dato latere decagoni regularis circulo inscribendi AB, invenire radium AC. Tab. I. Fig. 14.

Sit $AB = a$, $AC = x$; erit $BD = a + x$ & *per demonstrata in probl. præc.*

a +

$$\begin{aligned} a + x : x &= x : a \\ \hline ax + a^2 &= x^2 \\ \hline a^2 &= x^2 - ax \\ \hline \frac{5}{4}a^2 &= x^2 - ax + \frac{1}{4}a^2 \\ \hline \sqrt{\frac{5}{4}a^2} &= x - \frac{1}{2}a, \text{ ob } x > \frac{1}{2}a \text{ (§. 275).} \\ \hline \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{5}{4}a^2} &= x. \end{aligned}$$

Tab. I. *Constructio.* Construat^r triangulum rec-
Fig. 16. tangelum MLN, in quo ML = a & MN
= $\frac{1}{2}a$: erit LN = $\sqrt{\frac{5}{4}a^2}$ (§. 417 Geom.).
Producatur MN in O, donec NO = LN:
erit MO = x. Ex centro itaque O per M cir-
culus describi potest.

Aliter.

$$\begin{aligned} a + x : x &= x : a \\ a : x &= x - a : a \end{aligned}$$

Quærendæ adeo sunt ipsi a recipro-
cæ x & x - a.

PROBLEMA CXXVI.

Tab. I. 279. Dato radio circuli AE & la-
Fig. 17. tere decagoni AF invenire latus pen-
tagoni AB.

$$\begin{aligned} \text{Sit } AE &= a & AB &= x \text{ (§. 291)} \\ AF &= b & AG &= \frac{1}{2}x \text{ Geom.)} \\ GE &= \sqrt{a^2 - \frac{1}{4}x^2} \\ FG &= a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{4}x^2} \end{aligned}$$

Quare (§. 417 Geom.)

$$b^2 = \frac{1}{4}x^2 + a^2 - 2a\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}x^2} + a^2 - \frac{1}{4}x^2$$

$$b^2 = 2a^2 - 2a\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}x^2}$$

$$2a\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}x^2} = 2a^2 - b^2$$

$$4a^4 - a^2x^2 = 4a^4 - 4a^2b^2 + b^4$$

$$-a^2x^2 = -4a^2b^2 + b^4$$

$$4a^2b^2 - b^4 = a^2x^2$$

$$4b^2 - b^4 : a^2 = x^2$$

Est vero $b = \sqrt{\frac{5}{4}a^2} - \frac{1}{2}a$ (§. 285)

$$b^2 = \frac{5}{4}a^2 - a\sqrt{\frac{5}{4}a^2}$$

$$b^4 = \frac{15}{4}a^4 - 3a^3\sqrt{\frac{5}{4}a^2}$$

Ergo

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{24}{4}a^2 - 4a\sqrt{\frac{5}{4}a^2} - (\frac{15}{4}a^4 - 3a^3\sqrt{\frac{5}{4}a^2}) : a^2 \\ &= \frac{24}{4}a^2 - 4a\sqrt{\frac{5}{4}a^2} - \frac{15}{4}a^2 + 3a\sqrt{\frac{5}{4}a^2} \\ &= \frac{10}{4}a^2 - a\sqrt{\frac{5}{4}a^2} = a^2 + \frac{6}{4}a^2 - a\sqrt{\frac{5}{4}a^2} \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Tab. I. Fig. 15-

Constructio: Quærat^r latus decagoni EK
(§. 275), erit KI latus pentagoni.

Theorema: Latus pentagoni regularis pos-
test latera hexagoni & decagoni eidem cir-
culo inscriptorum simul.

SCHOLIUM.

280. Eandem prorsus constructionem de-
dit Ptolemæus.

COROLLARIUM.

281. Per præsens adeo problemâ inven-
iri potest sinus 36° (§. 2. Trigon.).

PROBLEMA CXXVII.

Tab. I. 282. Datis summa crurum trian-
Fig. 3. guli rectanguli AB + BC una cum per-
pendiculo BD ex angulo recto B in
hypothenusam AC demisso, invenire
latera.

Sit AB + BC = a, BD = b, AB - BC

= y, AC = x, erit AB = $\frac{1}{2}(a + y)$,

BC = $\frac{1}{2}(a - y)$ consequenter

(§. 417 Geom.) (§. 330 Geom.)

$$x^2 = \frac{1}{2}(aa + yy) \quad BA : BD = AC : BC$$

$$\frac{1}{2}(a + y) : b = x : \frac{1}{2}(a - y)$$

$$2x^2 = aa + yy$$

$$\frac{1}{4}(a^2 - y^2) = bx$$

$$2x^2 - a^2 = y^2$$

$$a^2 - y^2 = 4bx$$

$$a^2 - 4bx = y^2$$

Quare

Quare (§. 87. Arithm).

$$2x^2 - a^2 = a^2 - 4bx$$

$$2x^2 + 4bx = 2a^2$$

$$x^2 + 2bx = a^2$$

$$x^2 + 2bx + b^2 = a^2 + b^2$$

$$x = \sqrt{(a^2 + b^2)} - b$$

Tab. XII. Fig. 116. *Constructio* nihil difficultatis habet. Quod si enim triangulum construatur debet, ad AB = a excitetur in C perpendicularis AC = b (§. 249 Geom.), erit BC = $\sqrt{(a^2 + b^2)}$. Quare si fiat CD = AC, erit DB = $\sqrt{(a^2 + b^2)} - b$. Fiat jam porro BE = BD & descripto super EB semicirculo ex C ducatur CH ipsi AB parallela (§. 258 Geom.) secans semicirculum in F. Ductis enim rectis EF & FB, erit EFB triangulum quaesitum.

PROBLEMA CXXVIII.

Tab. I. Fig. 18. 283. *Datis pro triangulo rectangulo BAC hypotenusa BC & differentia crurum DC, invenire crura.*

Sit BC = c, DC = f, $\frac{1}{2}(AB + AC) = x$; erit AC = $x + \frac{1}{2}f$, AB = $x - \frac{1}{2}f$ (§. 5), consequenter (§. 417 Geom.).

$$2x^2 + \frac{1}{2}f^2 = c^2$$

$$2x^2 = c^2 - \frac{1}{2}f^2$$

$$x = \frac{1}{2}c^2 - \frac{1}{2}f^2$$

$$x = \sqrt{(\frac{1}{2}c^2 - \frac{1}{2}f^2)}$$

Constructio. Construat rectangulum triangulum AFE, in quo AF = FE = $\frac{1}{2}c$, erit AE = $\sqrt{\frac{1}{2}cc}$. Super AE describatur semicirculus ob AF = FE transiturus per F & in eo applicetur EG = $\frac{1}{2}f$; erit AG = x, consequenter si fiat DG = GC = GE, crus majus AC; minus AB = AD.

PROBLEMA CXXIX.

Tab. I. Fig. 19. 284. *In dato circulo aptare rectam datam KL, que producta transeat per datum punctum H tangentis HI.*

Sit LK = m, HI = n, LH = y; erit (§. 379 Geom.).

$$y^2 + my = n^2$$

$$\frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}m^2$$

$$y^2 + my + \frac{1}{4}m^2 = \frac{1}{4}m^2 + n^2$$

$$y + \frac{1}{2}m = \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + n^2)}$$

$$y = \sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + n^2)} - \frac{1}{2}m$$

Constructio. In puncto tangentis I erigatur perpendicularis MI = $\frac{1}{2}m$; erit HM = $\sqrt{(\frac{1}{4}m^2 + n^2)}$. Fiat NM = MI = $\frac{1}{2}m$; erit HN = x°. Quare si ex centro H radio HN describatur arcus LN; erit L punctum, per quod recta HK ducenda, ut LK sit chorda in circulo aptanda.

PROBLEMA CXXX.

285. *Datis duobus quadratis invenire duo alia reciproca, quorum summa aequatur quadrato dato.*

Sint quadrata data bb, cc, dd, quaesita yy & dd - yy. Erit per conditionem problematis

$$yy : bb = cc : dd - yy$$

$$ddy^2 - y^4 = bbcc$$

$$y^4 - ddy^2 + \frac{1}{4}d^4 = \frac{1}{4}d^4 - bbcc$$

$$\frac{1}{2}dd - y^2 = \sqrt{(\frac{1}{4}d^4 - bbcc)}$$

$$y^2 = \frac{1}{2}dd - \sqrt{(\frac{1}{4}d^4 - bbcc)}$$

$$y = \sqrt{(\frac{1}{2}dd - \sqrt{(\frac{1}{4}d^4 - bbcc)})}$$

Constructio. Queratur ad AB = d, AC = Tab. I. b & BD = c quarta proportionalis CE = bc:d. Fig. 20. Describatur semicirculus super CF = $\frac{1}{2}d$ & in eo applicetur CG = CE; erit FG = $\sqrt{(\frac{1}{4}d^4 - bbcc)}$: d. Fiat HC = d & CI = $\frac{1}{2}d - \sqrt{(\frac{1}{4}d^4 - bbcc)}$: d; erit media proportionalis CK = y. Denique super CH = d describatur semicirculus & in eo applicetur CL = CK, erit LH = $\sqrt{(d^2 - y^2)}$ latus alterius quadrati quaesiti.

PRO-

PROBLEMA CXXXI.

286. Datis duobus quadratis invenire duo alia reciproca, quorum differentia æquatur quadrato dato.

Sint quadrata data ff, gg, hh , quæ sita yy & $hh + yy$. Erit per conditionem problematis

$$yy : ff = gg : hh + yy$$

$$y^2 + hbyy = ff gg$$

$$\frac{1}{4} b^4 \qquad \frac{1}{4} b^4$$

$$y^2 + hbyy + \frac{1}{4} b^4 = ff gg + \frac{1}{4} b^4$$

$$y^2 + \frac{1}{2} hb = \sqrt{ff gg + \frac{1}{4} b^4}$$

$$y^2 = -\frac{1}{2} hb + \sqrt{ff gg + \frac{1}{4} b^4}$$

$$y = \sqrt{(-\frac{1}{2} hb + \sqrt{ff gg + \frac{1}{4} b^4})}$$

Constructio. Eadem fere, quæ problema-
tis præcedentis.

PROBLEMA CXXXII.

Tab.II. 287. Datis tribus lateribus trianguli
Fig. 21. cujuscunque HL, LI & IH, invenire al-
titudinem ML.

Sit $HL = c, LI = d, HI = g, HM = z$,
erit $MI = g - z$. Quare (§. 417 Geom.)
bis invento valore ipsius ML

$$cc - zz = dd - gg + 2gz - zz$$

$$cc = dd - gg + 2gz$$

$$cc - dd = 2gz - gg$$

$$cc + gg - dd = 2gz$$

$$cc + gg - dd = z$$

$$2g$$

Geometrica constructio non desideratur,
utpote ex elementis manifesta sed tantum
regula arithmetica.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

COROLLARIUM.

288. Vi æquationis tertiæ $dd - cc = gg - 2gz$. Sed $gg - 2gz$ est differentia inter zz & $gg - 2gz + zz$. Ergo in omni triangulo differentia quadratorum crurum HL & LI æquatur differentiæ quadratorum segmentorum basis HM & MI.

PROBLEMA CXXXIII.

289. Triangulo dato HLI aequale & alteri dato NOP simile construere.

Sit $HI = f, LM = e, NP = m, QO = n$, basis trianguli quæ sita = y , altitudo = z : erit

(§. 396 Geom.) (§. 392 Geom.)

$$m : n = y : z$$

$$fe = zy$$

$$mz = ny$$

$$fe : y = z$$

$$mfe : y = mz$$

$$ny = mfe : y$$

$$ny^2 = mfe$$

$$y^2 = mfe : n$$

$$y = \sqrt{mfe : n}$$

Constructio. Producaturs altitudo OQ trianguli NOP in M, donec altitudini alterius LM æqualis fiat. Producantur iidem crura trianguli in R & S, & per M agatur ipsi NP parallela: erit $RS = me : n$. Quæraturs inter RS & SI = f media proportionalis $TS = \sqrt{mfe : n}$, super qua ob angulos N & P datus triangulum TSV construi potest. (§. 264 Geom.).

Aliter.

$$n : m = z : y \quad fe = zy$$

Fiat $n : m = e : r \quad f : z = y : e$ (§. 299 Arithm.)

erit $z : y = e : r$ (§. 167. Arithm.)

Ergo $f : y = y : r$ (§. 194 Arithm.)

Est ergo y media proportionalis inter f & r , seu inter f & $em : n$, ut ante.

R r

PRO-

Tab. II.
Fig. 22.

PROBLEMA CXXXIV.

290. Ex angulo C rhombi dati ABDC ducere rectam CG lateri AB continuato occurrentem in G, ita ut EG sit aequalis lineæ datæ.

Ducatur Diagonalis CB & in E constituitur angulus CEF = CBG (§. 208 Geom.), cujus latus EF producat, donec diagonali continuatæ in F. occurrat.

Sit AB = b, CB = c, EG = d, BG = z, CF = y: erit BF = y - c. BG : GE = AB : EC (§. 268. Geom.) Unde reperitur EC = bd : z. Quoniam angulus CEF = CBG per construct. erit ob angulum communem C (§. 267 Geom.) CB : BG = CE : EF Unde reperitur EF = zbd : cz = bd : c. Porro o = x (§. 156 Geom.) & x = u (§. 99. 204 Geom.). Ergo o = u (§. 87 Arithm.) consequenter CBG = EBF (§. 88 Arithm.) = CEF (§. 87 Arithm.). Ergo ob angulum communem F (§. 267 Geom.).

$$CF : FE = FE : BF$$

$$y : \frac{bd}{c} = \frac{bd}{c} : y - c$$

$$cy : bd = bd : cy - cc$$

$$ccy^2 - c^3y = bbdd$$

$$y^2 - cy = bbdd : cc$$

$$y^2 - cy + \frac{1}{4}cc = \frac{1}{4}cc + bbdd : cc$$

$$y - \frac{1}{2}c = \sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + bbdd : cc\right)}$$

$$y = \frac{1}{2}c + \sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + bbdd : cc\right)}$$

Ex æquatione prima statim liquet, inveniendas esse ipsi bd : c reciprocas y & y - c. Ex ultima autem hæc elicitur.

Constructio. Fiat BM = EG = d & ducatur LM ipsi AC parallela; erit LM = bd : c (§. 268

Geom.) Dividatur BC bifariam in N & in C erigatur perpendicularis CO = LM; erit ON = $\sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + bbdd : cc\right)}$ (§. 417 Geom.). Translata ergo ON ex N in F; erit CF = y. Denique cum EF = bd : c = LM; ex puncto F intervallo EF determinetur punctum E. Quodsi jam ex C ducatur recta per E occurrens ipsi AB continuatæ in G, erit EG æqualis lineæ datæ.

PROBLEMA CXXXV.

291. A dato puncto E ducere rectam, que circulum datum tangat. Tab. II.
Fig. 23.

Quia punctum E positione, circulus GDFG & positione & magnitudine datur; dantur etiam EG & GC. Sit itaque EG = a, GC = b, ED = x; erit EF = a + 2b & (§. 379 Geom.)

$$aa + 2ab = x^2$$

$$\sqrt{(aa + 2ab)} = x$$

Constructio. Connectantur centrum circuli C & punctum datum E recta EC. Super ea describatur semicirculus CDE ducanturque chordæ CD & DE; erit D rectus (§. 317 Geom.). Est vero CE² = aa + 2ab + bb, CD² = bb; ergo DE = $\sqrt{(2ab + aa)}$ = x (§. 417 Geom.).

PROBLEMA CXXXVI.

292. Examinare regulam Renaldiniam, polygonum regulare quodcumque circulo inscribendi. Tab. II.
Fig. 24.

Regula Caroli Renaldini (e) hæc est. Dividatur diameter AB in tot partes æquales, in quot peripheria dividi debet. Super AB construatur triangulum æquilaterum AFB. Ex F per secundum divisionis punctum D ducatur recta FG. Erit ex ipsius mente BG latus polygoni.

Fal-

(e) De Resolutione & Compositione Mathematica lib. 2. f. 367.

Falsitatem regulæ una instantia ostendisse sufficit.

Sit BG latus octogoni & fiat BH = BG; erit HG latus quadrati. Sit porro CB = I, EG = x; erit CD = $\frac{1}{2}$, per regulam Renaldini, FC = $\sqrt{3}$ (§. 268). Quoniam angulus ad C rectus (§. 184 *Geom.*) & is ad E itidem rectus (§. 291 *Geom.*), præterea verticales ad D æquales (§. 156 *Geom.*); erit (§. 267 *Geom.*) FC : CD = EG :

DE, hoc est, $\sqrt{3} : \frac{1}{2} = x : \frac{1}{2}x$. Hinc
 $CE = \frac{\sqrt{3} + x}{2\sqrt{3}}$. Unde tandem ob CE^2

+ $EG^2 = CG^2$ (§. 417 *Geom.*) reperitur

$$\frac{3 + 2x\sqrt{3} + x^2}{12} + x^2 = 1$$

$$3 + 2x\sqrt{3} + 13x^2 = 12$$

$$2x\sqrt{3} + 13x^2 = 9$$

$$\frac{2}{13}x\sqrt{3} + x^2 = \frac{9}{13}$$

$$\frac{3}{13 \cdot 13} \quad \frac{3}{13 \cdot 13} \quad \text{add.}$$

$$\frac{3}{13 \cdot 13} + \frac{2}{13}x\sqrt{3} + x^2 = \frac{9}{13} + \frac{3}{13 \cdot 13} = \frac{120}{13 \cdot 13}$$

$$\frac{1}{13}\sqrt{3} + x = \frac{1}{13}\sqrt{120}$$

$$x = \frac{1}{13}\sqrt{120} - \frac{1}{13}\sqrt{3}$$

$$= \frac{2}{13}\sqrt{30} - \frac{1}{13}\sqrt{3}$$

Foret adeo semilatus quadrati, si vera esset regula *Renaldini*, ($2\sqrt{30} - \sqrt{3}$) : 13. Sed idem ex veris principiis elicitur $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ (§. 21. *Trigon.*) = $\sqrt{\frac{1}{2}}$: quod diversum a *Renaldiniano* esse extractio radicis probat. Fallit ergo regula *Renaldini* in octogono, adeoque non universalis.

SCHOLIUM.

293. Eodem prorsus modo ostenditur, quod etiam fallat in aliis polygonis.

PROBLEMA CXXXVII.

294. Data diagonali pentagoni regularis AD, invenire latus pentagoni AE.

Sit AE = x, AD = a. Quoni-
 am anguli AEC mensura est arcus
 AB (§. 314 *Geom.*) & ipsius EFA
 semisumma arcuum AE & CD (§.
 316 *Geom.*), hoc est, arcus AE (§.
 342 *Geom.*), est vero AB = AE
 (§. cit. *Geom.*); erit AEF = AFE (§.
 142 *Geom.*), consequenter AF = AE
 (§. 253 *Geom.*) = x, adeoque FD =
 a - x. Porro anguli AED mensura est
 AB + $\frac{1}{2}$ BC (§. 314 *Geom.*) & ipsius F
 mensura itidem AB + $\frac{1}{2}$ BC (§. 316.
Geom.) & angulus ADE utrique trian-
 gulo AED & EFD communis. Quare
 (§. 267 *Geom.*).

AD : ED = ED : FD

a : x = x : a - x

$$a^2 - ax = x^2$$

$$a^2 = x^2 + ax$$

Est adeo x pars major ipsius a media & extrema ratione sectæ (§. 258).

COROLLARIUM.

295. Erit ergo, substitutis a pro x & x pro a, $a = \frac{1}{2}x + \sqrt{\frac{5}{4}}x^2$. Unde patet, quomodo ex dato latere diagonalis inveniat.

PROBLEMA CXXXVIII.

296. Invenire circulum superficiei cylindri æqualem.

Sit ratio radii ad peripheriam r : p; peripheria cylindri = p, altitudo a; erit superficies = ap (§. 516 *Geom.*).

Sit radius circuli = x ; erit $r : p = x : \frac{px}{r}$, quæ est ejusdem peripheria (§. 425 *Geom.*). Unde habemus (§. 429 *Geom.*).

$$px^2 : 2r = ap$$

$$px^2 = 2rap$$

$$x^2 = 2ar$$

$$x = \sqrt{2ar}$$

Theorema. Superficies cylindri æquatur circulo, cujus radius est medius proportionalis inter diametrum & altitudinem cylindri.

PROBLEMA CXXXIX.

297. *Invenire cylindrum, cujus superficies sit circulo dato æqualis.*

Sit circuli radius = r , peripheria = p , altitudo cylindri = x , radius basis = y ; erit peripheria ejus $py : r$ (§. 425 *Geom.*), consequenter (§. 516. *Geom.*).

$$pyx : r = \frac{1}{2} pr$$

$$pyx = \frac{1}{2} pr^2$$

$$yx = \frac{1}{2} r^2$$

$$x = r^2 : 2y$$

Est adeo problema indeterminatum, ita ut radius pro arbitrio assumi possit, vel, quod perinde est, altitudo.

PROBLEMA CXL.

298. *Data diametro spheræ & altitudine cylindri ipsi æqualis, invenire diametrum cylindri.*

Sit diameter spheræ = d , altitudo cylindri = a , diameter ejus = x , erit soliditas illius $157 d^3 : 300$ (§. 552 *Geom.*), hujus $314 ax^2 : 400$ (§. 514 *Geom.*). Quare per conditionem problematis :

$$157 d^3 : 300 = 314 ax^2 : 400$$

$$4. 157 d^3 : 3 = 314 ax^2$$

$$628 d^3 : 942 a = 2d^3 : 3a = x^2$$

$$\sqrt{(2d^3 : 3a)} = x$$

Æquatio penultima in hanc analogiam

$$3a : 2d = d^2 : x^2$$

resoluta sequens suppeditat.

Theorema. Quadratum diametri spheræ est ad quadratum diametri cylindri ipsi æqualis fere ut tripla cylindri altitudo ad diametrum spheræ duplam.

PROBLEMA CXLI.

299. *Data diametro spheræ AB, invenire latus terrædri ipsi inscribendi AD.* Tab. II. Fig. 26.

Sit diameter spheræ $AB = a$, latus tetraëdri $AD = x$, erit radius circuli, cui unum e triangulis tetraëdri inscribi potest = $\sqrt{\frac{1}{3}x^2}$ (§. 269). Sit $AC = y$, erit $CB = a - y$, consequenter

$$(\text{§. 327. } \textit{Geom.})$$

$$AC : CD = CD : CB$$

$$(\text{§. 417 } \textit{Geom.}) \quad y : \sqrt{\frac{1}{3}x^2} = \sqrt{\frac{1}{3}x^2} : a - y$$

$$AD^2 = AC^2 + CD^2$$

$$ay - y^2 = \frac{1}{3}x^2$$

$$x^2 = y^2 + \frac{1}{3}x^2$$

$$ay - \frac{2}{3}x^2 = \frac{1}{3}x^2$$

$$\frac{2}{3}x^2 = y^2$$

$$ay = x^2$$

$$\sqrt{\frac{2}{3}x^2} = y$$

$$a\sqrt{\frac{2}{3}x^2} = x^2$$

$$\frac{2}{3}a^2x^2 = x^4$$

$$\frac{2}{3}a^2 = x^2$$

$$\sqrt{\frac{2}{3}a^2} = x$$

Est ergo $x^2 : a^2 = 2 : 3$.

Theorema. Quadratum lateris tetraëdri est ad quadratum diametri spheræ, cui inscribi potest, in ratione subsesquialtera.

COR-

COROLLARIUM I.

300. Est ergo latus tetraëdri ad diametrum sphaeræ, cui inscribitur, ut $\sqrt{2}$ ad $\sqrt{3}$, consequenter huic incommensurabile.

COROLLARIUM II.

Tab.II. Fig.27. 301. Porro quoniam $y^2 = \frac{2}{3}x^2 = \frac{2}{3}ay$, erit $y = \frac{2}{3}a$. Patet adeo tetraëdram sphaeræ inscribi, si diameter AB in tres partes æquales dividatur fiatque $AC = \frac{2}{3}AB$.

PROBLEMA CXLII.

Tab.II. Fig.28. 302. Data diametro sphaeræ, invenire latus cubi seu hexaëdri ipsi inscribendi FG.

Sit diameter sphaeræ, quæ diagonali cubi FH æquatur, $=a$, latus cubi $=x$; erit (§. 417 Geom.) $FI^2 = 2x^2$ & $FH^2 = 3x^2$, consequenter

$$\begin{aligned} 3x^2 &= a^2 \\ \hline x^2 &= \frac{1}{3}a^2 \\ \hline x &= \sqrt{\frac{1}{3}a^2} \end{aligned}$$

Theorema. Quadratum lateris hexaëdri est ad quadratum diametri sphaeræ circumscriptæ in ratione subtripla.

COROLLARIUM I.

303. Est ergo latus hexaëdri ad diametrum sphaeræ, cui inscribitur, ut 1 ad $\sqrt{3}$ consequenter huic incommensurabile.

COROLLARIUM II.

Tab.II. Fig.27. 304. Sit in diametro sphaeræ $AC = \frac{2}{3}a$ & $CB = \frac{1}{3}a$; erit $AD = \sqrt{\frac{2}{3}a^2}$, consequenter $DB = \sqrt{\frac{1}{3}a^2}$ seu latus hexaëdri.

PROBLEMA CXLIII.

Tab.II. Fig.29. 305. Data diametro sphaeræ, invenire latus octaëdri inscripti ML.

Sit $LM = y$, diameter sphaeræ circumscriptæ $HL = b$. Quoniam ML quadrantem subtendit (§. 342 Geom.); erit (§. 417 Geom.),

$$\begin{aligned} \frac{2}{4}bb \text{ seu } \frac{1}{2}bb &= x^2 \\ \hline \sqrt{\frac{1}{2}b^2} &= x \end{aligned}$$

Theorema. Quadratum lateris octaëdri est ad quadratum diametri sphaeræ circumscriptæ in ratione subdupla.

COROLLARIUM I.

306. Est ergo latus octaëdri ML ad diametrum sphaeræ circumscriptæ ut 1 ad $\sqrt{2}$, adeoque huic incommensurabile.

COROLLARIUM II.

307. Si ex centro sphaeræ E erigatur perpendicularis EF, erit $FA = \sqrt{\frac{1}{2}b^2}$ adeoque latus octaëdri inscribendi, id quod in ipso calculo supposuimus in futuros tamen usus sigillatim enunciandum.

PROBLEMA CXLIV.

308. Data diametro sphaeræ, invenire latus dodecaëdri AB. Tab.II. Fig.306.

Quoniam puncta A, C, F, H sunt in sphaera: planum per ea transiens est circulus, ut inferius in sphaericis independenter a dodecaëdro demonstrabitur. Quoniam anguli B, M; G & L, itemque latera AB, BC, CM, MF, FG, GH, HL & LA inter se æquantur (§. 475. 106 Geom.); $AC = CF = HF = HA$ (§. 179 Geom.) adeoque AHFC quadratum (§. 342 & 98 Geom.). Jam cum pentagona 12 in 36 triangula resolvantur per lineas diagonales, quadratum vero AHFC nonnisi 6 subtendat; omnia ista triangula a sex quadratis subtendantur necesse est, consequenter diagonalis AC est lateri hexaëdri sive cubi eidem sphaeræ inscripti æqualis (§. 459 Geom.).

Sit latus dodecaëdri $AB = x$, diameter sphaeræ $= d$, erit $AC = \sqrt{\frac{1}{3}d^2}$ (§. 302), consequenter

$$\sqrt{\frac{1}{3}d^2} : x = x : \sqrt{\frac{1}{3}d^2} - x \text{ (§. 294).}$$

$$\frac{\frac{1}{3}d^2 - x \sqrt{\frac{1}{3}d^2} = x^2}{\frac{1}{3}d^2 = x^2 + x \sqrt{\frac{1}{3}d^2}}$$

$$\frac{\frac{1}{12}d^2}{\frac{1}{12}d^2} = \frac{x^2 + x \sqrt{\frac{1}{3}d^2}}{\frac{1}{12}d^2}$$

$$\frac{\frac{5}{12}d^2 = x^2 + x \sqrt{\frac{1}{3}d^2} + \frac{1}{12}d^2}{\sqrt{\frac{5}{12}d^2} = x + \sqrt{\frac{1}{12}d^2}}$$

$$\sqrt{\frac{5}{12}d^2} = x + \sqrt{\frac{1}{12}d^2}$$

$$\sqrt{\frac{5}{12}d^2} - \sqrt{\frac{1}{12}d^2} = x$$

h. c. $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{3}d^2} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{3}d^2} = x$

Æquatio altera hoc suppeditat.

Theorema. Quadratum diametri sphaeræ æquatur rectangulo ex aggregato lateris dodecaëdri & hexaëdri eidem inscriptorum in triplum latus dodecaëdri.

COROLLARIUM I.

309. Si diameter sphaeræ fuerit 1, erit latus dodecaëdri inscripti $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{3}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{3}}$, consequenter illa ad hoc, ut 2 ad $\sqrt{\frac{5}{3}} - \sqrt{\frac{1}{3}}$ & quadratum illius ad quadratum hujus ut 6 ad 3 $-\sqrt{5}$. Est ergo diameter sphaeræ lateri dodecaëdri inscripti tum in se, tum potentia incommensurabilis.

COROLLARIUM II.

Tab. I. Fig. 27. 310. Latus dodecaëdri est portio major BG lateris hexaëdri DB eidem sphaeræ inscripti media & extrema ratione secti in G (§. 258).

PROBLEMA CXLV.

Tab. II. Fig. 31. 311. *Data diametro sphaeræ HM, invenire latus icosaëdri inscripti.*

Sit ABCDEA circulus subtendens angulum solidum icosaëdri H; erit latus icosaëdri æquale lateri pentagoni AB huic circulo inscripti (§. 475 *Geom.*). Concipiatur eidem circulo inscriptum decagonum regulare DKEFA &c. & alterum circulo alii, qui isti parallelus &

ab eo distat intervallo radii GC; erit DN = DC (§. 279). Quodsi ergo anguli pentagonorum lineis transversis DN, DI, EI &c. connectantur; decem prodibunt triangula æquilatera juncta decem aliis, quorum quinque a circulo superiore, quinque ab inferiore subtenduntur.

Sit HM = b, HC = x, GC = y. Quoniam GC est latus hexagoni; erit HG latus decagoni (§. 279) adeoque $= \sqrt{\frac{5}{4}y^2} - \frac{1}{2}y$, vi §. cit. Habemus ergo $2\sqrt{\frac{5}{4}y^2} - y + y = b$ $x^2 = y^2 + \frac{5}{4}y^2 - y\sqrt{\frac{5}{4}y^2}$
h. c. $2\sqrt{\frac{5}{4}y^2} = b$ $+ \frac{1}{4}y^2$

$5y^2 = b^2$	$x^2 = \frac{5}{2}y^2 - y\sqrt{\frac{5}{4}y^2}$
$y^2 = \frac{1}{5}b^2$	$x^2 = \frac{1}{2}b^2 - \sqrt{\frac{1}{20}b^4}$
$y = \sqrt{\frac{1}{5}b} = b : \sqrt{5}$	seu $\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}b\sqrt{\frac{1}{5}b^2}$
	$x = \sqrt{(\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}b\sqrt{\frac{1}{5}b^2})}$

Constructio. Fiat AH = AB = b, erit EH = $\sqrt{\frac{5}{4}b^2}$ (§. 417 *Geom.*) & ob EH: AH = EK: IK, hoc est, $\frac{1}{2}b\sqrt{5} : b = \frac{1}{2}b :$ $\frac{b}{\sqrt{5}}$ (§. 268 *Geom.*) IK = $b : \sqrt{5}$. Est ergo IK radius circuli, cui pentagonum icosaëdri inscribitur. Porro EI = $b : 2\sqrt{5} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{5}b^2}$ (§. cit. *Geom.*) & hinc AI = $\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{5}b^2}$. Unde tandem AK = $\sqrt{(\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}b\sqrt{\frac{1}{5}b^2})} = x$ (§. 330 *Geom.*).

COROLLARIUM I.

312. Quoniam $5y^2 = b^2$; quadratum diametri sphaeræ est in ratione quintupla ad quadratum radii circuli angulum solidum icosaëdri subtendentis.

COROLLARIUM II.

313. Liquet etiam, latus icosaëdri diametro sphaeræ circumscriptæ tum in se, tum potentia incommensurabile esse.

SCHOLIION I.

314. Si diameter sphaeræ fuerit 10000 erit (§. 299. 305. 302. 311. 308) latus tetraëdri inscripti 81149, octaëdri 70710, hexaëdri 57736, icosaëdri 52573, dodecaëdri 35682 (a).

SCHOLIION II.

315. Cum ex diametro sphaeræ corporibus

regularibus circumscriptæ invenire possimus latera eorum; non difficile foret, inde ulterius dicere tum super facies, tum soliditates eorundem, easque tum inter se, tum cum quadrato & cubo diametri sphaeræ conferre: sed quoniam hæc doctrina rarissimi est usus, eam per æternitendam esse judicamus.

C A P U T I V.

De Algebra ad Trigonometriam Planam applicata.

PROBLEMA CXLVI.

316. **D**atis basi HI trianguli cujuscunque & angulis ad basin H & I, invenire altitudinem.

Tab. II. Sit HI = a, LM = x, sinus anguli Fig. 2 I. MIL = s, ejus Cofinus = c; sinus anguli LHM = p, ejus Cofinus = q. Erit (§. 33 Trigon.) s : x = c : MI & p : x = q : HM. Unde reperitur MI = cx : s & HM = qx : p (§. 302 Arithm.). Quare (§. 87 Arithm.).

$$\frac{cx : s + qx : p = a}{pcx + sqx = asp}$$

$$pcx + sqx = asp$$

$$x = asp : (pc + sq)$$

Æquatio penultima in hanc analogiam

$$pc + sq : sp = a : x$$

resoluta sequens exhibet

Theorema. In omni triangulo HIL basis HI est ad altitudinem ML, ut summa rectangulorum ex sinu anguli obliqui ad basin unius in Cofinum alterius se habet ad rectangulum ex sinibus angulorum ad basin.

(a) Herigonius Curs. Mathem. Tom. I. p. 779.

Aliter.

Sumatur ML pro sinu toto, erunt HM & MI tangentés angulorum HLM & MLI, seu cotangentés datorum H & I. Sint sinus totus = t, Cotangentés = m & n, LM = x, HI = a; erit t : m = x : HM & t : n = x : MI (§. 40 Trigon.), consequenter HM = mx : t, MI = nx : t, adeoque (§. 87 Arithm.).

$$a = (mx + nx) : t$$

$$at = mx + nx$$

$$at : (m + n) = x$$

Theorema. Basis trianguli est ad altitudinem ut summa Cotangentium angulorum ad basin ad sinum totum.

PROBLEMA CXLVII.

317. **D**atis summa crurum HL & LI una cum angulis ad basin H & I, invenire crura HL & LI.

Sit HL + LI = a, sinus H = m, sinus I = n, HL = x, erit IL = a - x. Quare (§. 33 Trigon.).

$$\begin{aligned} x : n &= a - x : m \\ \hline mx &= na - nx \\ \hline mx + nx &= na \\ \hline x &= na : (m + n) \end{aligned}$$

$a - x = (ma + na - na) : (m + n) = ma : (m + n)$
Theorema. Summa crurum trianguli HL + LI est ad crus unum HL ut summa sinuum angulorum ad basin H & I ad sinum anguli I cruri isti HL oppositum.

PROBLEMA CXLVIII.

Tab. II. Fig. 2 I. 318. *Datis angulis ad basin H & I una cum segmento baseos uno HM, invenire segmentum alterum MI.*

Sit $HM = a$, $MI = x$, sinus anguli H $= m$, ejus Cosinus $= n$; sinus anguli I $= p$, ejus Cosinus $= q$. Erit (§. 33 *Trigon.*) $n : a = m : ML$. Reperitur adeo $ML = am : n$. Porro *vi* §. cit. $q : x = p : ML$. Reperitur itaque $ML = px : q$. Quare §. 8 I *Arithm.*),

$$\begin{aligned} px : q &= am : n \\ \hline pnx &= amq \\ \hline x &= amq : pn \end{aligned}$$

Est adeo $pn : mq = a : x$

Theorema. Si ex vertice trianguli L in basin HI perpendiculum demittitur; segmentum unum HM est ad alterum MI ut rectangulum ex sinu anguli segmento MI adjacentis in Cosinum anguli segmento HM adjacentis ad rectangulum ex sinu anguli H in Cosinum anguli I.

PROBLEMA CXLIX.

Tab. I. Fig. 3. 319. *Datis area trianguli rectanguli ABC una cum angulo C, invenire crura AB & BC.*

Sit area $= b$. $BC = x$

Sinus totus $= r$, erit $BA = 2b^2 : x$ (§. 394 *Geom.*)
 Tangens $c = t$

Quare (§. 40 *Trigon.*)

$$\begin{aligned} x : \frac{2b^2}{x} &= r : t \\ x^2 : 2b^2 &= r : t \\ \hline x^2 &= 2rb^2 : t \end{aligned}$$

$$x = \sqrt{(2rb^2 : t)}$$

Theorema. Area trianguli rectanguli est ad quadratum cruris unius BC ut tangens dimidia anguli adjacentis C ad sinum totum.

Constructio. Intra crura anguli dati ADM erigatur perpendicularis FE, puncto E pro lubitu assumpto, erit $DE = r$ & $FE = t$ (§. 7 *Trigon.*). Fiat $DG = FE$, $DH = b$ & agatur ipsi EG parallela HI: erit $DI = br . t$ (§. 271 *Geom.*). Fiat $MI = 2b$ & quaeratur inter MI & DI media proportionalis IK (§. 327 *Geom.*), quae erit crus unum. Dividatur MI bifariam in L & fiat $IN = LI$, ducaturque NO ipsi MK parallela, erit $IO = 2b^2 : x$ §. 271 *Geom.*), adeoque crus alterum, consequenter KOI, triangulum quaesitum.

Aliter. Sit EDA angulus datus. Fiat $DA = 2b$ & erigatur AE perpendicularis ad DA: erit simul $DA = r$ & $AE = t$ (§. 7. *Trigon.*). Producatur EA in infinitum & in D erigatur ad ED perpendicularis DG, erit $AG = \frac{2br}{t}$ (§. 327 *Geom.*). Fiat $AH = AG$ & $AI = \frac{1}{2} AD = b$, erit descripto super IH semicirculo $AL = \sqrt{\frac{2b^2r}{t}}$. Fiat denique $AB = AL$ & ducatur BC cruri anguli dati DE parallela; erit triangulum BAC quaesitum.

PROBLEMA CL.

320. *Data subtensa arcus AB quadrante minoris una cum radio circuli CE, invenire subtensam CB arcus compositi ex arcu AB & ejus complemento dimidio ad semicirculum.*

Applicetur AB diametro CD parallela & fiat $DF = AB$, ducanturque

rec-

rectæ EB, AD & BF. Quoniam $x = o$ (§. 315 *Geom.*), & ob parallelismum linearum AD & BF (§. 257 *Geom.*) $x = y$ (§. 233 *Geom.*); erit $o = y$ (§. 87 *Arithm.*). Est vero etiam ob $CE = EB$ (§. 40 *Geom.*) $u = o$ (§. 184 *Geom.*) = y , consequenter $CF : CB = CE$ (§. 267 *Geom.*). Sit jam $AB = a$, $CE = r$, $CB = x$; erit $CF = a + 2r$, consequenter.

$$\begin{aligned} a + 2r : x &= x : r \\ \hline ar + 2r^2 &= x^2 \\ \hline \sqrt{ar + 2r^2} &= x \end{aligned}$$

COROLLARIUM I.

321. Cum angulus CBD sit rectus (§. 317 *Geom.*); erit $BD^2 = 4r^2 - ar - 2r^2 = 2r^2 - ar$ (§. 417 *Geom.*), consequenter BD subtensa dimidii complementi ad semicirculum arcus $AB = \sqrt{2r^2 - ar}$.

COROLLARIUM II.

322. Quadratum ergo chordæ DB arcum quadrante minorem subtendentis æquatur rectangulo ex radio CE in differentiam chordæ diametro parallelæ ex puncto B ductæ AB a diametro CD.

COROLLARIUM III.

323. Quadrata chordarum CB & BD, quæ ambæ simul semicirculum subtendunt, sunt inter se ut $2r^2 + ar$ ad $2r^2 - ar$ (§. 319. 320), hoc est, ut $2r + a$ ad $2r - a$ (§. 181 *Arithm.*), hoc est, ut aggregatum ex diametro CD & chorda AB ex puncto concursus B eidem parallela ducta, ad differentiam hujus chordæ a diametro,

PROBLEMA CLI.

Tab. II. Fig. 34. 324. Datis in quadrilatero circumscripto lateribus AE, EB, BC & AC una cum diagonali EC, invenire diagonalem AB.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

Sit $AE = a$, $EB = b$, $BC = c$, $AC = d$, $EC = f$, $AB = y$. Ducatur EF, ita ut sit $o = x$ (§. 208 *Geom.*). Quoniam præterea $ACE = ABE$ (§. 315 *Geom.*); erit $EC : AC = EB : BF$, hoc est, $f : d = b : BF$ (§. 267 *Geom.*). Reperitur ergo $BF = bd : f$. Quoniam porro $EAB = ECB$ (§. 315 *Geom.*) & $AEF = CEB$ (§. 88 *Arithm.*); erit $EC (f) : CB (c) = EA (a) : AF (ac : f)$ (§. 267 *Geom.*). Quare (§. 86 *Arithm.*).

$$\begin{aligned} (bd + ac) : f &= y \\ \hline bd + ac &= fy \end{aligned}$$

Theorema. In quadrilatero circulo inscripto AEBC rectangulum ex diagonibus EC & AB æquatur rectangulis ex lateribus oppositis EB in AC & EA in BC.

PROBLEMA CLII.

325. Dato sinu anguli simpli, invenire sinus & Cosinus angulorum multiporum.

Sit angulus quicumque A, fiat $AB = BD = DF = FH = HL = LM = MP = PQ = QT = TV$: erit $A = ADB$ (§. 184 *Geom.*), $EBD = A + ADB$ (§. 239 *Geom.*) = $2A$, per demonstr. Eodem modo ostenditur, esse $FDH = A + DIA = 3A$; $HFL = A + AHF = 4A$; $LHK = A + ALH = 5A$; $PLM = A + AML = 6A$ &c. Demittantur perpendiculares BC, DE, FG, IH, LK, MN &c. Quod si AB sumatur pro sinu toto; erit BC sinus, AC Cosinus anguli simpli A; ED sinus, BE Cosinus anguli dupli, FG sinus, DG Cosinus anguli tripli, &c. (§. 2. II. *Trigon.*).

Sit $AB = r$, $BC = b$, $AC = a$, erit ob angulum A utrique $\triangle BAC$

S f &c

& EAD communem & rectos ad C & E æquales (§. 267 Geom.):

$$AB: BC = AD: DE$$

$$r: b = 2a: \frac{2ab}{r}$$

$$AB: AC = AD: AE$$

$$r: a = 2a: \frac{2a^2}{r}$$

Ergo $BE = AE - AB = 2a^2: r - r = (2a^2 - r^2): r$. Est vero $r^2 = a^2 + b^2$ (§. 417 Geom.). Ergo $BE = (2a^2 - a^2 - b^2): r = (a^2 - b^2): r$ & $AF = AE + EF = (3a^2 - b^2): r$.

$$AB: BC = AF: FG \text{ (§. 268. Geo.)}$$

$$r: b = \frac{3a^2 - b^2}{r}: \frac{3a^2b - b^3}{r^2}$$

$$AB: AC = AF: AG$$

$$r: a = \frac{3a^2 - b^2}{r}: \frac{3a^3 - ab^2}{r^2}$$

Ergo $DG = AG - AD = (3a^3 - ab^2): r^2 - 2a = (3a^3 - ab^2 - 2ar^2): r^2 =$ (substituto valore ipsius $r^2 = a^2 + b^2$), $(a^3 - 3ab^2): r^2$, consequenter $AH = AG + GH = (4a^3 - 4ab^2): r^2$

$$AB: BC = AH: HI$$

$$r: b = \frac{4a^3 - 4ab^2}{r^2}: \frac{4a^3b - 4ab^3}{r^3}$$

$$AB: AC = AH: AI$$

$$r: a = \frac{4a^3 - 4ab^2}{r^2}: \frac{4a^4 - 4a^2b^2}{r^3}$$

Quia $FA = (3a^2 - b^2): r = (3a^2 - b^2)r^2: r^3 = (3a^2 - b^2)(a^2 + b^2): r^3 = (3a^4 + 2a^2b^2 - b^4): r^3$ ideo erit $FI = AI - AF = (a^4 - 6a^2b^2 + b^4): r^3$.

Eodem prorsus modo reperitur

$$KL = (5a^4b - 10a^2b^3 + b^5): r^4$$

$$\& HK = (a^5 - 10a^3b^2 + 5ab^4): r^4;$$

$$MN = (6a^5b - 20a^3b^3 + 6ab^5): r^5$$

$$\& LN = (a^6 - 15a^4b^2 + 15a^2b^4 - b^6): r^5;$$

$$PO = (7a^6b - 35a^4b^3 + 21a^2b^5 - b^7): r^6$$

$$\& QR = (a^7 - 21a^5b^2 + 35a^3b^4 - 7ab^6): r^6$$

Si itaque radius seu sinus totus = r , erit sinus anguli

simplici b

dupli $2ba: r$

triplici $(3ba^2 - b^3): r^2$

quadrupli $(4ba^3 - 4b^3a): r$

quintupli $(5ba^4 - 10b^3a^2 + b^5): r^4$

sextupli $(6ba^5 - 20b^3a^3 + 6b^5a): r^5$

septupli $(7ba^6 - 35b^3a^4 + 21b^5a^2 - b^7): r^6$

&c.

Hinc patet lex progressionis in infinitum. Componitur nimirum formula pro sinu anguli multipli ex termino secundo, quarto, sexto, octavo &c. binomii ex cosinu a & sinu anguli simplici b compositi ad eam dignitatem evecti, cujus exponens idem est cum exponente multipli, signis + & — alternantibus (§. 95).

Hinc formula generalis in casu indefinito emergit

$$\frac{m}{1 \cdot r^{m-1}} ba^{m-1} - \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot r^{m-1}} b^3 a^{m-3} + \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot r^{m-1}} b^5 a^{m-5} + \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4 \cdot m - 5 \cdot m - 6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot r^{m-1}} b^7 a^{m-7} \&c.$$

Similiter si sinus totus = r , erit cosinus anguli

simplici a

dupli $(a^2 - b^2): r$

triplici $(a^3 - 3ab^2): r^2$

quadrupli $(a^4 - 6a^2b^2 + b^4): r^3$

quintupli $(a^5 - 10a^3b^2 + 5ab^4): r^4$

sextupli $(a^6 - 15a^4b^2 + 15a^2b^4 - b^6): r^5$

septupli $(a^7 - 21a^5b^2 + 35a^3b^4 - 7ab^6): r^6$

&c.

Unde denuo patet lex progressionis in infinitum. Nimirum formulæ componuntur ex terminis primo, tertio, quinto, septimo, nono &c. binomii ex cosinu a & sinu anguli simplici b compositi ad eam dignitatem

dignitatem eveci, cujus exponens est idem cum exponents multipli anguli desiderati signis + & — alternantibus (§. 95). Erit ergo formula generalis in casu indefinito

$$a^m - \frac{m \cdot m-1}{1 \cdot 2 \cdot r^{m-1}} b^2 a^{m-2} + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot r^{m-1}} b^4 a^{m-4} - \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot r^{m-1}} b^6 a^{m-6} + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot m-6 \cdot m-7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot r^{m-1}} b^8 a^{m-8}$$

&c. Quoniam $b^2 = r^2 - a^2$ (§. 16 Trig.) & ipsius b^2 potentie sunt etiam rationales; substituto hoc valore sive in formula generali, sive in specialibus, prodit Cofinus anguli multipli per solum Cofinum simpli & radium determinatus. Ita reperietur Cofinus anguli

dupli, $\frac{a^2 - b^2}{r} = \frac{a^2 - r^2 + a^2}{r} = \frac{2a^2}{r} - r$

tripli, $\frac{a^3 - 3ar^2 + 3a^3}{r^2} = \frac{4a^3}{r^2} - 3a$

quadrup. $\frac{a^4 - 6a^2r^2 + 6a^4 + r^4 - 2a^2r^2 + a^4}{r^3} = \frac{8a^4}{r^3} - \frac{8a^2}{r} + r$

quint. $\frac{a^5 - 10a^3r^2 + 10a^5 + 5ar^4 - 10a^3r^2 + 5a^4}{r^4} = \frac{16a^5}{r^4} - \frac{20a^3}{r^2} + 5a$

Similiter ex sinuum formula excluditur Cofinus, si valor ipsius $a = \sqrt{(r^2 - b^2)}$ substituitur: quamvis ea non sit ab irrationalitate libera.

COROLLARIUM.

326. Cum sinus sit chordæ dimidium (§. 2. Trig.), si chorda arcus simpli dicatur b & chorda ejus complementi ad quadrantem a , & diameter r ; per easdem formulas chordæ ar-

cum multorum determinantur. Quoniam vero data chorda datur etiam arcus; per easdem formulas arcus per datum numerum multiplicari potest.

PROBLEMA CLIII.

327. Data tangente arcus simpli, invenire tangentem arcus multipli.

Cum sit ut Cofinus $a^m - \frac{m \cdot m-1}{1 \cdot 2 \cdot r^{m-1}} b^2 a^{m-2} + \&c.$ ad sin. $\frac{m}{r^{m-1}} b a^{m-1} - \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot r^{m-1}} b^3 a^{m-3}$

&c. ita radius r ad tangentem (§. 26 Trig.); erit tangens (assumptis ad abbreviandum calculum pro coefficientibus cosinum A, B, C, D, E, pro coefficientibus sinuum P, Q, R, S, T excluso tamen in divisoribus r^{m-1}) =

$$\frac{Prb^{m-1} - Qrb^3a^{m-3} + Rrb^5a^{m-5} - Srb^7a^{m-7}}{a^m - Ab^2a^{m-2} + Bb^4a^{m-4} + Cb^6a^{m-6}} \&c.$$

Sit tangens anguli simpli t , erit (§. cit. Trig.) $a:b = r:t$, consequenter $a = br:t$.

Quodsi hic valor in locum ipsius a substituitur, prodit formula tangentis

$$\frac{Pb^m r^m}{t^{m-1}} - \frac{Qb^m r^{m-2}}{t^{m-3}} + \frac{Rb^m r^{m-4}}{t^{m-5}} - \frac{Sb^m r^{m-6}}{t^{m-7}} \&c.$$

$$\frac{b^m r^m}{t^m} - \frac{Ab^m r^{m-2}}{t^{m-2}} + \frac{Bb^m r^{m-4}}{t^{m-4}} - \frac{Cb^m r^{m-6}}{t^{m-6}}$$

Quodsi ulterius hæc formula dividatur per b^m & multiplicetur per t^m , prodebit tangens indefinita

$$\frac{Pr^m t - Qr^{m-2} t^3 + Rr^{m-4} t^5 - Sr^{m-6} t^7}{r^m - Ar^{m-2} t^2 + Br^{m-4} t^4 - Cr^{m-6} t^6} \&c.$$

Substitutis tandem valoribus P, Q, R, S & A, B, C, &c. tangentium formula erit

$$\left(\frac{m}{1} r^m t - \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2}{1 \cdot 2 \cdot 3} r^{m-2} t^3 + \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} r^{m-4} t^5 - \frac{m \cdot m-1 \cdot m-2 \cdot m-3 \cdot m-4 \cdot m-5 \cdot m-6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} r^{m-6} t^7 \&c. \right)$$

$$: \left(\frac{r^m - \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} r^{m-2} t^2 + \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} r^{m-4} t^4 + \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2 \cdot m - 3 \cdot m - 4 \cdot m - 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} r^{m-6} t^6 \right) \&c.$$

Apparet adeo, si binomium ex radio & tangente $r + t$ ad dignitatem indeterminatam eleuetur (§. 95), fractionis, quæ tangentem indefinitam exprimit, denominatorem componi ex terminis imparibus, numeratorem vero ex terminis paribus, sed per radium multiplicatis & utrobique signis + atque — alternantibus.

PROBLEMA CLIV.

328. *Data secante arcus simpli, invenire secantem multipli.*

Quoniam secans est tertia proportionalis ad Cosinum & radium (§. 26 *Trigon.*), erit (§. 325) assumtis pro coefficientibus Cosinus (excluso tamen in divisoribus r^{m-1}) A, B, C, D &c. secans indeterminata :

$$\frac{r^{m+1}}{a^m - Ab^2 a^{m-2} t^2 + Bb^4 a^{m-4} - Cb^6 a^{m-6}} \&c.$$

Est vero $r : b = f : t$ (§. *cit. Trig.*): unde eruitur $r = bf : t$. Hoc valore in formula secantis substituto, mutatur ea in sequentem :

$$\frac{r b^m f^m}{a^m t^m - Ab^2 a^{m-2} t^m + Bb^4 a^{m-4} t^m} \&c.$$

Porro $a : b = r : t$ (§. *cit. Trigon.*), adeoque $a = br : t$. Substituto itaque valore ipsius a in formula proxime præcedente; prodibit

$$\frac{r b^m f^m}{b^m r^m - Ab^m r^{m-2} t^2 + Bb^m r^{m-4} t^4} \&c.$$

Si tandem hæc formula dividatur per $r b^m$, determinabitur valor secantis indefinitæ ex tangente & secante anguli simpli

$$\frac{f^m}{r^{m-1} - Ar^{m-3} t^2 + Br^{m-5} t^4 + Cr^{m-7} t^6} \&c.$$

C A P U T V.

De Extractione Radicum ex Æquationibus altioribus.

PROBLEMA CLV.

329. **E**xplicare naturam æquationum.

1. Assumantur tot valores quantitatis incognitæ, quot libuerit, formeturque inde simplices æquationes, sed nihilo æquales.
2. Æquationes simplices in se invicem decantur; ita prodibunt æquationes altiores, quarum consideratio

earum proprietates manifestabit.

Sit $x = 2$	$x = a$
$x = -3$	$x = -b$
$x = 4$	$x = c$
erit $x - 2 = 0$. I	$x - a = 0$
$x + 3 = 0$. II	$x + b = 0$
$x - 4 = 0$. III	$x - c = 0$

Multiplicetur primo æquatio I per æquationem II & factum denuo per æquationem III.

$$\begin{array}{r}
 x-2=0 \\
 x+3=0 \\
 \hline
 +3x-6 \\
 x^2-2x \\
 \hline
 x^2+x-6=0 \\
 x-4=0 \\
 \hline
 -4x-4x+24 \\
 x^3+x^2-6x \\
 \hline
 x^3-3x^2-10x+24=0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 x-a=0 \\
 x+b=0 \\
 \hline
 x^2+bx-ab=0 \\
 -ax \\
 \hline
 x-c=0 \\
 \hline
 x^3-cx^2-bcx+abc=0 \\
 +bx^2+acx \\
 -ax^2-abx
 \end{array}$$

Ad has æquationes attendens (quæ facile ad superiores gradus evehi possunt) sequentia observabit:

1. *Quantitatem cognitam secundi termini esse summam radicum, sed signo contrario affectarum; quantitatem cognitam tertii esse summam productorum ex singulis binis; quantitatem cognitam quarti esse summam productorum ex singulis ternis &c. terminum denique ultimum esse factum omnium radicum.* E. gr. in æquatione quadratica termini secundi quantitas cognita $1 = 3 - 2$. Radices vero sunt $+2$ & -3 . Similiter in cubica quantitas cognita secundi termini $-3 = +3 - 4 - 2$. Radices sunt $-3, +4$ & $+2$. Quantitas cognita termini tertii in æquatione cubica $-10 = -6 + 8 - 12$. Radices sunt, $+2, -3$ & $+4$. In eadem terminus ultimus $+24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$.
2. *Quantilibet æquationem tot habere radices, quot quantitas incognita primi termini dimensiones, seu exponens unitates.* E. gr. in æquatione quadratica x^2 duas habet dimensiones: radices duæ sunt $+2$ & -3 . In æquatione cubica x^3 tres habet dimensiones, radices tres sunt $+2, -3$, & $+4$.

3. *In qualibet æquatione tot esse radices veras, quot sunt signorum permutationes; tot esse falsas, quot eorundem successiones.* E. gr. in æquatione quadratica $x^2 + x - 6 = 0$, una est signorum successio $++$, una permutatio $+ -$. Æquatio vero habet radices duas, alteram veram $+2$, alteram falsam -3 . In æquatione cubica $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ duæ sunt signorum permutationes $+ -$ & $- +$; una successio $- -$. Radices vero tres habet, duas quidem veras $+2$ & $+4$, unam falsam -3 .

SCHOLIUM I.

330. *Theoremata duo priora ex ipsa æquationem genesi haud difficulter demonstrantur: tertium vero, quod Harriotus per inductionem invenit, nemo hactenus demonstrare potuit.*

SCHOLIUM II.

331. *Ceterum non est, quod miremur, unam æquationem multas habere posse radices. Unius enim ejusdemque problematis varii esse possunt casus & in singulis casibus ad eandem pervenitur æquationem: quemadmodum exempla in Quadraticis supra habuimus (S. 169. 162.). Quoniam tamen casus quidam interdum impossibiles sunt; radices quoque impossibiles esse debent.*

COROLLARIUM.

332. *Radices veræ mutantur in falsas & falsæ in veras, si signa terminorum alternorum mutantur.* E. gr. æquatio $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ duas habet radices veras, unam falsam; sed si scribas $x^3 + 3x^2 - 10x - 24$, duæ sunt signorum successiones $++$ & $- -$; una vero permutatio $+ -$ adeoque æquatio duas radices falsas, veram unam habet.

PROBLEMA CLVI.

333. Radicem æquationis augere vel minuere quantitate data.

Sit æquatio $x^3 - 6x^2 + 13x - 10 = 0$. Invenienda est æquatio alia, in qua radix $x + 3$.

Fiat $x + 3 = y$

erit $x = y - 3$

$x^2 = y^2 - 6y + 9$

$x^3 = y^3 - 9y^2 + 27y - 27$
 $- 6x^2 = - 6y + 36y - 54$
 $+ 13x = + 13y - 39$
 $- 10 = - 10$

$0 = y^3 - 15y^2 + 76y - 130$

En æquationem novam, in qua $y = x + 3!$

Sit e contrario in æquatione modo inventa radix minuenda binario.

Fiat $y - 2 = x$

erit $y = x + 2$

$y^2 = x^2 + 4x + 4$

$y^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
 $- 15y^2 = - 15x^2 - 60x - 60$
 $+ 76y = + 76x + 152$
 $- 130 = - 130$

$10 = x^3 - 9x^2 + 18x - 30$

En æquationem novam, in qua $x = y - 2!$

COROLLARIUM I.

334. Quodsi radicem augeas quantitate radice falsa maxima majore; radices falsæ evadunt veræ, & contra si radicem minus quantitate radice vera maxima majore, veræ evadunt falsæ. Si enim $y = - 4$ & fiat $y + 5 = x$; erit $x = 5 - 4 = 1$. Contra si $y = 3$ & fiat $y - 4 = x$; erit $3 - 4 = - 1 = x$. Dum itaque radicem minuimus quantitate

quadam data, facile accidit ut radices veræ in falsas mutentur.

COROLLARIUM II.

335. Dum radices veræ augmentur, falsæ minuuntur. Nam si $y = 3$ & $= - 5$, fiat que $y + 4 = x$; erit $x = 3 + 4 = 7$ & $y = 4 - 5 = - 1$. Similiter si fiat $y - 2 = x$; erit $x = 3 - 2 = 1$ & $y = - 5 - 2 = - 7$.

PROBLEMA CLVII.

336. Radicem æquationis per quantitatem datam multiplicare.

Sit e. gr. radix æquationis $x^3 + px^2 + qx - r = 0$ multiplicanda per a .

Fiat $ax = y$

erit $x = y : a$

$x^2 = y^2 : a^2$

$x^3 = y^3 : a^3$

$+ px^2 = + py^2 : a^2$

$+ qx = + qy : a$

$- r = - r$

$\frac{y^3}{a^3} + \frac{py^2}{a^2} + \frac{qy}{a} - r = 0$

$y^3 + apy^2 + a^2qy - a^3r = 0$

En æquationem novam, in qua $y = ax!$

COROLLARIUM I.

337. Hinc manifestum est, æquationem datam tantum multiplicari debere per progressionem geometricam, in qua terminus primus, denominator rationis quantitas, per quam radix multiplicari jubetur. Sit e. gr. in æquatione $x^4 + 4x^3 - 19x^2 - 106x - 120 = 0$ radix multiplicanda per 2. Ita ergo procedendum.

$x^4 + 4x^3 - 19x^2 - 106x - 120 = 0$

$1 \quad 2 \quad 4 \quad 8 \quad 16$

$y^4 + 8y^3 - 76y^2 - 848y - 1920 = 0$

En

En æquationem, in qua $y = 2x$!

Similiter fit radix æquationis $x^3 - 3x + 1 = 0$ multiplicanda per 3.

$$\begin{array}{r} x^3 * - 3x + 1 = 0 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 9 \quad 27 \\ y^3 * - 27x + 27 = 0 \end{array}$$

En æquationem, in qua $y = 3x$.

SCHOLIUM.

338. *Stellula repleti solent loca vacua, in quibus termini æquationis deficiunt.*

PROBLEMA CLVIII.

339. *Radicem æquationis per quantitatem datam dividere.*

Sit æquationis $x^3 = px^2 + qx - r = 0$ radix dividenda per a .

$$\begin{array}{r} \text{Fiat } x : a = y \\ \text{erit } x = ay \\ \quad x^2 = a^2y^2 \\ \quad \quad x^3 = a^3y^3 \\ \quad - px^2 = - a^2py^2 \\ \quad + qx = + aqy \\ \quad - r = - r \\ \hline a^3y^3 - a^2py^2 + aqy - r = 0 \\ y^3 - \frac{py^2}{a} + \frac{qy}{a^2} - \frac{r}{a^3} = 0 \end{array}$$

En æquationem novam, in qua $y = x : a$!

COROLLARIUM.

340. Apparet adeo, non aliare opus esse, quam ut æquatio data dividatur per progressionem geometricam, cujus terminus primus 1, denominator rationis quantitas, per quam radix dividenda. Sit e. gr. radix æquationis $x^4 + 8x^3 - 76x^2 - 848x - 1920 = 0$ dividenda per 2. Ita igitur procedendum:

$$\begin{array}{r} x^4 + 8x^3 - 76x^2 - 848x - 1920 = 0 \\ \hline 1 \quad 2 \quad 4 \quad 8 \quad 16 \\ y^4 + 4y^3 - 19y^2 - 106y - 120 = 0 \end{array}$$

In hac æquatione $y = \frac{1}{2}x$.

Similiter si radix æquationis $x^3 * - 36x - 54 = 0$ dividatur per 3; erit

$$\begin{array}{r} x^3 * - 36x - 54 = 0 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 9 \quad 27 \end{array}$$

$$y^3 * - 4y - 2 = 0.$$

In hac æquatione $y = \frac{1}{3}x$.

PROBLEMA CLIX.

341. *Complere æquationem, in qua termini quidam deficiunt.*

Radix æquationis augenda est quantitate data.

Sit e. gr. æquatio $x^3 * - 23x - 70 = 0$.

$$\text{Fiat } x + 1 = y$$

$$\begin{array}{r} \text{erit } x = y - 1 \\ \quad x^2 = y^2 - 2y + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 = y^3 - 3y^2 + 3y - 1 \\ - 23x = \quad \quad - 23y + 23 \\ - 70 = \quad \quad \quad - 70 \\ \hline y^3 - 3y^2 - 20y - 48 = 0. \end{array}$$

Habetur hic æquatio completa, in qua $y = x + 1$.

SCHOLIUM.

342. *Idem problema solvi potest radicem æquationis quantitate data minuendo: sed cum hac ratione metuendum sit, ne radices veræ in falsas mutantur (S. 333) consultius est, ut radicem æquationis angeamus.*

PROBLEMA CLX.

343. *Secundum terminum ex æquatione tollere.*

Sit in æquatione $x^3 + px^2 - qx + r = 0$ tollendus secundus terminus px^2 .

Fiat

Fiat $t + x = y$

$$\begin{array}{r} \text{erit } x = y - t \\ x^2 = y^2 - 2ty + t^2 \\ \hline x^3 = y^3 - 3ty^2 + 3t^2y - t^3 \\ + px^2 = + py^2 + 2pty + pt^2 \\ \hline - qx = - qy + qt \\ + r = + r \end{array}$$

Ut secundus terminus tollatur, fieri debet

$$\underline{-3t - p = 0}$$

Unde erit $\underline{-3t = p}$

$$\frac{t = -\frac{1}{3}p}{3}$$

Quodsi fuerit $+px^2$, erit

$$\underline{-3t + p = 0}$$

$$\underline{-3t = -p}$$

$$\frac{t = +\frac{1}{3}p}{3}$$

Et in genere, si fuerit $x^m + px^{m-1}$ &c. & fiat $x = y - t$, erit

$$\frac{x^m = y^m - mty^{m-1} - 1 \text{ \&c.}}{+ px^{m-1} = + py^{m-1} \text{ \&c.}}$$

consequenter in casu primo

$$\underline{-mt - p = 0}$$

$$\underline{-mt = -p}$$

$$t = p : m$$

in casu autem altero

$$\underline{-mt + p = 0}$$

$$\underline{-mt = -p}$$

$$t = -p : m$$

Unde patet

Regula: Si terminus secundus sit positivus, augeatur; si privativus, minuatur radix quantitate cognita secun-

di termini per exponentem primi divisa.

Sit e. g. ex æquatione $x^3 - 8x^2 - x + 8 = 0$ tollendus medius terminus.

Fiat $x - 8 : 3 = y$

$$\begin{array}{r} \text{erit } x = y + 8 : 3 \\ x^2 = y^2 + 16y : 3 + 64 : 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 = y^3 + 8y^2 + 64y : 3 + 512 : 27 \\ -8x^2 = -8y^2 - 128y : 3 - 512 : 9 \\ -x = -y - 8 : 3 \\ 8 = + 8 \end{array}$$

$$\frac{y^3 * -67y : 3 - 880 : 27 = 0}{\text{In hac æquatione } y = x - 8 : 3}$$

COROLLARIUM I.

344. Quodsi ex æquatione quadratica affecta secundus terminus auferatur, ad puram reducitur, sicque ea alio adhuc modo resolvi potest. Si e. gr. $x^2 - 8x + 15 = 0$.

Fiat $x - 4 = y$

erit $x = y + 4$

$$\begin{array}{r} x^2 = y^2 + 8y + 16 \\ -8x = -8y - 32 \\ + 15 = + 15 \end{array}$$

$$\underline{y^2 - 1 = 0}$$

$$y = 1$$

Consequenter $x = 1 + 4 = 5$.

COROLLARIUM II.

345. Secundo termino sublato, æquationes cubicæ ad tres casus reducuntur. Nimirum

$$\begin{array}{l} x^3 * -px - r = 0 \\ x^3 * + px - r = 0 \\ x^3 * -px + r = 0 \end{array}$$

PROBLE-

PROBLEMA CLXI.

346. Ex æquatione terminum tertium tollere.

Si in æquatione $x^3 - 4x^2 + 4x - 6 = 0$

Fiat $x = y - m$

erit $x^2 = y^2 - 2my + m^2$

$$\begin{array}{r} x^3 = y^3 - 3my^2 + 3m^2y + m^3 \\ -4x^2 = -4y^2 + 8my - 4m^2 \\ + 4x = + 4y - 4m \\ - 6 = - 6 \end{array}$$

Quoniam æquatio sinistra dextræ æqualis; si tertius terminus deficere debet, talis assumendus est valor ipse m , ut sit

$$\begin{array}{r} 3m^2 + 8m + 4 = 0 \\ \text{erit ergo } m^2 + \frac{8}{3}m = -\frac{4}{3} \\ \frac{16}{9} \qquad \frac{16}{9} \\ \hline m^2 + \frac{8}{3}m + \frac{16}{9} = \frac{4}{9} \\ \hline m + \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \\ \hline m = -\frac{2}{3} \\ \text{Fiat ergo } x = y + \frac{2}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{erit } x^2 = y^2 + \frac{4}{3}y + \frac{4}{9} \\ \hline x^3 = y^3 + 2y^2 + \frac{4}{3}y + \frac{8}{27} \\ -4x^2 = -4y^2 - \frac{16}{3}y - \frac{16}{9} \\ + 4x = + 4y + \frac{8}{3} \\ - 6 = - 6 \\ \hline y^3 - 2y^2 + 130:27 = 0 \end{array}$$

En æquationem, in qua terminus tertius deficit, & $y = x - \frac{2}{3}$.

SCHOLIUM.

347. Eodem artificio in aliis quoque casibus utemur. Sed terminus quartus, quintus &c. hac methodo tolli nequeunt, quia radices aliores extrahendæ forent.

Wolffi Oper. Mathem. Tom. I.

PROBLEMA CLXII.

348. Ex æquatione terminum penultimum tollere, si secundus deficiat.

Pro quantitate incognita substituendus est terminus ultimus per y divisus.

Sit e. gr. in æquatione $x^3 - 3x + 1 = 0$ tollendus terminus antepenultimus $-3x$. Operatio talis erit

$$\begin{array}{r} x^3 = \frac{1}{y^3} \\ -3x = \frac{3}{y} \\ + 1 = + 1 \\ \hline (1 - \frac{3}{y} + \frac{1}{y^3} = 0 \\ \hline y^3 - 3y^2 + 1 = 0 \end{array}$$

PROBLEMA CLXIII.

349. Æquationem datam a fractionibus liberare.

Radix multiplicetur per factum ex omnibus denominatoribus fractionum occurrentium, aut per numerum, qui omnes denominatores metitur.

Exempla.

$$y^3 * - \frac{67}{3}y - \frac{880}{27} = 0$$

I	3	9	27
---	---	---	----

$$x^3 * - 201x - 880 = 0$$

In hac æquatione $x = 3y$.

$$x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{4}x - 64 = 0$$

I	12	144	1728
---	----	-----	------

$$y^3 - 8y^2 + 108y - 110592 = 0$$

In hac æquatione $y = 12x$.

PROBLEMA CLXIV.

350. Æquationem datam ab irrationalitate liberare.

T t Inter-

Interdum id fieri potest per multiplicationem; interdum per divisionem radicis. Neutra tamen regula universalis est.

Si radix fuerit quadrata, quæ tolli debet, radix æquationis multiplicatur per ipsam; si vero cubica aut altior quædam, per radicem cubicam ex quadrato quantitatis sub signo radicali tollendæ positæ, aut in genere per radicem ejusdem gradus, quæ tolli debet, sed ex quantitate sub signo radicali tollendæ posita ad gradum proxime inferiorem elevata. Interdum circumstantiæ singulares aliud suadent.

Exempla.

$$\begin{array}{rcccc} x^4 + 2ax^3 \sqrt{2} + 8abx^2 - a^3x \sqrt{8} - 2a^2b^2 & & & & \\ \hline 1 & \sqrt{2} & 2 & \sqrt{8} & 4 \end{array}$$

$$y^4 + 4ay^3 + 16aby^2 - 8a^3y - 8a^2b^2 = 0.$$

In hac æquatione $y = a \sqrt{2}$.

$$\begin{array}{rcccc} x^3 - ax^2 \sqrt[3]{2} + abx \sqrt[3]{32} - aab & & & & \\ \hline 1 & \sqrt[3]{4} & \sqrt[3]{16} & 4 & \end{array}$$

$$y^3 - 2ay^2 + 8aby - 4aab = 0$$

In hac æquatione $y = x \sqrt[3]{4}$

Divisio exemplis rectius, quam regulis docetur.

$$\begin{array}{rcccc} x^3 - 3x^2 \sqrt{3} * - 6 \sqrt{3} & & & & \\ \hline 1. & \sqrt{3}. & 3. & 3 \sqrt{3} & \end{array}$$

$$y^3 - 3y^2 * - 2 = 0$$

In hac æquatione $y = x \sqrt{3}$

$$\begin{array}{rcccc} x^3 - ax^2 \sqrt[3]{2} + abx \sqrt[3]{32} - a^2b & & & & \\ \hline 1 & \sqrt[3]{2} & \sqrt[3]{4} & 2 & \end{array}$$

$$y^3 - ay^2 + 2aby - \frac{1}{2}a^2b = 0$$

In hac æquatione $y = x \sqrt[3]{2}$.

$$\begin{array}{rcccc} x^3 - x^2 \sqrt{2} + 3\frac{1}{2}x - 3 \sqrt{2} & & & & \\ \hline 1 & \sqrt{2} & 2 & 2 \sqrt{2} & \end{array}$$

$$y^3 - y^2 + \frac{3}{4}y - \frac{3}{2} = 0$$

Quodsi ulterius fractiones tollere volueris: multiplicatio fieri debet per 2.

$$\begin{array}{rcccc} y^3 - y^2 + \frac{3}{4}y - \frac{3}{2} = 0 & & & & \\ \hline 1 & 2 & 4 & 8 & \end{array}$$

$$z^3 - 2z^2 + 7z - 12 = 0$$

In hac æquatione $z = 2y = 2x \sqrt{2}$.

PROBLEMA CLXV.

351. *Invenire utrum æquatio data habeat radices racionales, nec ne, & si quas habet, quenam ea sint.*

Cum æquationis terminus ultimus sit factum omnium radicum (§. 329), resolvatur is in suos factores & hi successive substituuntur pro x in æquatione data: in quibus enim casibus numeri positivi & negativi se mutuo destruunt, in iis substitutus est valor ipsius x .

Sit e. gr. $x^2 - 6x + 8 = 0$. Terminus ultimus 8 factores habet 2 & 4. Ponatur $x = 2$; erit

$$\begin{array}{r} x^2 = 4 \\ -6x = -12 \\ +8 = +8 \\ \hline 0 = 0 \end{array}$$

Est ergo 2 radix vera æquationis. Fiat quoque $4 = x$; erit

$$\begin{array}{r} x^2 = 16 \\ -6x = -24 \\ +8 = +8 \\ \hline 0 = 0 \end{array}$$

Est ergo 4 radix altera vera æquationis.

Sit $x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$. Factores termini ultimi 15 sunt 1, 3, 5.

Substituatur 1 pro x ; erit

$$\begin{array}{r} x = 1 \\ -3x^2 = -3 \\ -13x = -13 \\ +15 = +15 \\ \hline 0 = 0 \end{array}$$

Est ergo 1 una ex radicibus veris.

Substituatur porro 3 pro x ; erit

$$\begin{array}{r} x^3 = 27 \\ -3x^2 = -27 \\ -13x = -39 \\ +15 = +15 \\ \hline 0 = -24 \end{array}$$

Est ergo 3 nulla ex radicibus veris.

Substituatur ergo -3 pro x .

$$\begin{array}{r} x^3 = -27 \\ -3x^2 = -27 \\ -13x = +39 \\ +15 = +15 \\ \hline 0 = 0 \end{array}$$

Est itaque -3 radix falsa æquationis.

Substituatur denique 5 pro x ; erit

$$\begin{array}{r} x^3 = 125 \\ -3x^2 = -75 \\ -13x = -65 \\ +15 = +15 \\ \hline 0 = 0 \end{array}$$

Est ergo 5 radicum verarum altera.

Aliter.

Cum æquationes compositæ ex multiplicatione simplicium oriantur (§.329); si radix aliqua fuerit rationalis, æquatio per simplicem ex aliquo factore termini ultimi & x conflata divisibilis sit necesse est. Quare divisio hæc tentanda.

Sit data æquatio $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$. Factores termini ultimi sunt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12: unde æquationes simplices conflantur $x - 1 = 0$, $x + 1 = 0$; $x - 2 = 0$, $x + 2 = 0$; $x - 3 = 0$, $x + 3 = 0$; $x - 4 = 0$, $x + 4 = 0$; $x - 6 = 0$, $x + 6 = 0$; $x - 8 = 0$, $x + 8 = 0$; $x - 12 = 0$, $x + 12 = 0$. Divisio frustra tentatur per $x - 1$ & $x + 1$. Quare 1 nec radix falsa est, nec verarum una: succedit autem divisio per $x - 2$.

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x^2 - 10x + 24 \quad (x^2 - x - 12 \\ x - 2) x^3 - 2x^2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -x^2 - 10x \\ -x^2 + 2x \\ \hline -12x + 24 \\ -12x + 24 \\ \hline 0 \end{array}$$

Est adeo 2 una ex radicibus veris, cumque terminus ultimus sit 12 in quotiente, 8 & 12 non sunt in numero radicum. Divisio æquationis quadraticæ $x^2 - x + 12 = 0$ per $x - 3$ frustra tentatur; sed per $x + 3$ succedit.

$$\begin{array}{r} x + 3) \quad x^2 - x - 12 \quad (x - 4 \\ \quad \quad \quad x^2 + 3x \\ \hline \quad \quad \quad -4x - 12 \\ \quad \quad \quad -4x - 12 \\ \hline \quad \quad \quad 0 \end{array}$$

Est ergo 3 radix falsa æquationis &, ob $x - 4 = 0$, 4 verarum altera.

Similiter sit $x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$: erunt factores termini ultimi 1, 3, 5; consequenter divisores tentandi $x - 1 = 0$, $x + 1 = 0$; $x - 3 = 0$, $x + 3 = 0$, $x - 5 = 0$, $x + 5 = 0$. Tentetur divisio per $x - 1$.

$$\begin{array}{r} x - 1) \quad x^3 - 3x^2 - 13x + 15 \quad (x^2 - 2x - 15 \\ \quad \quad \quad x^3 - x^2 \\ \hline \quad \quad \quad -2x^2 - 13x \\ \quad \quad \quad -2x^2 + 2x \\ \hline \quad \quad \quad -15x + 15 \\ \quad \quad \quad -15x + 15 \\ \hline \quad \quad \quad 0 \end{array}$$

Est ergo 1 radicum verarum una. Divisio in æquatione quadratica per $x - 3$ non succedit: succedit tamen per $x + 3$.

Tt 2 $x + 3$

$$\begin{array}{r}
 x^2 - 2x - 15 \quad (x - 5) \\
 x^2 + 3x \\
 \hline
 -5x - 15 \\
 -5x - 15 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Est itaque 3 radix falsa, & ob $x - 5 = 0$, 5 verarum altera.

COROLLARIUM.

352. Ex modo allatis exemplis manifestum est, problema præfens hanc quoque admittere solutionem:

1. Numerus, quem radicem esse suspicamur, subducendus est ex coefficiente secundi termini.
2. Residuum multiplicandum est per illum ipsum numerum & factum ex coefficiente termini tertii subtrahendum.
3. Quod relinquitur, denuo per illum numerum multiplicetur; factum ex coefficiente termini tertii subtrahatur & ita porro.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0 \\
 -2 \quad + 2 \quad + 24 \\
 \hline
 -1 \quad -12 \quad 0 \\
 -2 \quad - \\
 \hline
 + 2 \quad + 24
 \end{array}$$

Quoniam 0 relinquitur, 2 est una radicem verarum.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0 \\
 -1 \quad + 2 \quad + 15 \\
 \hline
 -2 \quad -15 \quad 0 \\
 -1 \quad - \\
 \hline
 + 2 \quad + 15
 \end{array}$$

Est ergo 1 altera radicem verarum.

SCHOLIUM.

353. Ne radicem rationalium investigatio molesta accidat, consultum est, ut vel æquationem propositam in aliam transformemus,

in qua terminus ultimus divisores pauciores habet, vel duos numeros investigemus, intra quos radices continentur: quem in finem sequentia subnectimus problemata.

PROBLEMA CLXVI.

354. Æquationem propositam, in qua terminus ultimus plures admittit divisores, transformare in aliam, in qua terminus ultimus pauciores divisores habet.

Fiat $x = 1$, vel $x = -1$; vel $x = 2$, vel $x = -2$; vel $x = 3$, vel $x = -3$; vel $x = 4$, vel $x = -4$ &c. & his valoribus successive substitutis, observetur, quo in casu summa relinquat numerum pauciores factores habentem, quam terminus ultimus æquationis: eo enim numero radix æquationis vel augenda est, vel minuenda (§. 332).

Sit e. gr. $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$

$$\begin{array}{r}
 \text{Fiat } x = 1 \\
 \hline
 \text{erit } x^3 = 1 \\
 - 3x^2 = -3 \\
 - 10x = -10 \\
 + 24 = +24 \\
 \hline
 \text{Summa} = +12
 \end{array}$$

Cum 12 pauciores divisores admittat quam

24;

$$\begin{array}{r}
 \text{Fiat } x = y + 1 \\
 \hline
 \text{erit } x^2 = y^2 + 2y + 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 x^3 = y^3 + 3y^2 + 3y + 1 \\
 - 3x^2 = -3y^2 - 6y - 3 \\
 - 10x = -10y - 10 \\
 + 24 = +24 \\
 \hline
 y^3 * -13y + 12 = 0
 \end{array}$$

In hac æquatione est $y = x - 1$.

SCHO

SCHOLIUM.

355 Eadem æquatio $y^3 - 13y + 13 = 0$ habet radicem falsam -4 . Si enim hunc valorem pro y substituas, prodibit $-64 + 52 + 13 = 0$. Ergo $x = y + 1 = -3$. Reperitur adeo -3 radix falsa æquationis propositæ $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ prorsus ut supra (§. 350).

PROBLEMA CLXVII.

356. Invenire limites æquationis, hoc est, duas quantitates, intra quas radix continetur.

Sit $x^2 + px - q = 0$

erit $x^2 + px = q$

$px < q$ (§. 84 Arithm.).

$x < q:p$ (§. 182 Arithm.).

Similiter ob $x^2 + px = q$

$q > x^2$ (§. 84 Arithm.).

$\sqrt{q} > x$ (§. 246. 180 Arit.).

$x\sqrt{q} > x^2$ (§. 180 Arithm.).

px px add.

$x\sqrt{q} + px > x^2 + px$ (§. 90 Arithm.).

adeoque $(\sqrt{q} + p)x > q$ (§. 89 Arith.).

$x > q : (\sqrt{q} + p)$ (§. 182 Arithm.).

Sunt adeo limites æquationis $q:p$ & $q : (\sqrt{q} + p)$. Nempe radix minor esse debet quam $q:p$ & major quam $q : (\sqrt{q} + p)$.

Sit $x^2 - px + q = 0$

erit $x^2 + q = px$

$x^2 < px$

$x < p$

Similiter quia $x^2 = px - q$, adeoque differentia inter px & q positiva, erit

$px > q$

$x > q:p$

Sunt adeo limites æquationis p & $q:p$. Nempe radix minor est quam p & major quam $q:p$.

Sit $x^2 - px - q = 0$

erit $x^2 = px + q$

$x^2 > q$

$x > \sqrt{q}$

$x\sqrt{q} > q$

Ergo $px + x\sqrt{q} > px + q$ hoc est, $px + q < px + x\sqrt{q}$ adeoque $x^2 < px + x\sqrt{q}$

$x < p + \sqrt{q}$

Similiter $x^2 > px$

$x > p$

$px > p^2$

$px + q > p^2 + q$

$x^2 > p^2 + q$

$x > \sqrt{(p^2 + q)}$

Sunt adeo limites $p + \sqrt{q}$ & $\sqrt{(p^2 + q)}$. Nimirum radix minor esse debet quam $p + \sqrt{q}$; sed major quam $\sqrt{(p^2 + q)}$.

Sit $x^3 - qx + r = 0$

erit $x^3 + r = qx$

Ergo $qx > r$

$x > r:q$

Similiter $x^3 < qx$

$x^2 < q$

$x < \sqrt{q}$

Sunt adeo limites $r:q$ & \sqrt{q} .

Sit $x^3 + qx - r = 0$

erit $x^3 + qx = r$

$qx < r$

$x < r : q$

Similiter $r > x^3$

$r^{1:3} > x$

$r^{2:3} > x^2$

$xr^{2:3} > x^3$

$xr^{2:3} + qx > x^3 + qx$
 $> r$

$x > r : (r^{2:3} + q)$

Sunt adeo limites $r : q$, & $r : (r^{2:3} + q)$,

Sit $x^3 - px^2 + qx - r = 0$

erit $x^3 - px^2 = r - qx$

Quodsi ergo $x > p$, erit quoque $r > qx$, consequenter $x < r : q$. Sed si $p > x$; erit $qx > r$, consequenter $x > r : q$.

In utroque igitur casu limites sunt p & $r : q$.

Sit $x^3 - px^2 - qx + r = 0$

erit $x^3 + r = px^2 + qx$

$px^2 + qx > r$

$x^2 + qx : p > r : p$

$x^2 + qx : p + q^2 : 4p^2 > r : p + q^2 : 4p^2$

$x + q : 2p > \sqrt{(r : p + q^2 : 4p^2)}$

$x > \sqrt{(r : p + q^2 : 4p^2)} - q : 2p$

Similiter $px^2 + qx > x^3$

$px + q > x^2$

$q > x^2 - px$

$q + \frac{1}{4}p^2 > x^2 - px + \frac{1}{4}p^2$

$\sqrt{(q + \frac{1}{4}p^2)} > x - \frac{1}{2}p$

$x < \sqrt{(q + \frac{1}{4}p^2)} + \frac{1}{2}p$

Sunt adeo limites $\sqrt{(r : p + q^2 : 4p^2)}$

$- q : 2p$ & $\sqrt{(q + \frac{1}{4}p^2)} + \frac{1}{2}p$.

Sit $x^4 - qx^2 - rx - s = 0$

erit $x^4 - qx^2 = rx + s$

Ergo $x^4 > qx^2$

$x^2 > q$

$x > \sqrt{q}$

Similiter $x^4 - rx = qx^2 + s$

ergo $x^3 > r$

$x > r^{1:3}$

Tandem $x^4 - s = qx^2 + rx$

Ergo $x^4 > s$

$x > s^{1:4}$

$x^3 > s^{3:4}$

$x^3 s^{1:4} > s$

Similiter $x > q^{1:2}$ $x > r^{1:3}$

$xq^{1:2} > q$

$x^2 > r^{1:3}$

$x^3 q^{1:2} > qx^2$

$x^2 r^{1:3} > r$

$x^3 r^{1:3} > rx$

Ergo ob $x^4 = qx^2 + rx + s$

$x^4 > x^3 q^{1:2} + x^3 r^{1:3} + x^3 s^{1:4}$

$x > q^{1:2} + r^{1:3} + s^{1:4}$

Sunt adeo limites \sqrt{q} vel $r^{1:3}$ & $q^{1:2} + r^{1:3} + s^{1:4}$.

Eodem modo operandum est in casibus aliis.

SCHOLIUM.

357. In equatione $x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = 0$ factores termini ultimi sunt 1. 2. 3. 4.

6. 8. 12. 24. Limites reperiuntur $\sqrt{(\frac{24}{3} + \frac{25}{9}) - \frac{5}{3}} = \sqrt{\frac{97}{9}} - \frac{5}{3} = \frac{98 - 50}{30} = \frac{38}{30}$

$1\frac{1}{4}$ fere $\sqrt{(10 + \frac{9}{4})} + \frac{5}{2} = \sqrt{\frac{49}{4}} + \frac{5}{2} = \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{12}{2} = 6$. Maxima igitur

radicum non potest esse minor quam $1\frac{1}{4}$ debet tamen esse minor quam 5. Unde apparet divisionem tentandam esse per $x - 2$.

Quo

Quo facto reperitur $x = 2$ & æquatio reducitur ad quadraticam $x^2 - x - 12 = 0$ (§. 351). Unde radix vera altera $= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{37}$ (§. 143.) & radix falsa $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{37}$.

PROBLEMA CLXVIII.

358. Ex æquatione cubica radicem extrahere.

Æquationes cubicæ, sublato secundo termino, ad hos tres casus reducuntur (§. 345).

$$\begin{aligned} x^3 &= +px + q \\ x^3 &= -px + q \\ x^3 &= +px - q \end{aligned}$$

Fiat $x = y + z$

$$\text{erit } x^3 = y^3 + 3y^2z + 3z^2y + z^3$$

$$px = py + pz$$

Quamobrem in casu primo

$$y^3 + 3y^2z + 3z^2y + z^3 = py + pz + q$$

$$\text{Fiat } 3y^2z + 3z^2y = +py + pz$$

$$\text{erit } 3yz = p \quad (y+z)$$

$$z = p : 3y \quad (3y)$$

Erit porro $y^3 + z^3 = q$

$$\text{hoc est } y^3 + p^3 : 27y^3 = q^3$$

$$y^6 + \frac{1}{27}p^3 = qy^3$$

$$\frac{y^6 - qy^3}{\frac{1}{4}q^2} = -\frac{\frac{1}{27}p^3}{\frac{1}{4}q^2}$$

$$y^6 - qy^3 + \frac{1}{4}q^2 = \frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3$$

$$\left. \begin{aligned} y^3 - \frac{1}{2}q \\ \frac{1}{2}q - y^3 \end{aligned} \right\} = \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}$$

$$y^3 = \frac{1}{2}q \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}$$

$$y = \left(\frac{1}{2}q \pm \sqrt{\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Est nempe $y = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)}$ & $z = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q - \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)}$.

Ergo $y + z = x = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)} + \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q - \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)}$.

Eodem modo reperitur radix in casu altero $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3\right)}\right)} + \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q - \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3\right)}\right)}$.

Denique in casu tertio $x = \sqrt[3]{\left(-\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)} + \sqrt[3]{\left(-\frac{1}{2}q - \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)}$.

F. gr. Sit $x^3 = 6x + 40$: erit $p = 6$, $q = 40$, adeoque $\frac{1}{2}q = 20$, $\frac{1}{4}q^2 = 400$, $\frac{1}{27}p^3 = 2$, $\frac{1}{27}p^3 = 8$, consequenter $\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3 = 392$ & $\sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)} = \sqrt{392} = \sqrt{2 \cdot 196} = 14\sqrt{2}$. Unde $\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)} = 20 + 14\sqrt{2}$, adeoque $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)} = 2 + \sqrt{2}$. Quare per regulam primam $x = 2 + \sqrt{2} + 2 - \sqrt{2} = 4$.

Sit $x^3 = -3x + 36$. Quia $p = 3$, $q = 36$, adeoque $\frac{1}{2}q = 18$, $\frac{1}{4}q^2 = 324$, $\frac{1}{27}p^3 = 1$, $\frac{1}{27}p^3 = 1$, consequenter $\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3 = 325 = \frac{1300}{4}$ & $\sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3\right)} = 10\sqrt{\frac{13}{4}} = \frac{40}{4}\sqrt{3\frac{1}{4}}$. Unde $\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3\right)} = 18 + \frac{40}{4}\sqrt{3\frac{1}{4}}$, adeoque $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 + \frac{1}{27}p^3\right)}\right)} = \frac{3}{2} + \sqrt{3\frac{1}{4}}$. Quare per regulam secundam $x = \frac{3}{2} + \sqrt{3\frac{1}{4}} + \frac{3}{2} - \sqrt{3\frac{1}{4}} = 3$.

Sit $x^3 = 6x - 40$. Quoniam $p = 6$, $q = 40$, eodem modo, quo in casu primo, reperitur $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}q + \sqrt{\left(\frac{1}{4}q^2 - \frac{1}{27}p^3\right)}\right)} = -2 + \sqrt{2}$, adeoque $x = -2 + \sqrt{2} - 2 - \sqrt{2} = -4$.

SCHOLIUM.

359. Fquidem ex $20 + \sqrt{392}$ radix cubica extrahitur per regulas communes (§. 282 Arithm.): ut tamen appareat quomodo radix inveniri possit, si regulæ communes

com-

commode applicari nequeant, methodum generalem apponere libet, qua & in aliis casibus similibus utendum. Ceterum formulas illas extrahendi radicem ex æquatione cubica (§. 358) Cardani regulas vocat Cartesius (a), quia eas primus publicavit: ipse enim Cardanus inventionis laudem Scipioni Ferreo tribuit.

PROBLEMA CLXIX.

360. Extrahere radicem desideratam ex quantitate irrationali composita.

Sit ex binomio $3 + \sqrt{8}$ extrahenda radix quadrata. Ponamus eam esse $x + \sqrt{y}$, erit $x^2 + 2x\sqrt{y} + y = 3 + \sqrt{8}$.

$$\begin{array}{r} \text{Fiat } x^2 + y = 3 \qquad 2x\sqrt{y} = \sqrt{8} \\ \hline \text{erit } x^4 + 2x^2y + y^2 = 9 \qquad 4x^2y = 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4x^2y = 8 \\ \hline x^4 - 2x^2y + y^2 = 1 \end{array} \quad \text{Ext. Rad.}$$

$$\hline x^2 - y = 1$$

$$\hline x^2 = y + 1$$

Est vero etiam, ob $x^2 + y = 3$,

$$x^2 = 3 - y$$

$$\text{Quare } 3 - y = y + 1$$

$$\hline 3 = 2y + 1$$

$$\hline 2 = 2y$$

$$\hline 1 = y$$

$$\text{Ergo } x^2 = y + 1 = 2$$

$$\hline x = \sqrt{2}$$

Est ergo $x + \sqrt{y} = \sqrt{3 + \sqrt{8}} = 1 + \sqrt{2}$.

Sit similiter in problemate præcedente ex $20 + \sqrt{392}$ extrahenda radix cubica. Ponamus radicem esse $x + \sqrt{y}$, erit ejus cubus

$$x^3 + 3x^2\sqrt{y} + 3xy + \sqrt{y^3} = 20 + \sqrt{392}$$

$$\text{Fiat } 3x^2\sqrt{y} + \sqrt{y^3} = \sqrt{392}$$

$$\text{erit } 9x^4y + 6x^2y^2 + y^3 = 392$$

$$\text{Porro } x^3 + 3xy = 20$$

$$\begin{array}{r} x^6 + 6x^4y + 9x^2y^2 = 400 \\ 9x^4y + 6x^2y^2 + y^3 = 392 \text{ subtr.} \end{array}$$

$$x^6 - 3x^4y + 3x^2y^2 - y^3 = 8 \quad \text{Ext.R.}$$

$$\hline x^2 - y = 2$$

$$\hline x^2 - 2 = y$$

Substituto valore ipsius y in æquatione:

$$x^3 + 3xy = 20$$

$$\text{erit } x^3 + 3x^3 - 6x = 20$$

$$\text{hoc est } 4x^3 - 6x = 20$$

$$x^3 * - \frac{5}{4}x = 5$$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 4 & 8 \end{array} \quad (\S. 337).$$

$$z^3 * - 6z = 40$$

Si pro z substituaturs 4; erit $64 - 24 = 40$. Est ergo 4 radix hujus æquationis (§. 351), consequenter $x = z : 2 = 2$. Quare cum sit

$$x^2 - 2 = y$$

$$\text{erit } 4 - 2 = y$$

$$\hline 2 = y$$

Est ergo radix cubica ex $20 + \sqrt{392}$ extracta $2 + \sqrt{2}$.

Eodem modo operandum est in casibus aliis.

PROBLEMA CLXX.

361. Æquationem biquadraticam, in qua secundus terminus deficit, reducere ad cubicam.

• Sit æquatio biquadratica $x^4 + qx^2 + rx + f = 0$, ubi retinetur in omnibus terminis signum +, ut omnes casus repræ-

(a) Geom. Lib. II. p. m. 93. & 94.

repræsententur. Cum æquatio biquadratica ex multiplicatione duarum quadraticarum oriatur (§. 329); assumantur duæ quadraticæ $x^2 + yx + z = 0$ & $x^2 - yx + v = 0$, quæ in se invicem ductæ generabunt.

$$\begin{aligned} x^4 + zx^2 + yvx + vz = 0 \\ + vx^2 - yzx \\ - y^2x^2 \end{aligned}$$

Quoniam hæc æquatio eadem supponitur cum proposita; erit

$$\begin{array}{r} z + v - y^2 = q \quad yv - yz = r \quad vz = f \\ \hline q + y^2 = z + v \quad v - z = r : y \\ \hline q + y^2 - v = z \quad v - q - y^2 + v = r : y \\ \hline 2v = q + y^2 + r : y \\ \hline v = (q + y^2 + r : y) : 2 \end{array}$$

Substituatur valor ipsius v in æquatione $q + y^2 - v = z$, erit

$$\begin{aligned} q + y^2 - (q + y^2 + r : y) : 2 = z \\ \text{hoc est } z = (2q + 2y^2 - q - y^2 - r : y) : 2 \\ = (q + y^2 - r : y) : 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ergo } vz = \frac{(q + y^2 + r : y)}{2} \cdot \frac{(q + y^2 - r : y)}{2} \\ = \frac{q^2 + 2qy^2 + y^4 - r^2 : y^2}{4} = f \\ \hline \frac{q^2y^2 + 2qy^4 + y^6 - r^2 = 4fy^2}{y^6 + 2qy^4 + q^2y^2 - r^2 = 0} \\ \hline -4fy^2 \end{aligned}$$

Fiat $y^2 = t$, erit

$$\begin{aligned} t^3 + 2qt^2 + q^2t - r^2 = 0 \\ \hline -4ft \end{aligned}$$

PROBLEMA CLXXI.

362. Ex æquatione biquadratica radicem extrahere.

I. Si æquatio fuerit pura, e. gr.

$x^4 = a^2bc$: extrahatur primum radix quadrata, ut habeatur

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

$x^2 = a\sqrt{bc}$ & hinc denuo educatur radix quadrata. Reperietur $x = \sqrt{(a\sqrt{bc})}$

E. gr. Sit $x^4 = 32$; erit $x^2 = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, adeoque $x = 2\sqrt{2}$.

II. Si æquatio fuerit affecta,

1. Tollatur secundus terminus, si adfuerit (§. 343).

2. Reducatur æquatio ad cubicam (§. 361).

3. Inde extrahatur radix cubica (§. 358).

4. Hac data, ex æquationibus quarum ope biquadraticam ad cubicam reduximus, radices æquationis propositæ erui possunt.

E. gr. Sit $x^4 - 86x^2 + 600x - 851 = 0$; erit $q = -86, r = 600, f = -851$.

Jam cum æquatio cubica, ad quam ea reducenda, sit $t^3 + 2qt^2 + q^2t - r^2 = 0$:
 $\hline -4ft$

si in ea substituuntur valores quantitatum q, r, f , prodibit

$$\begin{aligned} t^3 - 172t^2 + 10800t - 360000 = 0 \\ \text{Hæc æquatio cum sit per } t - 100 \text{ divisibilis (§. 351); erit } t = 100, \text{ adeoque in problemate præcedente } y^2 = 100 \text{ \& hinc } y = 10. \end{aligned}$$

Hoc valore substituto in æquatione $\frac{q + y^2 - r : y}{2} = z$; reperitur z

$$= \frac{-86 + 100 - 600 : 10}{2} = \frac{46}{2} = 23;$$

Eodem valore ipsius y substituto in æquatione $v = \frac{q + y^2 + r : y}{2}$; invenitur

$$v = \frac{-86 + 100 + 600 : 10}{2} = \frac{74}{2}$$

$= 37$. Tandem valores quantitatum

V u y, z

y, z & v substituendi sunt in æquationibus quadraticis $x^2 + yx + z = 0$ & $x^2 - yx + v = 0$ & habebimus:

I. $x^2 + 10x - 23 = 0.$

$$\begin{array}{r} x^2 + 10x = 23 \\ \hline 25 \quad 25 \end{array}$$

$$x^2 + 10x + 25 = 48$$

$$x + 5 = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

$$x = 4\sqrt{3} - 5$$

II. $x - 10x^2 + 37 = 0$

$$\begin{array}{r} x^2 - 10x^2 = -37 \\ \hline 25 \quad 25 \end{array}$$

$$x^2 - 10x + 25 = -12$$

$$\begin{array}{l} x - 5 = \sqrt{-12} = 2\sqrt{-3} \\ 5 - x = \end{array}$$

$$x = 5 \pm 2\sqrt{-3}$$

Sunt ergo radices æquationis propositæ $4\sqrt{3} - 5$, $5 + 2\sqrt{-3}$ & $5 - 2\sqrt{-3}$

PROBLEMA CLXXII.

363. *Ex æquatione quacunque extrahere radicem per approximationem.*

Quamvis æquationum quadraticarum radices surdæ extrahi possint (§. 143), nec difficile sit inde ulterius radicem prope veram in fractionibus decimalibus elicere (§. 273 *Arithm.*): quoniam tamen methodus, quam nunc explicare intendimus, universalis est, ab exemplo facillimo æquationis quadraticæ ut ordiamur, consultum ducimus.

Sit $x^2 - 5x - 31 = 0$. Quoniam $x < 5 + \sqrt{31}$ & $> \sqrt{56}$, sive $x < 10$ & > 7 (§. 354): ponamus radi-

cem esse $8 + y$, ita ut y denotet fractionem, qua numerus assumptus radicem vel excedit, vel ab ea deficit: erit

$$\begin{array}{r} x^2 = 64 + 16y + y^2 \\ - 5x = -40 - 5y \\ \hline -31 = -31 \\ \hline -7 + 11y + y^2 = 0 \end{array}$$

Quoniam fractionum potentia continuo decrescunt & radix tantum desideratur prope vera, y^2 abjicitur: quo facto erit

$$\begin{array}{r} -7 + 11y = 0 \\ \hline y = \frac{7}{11} = \frac{6}{10} \text{ fere} = 0.6 \end{array}$$

Ergo $x = 8 + 0.6 = 8.6$

Ponamus $x = 8.6 + y$: erit

$$\begin{array}{r} x^2 = \frac{7396}{100} + \frac{172}{10}y + y^2 \\ - 5x = -\frac{430}{10} - 5y \\ \hline -31 = -31 \end{array}$$

$\frac{7396}{100} - \frac{430}{10} - 31 + \frac{172}{10}y - 5y = 0$
hoc est, reductione ad eandem denominationem facta, (quod in gratiam tyronum semel hic exhibere placuit)
 $7396 - 4300 - 3100 + (1720 - 500)y = 0$

$$-0.04 + 12.20y = 0$$

$$\begin{array}{r} 12.20y = 0.04 \\ \hline y = 0.04 : 1220 = 0.0032 \end{array}$$

Ergo $x = 8.6000 + 0.0032 = 8.6032$.

Ponamus $x = 8.6032 + y$, erit
 $x^2 = 7401505024 + 1720640000y + y^2$
 $- 5x = -4301600000 - 50000000y$
 $- 31 = -310000000$

$$-0.000094976 + 1220640000y = 0$$

$$\begin{array}{r} y = 0.000094976 : 1220640000 \\ = 0.0000077808. \end{array}$$

Ergo

Ergo $x = 8.6032000000 + 0.00000$
 $77808 = 8.603277808.$

Sit similiter ex æquatione cubica $x^3 + 2x^2 - 23x - 70 = 0$ extrahenda radix per approximationem. Ponamus denuo radicem esse $5 + y$ (numerus 5 assumitur vi limitum æquationis (§. 354)): quoniam termini, in quibus est y^2 & y^3 , omittuntur; non opus est, ut in transformatione æquationis exprimentur. Reperitur adeo

$$\begin{aligned} x^3 &= 125 + 75y. \dots \\ + 2x^2 &= 50 + 20y. \dots \\ - 23x &= -115 - 23y \\ - 70 &= -70 \\ \hline - 10 + 72y &= 0 \\ \hline y &= -\frac{10}{72} = 0.1 \end{aligned}$$

$$x^m = t^m + mt^{m-1}y$$

$$+ ax^{m-1} = at^{m-1} + (m-1).at^{m-2}y + \frac{m-1.m-2}{2}at^{m-3}y^2. \dots$$

$$+ bx^{m-2} = bt^{m-2} + (m-2).bt^{m-3}y + \frac{m-2.m-3}{2}bt^{m-4}y^2. \dots$$

$$+ cx^{m-3} = ct^{m-3} + (m-3).ct^{m-4}y + \frac{m-3.m-4}{2}ct^{m-5}y^2. \dots$$

&c. &c.

$$+ f = +f$$

$$\text{Fiat } t^m + at^{m-1} + bt^{m-2} + ct^{m-3} \text{ \&c.} = p$$

$$mt^{m-1} + (m-1)at^{m-2} + (m-2)bt^{m-3} + (m-3)ct^{m-4} \text{ \&c.} = q$$

$$\frac{m.m-1}{2}t^{m-2} + \frac{m-1.m-2}{2}at^{m-3} + \frac{m-2.m-3}{2}bt^{m-4} + \frac{m-3.m-4}{2}ct^{m-5} \text{ \&c.} = r$$

Quoniam termini, in quibus y ad plures dimensiones ascendit, ob parvitatem abjiciuntur, erit

$$p + qy + ry^2 = 0$$

Fiat ut in exemplis specialibus

$$\frac{p + qy = 0}{qy = -p}$$

$$\text{erit } \frac{p + qy = 0}{qy = -p}$$

$$y = -p : q$$

Ergo $x = 5 + 0.1 = 5.1$

Ponamus $x = 5.1 + y$: erit

$$x^3 = 132651 + 78030y. \dots$$

$$+ 2x^2 = 52020 + 20400y$$

$$- 23x = -117300 - 23000y$$

$$- 70 = -70.000$$

$$- 2.629 + 75.430y = 0$$

$$75430y = 2629$$

$$y = 2629 : 75430 = 0.0349$$

Ergo $x = 5.1 + 0.0349 = 5.1349$

Eodem modo progredi licet, quousque libuerit.

Nec difficile est eadem methodo regulam generalem investigare. Sit nempe $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + cx^{m-3} + dx^{m-4} + ex^{m-5} \text{ \&c.} + f = 0$. Ponamus esse $x = p + y$; erit

$$+ \frac{m.m-1}{2}t^{m-2}y^2. \dots$$

$$+ \frac{m-1.m-2}{2}at^{m-3}y^2. \dots$$

$$+ \frac{m-2.m-3}{2}bt^{m-4}y^2. \dots$$

$$+ \frac{m-3.m-4}{2}ct^{m-5}y^2. \dots$$

In applicatione regulæ hujus generalis eadem calculi instauratione opus est, qua in exemplis specialibus paulo ante usi sumus.

Quodsi vero regula desideretur, quæ celerius appropinquat, ex æquatione prima hunc in modum eruitur.

Quoniam $p + qy + ry^2 = 0$

erit $\frac{qy + ry^2}{y} = -p$ ($q + ry$)
 $y = -p : (q + ry)$

Sed $y = -p : q$, per regulam priorem.

Ergo $y = -p : (q - \frac{pr}{q}) = -pq : (q^2 - pr)$.

Vel quia $p + qy + ry^2 = 0$

erit $\frac{qy + ry^2}{y} = -p$

$\frac{qy + ry^2}{y} = -p : r$

$q^2 : 4r^2 + qy : r + y^2 = q^2 : 4r^2 - p : r$

$q : 2r + y = \sqrt{(\frac{1}{4}q^2 - pr)} : r$

Habetur adeo x , si valor ipsius y ad-
 jiciatur valori t , signo vel positivo, vel
 privativo, prout repertus fuerit.

SCHOLIUM.

364. *Duas regulas posteriores methodo
 ab hac diversa investigavit celeberrimus Hal-
 lejus (a), & eandem aliquot exemplis illus-
 travit. Quamvis vero usus earum ex ante al-
 latis exemplis manifestus esse videatur; non
 inconsultum tamen judicamus ut unum appo-
 namus.*

Sit $x^3 + 438x^2 - 7825x - 98508430 = 0$.

Fiat $x = t + y - 300 + y$; erit

$x^3 = 27000000t + 2700000ty + 900y^2 + y^3$

$+ax^2 = 39420000t + 262800ty + 438y^2$

$-bx = -2347500t - 7825y$

$-f = -98508430$

$-34435930t + 524975y + 1338y^2 = 0$

Est itaque $p = -34435930$, adeoque
 $-p = 34435930$, $q = 524975$, $r = 1338$.

Quare $y = -p : (q - pr : q) = 34435930 :$
 $(524975 + 46075274340 : 524975)$

$= 34435930 : 612741 = 56$,

consequenter $x = 300 + 56 = 356$.

Fiat jam $x = 356 + y$; erit

(a) In Transact. Anglican. n. 210. p. 136.

$x^3 = 45118016 + 380208y + 1068y^2 + y^3$
 $+ax^2 = 55510368 + 311856y + 438y^2$
 $-bx = -2785700 - 7825y$
 $-f = -98508430$

$-665746 + 684239y + 1506y = 0$.

Est itaque $p = -665746$, $q = 684239$,
 $r = 1506$. Quare $y = -p : (q - pr : q) =$
 $665746 : (684239 + 1002613476 : 684239)$
 $= 6657460 : 685704 = 0.9708$, conse-
 quenter $x = 356 + 0.9708 = 356.9708$.

Per regulam irrationalem radix in pluribus
 notis per duas operationes inveniri potest, quia
 rationali accuratior. Possunt quoque plures
 notae inveniri per rationalem, si operatio con-
 tinuetur.

COROLLARIUM.

365. Si $x^m - f = 0$ & fiat $x = t + y$; erit

$x^m - f = t^m + mt^{m-1}y + \frac{m.m-1}{2} t^{m-2}y^2$

&c. -f. Unde si fiat $t^m + mt^{m-1}y - f = 0$,
 erit $y = f - t^m : mt^{m-1}$.

Quae est regula per approximationem ex-
 trahendi radicem ex quavis æquatione pura.
 Si accuratior desideretur, fiat ut ante $t^m = p$,
 $mt^{m-1} = q$, $\frac{m.m-1}{2} t^{m-2} = r$; reperietur ut
 in problemate $y = -p : (q - pr : q)$. Unde
 apparet eandem regulam inservire radicem
 extractioni tum ex æquationibus puris, tum
 ex affectis.

PROBLEMA CLXXIII.

366. *Ex serie infinita radicem ex-
 trahere.*

Sit $v = ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5$ &c.

Fiat $x = hv + iv^2 + kv^3 + lv^4 + mv^5$
 $+ nv^6$ &c. erit (§. 95).

$x^2 = h^2v^2 + 2hiv^3 + i^2v^4 + 2ikv^5 + k^2v^6$
 $+ 2hkv^4 + 2hlv^5 + 2ilv^6$
 $+ 2hmv^6$

$x^3 = h^3v^3 + 3h^2iv^4 + 3hi^2v^5 + i^3v^6$
 $+ 3h^2kv^5 + 3h^2lv^6$
 $+ 6hikv^6$

$x^4 = h^4v^4 + 4h^3iv^5 + 6h^2i^2v^6$
 $+ 4h^3kv^6$

$x^5 =$	$h^5 v^5 + 4h^4 i v^6$	Substituantur valores modo inventi	in æquatione $0 = -v + ax + bx^2$		
$x^6 =$	$h^6 v^6$		$cx^3 + dx^4 + ex^5 + fx^6$ &c. erit		

$-v = -v$							
$+ ax =$	$+ ahv$	$+ aiv^2$	$+ akv^3$	$+ alv^4$	$+ amv^5$	$+ anv^6$	&c.
$+ bx^2 =$		$+ bh^2..$	$+ 2bhi..$	$+ bi^2..$	$+ 2bik..$	$+ bk^2..$	
				$+ 2bhk..$	$+ 2bhl..$	$+ 2bil..$	
						$+ 2bhm..$	
$+ cx^3 =$		$+ ch^3..$		$+ 3ch^2i..$	$+ 3chi^2..$	$+ lci^3..$	
					$+ 3ch^2k..$	$+ 3ch^2l..$	
						$+ 6chik..$	
$+ dx^4 =$				$+ dh^4..$	$+ 4dh^3i..$	$+ 6dh^2i^2..$	
						$+ 4dh^3k..$	
						$+ 4dh^3l..$	
$+ ex^5 =$					$+ eh^5..$	$+ 5eh^4i..$	
$+ fx^6 =$						$+ fh^6..$	

Jam cum æquatio ponatur nihilo æqualis, propterea quod v subducitur ex altero æquationis membro ipsi æquali; omnes terminos $v, v^2, v^3, v^4, v^5, v^6$ &c. in nihilum ductos concipere licet.

Fiat ergo in hac æquatione cujuslibet termini coefficientis nihilo æqualis, erit

$$\frac{ah - 1 = 0}{b = 1 : a} \quad \frac{ai + bh^2 = 0}{i = -bh^2 : a}$$

$$i = -b : a^3$$

$$\frac{ak + 2bhi + ch^3 = 0}{k = (-2bhi - ch^3) : a}$$

$$k = (+2b^2 - ac) : a^5$$

$$\frac{al + bi^2 + 2bhk + 3ch^2i + dh^4 = 0}{l = (-bi^2 - 2bhk - 3ch^2i - dh^4) : a}$$

consequenter ob

$$bi^2 = b^3 : 2bhk = (4b^3 - 2abc) : a^6$$

$$3ch^2i = -3bc : a^5 \quad dh^4 = d : a^4$$

$$l = -b^3 : a^7 - 4b^3 : a^7 + 2abc : a^7 + 3bc : a^6 - d : a^5$$

$$l = (5abc - 5b^3 - a^2d) : a^7$$

$$am + 2bik + 2bhl + 3chi^2 + 3ch^2k + 4dh^3i + eh^5 = 0$$

Ergo ob

$$2bik = (-4b^4 + 2abc) : a^8$$

$$2bhl = (10ab^2c - 10b^4 - 2a^2bd) : a^8 \quad eh^5 = e : a^3$$

$$3chi^2 = 3b^2c : a^7 \quad 3ch^2k = (6b^2c - 3ac^2) : a^7$$

$$m = (14b^4 - 21ab^2c + 6a^2bd + 3a^2c^2 - a^3e) : a^9$$

$$\text{Eodem modo reperitur } n = (-42b^5 + 84ab^3c - 28a^2bc^2 - 28a^2b^2d + 7a^3cd + 7a^3be - a^4f) : a^{11} \text{ \& ita porro.}$$

Quodsi tandem in æquatione assumpta $x = hv + iv^2 + kv^3 + lv^4 + mv^5 + nv^6$ &c. valores inventi coefficientium h, i, k, l, m, n &c. substituantur, prodibit radix quaesita

$$x = \frac{v}{a} - \frac{bv^2}{a^3} + \frac{2b^2 - ac}{a^5}$$

$$+ \frac{5abc - 5b^3 + a^2d}{a^7} v^4 +$$

$$\frac{14b^4 + 6a^2bd - 21ab^2c + 3a^2c^2 - a^3}{a^9} v^5$$

&c. in infinit.

CAPUT VI.

De Algebra ad Geometriam sublimiorem applicata.

DEFINITIO XX.

367. **P**er Geometriam sublimiorem intelligo eam Geometriæ partem, quæ de lineis curvis & solidis inde genitis tractat.

DEFINITIO XXI.

368. *Diameter* curvæ est recta AD rectas MM inter se parallelas bifariam secans in P. In specie *Axis* vocatur, si rectas æquidistantes ad angulos rectos fecet.

Tab. III. Fig. 36.

DEFINITIO XXII.

369. *Vertex curvæ* est punctum A, ex quo ducitur diameter.

DEFINITIO XXIII.

370. *Ordinatim applicata* sunt lineæ æquidistantes MM, quæ a diametro bifariam secantur. Earum dimidiæ PM vocantur *semiordinatæ*. Vocantur etiam *Semiordinatæ* lineæ QM, QM ex punctis curvæ M, M ad lineam AT positione datam ductæ ac inter se parallelæ.

Tab. V. Fig. 60.

DEFINITIO XXIV.

371. *Abscissa* AP est pars diametri vel alterius lineæ, ad quam curvæ refertur inter verticem aut aliud punctum fixum & semiordinatam PM intercepta. Quidam *sagittam* vocant.

Tab. III. Fig. 36.

SCHOLIUM.

372. *Abscissæ* nimirum a quovis puncto in linea positione data computari possunt, ad quam referuntur puncta curvæ, quemadmodum ex subsequentiis patebit.

DEFINITIO XXV.

373. *Diameter transversa* AB est recta, quæ utrinque intra curvas continuata rectas intra easdem æquidistantes MM bifariam secat.

Tab. III. Fig. 37.

DEFINITIO XXVI.

374. *Diameter conjugata* est recta, quæ alteri diametro æquidistantes bifariam secat.

DEFINITIO XXVII.

375. *Quantitates variabiles* sunt, quæ crescentibus aliis vel decrecentibus aut crescunt, aut decrescunt. E. gr. semiordinata PM & abscissa AP circuli sunt quantitates variabiles: una enim crescente crescit etiam altera.

Tab. III. Fig. 38.

Quantitates constantes sunt, quæ crescentibus aliis vel decrecentibus eadem manent.

Ita semidiameter circuli AC est quantitas constans: crescentibus enim abscissis & semiordinatis AP & PM semper eadem manet.

HYPOTHESIS VIII.

376. *Quantitates constantes primis Alphabeti literis indigentur* a, b, c, &c. *variabiles vero ultimis* z, y, x, &c. *Speciatim* x abscissam, y semiordinatam denotet, nisi aliud expresse moneatur.

DEFINITIO XXVIII.

377. *Curva Algebraica* est, in qua ratio abscissarum AP ad semiordinatas per æquationem algebraicam explicari potest. Sit exempli gr. in circulo

Tab. III. Fig. 36.

AB

AB = a, AP = x, PM = y, erit PB = a - x, consequenter ob PM² = AP · PB (§. 327. 377 Geom.), y² = ax - x². Vel sit PC = x, AC = a, PM = y; erit (§. 417 Geom.) MC² - PC² = PM², hoc est, a² - x² = y².

Tab. III. Fig. 38.

SCHOLIION I.

378. Dicuntur æquationes algebraicæ, quæ determinati sunt gradus, ita ut æquatio semper eadem maneat in singulis punctis curvæ.

SCHOLIION II.

379. Vulgo cum Cartesio (a) lineas algebraicas Geometricas vocant, quod eas tantum ad construenda problemata admittant, adeoque in Geometriam recipiant. Aliter vero nobis videtur, non refragantibus summis in re Geometrica arbitris Leibnitio atque Newtono (b).

DEFINITIO XXIX.

380. Curva transcendens est, quæ per æquationem algebraicam definiri nequit.

SCHOLIION.

381. Curvæ transcendentes ab aliis Cartesii exemplo dicuntur mechanicæ & ex Geometria ejiciuntur, aliter sentientibus viris summis Leibnitio atque Newtono. Invenit quoque Leibnitius novum æquationum transcendentium genus, quibus curvæ transcendentes definiuntur & quæ sunt gradus indefiniti, hoc est non constanter eadem in omnibus curvæ punctis (c).

DEFINITIO XXX.

382. Curvæ algebraicæ ejusdem gene-

(a) Lib. 2. p. m. 17. & seq.
 (b) Act. Erudit. Lips. A. 1708. p. 526.
 (c) Act. Erudit. Lips. A. 1684. p. 234. 235.

ris sunt, quarum æquationes ad eandem dimensionem assurgunt. Cum vero sola æquatio, quæ rectam definit, unius dimensionis esse possit, Curva primi generis vocatur, in qua æquatio ad duas dimensiones assurgit; si ad tres, curva secundi generis; si ad quatuor, curva tertii generis, &c.

E. gr. æquatio pro circulo est y² = ax - x², vel etiam a² - x² = y² (§. 377). Est ergo circulus curva primi generis. Similiter curva primi generis est, quæ definitur per æquationem ax = y². Sed curva secundi generis est, quam definit æquatio a²x = y³.

DEFINITIO XXXI.

383. Familia curvarum vocatur plurium curvarum diversi generis congeries, quæ omnes, per eandem æquationem indeterminati gradus, sed pro diversitate generis diversimode explicandi definiuntur.

E. gr. sit æquatio indeterminati gradus a^m - x^m = y^m. Si m = 2, erit ax = y². Si m = 3, erit a²x = y³; si m = 4, erit a³x = y⁴, &c. in infinitum. Omnes istæ curvæ dicuntur ejusdem familiæ.

SCHOLIION.

384. Æquationes, per quas curvarum familia definiuntur, cum transcendentibus non sunt confundendæ. Licet enim intuitu totius familiæ sint gradus indeterminati; cujuslibet tamen ex familia curvæ respectu gradum determinatum habent, cum æquationes transcendentes respectu ejusdem curvæ indefiniti gradus existant (§. 381).

COROLLARIUM.

385. Omnes adeo curvæ algebraicæ familiam quandam componunt, ex innumeris aliis constantem, quarum una quælibet infinita genera complectitur. Cum enim æquationes per quas curvæ definiuntur, ingre-

ingrediantur facta vel ex potentiis abscissarum & semiordinatarum in coefficientes datos, vel ex potentiis abscissarum in potentias semiordinatarum, vel ex meris quantitatibus datis, omnes vero æquationes nihilo æquales fieri possint (e. gr. si $ax = y^2$, erit $ax - y^2 = 0$); æquatio pro omnibus curvis algebraicis erit $ay^m + bx^n + cy^r x^s + df = 0$. Signum $+$ in omnibus terminis retinetur, quia in casibus singularibus infinitæ variationes occurrere possunt. Et, si plures potentie ejusdem indeterminatæ quantitatis, v. gr. x occurrunt, coefficientes termini in formula, v. gr. b explicatur per omnes ejus coefficientes & exponens dignitatis v. gr. n per omnes dignitatum exponentes.

DEFINITIO XXXII.

386. *Sectiones conicæ sunt lineæ curvæ, quæ ex coni sectione oriuntur.*

SCHOLIION.

387. *Sectiones conicæ præter circulum sunt tres; Parabola, Hyperbola & Ellipsis. Nos præcipuas earum proprietates, quæ scilicet frequentioris sunt usus, ex æquationibus eas definiendis per calculum Algebraicum eruemus, quia nobis propositum est, Algebrae ad Geometriam sublimiorem applicationem exemplis docere, licet non diffiteamur, communes earum proprietates una eademque opera demonstrari, si in solido seu in cono, ex quo secantur, considerentur.*

DEFINITIO XXXIII.

388. *Parabola est curva, in qua $ax = y^2$, hoc est, quadratum semiordinatæ æquatur rectangulo ex abscissa in rectam constantem, quæ axis Parameter, ab aliis Latus rectum dicitur.*

SCHOLIION.

389. *Hanc proprietatem parabola competere assumimus respectu axis: quod vero etiam ipsi competere debeat respectu cujuslibet diametri, inferius demonstrabitur.*

COROLLARIUM I.

390. Est ergo parabola curva primi generis & crescentibus abscissis crescunt semiordinatæ, consequenter curva in se non redit.

COROLLARIUM II.

391. Et in ea $x = y^2$: a atque $a = y^2$: x , hoc est, abscissa est tertia proportionalis ad parametrum & semiordinatam, parameter vero tertia proportionalis ad abscissam & semiordinatam.

COROLLARIUM III.

392. Porro $\sqrt{ax} = y$, hoc est, semiordinata est media proportionalis inter parametrum & abscissam.

COROLLARIUM IV.

393. Data itaque parametro AB describi potest parabola. Continuetur enim parameter AB in C & in B erigatur perpendicularis infra lineam AC continuanda in N. Ex centris ad libitum assumtis circino usque ad A aperto ducantur arcus, rectam BV in I, II, III, IV, V &c. rectam vero BC in 1, 2, 3, 4, 5 &c. interfecantes: erunt B1, B2, B3, B4, B5 &c. abscissæ, BI, BII, BIII, BIV, BV &c. semiordinatæ (§. 327 Geom.). Quare si lineæ B1, B2, B3 &c. ex recta BC in BN transferantur & in punctis 1, 2, 3 &c. normales applicentur 1I = B1, 2II = BII, 3III = BIII &c. curva per puncta I, II, III &c. transiens parabola est: BN vero ejus axis (§. 392). Elegantius parabola describitur, si sumto AX pro axe parabola & puncto A pro vertice fiat AB parametro æqualis & ducta recta CD, quæ rectam BX ad angulos rectos secet, describantur pro arbitrio circuli quotcunque transeuntes per B & axem secantes in P, P, P &c. erunt enim AP, AP, AP &c. abscissæ, PI = A1, PII = A2, PIII = A3 &c. semiordinatæ parabola (§. 327 Geom.).

Tab. III. Fig. 39.

Tab. XII. Fig. 118.

COROL-

COROLLARIUM V.

Tab. III. Fig. 39. 394. Quodlibet etiam punctum parabolæ geometricè determinari potest. E. gr. quæritur, utrum punctum M sit in parabola, necne. Demittatur ex M ad BN perpendicularis PM & fiat PN parametro AB æqualis. Super BN describatur semicirculus. Quod si enim is transeat per M; erit punctum M in parabola (§. 327. *Geom.* & §. 391 *Analys.*).

DEFINITIO XXXIV.

395. Focus est punctum axis F, in quo semiordinata FN æquatur semiparametro.

PROBLEMA CLXXIV.

Tab. III. Fig. 40. 396. Invenire distantiam Foci a vertice AF.

Sit $AF = x$, parameter $= a$, erit $FN = \frac{1}{2}a$ (§. 395), consequenter $\frac{1}{4}a^2 = ax$ (§. 387)

$$\frac{1}{4}a = x$$

Theorema. In Parabola distantia foci a vertice AF est ad parametrum in ratione subquadrupla, seu quarta pars parametri.

COROLLARIUM I.

397. Quoniam $y^2 = ax$ (§. 388): quadratum semiordinatæ PM est quadruplum rectanguli ex distantia foci a vertice in abscissam $\frac{1}{4}ax$ sive AF. AP.

COROLLARIUM II.

398. Invenitur adeo distantia foci a vertice AF, si ad abscissam quamcunque AP & dimidiam semiordinatam $\frac{1}{2}PM$ quærat tertia proportionalis (§. 327 *Geom.*). Est enim $\frac{1}{4}PM^2 = AP \cdot AF$ (§. 377 *Geom.*), consequenter $PM^2 = 4 AF \cdot AP$.

PROBLEMA CLXXV.

Tab. III. Fig. 40. 399. Determinare quantitatem rectæ FM ex foco F ad extremitatem semiordinatæ M ductæ.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

Sit $AP = x$. Quoniam $AF = \frac{1}{4}a$ (§. 396), erit $PF = x - \frac{1}{4}a$ vel $\frac{1}{4}a - x$, si $AF > PA$, consequenter

$$PF^2 = x^2 - \frac{1}{2}ax + \frac{1}{16}a^2$$

$$PM^2 = ax \quad (\text{§. 388})$$

$$FM^2 = x^2 + \frac{1}{2}ax + \frac{1}{16}a^2 \quad (\text{§. 417 } \textit{Geom.})$$

$$FM = x + \frac{1}{4}a.$$

Theorema. Recta FM ex foco F ad extremitatem semiordinatæ parabolæ ducta æquatur aggregato ex abscissa AP & distantia foci a vertice AF.

COROLLARIUM I.

400. Si quarta pars parametri ex A in f & F transfertur & per AD parallelæ quotcunque ipsi in punctis P normales MM aguntur, tandemque ex F intervallo Pf puncta M determinantur; curva per hæc puncta transiens est parabola.

COROLLARIUM II.

401. Potest ergo parabola etiam continuo Tab. III. Fig. 41. motu describi. Nimirum assumpta recta pro axe fiat $fA = AF = \frac{1}{4}a$. In A firmetur regula DB secans axem fD ad angulos rectos. Extremitati regulæ alterius EC alligetur filum, altero sui extremo in foco F fixum, quod sit $= AD + AF$. Quod si stylo ad regulam EC applicato regula EC juxta ductum alterius DB dextrorsum & dein sinistrorsum promoveatur; stylus parabolam designabit. Est enim constanter $FM = EM = Pf = x + \frac{1}{4}a$. consequenter punctum M in parabola (§. 399).

PROBLEMA CLXXVI.

402. Invenire rationem semiordinatarum in Parabola.

X x

Sint

Sint abscissæ x & v , semiordinatæ y & z ; erit $y^2 = ax$ & $z^2 = av$ (§. 388), consequenter

$$\frac{y^2 : z^2 = ax : av}{y^2 : z^2 = x : v} \quad (\text{§. 124})$$

$$y : z = \sqrt{x} : \sqrt{v}$$

Theorema. Quadrata semiordinatarum sunt inter se ut abscissæ: ipsæ autem semiordinatæ in ratione subduplicata abscissarum.

PROBLEMA CLXXVII.

Tab. III. Fig. 40. 403. *Determinare quantitatem rectanguli ex summa duarum semiordinatarum PM + pm in differentiam earundem Rm.*

$$\frac{PM + pm = \sqrt{ax} + \sqrt{av} \quad (\text{§. 402})}{mR = \sqrt{av} - \sqrt{ax} \quad 388).}{(PM + pm)mR = av - ax = a(v - x) = a \cdot pp}$$

Theorema. Rectangulum ex summa duarum semiordinatarum in differentiam earundem æquatur rectangulo ex parametro in differentiam abscissarum.

COROLLARIUM.

404. Est ergo parameter ad summam duarum semiordinatarum ut earundem differentia ad differentiam abscissarum. (§. 299 Arithm.)

PROBLEMA CLXXVIII.

405. *Determinare quantitatem rectanguli ex semiordinata in abscissam.*

Tab. III. Fig. 40. Quoniam $PM = \sqrt{ax}$ (§. 392); erit $PM \cdot AP = x\sqrt{ax} = \sqrt{ax^3}$ (§. 61). Quare cum sit $ax : \sqrt{ax^3} = \sqrt{ax^3} : x^2$, hoc est, $ax : x\sqrt{ax} = \sqrt{ax^3} : x^2$; erit $a : \sqrt{ax} = \sqrt{ax^3} : x^2$ (§. 124) hoc est $a : PM = PM \cdot AP : AP^2$.

Theorema. In parabola est rectangulum ex semiordinata in abscissam ad quadratum abscissæ ut parameter ad semiordinatam.

PROBLEMA CLXX.

406. *Determinare quantitatem rectanguli ex abscissa una in alteram.*

Sit abscissa una $= x$, altera $= v$; semiordinata una $= y$, altera $= z$; erit $x = y^2 : a$ & $v = z^2 : a$ (§. 391), consequenter $xv = y^2 z^2 : a^2$, adeoque $a^2 : y^2 = z^2 : xv$.

Theorema. In parabola quadratum parametri est ad quadratum semiordinatæ unius, ut quadratum semiordinatæ alterius ad rectangulum abscissarum,

PROBLEMA CLXXX.

407. *Determinare quantitatem chordæ AM.*

Sit Parameter $= a$, $AP = x$, erit $PM^2 = ax$ (§. 388). Quare cum $AP^2 = x^2$; erit $AM^2 = ax + x^2$ (§. 417 Geom.), $= (a + x)x = (a + AP) \cdot AP$.

Theorema. In parabola chorda est media proportionalis inter abscissam & compositam ex parametro & abscissa.

DEFINITIO XXXV.

408. Si TM curvam tangit in M , ducatur MR ad tangentem normalis; recta PT inter tangentem TM & semiordinatam PM intercepta *Subtangens* vocatur: quæ vero inter semiordinatam & normalem intercipitur PR , *Subnormalis* audit.

COROLLARIUM.

409. Est adeo TMR triangulum rectangulum (§. 91 Geom.), adeoque ob PM ad AR normalem (§. 329. 267 Geom.), $PR : PM = PM : PT$ & $PM : PT = MR : TM$, hoc est, in omni curva subnormalis est tertia proportionalis ad subtangentem & semiordinatam, & normalis est ad tangentem ut semiordinata ad subtangentem.

PRO-

PROBLEMA CLXXXI.

410. Determinare quantitatem subtangentis PT & subnormalis PR in Parabola.

Sit AP=x, MR ad tangentem TM perpendicularis=t, RA=v, erit PR=v-x, PM²=ax (§. 388) & (§. 417 Geom.)

$$\text{hoc est } \frac{ax = t^2 - v^2 + 2vx - x^2}{x^2 - 2vx + v^2 = 0} + ax - t^2$$

Eadem æquatio provenit, si recta TM parabolam secet, & quidem ad utrumque sectionis punctum. Quoniam itaque in puncto contactus duo illa puncta coincidunt; æquatio duas radices æquales habere debet, coincidentibus nimirum etiam abscissis per x designatis. Quare si fiat x=z seu x-z=0 & inde formetur æquatio x²-2zx+z²=0, duas æquales radices continens (§. 329); hæc cum antea inventa eadem esse debet, consequenter

$$-2z = -2v + a$$

Ergo ob z=x) $\frac{x = v - \frac{1}{2}a}{\frac{1}{2}a = v - x = PR}$

Porro (§. 406) PR: PM=PM:PT hoc est, $\frac{1}{2}a : \sqrt{ax} = \sqrt{ax} : PT$

Ergo PT=ax: $\frac{1}{2}a = 2x$.

Theorema. In parabola subtangens PT est abscissæ AP dupla; subnormalis vero PR parametri subdupla, adeoque constans.

COROLLARIUM I.

411. Quoniam TA=x & distantia foci a vertice AF= $\frac{1}{4}a$ (§. 396); erit TF= $\frac{1}{4}a + x$. Ergo recta FM ex foco F ad punctum contactus M ducta æquatur rectæ TF (§. 399), consequenter TFM triangulum æquicrurum.

COROLLARIUM II.

412. Quoniam PA=x & AF= $\frac{1}{4}a$ (§. 396), erit PF=x- $\frac{1}{4}a$, consequenter cum sit PR= $\frac{1}{2}a$ (§. 410), FR=x+ $\frac{1}{4}a$, adeoque FR=FM (§. 399)=TM (§. 411). Circulus igitur ex foco parabolæ F per punctum ejus M ductus subtangentem PT & subnormalem PR determinat, consequenter punctum T, ex quo ducitur tangens TM.

COROLLARIUM III.

413. Quodsi MG ducatur parallela axi AQ, erit angulus GMS=FTM (§. 233 Geom.). Cumque sit TF=FM (§. 411); erit FTM=FMT (§. 184 Geom.), consequenter FMT=GMS (§. 87 Arithm.).

Tab. III. Fig. 42.

PROBLEMA CLXXXII.

414. Ducta ON tangenti TM, & MG axi AQ parallela, determinare rationem segmentorum HF & FN.

Tab. III. Fig. 43.

Sit AP=AT=x, erit PM= \sqrt{ax} (§. 392) PT=IO (ob TO=MF=PI, (§. 257 Geom.))=2x (§. 410). Sit MF=PI=v, erit TI=v+2x, IA=v+x. Sit denique IQ=FG=t, erit OQ=OI+IQ=2x+t, QA=x+v+t, & hinc QN²=ax+av+at (§. 388). Porro (§. 268 Geom.).

$$OI : IF = OQ : QN$$

$$\text{h. e. } OI^2 : IF^2 = OQ^2 : QN^2$$

$$4x^2 : ax = (2x+t)^2 : QN^2$$

$$4x : a = (2x+t)^2 : \frac{a(2x+t)^2}{4x}$$

Est itaq; $\frac{a(x+v+t) = a(2x+t)^2 : 4x}{4x^2 + 4xv + 4tx = 4x^2 + 4tx + t^2}$

$$\frac{4x^2 + 4xv + 4tx = 4x^2 + 4tx + t^2}{4xv = t^2}$$

Tab. III. Fig. 40.

Quodsi LI dicatur t ; reperietur eodem modo $t^2 = 4xv$, reliquis manentibus iisdem. Unde patet, esse LI = IQ. Est vero (§. 268 *Geom.*).

OH:OL=HN:LQ & OH:OL=HF:LI adeoque HN : HF = LQ : LI (§. 167. 173 *Arithm.*). Sed LI = $\frac{1}{2}$ LQ = IQ, ^{per demonstrata.} Ergo HF = $\frac{1}{2}$ HN = FN (§. 149 *Arith.*).

Theorema. Si recta HN tangenti TM parallela ducatur, recta MG ex puncto contactus M cum axe parallela ducta eam bifariam secat in F.

COROLLARIUM I.

415. Est ergo MG diameter, HN ejus ordinata, MF abscissa (§. 368. 370. 371).

COROLLARIUM II.

416. Quoniam anguli recti ad G & I per constr. æquales sunt (§. 145 *Geom.*) & ob parallelismum, rectarum FG & OQ per construct. anguli F & O in $\triangle FNG$ & FOI æquales sunt (§. 233 *Geom.*), erit (§. 268 *Geom.*)

$$OI : FI = FG : GN$$

$$2x : \sqrt{ax} = \sqrt{4vx} : \sqrt{av}$$

Et quia (§. 417 *Geom.*) $FN^2 = FG^2 + GN^2$ erit $FN^2 = 4vx + av = (a + 4x)v$. Jam cum $FM = v$, & x respectu puncti M. constans; $a + 4x$ est parameter diametri, & quadratum etiam ad diametrum applicatæ æquale rectangulo ex parametro in abscissam.

COROLLARIUM III.

417. Recta ex foco ad verticem diametri M ducta est $\frac{1}{4}a + x$ (§. 399); diameter ergo parametri est rectæ illius quadrupla.

PROBLEMA CLXXXIII.

418. Si TM parabolam tangit in M

& MR fuerit ad eam normalis & ex foco F ducatur recta FM atque FO ad TM normalis, demittatur etiam ex R ad rectam FM normalis RH; determinare quantitatem segmentorum MH & FH, itemque rectæ OF.

Sit parameter a , $AP = x$, erit $FM = \frac{1}{4}a + x$ (§. 399), $PR = \frac{1}{2}a$ & $TP = 2x$ (§. 410). Cum TFM sit triangulum æquicrurum (§. 411), erit $TO = OM$ (§. 184 *Geom.*). Quoniam itaque $TM^2 = TP^2 + PM^2$ (§. cit.); erit $TM^2 = 4x^2 + ax$ (§. 388), consequenter $OM^2 = x^2 + \frac{1}{4}ax$, quod ex $FM^2 = \frac{1}{16}a^2 + \frac{1}{2}ax + x^2$ subductum relinquit $FO^2 = \frac{1}{16}a^2 + \frac{1}{4}ax = (\frac{1}{4}a + x) \frac{1}{4}a$ (§. 417 *Geom.*). Porro $MR^2 = PR^2 + PM^2$ (§. 417 *Geom.*) = $\frac{1}{4}a^2 + ax = (\frac{1}{4}a + x)a$. Jam cum in Triang. OFM & HMR anguli ad O & H recti per hypoth. sint inter se æquales (§. 145 *Geom.*) & ob parallelismum rectarum MR & FO (§. 256. *Geom.*) anguli F & M æquales (§. 233 *Geom.*); erit (§. 268 *Geom.*).

$$FM : OF = MR : MH$$

adeoq; $FM^2 : OF^2 = MR^2 : MH^2$ (§. 124) $(\frac{1}{4}a + x)^2 : (\frac{1}{4}a + x) \frac{1}{4}a = (\frac{1}{4}a + x)a : MH^2$ $\frac{1}{4}a + x : \frac{1}{4}a = (\frac{1}{4}a + x)a : MH^2$ (§. 124)

$$1 : \frac{1}{4}a = a : MH^2 \text{ (§. cit.)}$$

$$MH^2 = \frac{1}{4}a^2$$

$$MH = \frac{1}{2}a = PR$$

Ergo $HF = FM - HM = x = \frac{1}{4}a = FP$.

Theorema 1. Recta OF ex foco parabolæ F ad tangentem TM ducta est media proportionalis inter quartam partem parametri & rectam FM ex foco F ad punctum parabolæ M ductam.

Theorema

Tab.
XII.
Fig.
191

Theorema 2. Si MR fuerit ad parabolam in puncto M normalis & ex R ducatur ad rectam FM ex foco F in idem parabolæ punctum M ductum normalis RH; erit MH subnormali PR & HF portioni axis inter focum F & semiordinatam PM interceptæ æqualis.

PROBLEMA CLXXXIV.

419. *Invenire equationem ad parabolam externam, hoc est, punctis parabolæ M ad rectam AO, quæ ad axem AR in vertice A perpendicularis, relatis.*

Sit abscissa AN = x, semiordinata NM = y, parameter = a. Quoniam AN per hypoth. & PM (§. 368) perpendicularis ad AR; erit AN ipsi PM parallela (§. 256 *Geom.*). Cum ex eadem ratione NM sit parallela ipsi AR; erit AN = PM & NM = AP (§. 257 *Geom.*), consequenter PM = x, AP = y, atque ideo $x^2 = ay$ (§. 388).

DEFINITIO XXXVI.

420. *Ellipsis est linea curva, in qua quadratum semiordinatæ PM est ad rectangulum ex segmentis axis AP & PB ut parameter ad axem, hoc est, si AB = a, parameter = b, PM = y, AP = x, erit b : a = y² : ax - x² adeoque ay² = abx - bx².*

COROLLARIUM I.

421. Est ergo $y^2 = bx - bx^2 : a$, hoc est, quadratum semiordinatæ æquatur rectangulo ex parametro in abscissam, demto tamen alio rectangulo ex eadem abscissa in quartam proportionalem ad axem, parametrum & abscissam.

COROLLARIUM II.

422. Fiat $y = 0$, erit $bx - bx^2 : a = 0$, adeoque $abx = bx^2$ consequenter $a = x$. Pa-

tet adeo curvam secare AB in A & B, consequenter in se redire.

COROLLARIUM III.

423. Fiat $x = \frac{1}{2} a$. Erit $y^2 = \frac{1}{2} ab - a^2 b : 4a = \frac{1}{4} ab$, consequenter $y = CD = \sqrt{\frac{1}{4} ab}$. Ergo $DE = 2 \sqrt{\frac{1}{4} ab} = \sqrt{ab}$, hoc est, axis minor ED est medius proportionalis inter majorem AB & parametrum, consequenter parameter tertia proportionalis ad axem majorem & minorem.

COROLLARIUM IV.

424. Quia $ay^2 = abx - bx^2$

$$\text{erit } \frac{bx^2 = abx - ay^2}{bx^2 : (bx - y^2) = a}$$

Invenitur ergo axis parametro, abscissa & semiordinata datis, si fiat, 1^o. $b : y = y : \frac{y^2}{b}$

2^o. $x - \frac{y^2}{b} = \frac{bx - y^2}{b} : x = x : a$. Nimirum sit

axis AB positione datus & parameter AL ad eum perpendicularis. Datis abscissa AP & semiordinata PM, fiat AN = AQ = PM; ducta NF ipsi LQ parallela, erit AF = y² : b, consequenter FP = x - y² : b. Continuetur LA in G, factaque AH = FP & AG = AP ducatur GB ipsi HP parallela : erit AB = bx² : (bx - y²), adeoque axis quæsitus.

Tab. XII. Fig. 120.

COROLLARIUM V.

425. Quia $ay^2 = abx - bx^2$

$$\text{erit } ay^2 : (ax - x^2) = b \text{ consequenter } 1^{\circ}. x : y = y : \frac{y^2}{x} \text{ \& } 2^{\circ}. a - x : \frac{y^2}{x} = a : b.$$

Datis ergo axe AB, abscissa AP & semiordinata PM, ita invenitur parameter AG. 1^o. Fiat AI = PM & ex A per M ducatur recta AL. 2^o. In I erigatur perpendicularis LI; erit (§. 268. *Geom.*) ob AP : PM = AI : LI; LI = y² : x. 3^o. Producatum PM in O, donec PO = LI = y² : x, & ex B per O ducatur recta BG. 4. In A excutetur

Tab. IV.

Fig. 45.

Tab. III. Fig. 42.

Tab. III. Fig. 44.

perpendicularis GA = (ob BP: PO = BA: GA) $ay^2 : (ax - x^2) :$ quæ erit parameter AG.

COROLLARIUM VI.

$$426. y = \sqrt{\left(\frac{abx - bx^2}{a}\right)} = \sqrt{\left(\frac{bx}{a}(a - x)\right)}.$$

Datis itaque axe AB & parametro AG, cui-libet abscissæ BP semiordinata PN assignatur, si parametro AG axi AB ad angulos rectos iuncta ducatur GB & erecta perpendiculari PN, fiat PL = PH, tandemque super AL semicirculus describatur. Est enim AB (a): GA (b) = BP (x): PH (bx : a) & PN = √(AP. PL) = √((a - x), (bx : a) = √(bx - bx² : a).

PROBLEMA CLXXXV.

Tab. III. Fig.44. 427. Invenire distantiam foci a vertice AF.

Sit AB = a, parameter = b, AF = x, erit FR = ½ b (§. 395) &

$$\frac{1}{4} ab^2 = abx - bx^2$$

$$\frac{1}{4} ab = ax - x^2$$

$$\frac{x^2 - ax = -\frac{1}{4} ab}{\frac{1}{4} a^2 \qquad \frac{1}{4} a^2}$$

$$\frac{x^2 - ax + \frac{1}{4} a^2 - \frac{1}{4} a^2 = -\frac{1}{4} ab}{\frac{1}{2} a - x = \sqrt{\left(\frac{1}{4} a^2 - \frac{1}{4} ab\right)}}$$

$$\frac{1}{2} a - \sqrt{\left(\frac{1}{4} a^2 - \frac{1}{4} ab\right)} = x$$

Constructio. Ex B in L transferatur dimidia parameter, erit CL = ½ a - ½ b. In centro C erigatur perpendicularis CK occurrens semicirculo super AL descripto in K, erit CK = √(¼ a² - ¼ ab). Fiat itaque CF = CK; erit in F focus.

Aliter Quoniam √¼ ab = CD, (§.423) si intervallo DF = ½ a interfecetur AB in F, erit in F focus. Num CD² = ¼ ab & DF² = ¼ a². Ergo CF = √(¼ a² - ¼ ab), ut ante.

Æquatio secunda sequens suppeditat

Theorema. Si axis AB in foco F secetur; erit rectangulum ex segmentis axis AF. FB subquadruplum rectanguli ex parametro in axem seu quadrato axis dimidii majoris CD æquale.

COROLLARIUM.

428. Distantia foci a centro est = √(¼ a² - ¼ ab), hoc est, quadratum ejus est differentia quadratorum DC & AC.

PROBLEMA CLXXXVI.

429. Invenire rationem ordinarum PM & pm in ellipsi. Tab. III.

Sit AB = a, parameter = b, AP = x, Fig.44. PM = y, Ap = z, pm = v; erit

$$\left. \begin{aligned} y^2 &= bx - bx^2 : a \\ v^2 &= bz - bz^2 : a \end{aligned} \right\} (\S. 421).$$

$$\text{Ergo } y^2 : v^2 = bx - \frac{bx^2}{a} : bz - \frac{bz^2}{a}$$

$$\text{h. e. } y^2 : v^2 = ax - x^2 : az - z^2$$

seu PM² : pm² = AP. BP : Ap. pB
Theorema. In ellipsi quadrata semiordinatum sunt inter se ut rectangula ex axis segmentis.

COROLLARIUM I.

430. Est igitur etiam DC² : PM² = CB² : AP. PB, consequenter DC² : CB² = PM² : AP. PB (§. 173 Arithm.), hoc est, quadratum axis minoris est ad quadratum majoris ut quadratum semiordinate ad rectangulum ex axis segmentis.

COROLLARIUM II.

431. Sit CP = x, erit AP = ½ a - x & PB = ½ a + x, consequenter AP. PB = ¼ a² - x². Habemus adeo (§. 430)

$$\frac{1}{4} ab : \frac{1}{4} a^2 = y^2 : \frac{1}{4} a^2 - xx$$

hoc est b : a =

$$\frac{ay^2 = \frac{1}{4} a^2 b - bx^2}{\frac{1}{4} a^2 - xx}$$

$$y^2 = \frac{1}{4} ab - bx^2 : a$$

En æquationem aliam, quæ naturam ellipsis definit, abscissis a centro C computatis.

COROL-

COROLLARIUM III.

432. Sit $CD = d$, $AC = r$, $PC = x$, erit $AP = r - x$ & $PB = r + x$, consequenter $AP \cdot PB = r^2 - x^2 = AC^2 - PC^2$. Habemus ergo ut ante

$$d^2 : r^2 = y^2 : r^2 - x^2$$

unde $r^2 y^2 = d^2 (r^2 - x^2)$

$$y^2 = d^2 (r^2 - x^2) : r^2$$

En æquationem adhuc aliam, quæ itidem ellipsis naturam definit, abscissis denuo a centro C computatis, & qua in subsequentiis ob commoditatem utemur.

COROLLARIUM IV.

433. Crescentibus adeo abscissis x, semiordinatæ decreſcere debent. Quodsi tandem fiat $x = r$; erit $r^2 - x^2 = 0$, consequenter $y^2 = 0$, adeoque ellipsis cum axe tandem concurrat. Unde porro intelligitur, ellipsin esse lineam in se redeuntem.

PROBLEMA CLXXVII.

Tab. IV. Fig. 46. 434. Determinare quantitatem rectarum FM & fM ex utroque foco F & f ad idem peripheria punctum M ductarum.

Sint $FC = fC = c$, reliqua ut ante: erit $PC = \frac{1}{2}a - x$, $Pf = c + \frac{1}{2}a - x$, $pF = c - \frac{1}{2}a + x$, adeoque $PF^2 = c^2 - ac + \frac{1}{4}a^2 + 2cx - ax + x^2 = (\frac{1}{2}a - c)^2 + 2cx - ax + x^2$; $Pf^2 = c^2 + ac + \frac{1}{4}a^2 - 2cx - ax + x^2 = (\frac{1}{2}a + c)^2 - 2cx - ax + x^2$. Est vero (§. 430).

$$CB^2 : DC^2 = AP : PB : PM^2$$

$$\frac{1}{4}a^2 : \frac{1}{4}a^2 - c^2 = ax - xx : PM^2$$

Habemus adeo

$$PM^2 = ax - xx - \frac{4ccx}{a} + \frac{4ccxx}{aa}$$

$$Pf^2 = (\frac{1}{2}a - c)^2 + 2cx - ax + xx$$

$$FM^2 = (\frac{1}{2}a - c)^2 + 2cx - \frac{4c^2x}{a} + \frac{4c^2x^2}{aa}$$

$$FM = \frac{1}{2}a - c + 2cx : a$$

Porro

$$PM^2 = ax - xx - \frac{4ccx}{a} + \frac{4ccxx}{aa}$$

$$Pf^2 = (\frac{1}{2}a + c)^2 - 2cx - ax + xx$$

$$fM^2 = (\frac{1}{2}a + c)^2 - 2cx - \frac{4ccx}{a} + \frac{4c^2x^2}{aa}$$

$$fM = \frac{1}{2}a + c - 2cx : a$$

$$FM = \frac{1}{2}a - c + 2cx : a$$

$$fM + FM = a = AB$$

Theorema. Summa rectarum FM & fM ex utroque foco F & f ad idem peripheria punctum M ductarum æquatur axi majori AB.

COROLLARIUM I.

435. Datis ergo axibus conjugatis ellipsis facillime describitur. Determinatis enim focus F & f (§. 427), clavi in iis designantur & his filum circumligetur FMf axi majori AB æquale. Quodsi immisso stylo filum extendatur & circa clavos circumducatur, ellipsis designabitur.

COROLLARIUM II.

436. Immo eodem modo geometricè determinatur quodlibet punctum ellipseos M. Axis enim AB dividatur pro arbitrio utcumque in duas partes, & parte una ex foco F, altera ex foco f describitur arcus: duo enim hi arcus se mutuo secabunt in puncto M. Possunt autem una eademque opera quatuor simul determinari puncta, singula nempe in singulis quadrantibus AD, DB, BE & EA.

PROBLEMA CLXXXVIII.

437. Determinare quantitatem rectæ MR ex quovis ellipsis puncto M ad axem conjugatum DC perpendicularis.

Sit $MR = PC = v$, $AC = r$, erit $AP = r - v$ & $PB = r + v$. Sit $DR = z$, $DC = c$, erit $RC = PM = c - z$, consequenter (§. 430)

$$DC^2 :$$

Tab. III. Fig. 44

$$DC^2 : CB^2 = PM^2 : AP \cdot PB$$

$$cc : rr = z_2 - 2cz + c^2 : r^2 - v^2$$

$$c^2 : z^2 - 2cz + c^2 = r^2 : r^2 - v^2 \text{ (§.173 Arith.)}$$

$$2cz - z^2 : c^2 = v^2 : r^2 \text{ (§.193 Arithm.)}$$

$$2cz - z^2 : v^2 = c^2 : r^2 \text{ (§.173 Arithm.)}$$

$$DR \cdot RE : RM^2 = DC^2 : AC^2.$$

Theorema. Rectangulum ex segmentis axis conjugati est ad quadratum semiordinatæ ipsius ut quadratum axis conjugati ad quadratum axis majoris.

COROLLARIUM I.

438. Habent ergo ad axem conjugatum coordinatæ eandem relationem, quæ inter coordinatas ad axem majorem intercedit.

COROLLARIUM II.

439. Quoniam $v^2 = \frac{2r^2z}{c} - \frac{r^2z^2}{c^2}$ (§.437); si fiat $2r^2 : c = p$, erit $v^2 = pz - px^2 : 2c$. Est adeo p parameter axis conjugati (§.420). Quare parameter axis conjugati tertia proportionalis ad $2c$ & $2r$, seu ad axem conjugatum & axem majorem.

PROBLEMA CLXXXIX.

Tab. 440. *Determinare subtangentem PT & subnormalem PR in Ellipsi.*

Fig.47. Eadem prorsus methodo utendum, qua in parabola usi sumus. Nimirum sit parameter $= b$, axis major $= a$, $AP = x$, $PM = y$, $MR = t$, $RA = z$; erit $PR = z - x$, consequenter $PM^2 = t^2 - z^2 + 2zx - x^2$. Est vero etiam $PM^2 = bx - bx^2 : a$ (§.421). Quare

$$t^2 - z^2 + 2zx - x^2 = bx - bx^2 : a$$

$$at^2 - az^2 + 2azx - ax^2 = abx - bx^2$$

$$ax^2 - bx^2 + abx - 2azx + az^2 - at^2 = 0$$

$$x^2 + \frac{ab - 2az}{a - b} x + \frac{az^2 - at^2}{a - b} = 0$$

Cum ex superioribus constet, æquationem hanc duas habere debere radices æquales; ponatur ut supra (§.410) $x - v = 0$, erit $x^2 - 2vx + v^2 = 0$, æquatio eadem cum anteriore, consequenter

$$(ab - 2az) : (a - b) = -2v$$

$$ab - 2az = -2av + 2bv$$

$$ab + 2av - 2bv = 2az$$

$$\frac{1}{2}b + v - bv : a = z$$

Est vero $v = x$, per hypoth. Quare si x pro v substituatur, prodibit $z = \frac{1}{2}b + x - bx : a = AR$. Ergo $PR = \frac{1}{2}b + x - bx : a - x = \frac{1}{2}b - bx : a = (\frac{1}{2}ab - bx) : a$, quæ expressio hanc suppeditat analogiam:

$$a : b = \frac{1}{2}a - x : PR$$

Theorema. In ellipsi est ut axis primus ad parametrum ita distantia semiordinatæ a centro ad subnormalem

Porro $PR : PM = PM : PT$ (§.409).

$$\frac{\frac{1}{2}ab - bx}{a} : y = y : \frac{ay^2}{\frac{1}{2}ab - bx}$$

Est vero $ay^2 = abx - bx^2$ (§.420). Ergo $PT = (abx - bx^2) : (\frac{1}{2}ab - bx) = (ax - x^2) : (\frac{1}{2}a - x)$. Habemus adeo

$$\frac{1}{2}a - x : x = a - x : PT$$

$$PC : AP = PB : PT$$

Ergo $PB \cdot AP = CP \cdot PT$

Theorema. In ellipsi rectangulum ex segmentis axis æquatur rectangulo ex distantia semiordinatæ a centro in subtangentem.

Tandem $AT = PT - AP = (ax - x^2) :$

$$(\frac{1}{2}a - x) - x = (ax - x^2 - \frac{1}{2}ax + x^2) :$$

$$(\frac{1}{2}a - x) = \frac{1}{2}ax : (\frac{1}{2}a - x). \text{ Quare}$$

$$\frac{1}{2}a - x : \frac{1}{2}a = x : AT$$

$$PG : AC = AP : AT$$

Theorema. Ut distantia semiordinatæ a centro ad axem dimidium, ita abscissa ad portionem subtangentis inter verticem ellipsis & tangentem interceptam.

COROLLARIUM I.

441. Quia $PC : AC = AP : AT$; erit etiam $PC : AP = AC : AT$ (§. 173 *Arithm.*), consequenter $PC : PC + PA = AC : CA + AT$ (§. 190 *Arithm.*), hoc est, $PC : AC = AC : CT$.

COROLLARIUM II.

442. Est ergo $AC^2 = PC \cdot CT$ (§. 377 *Geom.*) hoc est quadratum dimidii axis AC æquatur rectangulo ex CT in PC.

COROLLARIUM III.

443. Crescētibus abscissis x , decrescit $\frac{1}{2}a - x$, consequenter ratio $\frac{1}{2}a - x : \frac{1}{2}a$ minuitur (§. 203 *Arithm.*). Abscissa igitur major ad AT rationem minorem habet quam minor.

COROLLARIUM IV.

444. Si $x = \frac{1}{2}a$, hoc est, quando AC sit abscissa, $\frac{1}{2}a - x = 0$, consequenter abscissa rationem infinitam habet ad AT, adeoque tangens TM cum subtangente TP nunquam concurrat. Est igitur axi parallela.

COROLLARIUM V.

445. Hinc vero ulterius liquet, quantitatem finitam AC respectu infinitæ pro nihilo habendam esse.

PROBLEMA CXC.

446. *Determinare quantitatem rectanguli ex subtangente PT in abscissam CP.*

Sit $PC = x$, $PT = t$, $AC = r$; erit $AP = r - x$ & $PB = r + x$, $CT = t + x$. Quoniam (§. 441)

$$PC : AC = AC : CT$$

$$x : r = r : t + x$$

$$\text{erit } tx + xx = r^2$$

$$tx = r^2 - x^2 = AP \cdot PB$$

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

Theorema. Rectangulum ex subtangente PT in abscissam CP æquatur rectangulo ex segmentis axis.

PROBLEMA CXCI.

447. *Determinare valorem subtangentis PT, abscissis a centro computatis.* Fig. 47.

Sit $AC = r$, $PC = v$, erit $PB = r + v$, $AP = r - v$, consequenter (§. 440)

$$PC : PB = AP : PT$$

$$v : r + v = r - v : t$$

$$tv = r^2 - v^2$$

Theorema. Rectangulum ex subtangente & distantia ordinatæ a centro æquatur differentiæ quadrati hujus distantæ a quadrato semiaxis transversi.

PROBLEMA CXCII.

448. *Determinare quantitatem subtangentis KE in axe conjugato.* Tab. IV. Fig. 47.

Si tangens TM continuetur, donec axi conjugato continuato in E occurrat, & ex M demittatur perpendicularis MK = PC (§. 157 *Geom.*) erit ob parallelismum rectorum KM & CT angulus T = EMK (§. 233 *Geom.*). consequenter (§. 267 *Geom.*)

$$TP : PM = MK : KE$$

$$\frac{r^2 - v^2}{v} : y = v : \frac{v^2 y}{r^2 - v^2}$$

Quodsi fiat $DC = c$, $DK = z$, erit $KC =$

$$PM = y = c - z \text{ \& } v^2 = \frac{2r^2 z}{c} - \frac{r^2 z^2}{c^2} \text{ (§. 436).}$$

$$\text{Hinc } r^2 - v^2 = (c^2 r^2 - 2r^2 cz + r^2 z^2) : c^2 \text{ \& } v^2 y = (2r^2 cz - r^2 z^2) (c - z) : c^2. \text{ Quare } v^2 y : (r^2 - v^2) = (2r^2 cz - r^2 z^2) (c - z) : (c^2 r^2 - 2r^2 cz + r^2 z^2) = (2r^2 cz - r^2 z^2) : (cr^2 - r^2 z) = (2cz - z^2) : (c - z)$$

Expressio itaque subtangentis in axe conjugato eadem, quæ in transverso.

Y y

PRO-

PROBLEMA CXCIH.

Tab. IV. Fig. 48.

449. Si recta HN tangenti TM parallela ducatur & punctum contactus M atque centrum C jungantur recta MC, que secat HN in G, determinare rationem rectarum HG & GN.

Sit AB=a, PM=y, PC=c, FG=KD=t, GI=KS=z, erit IF=HL=DS=t-z, HL²=t²-2tz+z². Opera nunc danda, ut HL² alia adhuc ratione exprimatur. Est itaque (§. 268 Geom.)

$$PM:PC=FG:FC$$

$$y:c=t:(t:y)$$

Et quia ΔTMP ∽ FOG (§. 233. & 267 Geom.), & GIH ∽ FOG (§. 268 Geom.); erit etiam TMP ∽ GIH consequenter (§. 267 Geom.)

$$PM:PT=GI:HI$$

$$y:\frac{ax-x^2}{c} = z:\frac{(ax-x^2)z}{cy} \quad (\S. 440)$$

Ponamus brevitatis gratia ax-x²=v; erit FL=HI=vz:cy. Ergo CL=FL+FC=tc:y+vz:cy=(tc²+vz):cy. Hinc AL=AC-CL= $\frac{1}{2}a-(tc^2+vz):cy=(\frac{1}{2}acy-tc^2-vz):cy$ & BL=AB-AL=a-($\frac{1}{2}acy-tc^2-vz):cy=(\frac{1}{2}acy+tc^2+vz):cy$. Est vero (§. 429)

$$AP:PB:LA:LB=PM^2:HL^2$$

$$v:\frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-2tc^2vz-v^2z^2}{c^2y^2} = y^2:HL^2$$

$$\text{Hinc } HL^2 =$$

$$\frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-2tc^2vz-v^2z^2}{c^2v} = t^2-2tz+z^2$$

$$\frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-2tc^2vz-v^2z^2}{c^2v} = t^2-2tz+z^2$$

$$\frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-v^2z^2}{c^2v} = t^2c^2v+z^2c^2v$$

$$\frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-t^2c^2v}{c^2v} = v^2z^2+c^2vz^2$$

$$\frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-t^2c^2v}{v^2+c^2v} = z^2$$

Quodsi jam KN dicatur z, reliqua maneant ut ante; reperietur eodem modo $z^2 = \frac{\frac{1}{4}a^2c^2y^2-t^2c^4-t^2c^2v}{v^2+c^2v}$, consequenter KN²=KS², adeoque & KN=KS.

Est vero (§. 268 Geom.) KN:KS=GN:HG. Ergo GN=HG.

Theorema. Si recta HN tangenti TM parallela ducatur, recta MC per contactum M & centrum ellipsis C transiens eam bifariam secat. Tab. IV. Fig. 49.

COROLLARIUM I.

450. Est ergo MC diameter, HN ejus ordinata (§. 368. 370).

COROLLARIUM II.

451. Cum vero parallela HN quamcunque aliam, & recta MQ itidem quamcunque aliam substituere liceat; omnes rectae per centrum transeuntes & in peripheria utrinque terminatae sunt diametri, ipsisque coordinatae sunt tangentibus parallelae.

COROLLARIUM III.

452. Est ergo etiam ECV diameter, consequenter MQ & EV sunt diametri conjugatae (§. 374).

PROBLEMA CXCIH.

453. Si ex diametri VE tangenti TM parallela extremitate V perpendicularis VR demittatur in axem AB; determinare quantitatem rectae RC.

Sit CA=r, CR=v, PT=t, PC=x; erit AR=r-v, RB=r+v, consequenter AP:PB=tx (§. 446), AR:RB=r²-v²=tx+x²-v² (§. 447). Quoniam VE ipsi TM parallela, per hypoth. erit MTC=TCV (§. 233 Geom.). Quare cum anguli ad P & R sint recti,

Tab. IV. Fig. 49.

per

per construct. erit (§. 267 Geom.),
 PM: RV=TP: RC. Hinc PM²: RV²
 =TP²: RC² (§. 124). Est vero etiam
 PM²: RV²=AP. PB: AR. RB (§.429).
 Ergo (§. 167 Arithm.)

$$AP. PB: AR. RB=TP^2: RC^2$$

$$tx: tx + x^2 - v^2 = t^2: v^2$$

$$tv^2x = t^3x + t^2x^2 - t^2v^2$$

$$v^2x = t^2x + tx^2 - tv^2$$

$$tv^2 + xv^2 = t^2x + tx^2$$

$$v^2 = tx$$

habet est, CR²=AP. PB.
 consequenter AP: CR=CR: PB.

PROBLEMA CXCIV.

Tab. 454. Determinare quantitatem se-
 IV. miordinata GH ad diametrum ellipsis
 Fig.49. MQ.

Ductis KI ipsi FD & KG ipsi AB
 parallelis, fiat CP=x, AC=r, PT=t,
 PM=y, KG=IL=m, LC=n. Erit
 (§. 268 Geom.)

$$CP: PM=CL: LG$$

$$x: y = n: \frac{ny}{x}$$

Porro ob parallelas TM & HN per
 const. ang. TSA=KHG (§. 233 Geom.)
 adeoque ob rectos ad I & K per const.
 T=HGK (§. 246 Geom.), & hinc (§.
 267 Geom.).

$$TP: PM=KG: KH$$

$$t: y = m: \frac{my}{t}$$

$$HI=KI-KH = \frac{ny}{x} - \frac{my}{t}$$

$$CI=CL+LI = n+m$$

$$HI^2 = \frac{n^2y^2}{x^2} - \frac{2mny^2}{tx} + \frac{m^2y^2}{t^2}$$

$$CI^2 = n^2 + 2mn + m^2$$

$$AI. IB=AC^2-CI^2=r^2-n^2-2mn$$

$$-m^2 (§. 432).$$

Est vero (§. 429)

$$AP. PB: AI. IB=PM^2: HI^2$$

$$r^2-x^2: r^2-n^2-2mn-m^2=y^2: HI$$

$$\text{Unde elicitur } HI^2 = \frac{r^2y^2-n^2y^2-2mny^2-m^2y^2}{r^2-x^2}$$

Quare

$$\frac{m^2y^2}{x^2} - \frac{2mny^2}{tx} + \frac{m^2y^2}{t^2} = \frac{r^2y^2-n^2y^2-2mny^2-m^2y^2}{r^2-x^2}$$

Sed $\frac{2mny^2}{tx} = \frac{2mny^2}{r^2-x^2}$ (§. 446). Ergo

$$\frac{n^2y^2}{x^2} + \frac{m^2y^2}{t^2} = \frac{r^2y^2-n^2y^2-m^2y^2}{r^2-x^2}$$

$$\frac{n^2}{x^2} + \frac{m^2}{t^2} = \frac{r^2-n^2-m^2}{r^2-x^2}$$

$$n^2 + \frac{m^2x^2}{t^2} = \frac{r^2x^2-n^2x^2-m^2x^2}{r^2-x^2}$$

$$\frac{m^2x^4}{t^2x^2} = \frac{r^2x^2-n^2x^2-m^2x^2}{r^2-x^2} - n^2$$

$$\frac{m^2x^4}{t^2x^2} = \frac{r^2x^2-n^2x^2-m^2x^2-r^2n^2+n^2x^2}{r^2-x^2}$$

$$= \frac{r^2x^2-m^2x^2-r^2n^2}{r^2-x^2}$$

hoc est, ob $t^2x^2=(r^2-x^2)^2$ (§. 446)

$$m^2x^4=(r^2x^2-m^2x^2-r^2n^2)(r^2-x^2)$$

$$=r^4x^2-r^2m^2x^2-r^4n^2-r^2x^4+m^2x^4+r^2n^2x^2$$

$$0=r^4x^2-r^2m^2x^2-r^4n^2-r^2x^4+m^2x^4+r^2n^2x^2$$

$$0=r^2-m^2-\frac{r^2n^2}{x^2}-x^2+n^2$$

$$m^2=r^2+n^2-x^2-\frac{r^2n^2}{x^2}=KG^2$$

Sit jam CM=v, erit (§. 268 Geom.)

$$CP: CM=CL: CG$$

$$x: v = n: (vn: x)$$

$$\text{Ergo } MG=MG-CG=v-vn: x \text{ \& } CQ$$

$$Yy^2 = GC$$

$$=GC + MC = v + vn : x \text{ MG.GQ} = v^2 - v^2 n^2 : x^2$$

Quodsi $v^2 - v^2 n^2 : x^2 = \text{MG QG}$ multiplices per $r^2 - x^2 = \text{CR}^2$ (§. 453) & $r^2 + n^2 - x^2 - r^2 n^2 : x^2 = \text{KG}^2$ per $v^2 = \text{CM}^2$; utrobique prodit $r^2 v^2 + n^2 v^2 - x^2 v^2 - r^2 n^2 v^2 : x^2$ Est itaque $\text{MG. QG. CR}^2 = \text{KG}^2. \text{CM}^2$, adeoque (§. 299 *Arithm.*) $\text{KG}^2 : \text{CR}^2 = \text{MG. QG} : \text{CM}^2$. Jam ob parallelas EV & HN , per *hypoth.* $\text{MCV} = \text{MGH}$ (§. 233 *Geom.*) & ob parallelas KG & RC , per *constr.* $\text{MGK} = \text{MCR}$ (§. *cit.*). Ergo $\text{KGH} = \text{RCV}$ (§. 91 *Arith.*), consequenter $\text{KG}^2 : \text{CR}^2 = \text{HG}^2 : \text{CV}^2$ (§. 267 *Geom.* & §. 260 *Arithm.*). Unde tandem habetur (§. 167 *Arithm.*) $\text{MG QG. CM}^2 = \text{HG}^2 : \text{CV}^2$.

Theorema. In ellipsi est quadratum semiordinate ad quadratum semidiametri conjugate ut rectangulum ex segmentis diametri ad quadratum semidiametri.

COROLLARIUM.

455. Sit $\text{MQ} = a$, $\text{EV} = c$, $\text{MG} = x$, $\text{HG} = y$, erit $\text{GQ} = a - x$, consequenter (§. 454)

$$\frac{ax - x^2 : \frac{1}{4} a^2 = y^2 : \frac{1}{4} c^2}{\frac{1}{4} c^2 ax - \frac{1}{4} c^2 x^2 = \frac{1}{4} a^2 y^2}{c^2 x - \frac{c^2 x^2}{a} = ay^2}$$

Fiat $\frac{c^2}{a} = b$, erit $c^2 = ab$.

Hinc $abx - bx^2 = ay^2$

Eadem ergo est relatio semiordinatarum ad diametros, quæ ad axem (§. 420) & diametri, parameter est tertia proportionalis ad diametros a & c .

SCHOLIUM.

456. Cum ex hac æquatione fundamentali reliquas ellipsis proprietates respectu axis deduxerimus; evidens est, omnes quoque istas proprietates ellipsi competere intuitu diametri.

PROBLEMA CXCVI.

457. *Determinare quantitatem rectæ FO ex foco F ad Tangentem Ellipsis TM perpendicularis.* Tab. XII. Fig. 119.

Sit RM ad tangentem TM normalis; erunt MR & OF inter se parallelæ (§. 256 *Geom.*), adeoque $\text{TR} : \text{RM} = \text{TF} : \text{FO}$ (§. 268 *Geom.*). Porro cum in triangulo rectangulo TMR semiordinata PM sit ad hypotenusam TR perpendicularis (§. 368. 370); erit $\triangle \text{PMR} \sim \triangle \text{TMP}$ (§. 329 *Geom.*), adeoque $\text{TR} : \text{RM} = \text{RM} : \text{PR}$ (§. 267 *Geom.*). Est ergo $\text{RM} : \text{PR} = \text{TF} : \text{FO}$ (§. 167 *Arithm.*), consequenter $\text{FO. RM} = \text{PR. TF}$ (§. 378 *Geom.*).

Theorema. Rectangulum ex subnormali PR in differentiam distantie foci a semiordinate atque subtangentis TF æquale est rectangulo ex normali MR & recta ex foco ad tangentem perpendiculari FO .

PROBLEMA CXCVII.

458. *Si in F fuerit focus ellipsis & MR ad eam normalis, HR vero normalis ad FM ex foco ad punctum contactus ductam; determinare quantitatem segmentorum MH & HF.* Tab. XII. Fig. 119.

Sit parameter $= b$, axis $= a$, distantia foci a centro $= c$, erit $\text{FM} = \frac{1}{2} a - c + 2cx : a$ (§. 434), $\text{PR} = (\frac{1}{2} ab - bx) : a$ (§. 440), $\text{AT} = \frac{1}{2} ax : (\frac{1}{2} a - x)$ (§. *cit.*) & $\text{AF} = \frac{1}{2} a - c$, consequenter $\text{TF} = \frac{1}{2} ax : (\frac{1}{2} a - x) + \frac{1}{2} a - c = ax : (a - 2x) + \frac{1}{2} a - c = (\frac{1}{2} a^2 - ac + 2cx) : (a - 2x)$. Ducatur FO ad tangentem TM normalis, erit OF parallela ipsi MR (§. 256 *Geom.*), adeoque angulus OFM ipsi HMR æqualis (§. 233 *Geom.*) & hinc

& hinc ob rectos ad O & H æquales (§.145 *Geom.*) reperitur (§.267 *Geom.*)

FM:FO=MR:MH hoc est, FM: $\frac{PR.TF}{MR}$ =MR:MH (§.457). Est itaque MH = (PR. TF) : FM, consequenter FM: TF=PR:MH. Quare

$$\frac{\frac{1}{2}a-c + \frac{2cx}{a} : \frac{\frac{1}{2}a^2-ac + 2cx}{a-2x} = \frac{ab-2bx}{2a} : MH}{a^2-2ac+4cx : \frac{\frac{1}{2}a^2-ac + 2cx}{a-2x} = ab-2bx : MH}$$

(§.184. *Arith.*)

$$\frac{a^2-2ac+4cx}{a-2x} : \frac{\frac{1}{2}a^2-ac + 2cx}{a-2x} = b : MH$$

(§.183. *Arith.*)

Est ergo MH = $\frac{1}{2}b$ (§.149 *Arith.*)

Theorema. Si MR fuerit ad ellipsin normalis & ex R ducatur ad rectam FM ex foco F in idem parabolæ punctum M ductam normalis HR; erit MH parametro dimidiæ æqualis.

DEFINITIO XXXVII.

459. *Hyperbola* est linea curva, in qua $ay^2=abx + bxx$, hoc est, $b:a=y^2 : ax + x^2$, seu quadratum semiordinatæ est ad rectangulum ex abscissa in rectam compositam ex eadem abscissa & recta quadam constante, quæ *Axis transversus*, vel *Latus transversum* audit, ut recta alia constans, quæ *axis Parameter* dicitur, ad axem transversum.

COROLLARIUM.

460. Est ergo etiam hic ut in ellipsi $y^2 = bx + bx^2 : a$, $b = ay^2 : (ax + xx)$, $a = bxx : (y^2 - bx)$ &c. nisi quod hic contraria signa occurrant (§.421 & seqq.).

DEFINITIO XXXVIII.

461. In hyperbola *Axis conjugatus* dicitur media proportionalis inter axem transversum & parametrum, quia talis est axis conjugatus in ellipsi (§.423).

DEFINITIO XXXIX.

462. Si axis transversus AB axi AX in directum jungitur & in C bifariam dividitur; punctum C *Centrum* appellatur.

Tab. III. Fig. 37.

PROBLEMA CXCVIII.

463. *Datis parametro & axe transverso AB, invenire distantiam foci a vertice AF.*

Sit parameter = b , AB = a , erit FN = $\frac{1}{2}b$ (§.395) & (§.459).

$$b : a = \frac{1}{4}bb : ax + xx$$

$$\frac{\frac{1}{4}abb = abx + bxx}{\frac{1}{4}ab = ax + xx}$$

$$\frac{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab = \frac{1}{4}aa + ax + xx}{\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab)} = \frac{1}{2}a + x}$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab)} = \frac{1}{2}a + x$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab)} - \frac{1}{2}a = x$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab)} - \frac{1}{2}a = x$$

Invenitur adeo x quærendo inter $\frac{1}{2}a$ & $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$ mediam proportionalem ac inde auferendo $\frac{1}{2}a$. Vel, quia $\sqrt{\frac{1}{4}ab} = CE$ (§.461), si fiat AG = EC, erit GC = $\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}ab)}$. Quare cum sit AC = $\frac{1}{2}a$, si ex centro C radio CG describatur arcus GF axem secans in F, erit AF = $\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}ab)} - \frac{1}{2}a$, adeoque in F focus.

Tab. III. Fig. 37.

COROLLARIUM I.

464. Est adeo distantia foci a centro FC = $\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}ab)}$. Quare si FC = c , erit CE = $c^2 - \frac{1}{4}a^2$.

COROLLARIUM II.

465. Quia $ax + xx = \frac{1}{4}ab$ & $ax + xx = AF$. FB, $\frac{1}{4}ab$ vero quadratum semiaxis conjugati (§.461), rectangulum ex AF in FB huic quadrato æquale est.

PROBLEMA CXCIX.

Tab. III. Fig. 40. 466. Invenire rationem semiordinatarum PM & pm. Sit axis transversus = a, parameter = b, AP = x, PM = y, Ap = v, pm = z; erit (§. 460).

$$y^2 : z^2 = bx + \frac{bxx}{a} : bv + \frac{bv^2}{a}$$

$$= ax + xx : bv + v^2 \text{ (§. 124).}$$

$$= (a + x)x : (b + v)v$$

Theorema. In hyperbola quadrata semiordinatarum sunt inter se ut rectangula ex abscissa in rectam quandam compositam ex abscissa & axe transverso.

COROLLARIUM.

467. Crescentibus adeo abscissis x, crescent quoque rectangula ax + x², consequenter & quadrata semiordinatarum y², adeoque semiordinata ipsa. Hyperbola igitur continuo ab axe recedit.

PROBLEMA CC.

468. Invenire rationem axis transversi ad axem conjugatum.

Si axis transversus = a, parameter = b, erit quadratum axis conjugati = ab (§. 461). Hoc ergo ad quadratum transversi, ut ab ad aa, hoc est, ut b ad a (§. 124).

Theorema. Quadratum axis conjugati est ad quadratum transversi, ut parameter ad axem transversum.

COROLLARIUM.

Tab. III. Fig. 37. 469. Quoniam b : a = PM² : AP.PB (§. 459); quadratum axis conjugati est ad quadratum transversi ut quadratum semiordinatae ad rectangulum ex abscissa in compositam ex abscissa & axe transverso.

PROBLEMA CCI.

470. Sint duae hyperbolae aequales, eandem parametrum, eundem axem transversum atque conjugatum habentes, quarum axes AX & BY cum axe trans-

verso communi AB in directum jacent. Ex focus F & f ad punctum M hyperbolae unius ducantur rectae FM & fM: determinare quantitatem harum rectarum.

Sit FC = fC = c, reliqua ut in precedentibus: erit AF = c - 1/2 a, Af = c + 1/2 a, PF = x - c + 1/2 a, Pf = c + 1/2 a + x, PF² = x² - 2cx + c² + ax - ac + 1/4 a², Pf² = c² + ac + 1/4 a² + 2cx + ax + x². Jam (§. 464) quadratum semiaxis conjugati CE = cc - 1/4 aa. Porro (§. 469)

$$AC^2 : CE^2 = AP : BP : PM^2$$

$$\frac{1}{4} aa : cc - \frac{1}{4} aa = ax + xx : PM^2$$

Est itaque

$$PM^2 = -ax - xx + 4c^2 x : a + 4c^2 x^2 : a^2$$

$$PF^2 = x^2 - 2cx + c^2 + ax - ac + \frac{1}{4} a^2$$

$$FM^2 = c^2 - ac + \frac{1}{4} a^2 - 2cx + \frac{4c^2 x}{a} + \frac{4c^2 x^2}{a^2}$$

$$FM = c - \frac{1}{2} a + 2cx : a$$

Similiter

$$PM^2 = -ax - x^2 + 4c^2 x : a + 4c^2 x^2 : a^2$$

$$Pf^2 = c^2 + ac + \frac{1}{4} a^2 + 2cx + ax + x^2$$

$$fM^2 = c^2 + ac + \frac{1}{4} a^2 + 2cx + \frac{4c^2 x}{a} + \frac{4c^2 x^2}{a^2}$$

$$fM = c + \frac{1}{2} a + 2cx : a$$

$$FM = c - \frac{1}{2} a + 2cx : a$$

$$fM - FM = a = AB$$

COROLLARIUM I.

471. Datis ergo axe transverso & distantia a vertice, hyperbola motu continuo ita describitur. Scilicet in focus F & f defigantur clavi aut paxilli, quorum alteri in F annectatur filum FMC, altero sui extremo C regula Cf alligatum, quae ipsum superet axe transverso AB. Altera regula extremitas perforata clavo f injiciatur & stilo ad filum applicato regula emoveatur.

Tab. IV. Fig. 50.

COROI-

COROLLARIUM II.

472. Iisdem datis, puncta quotcunque hyperbolæ determinantur, si ex foco *f* intervallo quocunque *AB* majore describatur arcus, factof *b* = *AB*, intervallo residuo *bm* ex *F* ducatur arcus alius priorem in *m* interfecans, erit enim ob *fm* - *Fm* = *AB*, *m* punctum hyperbolæ (§. 470) Vel commodius hyperbola ita describitur: Fiat *AB* axi transverso æqualis determinanturque foci *f* & *F* (§. 463.). Jungatur ipsif *O* recta *fK* sub angulo acuto quocunque & ex centro *f* radiis ipsa *fA* majoribus describantur arcus quotcunque concentrici secantes rectam *fK* in *I*, *II*, *III*, &c. Fiat *FL* = *AB* & ex foco *F* intervallis *LI*, *LII*, *LIII* &c. interfecentur arcus isti utrinque in *1*, *2*, *3*: erunt puncta *1*, *2*, *3* &c. in hyperbola. Est enim *fI* = *f1*, *fII* = *f2*, *fIII* = *f3* &c. (§. 40 *Geom.*). Sed *F1* = *LI*, *F2* = *LII*, *F3* = *LIII* &c. per *constr.* Ergo *f1* - *F1* = *fI* - *LI* = *AB*, *f2* - *F2* = *fII* - *LII* = *AB*, *f3* - *F3* = *fIII* - *LIII* = *AB* &c. consequenter puncta *1*, *2*, *3* &c. in hyperbola (§. 470).

PROBLEMA CCII.

473. Determinare situm rectæ *DE*, que per verticem *A* ipsi ordinatæ *Mm* parallela ducitur.

Sit *AP* = *x*, *PM* = *y*, parameter = *b*, axis transversus = *a*: erit *y*² = *bx* - *bx*²: *a* (§. 460). Quoniam in vertice *A* sit *x* = 0; erit etiam *y* = 0, consequenter *DE* tota extra hyperbolam cadit, eamque adeo tangit.

Theorema. Si recta *DE* per verticem *A* ordinatis *Mm* parallela ducatur; hyperbolam in *A* tangit.

DEFINITIO XL.

474. Si recta *DE* per verticem hyperbolæ *A* ordinatis *Mm* parallela ducatur, fiatque axi conjugato æqualis, nempe pars *DA* & *AE* semiaxi; præterea ex centro *C* per *D* & *E* agan-

tur rectæ *CF* & *CG*: rectæ hæ dicuntur *Asymptota hyperbolæ*.

COROLLARIUM I.

475. Quoniam (§. 268 *Geom.*) *CA*: *AE* = *CP*: *Pr* & *CA*: (*DA*) *AE* = *CP*: *PR*; erit *Pr* = *PR* (§. 177 *Arithm.*). Quare cum sit *PM* = *Pm* (§. 370); erit quoque *MR* = *mr* (§. 91 *Arithm.*).

COROLLARIUM II.

476. Si *AI* ducatur parallela ipsi *DC* & *AH* ipsi *CE*; erit *EA*: *ED* = *AI*: *DC* (§. 268 *Geom.*). Sed *EA* = $\frac{1}{2}$ *ED* (§. 474). Ergo *AI* = $\frac{1}{2}$ *DC* = $\frac{1}{2}$ *CE*. Et quoniam porro *EA*: *AD* = *EI*: *IC* (§. 268. *Geom.*); erit *EI* = *CI* = $\frac{1}{2}$ *EC*, consequenter *AI* = *CI* (§. 87).

DEFINITIO XLI.

477. Quadratum rectæ *CI* vel *AI* dicitur *Potentia hyperbolæ*.

PROBLEMA CCIII.

378. Determinare potentiam hyperbolæ.

Sit *CA* = $\frac{1}{2}$ *a*, *AE* = $\frac{1}{2}$ *c*, erit *CE* = $\sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc)}$ (§. 417 *Geom.*) adeoque *CI* = $\frac{1}{2} \sqrt{(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc)}$. Ergo *CI*² = $\frac{aa + cc}{16}$.

Theorema: Potentia hyperbolæ est decima sexta pars quadratorum axium conjugatorum, vel quarta pars quadratorum semiaxium conjugatorum.

COROLLARIUM.

479. Quoniam *cc* = *ab* (§. 461); erit *CI*² = $\frac{aa + ab}{16} = \frac{1}{4} a(\frac{1}{4}a + \frac{1}{4}b)$, hoc est poten-

tia hyperbolæ æquatur rectangulo ex quarta parte axis transversi in quartam partem aggregati ex axe transverso & parametro.

PROBLEMA CCIV.

480. Determinare differentiam quadratorum *PM* & *PR*.

Quoniam Fig. 51.

Tab. XII. Fig. 124.

Tab. IV. Fig. 51

Tab. IV. Fig. 51

Tab. IV.

Quoniam $DA = \sqrt{\frac{1}{4}ab}$ (§. 461) & $CP + \frac{1}{2}a + x$; præterea (§. 268 *Geom.*).

$$CA : AD = CP : PR$$

$$\frac{1}{2}a : \sqrt{\frac{1}{4}ab} = \frac{1}{2}a + x : PR$$

$$\text{crit } PR = \left(\frac{1}{2}a \sqrt{\frac{1}{4}ab} + x \sqrt{\frac{1}{4}ab} \right) : \frac{1}{2}a = \sqrt{\frac{1}{4}ab} + 2x \sqrt{\frac{1}{4}ab} : a. \text{ Quare}$$

$$PR^2 = \frac{1}{4}ab + bx + bx^2 : a$$

$$PM^2 \quad bx + bx^2 : a \text{ (§. 460)}$$

$$PR^2 - PM^2 = \frac{1}{4}ab = DA^2$$

Theorema. Si in hyperbola semiordinata PM producat, donec asymptoto in R occurrat; erit differentia quadratorum PM & PR æqualis quadrato semiaxis conjugati DA.

COROLLARIUM.

481. Crescente adeo semiordinata PM, decrefcit recta MR, adeoque hyperbola ad asymptotum propius accedit. Nunquam tamen cum ea concurrere potest, quia cum fit $PR^2 - PM^2 = DA^2$, fieri nequit, ut $PR^2 - PM^2 = 0$ evadat.

SCHOLIUM.

482. *En rationem, cur lineas CF & CG ἀσυμπτῶν δὲ seu non coincidentes vocaverint veteres.*

PROBLEMA CCV.

483. *Determinare quantitatem reſtangiuli ex MR in Mr.*

Sit $PR = z$, $PM = y$; erit $MR = z - y$, $Mr = z + y$, conſequenter $MR \cdot Mr = z^2 - y^2 = PR^2 - PM^2$.

Theorema. In hyperbola reſtangulum ex MR & Mr æquatur differentie quadratorum PR^2 & PM^2 .

COROLLARIUM.

484. Idem ergo reſtangulum æquale eſt quadrato ſemiaxis conjugati DA (§. 480), conſequenter omnia reſtangula eodem modo formata æqualia ſunt.

PROBLEMA CCVI.

485. Si QM & sm cum asymptoto CG,

qm & SM cum altera CF parallela ducantur; determinare rationem reſtangulorum QM , MS & qm , ms .

Sit $MR = mr = a$, $Rm = rM = b$, $QM = v$, $mq = z$. Erit (§. 268 *Geom.*)

$$RM : MQ = Rm : ms$$

$$a : v = b : (bv : a)$$

$$rm : mq = rM : MS$$

$$a : z = b : (bz : a)$$

Eſt ergo $MQ \cdot MS = bvz : a$ & $mq \cdot ms = bvz : a$, conſequenter $MQ \cdot MS = mq \cdot ms$.

Theorema. Si QM & ms cum asymptoto CG; qm vero & MS cum altera CF parallela ducantur; reſtangula ex QM in MS & qm in ms æqualia ſunt.

COROLLARIUM.

486. Quoniam $Cq = sm$ & $CQ = MS$ (§. 257 *Geom.*); etiam reſtangula ex Cq in qm & ex CQ in QM æqualia ſunt.

PROBLEMA CCVII.

487. *Determinare rationem reſtanguli ex qm in ms ad potentiam hyperbole ſeu AI^2 .*

Tab. IV. Fig. 51

Sit $mr = z$, $qm = y$, $AE = c$: erit, ob parallelas AE & Pr , ang. $E = r$, & ob parallelas AI & qm , ang. $I = q$ (§. 233 *Geom.*); conſequenter (§. 268 *Geom.*).

$$mr : qm = AE : AI$$

$$z : y = c : \frac{cy}{z}$$

Porro ob mR . $mr = AE^2$ (§. 484) erit (§. 299 *Arithm.*)

$$mr : AE = AE : mR$$

$$z : c = c : \frac{cc}{z}$$

Denique ob parallelas sm & CE , $o = x$ & ob parallelas DE & Rm , $x = y$ (§. 233 *Geom.*) adeoque $o = y$ (§. 87 *Arith.*).

Simi-

Similiter ob parallelas AI & CR, angulus AIE=CDE & ob parallelas DE & Rm, CDE=∠Rm (§. 233 Geom.). Ergo IAE=R (§. 87 Arithm.), consequenter (§. 267 Geom.)

$$AE : IE = mR : sm$$

$$c : \frac{cy}{z} = \frac{cc}{z} : \frac{ccy}{zz}$$

Quare sm.qm=ccyy:zz. Est vero etiam AI²=c²y²:z². Ergo sm.qm=AI².

Theorema. Si qm cum asymptoto CF parallela ducatur, rectangulum ex qm in Cq æquatur potentia hyperbolæ.

COROLLARIUM I.

488. Quare si fiat CI=AI=a, Cq=x & qm=y; erit a²=xy: quæ est æquatio naturam hyperbolæ intra asymptotos declarans.

COROLLARIUM II.

489. Datis ergo asymptotis positione & latere potentia hyperbolæ CI vel AI, si in una asymptotorum CG sumantur abscissæ quotcunque, inveniuntur totidem semiordinatæ & per eas puncta quotlibet hyperbolæ determinabuntur, querendo ad abscissas & latus potentia GI tertia proportionales (§. 271 Geom.). Nimirum sint AB & AC asymptoti, AD=DI=a latus potentia hyperbolæ. Sit AP=x. Ducatur FG parallela ipsi AC & PN parallela ipsi DI; erit PN=DI (§. 257 Geom.)=a. Ducatur AN secans DI in H: erit (§. 268 Geom.)

$$AP : PN = AD : DH$$

$$x : a = a : DH$$

adeoque DH=a²:x. Quare si fiat PM (=y)=DH: erit y=a²:x, consequenter yx=a², adeoque punctum M in hyperbola (§. 488).

COROLLARIUM III.

490. Quodsi abscissæ non computentur a centro C, sed ab alio quovis puncto L, dicaturque CL=b; erit Cq=b+x, consequenter a²=by+xy.

Wolphi Oper. Mathem. Tom. I.

PROBLEMA CVIII.

491. Determinare in hyperbola sub-tangentem PT & subnormalem PR.

Tab. III. Fig. 42.

Sit parameter=b, axis transversus=a, AP=x, PM=y, RM=z, RA=t, erit PR=t-x, PM²=z²-t²+2tx-x². Quare (§. 417 Geom.)

$$\frac{z^2 - t^2 + 2tx - x^2 = bx + bx^2 : a}{az^2 - at^2 + 2atx - ax^2 = abx + bx^2}$$

$$\frac{bx^2 + axz + abx + at^2 = 0}{-2atx - az^2}$$

$$\frac{x^2 + \frac{ab - 2at}{b+a}x + \frac{at^2 - az^2}{b+a} = az^2}{b+a}$$

Fiat jam ob rationes supra (§. 410) allatas x-v=0: erit x²-2vx+v²=0, & quia hæc æquatio eadem cum præcedente, habetur

$$\frac{ab - 2at}{b+a} = -2v$$

$$\frac{ab - 2at = -2bv - 2av}{ab + 2bv + 2av = 2at}$$

$$\frac{1}{2}b + \frac{bv}{a} + v = t$$

hoc est, quia x=v,

$$\frac{1}{2}b + bx : a + x = t = RA.$$

$$\text{Ergo } PR = \frac{1}{2}b + bx : a + x - x = \frac{1}{2}b + bx : a = (\frac{1}{2}a + x)b : a.$$

Theorema In hyperbola est ut axis transversus ad parametrum, ita aggregatum ex semiaxe transverso & abscissa ad subnormalem.

Porro (§. 409)

$$PR : PM = PM : PT$$

$$\frac{\frac{1}{2}a + x}{a} b : \sqrt{(bx + \frac{bx^2}{a})} = \sqrt{(bx + \frac{bx^2}{a})} : PT$$

$$\text{Reperitur ergo } PT = (abx + bx^2) : (\frac{1}{2}a + x)b = (ax + x^2) : (\frac{1}{2}a + x).$$

Z z

Theo.

Tab. XIII. Fig. 323.

Tab. IV. Fig. 51.

Theorema. In hyperbola est ut aggregatum ex semiaxe transverso & abscissa ad abscissam ita aggregatum ex integro axe transverso & abscissa ad subtangente[m].

$$\text{Denique } AT = (ax + x^2) : (\frac{1}{2}a + x) \\ -x = (ax + x^2 - \frac{1}{2}ax - x^2) : (\frac{1}{2}a + x) \\ = \frac{1}{2}ax : (\frac{1}{2}a + x).$$

Theorema. In hyperbola est ut aggregatum ex semiaxe transverso & abscissa ad abscissam, ita semiaxis transversus ad rectam AT inter verticem & tangentem intercepta[m].

PROBLEMA CCIX.

Tab. 492. *Ducta NO tangenti TM parallela, & ex centro C per contactum M recta CQ, qua NO secat in G, determinare rationem segmentorum GN & GO.*

Demittatur ex N perpendicularis NS ad axem AS continuanda in D, donec recta OD axi AS parallela occurrat in D. Ducantur porro HG ad ND & GF, MP, OL ad axem AS perpendiculares: erit GI ipsi PM parallela (§. 256 *Geom.*). Sit AB axis transversus = a, AP = x, PM = y, PC = $\frac{1}{2}a + x = p$, GI = HS = v, GF = HD = z, erit IF = DS = LO = z - v, & (§. 268 *Geom.*)

$$PM : PC = GI : IC$$

$$y : p = v : \frac{pv}{y}$$

Ob parallelas TM & GO (§. 233 *Geom.*) angulus K = T. & ob parallelas KI & OF per constr. angulus K = O, consequenter O = T. Quare cum præterea F & P. sint recti; erit (§. 267 *Geom.*)

$$PM : PT = GF : FO$$

$$y : \frac{ax + xx}{\frac{1}{2}a + x} = z : \frac{(ax + xx)z}{(\frac{1}{2}a + x)y}$$

Ponatur brevitatis gratia $ax + xx = q$ & $\frac{1}{2}a + x = p$ ut ante; erit $FO = qz : py$. Ergo $LC = IC - FO = pv : y - qz : py = (p^2v - qz) : py$ & $LA = LC - AC$

$$= (p^2v - qz - \frac{1}{2}apy) : py, LB = LC + CB = (p^2v - qz + \frac{1}{2}apy) : py. \text{ Est vero (§. 466)}$$

$$AP. PB : AL. LB = PM^2 : OL^2 \\ q : \frac{p^4v^2 - 2p^2qzv + q^2z^2 - \frac{1}{4}a^2p^2y^2}{p^2y^2} = y^2 : OL^2$$

Quare

$$OL^2 = \frac{p^4v^2 - 2p^2qzv + q^2z^2 - \frac{1}{4}a^2p^2y^2}{p^2q}$$

Jam $yy = (ax + xx) b : a$ (§. 459). Cum itaque posuerimus $ax + xx = q$; $yy = bq : a$. Hoc valore in expressione ipsius OL^2 substituto habetur

$$OL^2 = \frac{p^4v^2 - 2p^2qzv + q^2z^2 - \frac{1}{4}ap^2bq}{p^2q}$$

Enim vero $LO^2 = z^2 - 2zv + v^2$. habemus adeo $z^2 - 2zv + v^2 = \frac{p^4v^2 - 2p^2qzv + q^2z^2 - \frac{1}{4}ap^2bq}{p^2q}$

$$p^2qz^2 - 2p^2qzv + p^2qv^2 = p^4v^2 - 2p^2qzv + q^2z^2 - \frac{1}{4}ap^2bq$$

$$\frac{1}{4}ap^2bq + p^2qv^2 - p^4v^2 = q^2z^2 - p^2qz^2$$

$$z^2 = \frac{\frac{1}{4}ap^2bq + p^2qv^2 - p^4v^2}{q^2 - p^2q}$$

Quodsi HN dicatur z & calculus eodem modo instituat; reperietur denuo $z^2 = \frac{\frac{1}{4}ap^2bq + p^2qv^2 - p^4v^2}{p^2 - p^2q}$

Unde liquet esse $HN^2 = GF^2 = HD^2$, consequenter $HN = HD$. Quoniam igitur (§. 268 *Geom.*) $HN : HD = NG : GO$; erit $NG = GO$.

Theorema. Recta CQ ex centro C per contactum M ducta dividit rectas NO tangenti TM parallelas bifariam.

COROLLARIUM.

493. Est itaque CQ diameter, NO ordinatim ad eam applicata (§. 368); MC vero est semidiameter transversa.

PROBLEMA CCX.

Tab. V. Fig. 53. 494. Ductis duabus rectis Hm & mK ex eodem hyperbolæ puncto m , utrinque in asymptotis CQ & CT terminatis, itidemque duabus aliis LN & NO prioribus parallelis; determinare rationem rectangulorum $Hm.mK$ & $LN.NO$.

Ducantur ordinatæ ad axem utrinque usque ad asymptotos continuandæ Rr & QT .

Sit $Rm=y$, $QN=z$, $TN=t$. Quoniam $Rm.mr=QN.NT$ (§. 484); erit (§. 299. *Arithm.*)

$$Rm : QN = TN : mr$$

$$y : z = t : \frac{tz}{y}$$

Sit porro $Hm=a$, $mK=b$. Quoniam ob parallelas mr & NT , angulus $r=T$ & ob parallelas Km & NO , $K=O$ (§. 233 *Geom.*) erit (§. 267 *Geom.*)

$$rm : Km = TN : NO$$

$$\frac{tz}{y} : b = t : \frac{by}{z}$$

Ob similem rationem, nempe similitudinem $\triangle\triangle QLN$ & RHm

$$Rm : Hm = QN : LN$$

$$y : a = z : \frac{az}{y}$$

Ergo $LN.NO=abzy$; $zy=ab$. Est vero etiam $Hm.mK=ab$. Sunt igitur duo ista rectangula æqualia.

Theorema. Si intra asymptotos hyperbolæ ex ejus puncto m ducantur utcumque duæ rectæ Hm & mK & iis aliæ duæ parallelæ LN & NO ; erit $Hm.mK=LN.NO$.

Idem invenitur, si ductæ rectæ Hmk agatur parallela LN_o . Nempe in hoc etiam casu $Hm.mk=LN.No$.

COROLLARIUM.

495. Omnia igitur rectangula ex rectis

eidem Hk vel duabus Hm & mK parallelis eodem modo formata inter se æqualia sunt.

PROBLEMA CCXI.

Tab. V. Fig. 53. 496. Si recta Hk utcumque intra asymptotos CQ & CT ducatur determinare rationem segmentorum HE & mk inter hyperbolam & asymptotos interceptorum.

Ducantur per E & m rectæ IG & Rr ad axem normales, fiatque $Rm=a$, $IE=b$, $EG=c$, $Hm=x$, $mk=y$. Quia $IE.EG=Rm.mr$ (§. 484); erit (§. 299 *Arithm.*)

$$mR : IE = EG : mr$$

$$a : b = c : \frac{bc}{a}$$

Porro ob IG ipsi Rr parallelam (§. 268 *Geom.*)

$$mR : Hm = IE : EH$$

$$a : x = b : \frac{bx}{a}$$

$$rm : km = EG : Ek$$

$$\frac{bc}{a} : y = c : \frac{ay}{b}$$

Est itaque $Ek.EH=abxy$; $ab=xy$ $Hm.mk$. Quare

$$Ek : mk = mH : HE$$

$Ek-mk : mk = mH-HE : HE$ (§. 193 *Arithm.*)

h. e. $Em : mk = Em : HE$.

consequenter $mk = HE$ (§. 177 *Arithm.*)

Theorema. *Si inter asymptotos recta Hk utcumque ducatur, segmenta HE & mk inter hyperbolam & asymptotos utrinque intercepta æqualia sunt.

COROLLARIUM I.

497. Quando fit $Em=0$; recta Hk hyperbolam tangit. Tangens adeo FD inter asymptotos intercepta in contactu V bifariam dividitur.

COROLLARIUM II.

498. Rectangulum itaque ex segmentis Hm & mk rectæ tangenti FD parallela æquatur quadrato tangenti dimidiæ DV (§. 495).

PROBLEMA CCXII.

499. Determinare relationem semior-
dinatæ PM ad diametri abscissam AP.

Tab.
V.
Fig. 54.

Sit AB diameter transversa, DE dia-
meter conjugata, adeoque ordinata
NM parallela, C centrum hyperbo-
læ & CQ atque CR sint ejus asymp-
tæ. Fiat DA=c, CA=r, PM=y, CP
=v & CB=AC: erit (§. 268 Geom.)

$$CA : DA = CP : PR$$

$$r : c = v : \frac{cv}{r}$$

$$\text{Quare } RM = \frac{cv}{r} - y = \frac{cv - ry}{r} \text{ \& } MQ$$

$$= \frac{cv + ry}{r}, \text{ consequenter } RM \cdot MQ =$$

$$(c^2v^2 - r^2y^2) : r^2. \text{ Est vero } RM \cdot MQ = DA^2$$

$$= c^2 (\text{§. 498}). \text{ Habemus itaque}$$

$$(c^2v^2 - r^2y^2) : r^2 = c^2$$

$$\frac{c^2v^2 - r^2y^2}{c^2v^2 - r^2c^2} = \frac{r^2}{r^2}$$

$$c^2v^2 - r^2y^2 = r^2c^2$$

quæ æquatio in hanc resolvitur ana-
logiam,

$$y^2 : v^2 = r^2 : c^2 : r^2$$

$$PM^2 : AP : PB = DA^2 : AC^2$$

Est nimirum BP=BC + CP=r+v
& AP=CP-CA=v-r, adeoque
AP . PB = (v-r)(v+r)=v^2-r^2.

Theorema. Quadratum semior-
dinatæ in hy-
perbolæ est ad rectangulum ex abscissa & ag-
gregato ex diametro transversa AB & abscissa
AP, ut quadratum semidiametri conjugatæ
AD ad quadratum semidiametri transversæ
CA.

COROLLARIUM.

500. Quodsi fiat AP=x, & 2r=AB
=a, erit v^2-r^2=ax+x^2, consequenter y^2
=(c^2ax+x^2) : \frac{1}{4}aa = \frac{4cx+x^2}{a} + \frac{4c^2x^2}{a^2}

Fiat 4c^2 : a=b; erit y^2 = bx + bx^2 : a.
Eadem ergo æquatio hyperbolæ naturam de-
fuit respectu diametri, quæ eam exprimit
respectu axis, estque parameter tertia pro-
portionalis ad diametros conjugatas DE &
AB. Unde liquet easdem proprietates hy-
perbolæ competere respectu diametri, quæ
superius ex æquatione fundamentali respectu
axis deduximus.

PROBLEMA CCXIII.

501. Ductis AF & TN asymptoto
CR parallelis, determinare rationem
rectanguli ex TN in TC ad rectangulum
ex AF in FC. Tab.
V.
Fig. 54.

Sit CF=a, AF=b, AD=c, RN
=z, erit ob AE=DA etiam EF=FC
=a (§. 268 Geom.). Et quoniam RN.
NQ=DA^2 (§. 498), erit (§. 299 Arith.).

$$RN : DA = DA : NQ$$

$$z : c = c : \frac{c^2}{z}$$

Porro (§. 268 Geom.)

$$AE : AF = QN : TN$$

$$c : b = \frac{c^2}{z} : \frac{bc}{z}$$

$$AE : FE = QN : TQ$$

$$c : a = \frac{c^2}{z} : \frac{ac}{z}$$

$$QN : QT = RN : TC$$

$$\frac{c^2}{z} : \frac{ac}{z} = z : \frac{az}{c}$$

$$\text{Ergo } TC \cdot TN = \frac{azbc}{cz} = ab = CF \cdot AF$$

Theorema. Si ex vertice A & quocunque hy-
perbolæ puncto N ducantur AF & TN cum
asymptoto CR parallela; erit rectangulum
ex TN in TC æquale rectangulo ex FA in FC.

COROLLARIUM.

502, Quodsi adeo fiat $TC = x$, $TN = y$; æquatio hyperbolæ naturam inter asymptotos respectu diametri declarans erit $xy = ab$.

PROBLEMA CCXIV.

Tab. XII. Fig. 119. 503. Determinare quantitatem rectæ FO ex foco F ad tangentem hyperbolæ TM perpendicularis.

Eodem prorsus, quo supra (§. 457), modo reperitur FO.RM = PR. TF, ut verba singula huc transcribere liceat.

Theorema. Rectangulum ex subnormali PR in differentiam distantiarum foci a semiorinata atque subtangentis TF æquale est rectangulo ex normali MR & recta ex foco ad tangentem perpendiculari.

PROBLEMA CCXV.

Tab. XII. Fig. 119. 504. Si in F fuerit focus hyperbolæ & MR ad eam normalis, HR vero normalis ad FM ex foco F ad punctum contactus M ductam; determinare quantitatem segmentorum MH & HF.

Sic parameter = b, axis = a, distantia foci a centro = c, erit FM = $c - \frac{1}{2}a + 2cx : a$ (§. 470), PR = $(\frac{1}{2}ab + bx) : a$ & AT = $\frac{1}{2}ax : (\frac{1}{2}a + x)$ (§. 491), AF = $c - \frac{1}{2}a$, TF = $\frac{1}{2}ax : (\frac{1}{2}a + x) + c - \frac{1}{2}a = ax : (a + 2x) + c - \frac{1}{2}a = (ac - \frac{1}{2}a^2 + 2cx) : (a + 2x)$. Ducta FO ad Tangentem TM. parallela, reperitur prorsus ut supra, iisdem retentis verbis, FM : TF = PR : MH (§. 458). Quare

$$c - \frac{1}{2}a + \frac{2cx}{a} : \frac{ac - \frac{1}{2}a^2 + 2cx}{a + 2x} = \frac{\frac{1}{2}ab + bx}{a} : MH$$

Hoc est

$$2ac - a^2 + 4cx : \frac{ac - \frac{1}{2}a^2 + 2cx}{a + 2x} = ab + 2bx : MH$$

(§. 184 Arith.)

$$\frac{2ac - a^2 + 4cx}{a + 2x} : \frac{ac - \frac{1}{2}a^2 + 2cx}{a + 2x} = b : MH$$

(§. 183 Arith.)

Est ergo MH = $\frac{1}{2}b$ (§. 149. Arith.).

Theorema. Si MR fuerit ad hyperbolam normalis & ex R ducatur ad FM ex foco F ad punctum contactus M ductam normalis HR; erit MH parametro dimidiæ æqualis.

DEFINITIO XLII.

505. Hyperbola æquilatera dicitur, in qua axes conjugati AB & DE sunt æquales. Tab. IV. Fig. 51.

COROLLARIUM I.

506. Cum parameter sit tertia proportio- nalis ad axes conjugatos (§. 461); ipsa etiam axibus æqualis est.

COROLLARIUM II.

508. Quare si in æquatione $y^2 = bx + bx^2 : a$ fiat $b = a$; æquatio $y^2 = ax + x^2$ naturam hyperbolæ æquilateræ declarat.

COROLLARIUM III.

507. Hinc quadrata ordinarum y^2 & z^2 sunt inter se ut $ax + x^2$ & $ay + y^2$, hoc est, ut rectangula ex abscissis in rectas compositas ex abscissis & axe determinato vel parametro.

COROLLARIUM IV.

509. Si sint CP = x, CA = r, erit AP = $x - r$ & PB = $r + x$ consequenter $y^2 = r^2 - x^2$.

COROLLARIUM V.

510. Quoniam AE = CA (§. 506); erit ACE angulus semirectus (§. 241 Geom.); consequenter angulus asymptotorum FCG in hyperbola æquilatera rectus.

PROBLEMA CCXVI.

Tab. V. Fig. 55. §11. Investigare naturam curvæ, quæ oritur; si conus ABC ita secetur ut sectionis axis DE sit lateri Coni AC parallelus, ipsum vero planum sectionis DLN ad basim sectionis triangularis AB perpendicularis.

Secetur conus plano HMI basi ANB parallelò: erit HMI circulus (§. 468 Geom.), consequenter cum uterque circulus HMI & ANB per sectionem triangularem ACB secetur in HI & AB & a sectione data in pM & LN; erunt cum HI & AB, tum pM & LN inter se parallelæ (§. 499 Geom.). Quare cum sit EN perpendicularis ad AB per hypoth. erit etiam PM perpendicularis ad HI (§. 492 Geom.), consequenter cum DE & HI, itemque DE & AB sint in eodem plano sectionis triangularis, EN & PM etiam perpendiculares sunt ad DE (§. 484 Geom.) adeoque semiordinatæ ad axem DE applicatæ (§. 368. 370). Et quia AH parallela ipsi EP per hypoth. HP parallela ipsi AE per demonstr. erit HP=AE (§. 257 Geom.). Sit jam AE=HP=v, PI=t, DP=x, DE=z; erit (§. 268 Geom.)

$$DP: DE = PI: EB$$

$$x: z = t: \frac{tz}{x}$$

Ergo PM²=HP. PI (§. 377)=tv & EN²=AE. EB (§. cit.)=tzv:x. Est ergo (positis PM²=y², EN²=q²).

$$y^2: q^2 = tv: \frac{tzv}{x}$$

$$\text{hoc est} = tvx: tzv \quad (\S. 124).$$

$$= x: z$$

Est itaque curva NMDpL parabolæ (§. 402).

PROBLEMA CCXVII.

Tab. V. Fig. 56. §12. Si Conus ABC ita secetur, ut axis sectionis DE cum diametro basis AB continuata in F concurrat, & planum sectionis continuatum eam ad angulos rectos secet, invenire naturam curvæ ex hac sectione prodeuntis DMNELD.

Eodem, quo ante (§. 511) modo ostenditur esse PM & QN cum femiordinatas circulorum IMH & LNK, tum curvæ DMNE. Sit jam DE=a, DP=x, DQ=v, PH=t, QL=f; erit PE=a-x, QE=a-v & (§. 268 Geom.)

$$DP: PH = DQ: QK$$

$$x: t = v: \frac{vt}{x}$$

$$EQ: QL = EP: PI$$

$$a-v: f = a-x: \frac{fa-fx}{a-v}$$

Quare (§. 377) PM²=HP. PI=(tfa-tfx):(a-v) & QN²=KQ. QL=vtf: x. Est adeo

$$PM^2: QN^2 = \frac{tfa-tfx}{a-v}: \frac{vtf}{x}$$

$$\text{hoc est} = tfax-tfx^2: avtf-v^2tf \quad (\S. 124) = ax-x^2: av-v^2$$

Est itaque curva DMNELD Ellipsis (§. 429).

PROBLEMA CCXVIII.

Tab. IV. Fig. 57. §13. Si Conus ABC ita secetur, ut axis sectionis DQ continuatus cum latere Coni AC continuato in E concurrat, planum vero sectionis DLN secet diametrum basis AB ad angulos rectos; invenire naturam curvæ DMN, quæ ex hac sectione resultat.

Eodem modo, quo paulo ante (§. 511), ostenditur, QN & PM esse femiordinatas cum circulorum HMI atque

atque ANB, tum curvæ DMN.

Sit ED = a, DP = x, DQ = v, PH = t, PI = f; erit EP = a + x, EQ = a + v & (§. 268 Geom.)

$$EP : PH = EQ : AQ$$

$$a + x : t = a + v : \frac{at + vt}{a + x}$$

$$DP : PI = DQ : QB$$

$$x : f = v : \frac{fv}{x}$$

Ergo HP. PI = tf & AQ. QB = (atfv + v²tf) : (ax + x²), consequenter ob PM² = HP. PI & QN² = AQ. QB (§. 377).

$$PM^2 : QN^2 = tf : \frac{atfv + v^2tf}{ax + xx}$$

$$\text{hoc est,} = 1 : \frac{av + vv}{ax + xx}$$

$$(\text{§. 124}) = ax + xx : av + vv$$

Est itaque LDMN hyperbola (§. 466), DE ejus axis transversus, E vertex hyperbolæ oppositæ.

SCHOLIION.

514. Hinc intelligimus, quod statim ab initio parabolam, hyperbolam atque ellipsin tanquam ex Cono sectas proponere & ex indole sectionis æquationem fundamentalem eruere licuisset, nisi nobis constitutum fuisset ostendere, quomodo ex æquationibus utcunque assumtis vel datis curvarum proprietates ac descriptiones per algebram & arithmeticam speciosam eruere debeamus. Immo potuissent quoque (quod faciunt alii) earundem curvarum per motum continuum descriptiones fundamenti loco assumi & inde æquationes elici: quod ut appareat, unum de ellipsi exemplum proposuisse suffecerit.

PROBLEMA CCXXIX.

515. Sit descripta curva ADMB, circumductu regule GM in instrumento, cujus structura ex Fig. 59. Tab. IV.

manifesta est, ita ut paxilli in E defixi basis mobilis incedat per canalem ab, alterius vero in F per cd; investigare naturam ejus.

Ex curvæ descriptione manifestum, esse longitudinem regulæ EM axi majori dimidio CB, partem vero ejus FM axi dimidio minori DC æqualem, consequenter distantiam paxillorum EF differentiam inter semiaxem majorem AC & semiaxem minorem DC.

Assumamus itaque quemcumque regulæ situm EFM & determinetur curva, in qua sit punctum ejus M. Demittantur ex puncto M ordinatæ ad utrumque axem PM & MR.

Fiat CP = RM = x, PM = y, AC = EM = a, CD = FM = b, erit EF = a - b & (§. 268 Geom.)

$$EM : MR = EF : FC$$

$$a : x = a - b : \frac{ax - bx}{a}$$

$$\text{Ergo } PF = x - x + bx : a = bx : a$$

$$\text{Hinc } PM^2 = FM^2 - FP^2 \text{ (§. 417 Geom.)} = b^2 - b^2 x^2 : a^2 = (a^2 b^2 - b^2 x^2) : a^2 = y^2.$$

Est adeo curva ADMB Ellipsis (§. 432).

DEFINITIO XLIII.

516. Circuli superiorum generum sunt curvæ, in quibus est AP^m : PM^m = PM : PB vel etiam AP^m : PM^m = PMⁿ : PBⁿ.

COROLLARIUM I.

517. Sit AP = x, PM = y, AB = a : erit PB = a - x, consequenter xⁿ : y^m = y : a - x. Hinc æquatio infinitos circulos definiens est y^{m+1} = ax^m - x^{m+1} & alios adhuc infinitos definiens y^{m+n} = (a - x)ⁿx^m.

COROL.

Tab. IV. Fig. 59.

Tab. IV. Fig. 58.

Tab. III. Fig. 38.

Tab. IV. Fig. 58.

COROLLARIUM II.

518. Si $m=1$, erit $y^2=ax-x^2$, adeoque circulus primi generis sub hac æquatione una continetur. Si $m=2$, $n=1$, erit $y^3=ax^2-x^3$: quæ æquatio circulum secundi generis definit.

DEFINITIO XLIV.

519. *Parabolæ superiorum generum* sunt curvæ algebraicæ, quæ definiuntur per $a^{m-1}x=y^m$, e. gr. per $a^2x=y^3$, $a^3x=y^4$, $a^4x=y^5$, $a^5x=y^6$ &c. Dicuntur a nonnullis *Paraboloides*: speciatim *Paraboloidem cubicalem* vocant, si $a^2x=y^3$; *Paraboloidem biquadraticalem*, si $a^3x=y^4$; *surdesolidalem* si $a^4x=y^5$ &c. Harum curvarum respectu *Parabola* primi generis superius explicata dicitur *Apolloniana*, item *quadratica*. Ad parabolas quoque referri solent curvæ, in quibus $ax^{m-1}=y^m$, veluti $ax^2=y^3$, $ax^3=y^4$: quia a nonnullis *semiparabolæ* appellantur. Omnes comprehenduntur sub communi æquatione $a^m x^n = y^r$, quæ ad alias quoque curvas extenditur, veluti ad eas, in quibus $a^2x^2=y^4$, $a^2x^3=y^5$, $a^3x^4=y^7$.

COROLLARIUM I.

520. Cum in parabolis superiorum generum sit $y^m = a^{m-1}x$, si alia quæcunque semiordinata dicatur v , abscissa ipsi respondens z , erit $v^m = a^{m-1}z$, consequenter

$$y^m : v^m = a^{m-1}x : a^{m-1}z$$

hoc est, $= x : z$

Communis adeo parabolæ proprietates est, quod ordinarum potentie rationem abscissarum habeant.

COROLLARIUM II.

521. In semiparabolis vero est $y^m : v^m = ax^{m-1} : az^{m-1} = x^{m-1} : z^{m-1}$, seu po-

tentie semiordinatarum sunt ut potentie abscissarum uno gradu inferiores; e. gr. in semiparabolis cubicalibus cubi ordinarum y^3 & v^3 sunt ut quadrata abscissarum x^2 & z^2 . Et in genere in omnibus curvis parabolæ agnatis $y^{m+n} : v^{m+n} = a^m x^n : a^m z^n = x^n : z^n$.

DEFINITIO XLV.

522. *Ellipses infinitas* definit æquatio $ay^{m+n} = bx^m(a-x)^n$, quæ a nonnullis *Elliptoides* dicuntur, si $m > 1$, vel $n > 1$, vel m & $n > 1$. E. gr. *Elliptoidem cubicalem*, si $ay^3 = bx^2(a-x)$: *Elliptoidem biquadraticalem* appellant ellipsin tertii generis, in qua $ay^4 = bx^2(a-x)^2$. Harum curvarum respectu *Ellipsis* primi generis *Apolloniana* vocatur.

COROLLARIUM I.

523. Si alia quæcunque ordinata dicatur v & abscissa respondens z , erit $av^{m+n} = bz^m(a-z)^n$, consequenter $ay^{m+n} : av^{m+n} = bx^m(a-x)^n : bz^m(a-z)^n$ hoc est, $y^{m+n} : v^{m+n} = x^m(a-x)^n : z^m(a-z)^n$.

COROLLARIUM II.

524. Si fiat $a=b$, erit $y^{m+n} = x^m(a-x)^n$ & si porro fiat $n=1$; erit $y^{m+1} = x^m(a-x)$, $= ax^m - x^{m+1}$, hoc est, ellipses superiorum generum degenerant in circulos superiorum generum,

DEFINITIO XLVI.

425. *Hyperbolas infinitas* definit æquatio $ay^{m+n} = bx^m(a+x)^n$, quæ a nonnullis *Hyperboloides* appellantur, si $m > 1$, vel $n > 1$, vel m & $n > 1$ e. gr. $ay^3 = bx^2(a+x)$. Et harum curvarum respectu *Hyperbola* primi generis *Apolloniana* salutatur.

COROLLARIUM.

526. Est ergo in infinitis hyperbolicis
 $ay^{m+n} : av^{m+n} = bx^m (a+x)^n : bz^m (a+z)^n$ hoc est, $y^{m+n} : v^{m+n} = x^m (a+x)^n : z^m (a+z)^n$.

DEFINITIO XLVII.

527. Conos superiorum generum appello, quorum bases & sectiones basi-
 Tab.V. bus parallelæ sunt circuli superiorum
 Fig.55. generum. Generatur istiusmodi Conus, si recta linea AC in puncto sublimi C fixa, sed quæ pro re nata magis aut minus extendi posse concipitur, circa peripheriam circuli ANB convertatur.

PROBLEMA CCXX.

528. Investigare naturas curvarum,
 Tab.V. quæ procedunt, si Coni superiorum gene-
 Fig.55. rum ita secantur, ut axis sectionis DE sit lateri Coni AC parallelus, planum vero sectionis LDN secet diametrum basis AB ad angulos rectos.

Eodem, quo supra (§. 511) modo ostenditur, esse PM & EN inter se parallelas & cum circulo HMI atque ANB, tum curvæ LDN semiordinatas. Sit $PM=y, EN=q, AE=HP=v, DP=x, DE=z, PI=t$; reperietur ut in probl. 216 (§. 511) $EB = tz : x$. Est vero (§. 516).

$$HP^m : PM^m = PM : PI$$

$$v^m : y^m = y : t$$

$$y^{m+1} = tv^m$$

Porro $AE^m : EN^m = EN : EB$.

$$v^m : q^m = q : (tz : x)$$

$$q^{m+1} = tzv^m : x$$

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

$$\text{Quare } y^{m+1} : q^{m+1} = tv^m : \frac{tzv^m}{x}$$

$$\text{hoc est } = 1 : \frac{z}{x} \text{ (§. 124).}$$

$$\text{feu } = x : z$$

Sunt ergo curvæ istæ parabolæ superiorum generum (§. 520).

Vel sit generaliter (§. 516)

$$HP^m : PM^m = PM^n : PI^n$$

$$v^m : y^m = y^n : t^n$$

$$y^{m+n} = t^n v^m$$

$$AE^m : EN^m = EN^n : EB^n$$

$$v^m : q^m = q^n : \frac{t^n z^n}{x^n}$$

$$q^{m+n} = \frac{t^n z^n v^m}{x^n}$$

Quare

$$y^{m+n} : q^{m+n} = t^n v^m : \frac{t^n z^n v^m}{x^n}$$

$$= x^n : z^n$$

Sunt itaque curvæ DLN superiorum generum parabolis agnatæ (§. 521).

PROBLEMA CCXXI.

529. Investigare naturam curvarum, Tab.V. quæ nascuntur, si conii superiorum gene- Fig.56. rum ita secantur, ut axis sectionis DE cum diametro basis AB continuata in F concurrat, planum vero sectionis continuatum eandem ad angulos rectos secet.

Patet, ut supra (§. 511) PM & QN esse inter se parallelas atque semiordinatas cum circulo HMI & KNL, tum curvæ DMNE. Sit $DE=a, DP=x, DQ=v, PH=t, QL=f, PM=y, QN=z$; erit $PE=a-x, QE=a-v$ & reperietur ut in probl. 217 (§. 512) $QK=vt : x, PI=(fa-fx) : (a-v)$. Est vero (§. 517)

Aaa

IP

$$IP^n : PM^m = PM^n : PH^n$$

$$\frac{f^m (a-x)^n}{(a-v)^m} : y^m = y^n : t^n$$

$$y^{m+n} = t^n f^m (a-x)^m : (a-v)^m$$

Porro $QL^m : QN^m = QN^n : KQ^n$

$$f^m : z^m = z^n : \frac{v^n t^n}{x^n}$$

$$z^{m+n} = t^n v^n f^m : x^n$$

Quare

$$y^{m+n} : z^{m+n} = \frac{t^n f^m (a-x)^m}{(a-v)^m} : \frac{v^n t^n f^m}{x^n}$$

hoc est $= (a-x)^m x^n : (a-v)^m v^n$

Sunt adeo curvæ istæ in numero ellipsium superiorum generum (§. 523).

PROBLEMA CCXXII.

Tab. IV. Fig. 57. 530. Investigare naturam curvarum, quæ gignuntur, si Coni superiorum generum ita secentur, ut axis sectionis DQ cum latere Coni continuato AC, continuatus & ipse, in E concurrat, planum vero sectionis DLN diametrum basis AB ad angulos rectos secet.

Patet ut supra (§. 511), PM & QN esse inter se parallelas, atque semio-dinatas cum circulorum HMI & ANB, tum curvæ DMN. Sit DE = a, DP = x, DQ = v, PH = t, PI = f; erit EP = a + x, EQ = a + v & reperietur ut in probl. 218 (§. 513) AQ = t(a + v) : (a + x) & QB = fv : x. Est vero (§. 517)

$$PI^m : PM^m = PM^n : PH^n$$

$$f^m : y^m = y^n : t^n$$

$$y^{m+n} = t^n f^m$$

Porro $QB^n : QN^n = QN^n : AQ^n$

$$\frac{f^m v^m}{x^m} : z^m = z^n : \frac{t^n (a+v)^n}{(a+x)^n}$$

$$z^{m+n} = \frac{t^n f^m v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$$

Quare.

$$y^{m+n} : z^{m+n} = t^n f^m : \frac{t^n f^m v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$$

hoc est (§. 124) = 1 : $\frac{v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$

$$= x^m (a+x)^n : v^m (a+v)^n$$

Sunt adeo curvæ hyperbolæ superiorum generum (§. 526.)

PROBLEMA CCXXIII.

Tab. V.

531. Diametro semicirculi AB jungatur ad angulos rectos recta AT ducta & ab eodem centro C secantes QC. Erigantur in Q normales QM ipsi QR æquales. Investigare naturam curvæ AMP, quæ est locus omnium punctorum M hac ratione inventorum.

Sit AQ = PM = y, QM = QR = x, AB = a, erit (§. 379. Geom.) $y^2 = ax + x^2$.

Est adeo curva AMR hyperbola æquilatera, cujus axes & parameter diametro circuli AB æquales (§. 461.)

COROLIARIUM.

532. Habemus adeo facilem hyperbolæ æquilateræ per innumera puncta M geometrice determinata descriptionem.

PROBLEMA CCXXIV.

Tab. XII.

533. Invenire equationem hyperbolæ ad axem CR ex centro C ductæ & ad axem transversum AB normalem relatæ. Fig. 114.

Sit CQ = PM = x, CP = QM = y, CB = CA = a, erit BP = a + y, AP = y - a, adeoque BP. PA = $y^2 - a^2$. Sit porro parameter = b, erit.

$$b : a = x^2 : y^2 - a^2$$

$$ax^2 = by^2 - a^2 b$$

$$ax^2 + a^2 b = by^2$$

$$\frac{ax^2}{b} + a^2 = y^2$$

COROLLARIUM.

534. Quodsi hyperbola fuerit æquilatera, erit $a = b$ (§. 505), consequenter $y^2 = x^2 \mp a^2$, sive $QM^2 = CQ^2 \mp CB^2$.

DEFINITIO XLVIII.

Tab. VI. Fig. 61. 535. Si ducatur recta BD & alia AC ad ipsam in E perpendicularis, ex puncto autem C agantur rectæ quotcunque CM rectam BD secantes in Q, fiatque $QM = QN = AE = EF$; Curva, in qua sunt puncta M, dicitur a Nicomede inventore *Conchilis* seu *Conchois prima*; altera vero, in qua sunt puncta N, *Conchois secunda*; recta BD *regula*; punctum C *Polus*. Excogitavit autem instrumentum, quo motu continuo Conchois prima describi potest. Nimirum in regula AD excavatus est canalis, ut clavus teres regulæ mobili CB in F firmiter infixus intra eam libere moveri possit. Regulæ EG in K infigitur clavus alius, in fissuram regulæ mobilis CB immittendus. Quodsi regula BC ita moveatur, ut clavus F canalem AD percurrat; stylus in C Conchoidem primam describet.

COROLLARIUM I.

536. Sit $AP = x$, $AE = a$, erit $PE = MR = a - x$. Crescentibus adeo x , decrescit $a - x$ seu MR, adeoque curva continuo ad regulam BD propius accedit. Eodem modo patet, rectam NO continuo decrescere debere, adeoque conchoidem quoque inferiorem ad regulam continuo propius accedere.

COROLLARIUM II.

537. Quoniam tamen inter conchoidem utramque & rectam BD semper interjicitur recta QM vel QN ipsi AE æqualis (§. 535);

neutra conchoidum cum recta BD concurrere potest, consequenter BD est asymptotus utriusque conchoidis.

PROBLEMA CCXXV.

538. *Invenire equationem pro Conchoide.* Tab. VI. Fig. 61.

Sit $QM = AE = a$, $EC = b$, $MR = EP = x$, $ER = PM = y$, erit $CP = b + x$ & (§. 268 *Geom.*)

$$PE : MQ = EC : CQ$$

$$x : a = b : \frac{ab}{x}$$

Hinc $CM = a + ab : x = (ax + ab) : x$. Et quoniam $PM^2 + PC^2 = CM^2$ (§. 417. *Geom.*); erit $y^2 + x^2 + 2bx + b^2 = (a^2 b^2 + 2a^2 bx + a^2 x^2) : x^2$ consequenter $x^4 \mp 2bx^3 \mp y^2 x^2 \mp b^2 x^2 = a^2 b^2 \mp 2a^2 bx \mp a^2 x^2$: quæ est æquatio naturam conchoidis primæ explicans.

Sit $CE = b$, $QN = a$, $EG = ON = x$, $GN = EO = y$; erit $GC = b - x$ & (§. 268. *Geom.*)

$$EG : QN = GC : CN$$

$$x : a = b - x : \frac{ab - ax}{x}$$

Habemus ergo ob $CN^2 = CG^2 \mp GN^2$ (§. 417. *Geom.*), $(a^2 b^2 - 2a^2 bx \mp a^2 x^2) : x^2 = b^2 - 2bx \mp x^2 \mp y^2$, hoc est, $a^2 b^2 - 2a^2 bx \mp a^2 x^2 = b^2 x^2 - 2bx^3 \mp x^4 \mp x^2 y^2$: quæ est æquatio naturam conchoidis inferioris declarans.

COROLLARIUM.

539. Est adeo conchois utraque lineæ tertii generis (§. 382).

DEFINITIO XLIX.

540. Aliæ *Conchoidum* species prodeunt; si fiat $CE : CQ = QM : AE$, vel indefinite si $CE^m : CQ^n = QM^n : AE^n$.

COROLLARIUM.

541. Quare si $CE = b$, $EA = a$, $CQ = x$, $QM = y$, erit $ab = xy$ & pro infinitis conchoidibus $a^n b^m = x^n y^m$.

SCHOLIUM.

542. *Æquatio hæc videtur eadem cum æquatione hyperbolæ inter asymptotos* (§. 486); eadem tamen non est, cum in presente casu æquatio non exprimat relationem punctorum per rectas parallelas ad eandem rectam positione datam, quemadmodum in hyperbolæ.

PROBLEMA CCXXVI.

543. *Invenire æquationem ad quodlibet punctum Conchoidis, in qua* $CE : CQ = QM : AE$.

Sit $AE = a$, $CE = b$, $PM = y$, $PE = x$, erit $CP = b + x$, $CP^2 = b^2 + 2bx + x^2$, $CM^2 = y^2 + b^2 + 2bx + x^2$ (§. 417. *Geom.*) & (§. 268. *Geom.*) $CP : CM = CE : CQ = EP : QM$. Quare $CE \cdot EP : CQ \cdot QM = CP^2 : CM^2$ (§. 213. *Arithm.*), hoc est, ob $CQ \cdot QM = CE \cdot EA$ per *hypoth.*

$CE \cdot EP : CE \cdot EA = CP^2 : CM^2$
hoc est (§. 181),
 $EP : EA = CP^2 : CM^2$
 $x : a = b^2 + 2bx + x^2 : y^2 + b^2 + 2bx + x^2$
 $ab^2 + 2abx + ax^2 = y^2 x + b^2 x + 2bx^2 + x^3$
quæ est æquatio desiderata.

DEFINITIO L.

Tab. VI. Fig. 63. 544. Diametro AB semicirculi AOB jungatur ad angulos rectos recta indefinita BC . Ducatur recta AH fiatque $AM = IH$, vel in altero quadrante $LC = AN$: erit punctum M , itemque L in curva $AMOL$, quam *Cissoïdem* dixit *Diocles* inventor.

COROLLARIUM I.

545. Ducantur rectæ PM & KI ad AB normales; erunt eadem inter se parallelæ (§. 256. *Geom.*) & (§. 268. *Geom.*) $AP : KB = AM : IH$. Sed $AM = IH$ (§. 544). Ergo $AP = KB$ (§. 149. *Arithm.*), consequenter $AK = PB$ (§. 88. *Arithm.*) & $PN = IK$.

COROLLARIUM II.

546. Eodem modo patet, *Cissoïdem* AMO semicirculum AOB bifariam dividere. Est enim $AO : OF = AG : GB$ (§. 268. *Geom.*), Sed $AO = OF$ (§. 544.). Ergo $AG = GB$ (§. 149. *Arithm.*). Est itaque ANO quadrans.

COROLLARIUM III.

547. $AK : KI = KI : KB$ (§. 327. *Geom.*), hoc est, $AK : PN = PN : AP$ (§. 545). Porro $AK : (KI) PN = AP : PM$ (§. 268. *Geom.*). Ergo $PN : AP = AP : PM$ (§. 167. *Arithm.*). Sunt adeo AK , PN , AP & PM quatuor linearum continue proportionales &, si fiat $PN = v$, $AP = x$, $PM = y$, $x^2 = vy$. Eodem modo ostenditur esse AP , PN , AK , KL continue proportionales.

PROBLEMA CCXXVII.

548. *Invenire æquationem, que naturam Cissoïdis AMOL declarat.*

Sit $AB = a$, $AP = x$, $PM = y$; erit $AK = PB$ (§. 545.) = $a - x$, $KI^2 = PN^2 = ax - x^2$ & (§. 547. 124.)

$$AK^2 : PN^2 = AP^2 : PM^2$$

$$a^2 - 2ax + x^2 : ax - x^2 = x^2 : y^2$$

$$\frac{a^2 y^2 - 2axy^2 + x^2 y^2 = ax^3 - x^4}{ay^2 - xy^2 = x^3}$$

hoc est, $(a - x)y^2 = x^3$

Theorema. In *Cissoïde Dioclis* cubus abscissæ AP æquatur solido ex quadrato semiorbinatæ PM in complementum diametri circuli genitoris PB .

COROL.

COROLLARIUM I.

549. Quando punctum P cadit in B, tum fit $x = a$ & $BC = y$, consequenter $y^2 = \frac{a^3}{o}$.

Quare $o : 1 = a^3 : y^2$, hoc est, valor ipsius y fit infinitus, adeoque Cissois AMOL cum BC nunquam concurrat. Est ergo BC Cissoidis asymptotus.

COROLLARIUM II.

550. Cissois est linea secundi generis (§. 382).

SCHOLIUM.

551. Veteres tam Conchoide, quam Cissoide usi sunt ad inveniendas duas medias continue proportionales inter duas rectas datus, quemadmodum docet Pappus.

DEFINITIO LI.

Tab. VI. Fig. 64. 552. Si recta AX dividatur in partes quotcunque æquales, ipsique in punctis divisionum A, P, p &c. jungantur rectæ AN, PM, pm &c. continue proportionales, puncta N, M, m &c. in curva existunt, quæ *Logistica*, itemque *Logarithmica* vocari solet.

COROLLARIUM I.

553. Sunt ergo abscissæ AP, Ap &c. semiordinatarum PM, pm &c. logarithmi (§. 334. *Arithm.*).

COROLLARIUM II.

554. Hinc si $AP = x$, $Ap = v$, $PM = y$, $pm = z$, & logarithmi ipsorum y & $z = ly$ & lz ; erit $x = ly$ & $v = lz$, consequenter $x : v = ly : lz$, hoc est, denominatores rationum AN : PM & AN : pm sunt inter se ut abscissæ AP & Ap.

COROLLARIUM III.

555. Quamobrem infinitas alias logísticas excogitare licet, si fiat $x^m : v^m = ly : lz$, ut nempe abscissarum potestates aut radices quæcunque (m nempe numerum fractum denotante) sint semiordinatarum logarithmi.

COROLLARIUM IV.

556. Cum semiordinatæ pm continuo decrecant, ratione AN ad pm cum abscissis continuo crescente (§. 553. *Analys.* & §. 205. *Arithm.*) curva ad axem AX continuo propius accedit. Quodsi pm ponatur fieri nihilo æqualis, ratio ipsius AN in infinitum augetur, consequenter & abscissa AP (§. 554). Quare logistica nonnisi infinito intervallo cum axe concurrat, adeoque AX est ejus asymptotus.

DEFINITIO LII.

557. Si quadrans circuli in partes Tab. VI. Fig. 65. quotcunque æquales in punctis P, p, p, &c. dividatur & ex radiis CP, Cp, Cp, &c. refecentur CM, Cm, Cm &c. continue proportionales; puncta M, m, m, &c. erunt in *Logistica spirali*.

COROLLARIUM I.

558. Sunt ergo arcus AP, Ap &c. logarithmi ordinarum CM, Cm &c.

COROLLARIUM II.

559. Unde liquet, infinitas logísticas spirales excogitari posse (§. 555.)

DEFINITIO LIII.

560. Si quadrans BGD bifariam dividatur in G & arcus BG, GD denuo subdividantur bifariam in E & F, atque ita porro; axis AC arbitrariæ longitudinis assumtus eodem modo dividatur in partes æquales Ab, bi, ik, kC, tandemque in punctis b, i, k, C applicentur normales eh, ig, kf, Cd ipsis HE, IG, KF, CD æquales; puncta A, e, g, f, d erunt in Linea, a *Leibnitio* inventore *Linea Sinuum* dicta. Tab. VI. Fig. 66.

COROLLARIUM.

561. Cum HE, IG, KF, CD sint sinus arcuum BE, BG, BF, BD (§. 2. *Trigon.*) erunt abscissæ Ab, Ai, Ak, AC ut arcus seu anguli, semiordinatæ eh, ig, kf, Cd, ut sinus eorundem arcuum seu angulorum.

DEFINITIO LIV.

Tab. VI. 562. Iisdem factis, quæ in definitio-
Fig. 66. ne præcedente fieri præcipimus, fiant
ch, ig, kf &c; tangentibus BL, BM, DN
&c. vel secantibus CL, CM, CN &c.
æquales; Curvæ adhuc aliæ gignentur,
quas *Lineas Tangentium & Secantium*
appellare libet.

COROLLARIUM.

563. In linea tangentium abscissæ sunt ut
arcus seu anguli, semiordinatæ ut eorundem
tangentes: in secantium vero linea abscissæ
itidem sunt ut arcus seu anguli, semiordinatæ
ut eorundem secantes.

DEFINITIO LV.

Tab. VI. 564. Quadrans arcus ANB dividatur
Fig. 67. in partes quotcunque æquales in N, *n*
&c. per continuam bisectionem; in to-
tidem dividatur radius AC per puncta
P, *p* &c. Ducantur radii CN, *cn* &c. de-
nique ex punctis P, *p* &c. erigantur
perpendicularares PM, *pm* &c. istis in
punctis M, *m* &c. occurrentes: erunt
puncta M, *m* &c. in curva, quam *Dinos-
trates* inventor *Quadraticem* appellavit.

COROLLARIUM.

565. Est ergo ANB: AN = AC: AP. Quare
si fiat ANB = *a*, AC = *b*, AN = *x*, AP = *y*;
erit $ay = bx$.

DEFINITIO LVI.

Tab. VI. 566. Si quadrans ANB & ejus ra-
Fig. 68. dius in partes æquales dividantur ut in
definitione præcedente, & ex punctis
P, *p* &c. agantur rectæ PM, *pm* &c. ip-
si CB; ex punctis N, *n* &c. rectæ NM, *nm*
&c. ipsi AC parallelæ: puncta M, *m*, &c.
sunt in *Quadraticæ Tschirnhusiana* a D^{no}.
de Tschirnhausen ad imitationem alte-
rius excogitata (*a*).

(*a*) In Medicina Mentis part. II. p. 114.

COROLLARIUM I.

567. Cum etiam hic ANB: AN = AC: AP;
quadratrix quoque Tschirnhusiana continetur
sub æquatione $ax = by$.

COROLLARIUM II.

568. Quoniam PM = QN, erit PM Sinus
arcus AN (S. 2. Trigon.). Quare cum sit
AP: Ap = AN: An (S. 566); abscissæ Qua-
draticis hujus sunt ut arcus & semiordinatæ ut
sinus eisdem respondentes, quemadmodum
in linea sinuum (S. 561).

DEFINITIO LVII.

569. Peripheria circuli APpA divi-
datur in partes quotcunque æquales in
punctis, *p*, per continuam bisectionem.
In totidem partes dividatur radius CA,
fiatque CM parti uni, *Cm* vero dua-
bus &c. partibus radii æqualis. Erunt
puncta M, *m*, *m*, &c. in linea curva,
quam ab inventore *Archimede* dicunt
Spiralem vel *Helicem Archimedeam*. Di-
citur autem *Spiralis prima*, quia conti-
nuari potest, circulo duplo radio des-
cripto: immo *secunda* continuatur,
descripto radio circulo triplo & ita por-
ro in infinitum.

Tab.
VII.
Fig. 69.

COROLLARIUM I.

570. Est ergo AP ad peripheriam ut CM
ad radium. Quare si peripheria dicatur *p*,
radius AC = *r*, AP = *x*, PM = *y*, erit CM
= $r - y$, consequenter ob $p : r = x : r - y$;
habebimus $pr - py = rx$.

COROLLARIUM II.

571. Si CM = *y*; erit $rx = py$: quam
æquationem cum quadraticæ tam *Dinos-
tratis*, quam *Tschirnhusii* communem habet
spiralis.

Co-

COROLLARIUM III.

572. Quare pro infinitis spiralibus & quadraticibus erit $r^n x^m = p^2 y^n$.

DEFINITIO LVIII.

573. Cyclois vel Trochois est curva, quam describit punctum *a* in peripheria circuli, si circulus super recta AC rotatur.

COROLLARIUM I.

574. Recta igitur AC peripheriæ; AD semiperipheriæ circuli æqualis est, & in quocunque circuli genitoris situ Ad arcui Pd.

COROLLARIUM II.

575. Si PL ducatur cum AD parallela; erit PM arcui BM circuli genitoris æqualis. Est enim Pd = Ad & hinc Pb = dD (§. 574). Quare cum NL = Dd (§. 226. Geom.) & ob Pb = MB etiam PN = ML (§. 12. Trigon.); erit etiam PN + NM = PM = ML + NM = NL = Dd, consequenter ob Dd = Pb = MB per demonstr. PM = MB. Sumto igitur arcu MB pro abscissa, PM pro semior-
dinata, si BM = x, PM = y; erit $x = y$.

DEFINITIO LIX.

576. Epicyclois describitur, si circulus non ut in præcedente definitione super recta, sed super peripheria alterius circuli incedat. Dicitur Epicyclois superior, si circulus genitor per peripheriæ convexitatem rotatur: Epicyclois inferior, si ejus concavitatem emetitur.

SCHOLIUM I.

577. Logarithmica, logistica spiralis, linea sinuum, linea tangentium, linea secantium, quadratrix Dinostratis, quadratrix Tschirnhusiana, Spiralis Archimæda, Cyclois, Epicyclois sunt lineæ transcendentes; neque enim per æquationes algebraicas explicari

possunt. Tradidimus equidem pro aliquibus earum æquationes; veruntamen cum in his assumserimus arcus circulares in numerum indeterminatarum, æquationes algebraicæ non sunt. Supposuimus enim superius, æquationes algebraicas relationem, quam habent puncta curvarum ad axem vel diametros, per solas lineas rectas explicare debere.

SCHOLIUM II.

578. Innumera autem curvæ aliæ tam algebraicæ, quam transcendentes excogitari possunt & actu excogitatae sunt a Geometris. Sed de his omnibus agere minime consultum est. Trademus autem in analysi infinitorum methodos generales, quibus non modo curvarum hactenus explicatarum, sed etiam aliarum quarumcunque symptomata, si quando iis opus habemus, erui possunt. Ut tamen appareat, quomodo plures excogitari possint; unum alterumque exemplum addere lubet.

PROBLEMA CCXXVIII.

§. 579. Invenire naturas curvarum, quæ prodeunt, si semior-
dinatæ PM continentur in N, donec fiant chordis AM æquales.

Facile apparet, curvas infinitas, immo infinitas earum series construere posse. Æquatio igitur in dato casu speciali eruenda ex æquatione curvæ genetricis ABC. Sit ea circulus, cujus diameter *a*. Sit in omni casu AP = x, PN = y; erit $PM^2 = ax - x^2$ (§. 377). Quare cum $AP^2 = x^2$ & $AM^2 = AP^2 + PM^2$ (§. 417 Geom.); erit $AM^2 = ax$, consequenter æquatio ad curvam genitam AND, $y^2 = ax$. Est itaque curva AND parabola (§. 388).

Sit curva genetrix AMC parabola: erit $PM^2 = ax$ (§. 388.) consequenter $AM^2 = PN^2 = ax + x^2$. Quoniam itaque

Tab. XII. Fig. 125.

taque æquatio ad curvam AND, $y^2 = ax + x^2$; erit ea hyperbola æquilatera, cujus axis transversus $= a$ (§. 507).

Sit curva genetrix AMC hyperbola æquilatera: erit $PM^2 = ax + x^2$, consequenter $AM^2 = PN^2 = ax + 2x^2$. Æquatio itaque ad curvam AND, $y^2 = ax + 2x^2$, adeoque eadem hyperbola scalena, cujus parameter a , axis transversus vero $= \frac{1}{2} a$ (§. 459).

Sit AMC parabola secundi generis, erit $PM = \sqrt[3]{a^2 x}$ (§. 519), adeoque $PM^2 = \sqrt[3]{a^4 x^2}$ & $PN^2 = x^2 + \sqrt[3]{a^4 x^2}$. Cum itaque æquatio ad curvam sit $y^2 = x^2 + \sqrt[3]{a^4 x^2}$; erit $(y^2 - x^2)^3 = a^4 x^2$, seu $y^6 - 3x^2 y^4 + 3x^4 y^2 = x^6 + a^4 x^2$.

SCHOLIION.

580. Patet per problema præfens plurimarum curvarum descriptiones facillimo negotio detegi posse: quod idem per sequentia quoque problemata intelligitur. Nec minus liquet, eodem modo ad axem AB applicari posse tangentes, subtangentes, normales, subnormales & quascunque alias lineas eodem modo determinatas. Hoc pacto subinde theorematata non inelegantia reperiuntur, qualia in ipsa resolutione problematis præsentis continentur, v. gr. Quod, si parabola circa diametrum circuli describatur, chordæ circuli AM sint semiordinatæ parabola PN æquales.

PROBLEMA CCXXIX.

Tab. XIII. Fig. 126.

581. Investigare naturas curvarum, quæ gignuntur, si ad chordam AM curvæ genetricis AMC erigatur perpendicularis AN semiordinatam PM ultra axem AB continuatam secans in N.

Sit curva genetrix AMC: Quoniam

MAN angulus rectus per hypothesin; erit $PM : AP = AP : PN$ (§. 327. Geom.), consequenter $PM^m : AP^m = AP^m : PN^m$ (§. 124), adeoque $PN^m = AP^{2m} : PM^m$, consequenter si $AP = x$, $PN = y$; $y^m = x^{2m} : PM^m$. Valor igitur ipsius PM & exponens m ex æquatione curvæ genetricis AMC determinantur.

Sit AMC circulus; erit $PM^2 = ax - x^2$, adeoque æquatio ad curvam ANR, $y^2 = x^4 : (ax - x^2) = x^3 : (a - x)$. Est igitur curva ANR Cissois Dioclis (§. 548).

Sit curva genetrix parabola Apolloniana: erit $PM^2 = ax$, adeoque $y^2 = x^4 : ax = x^3 : a$, hoc est, $ay^2 = x^3$. Est igitur ANR Parabola secundi generis (§. 519).

Sit in genere curva genetrix quædam ex parabolis infinitis, quæ definiuntur per æquationem $PM^m = ax^{m-1}$, adeoque $y^m = x^{2m} : ax^{m-1} = x^{m+1} : a$ hoc est, $ay^m = x^{m+1}$ Est igitur ANR parabola proxime superior genetricæ. Unde patet modus describendi omnes parabolæ in infinitum, quæ continentur sub æquatione $y^m = ax^{m-1}$.

Sit curva genetrix hyperbola æquilatera: erit $PM^2 = ax + x^2$, adeoque $y^2 = x^4 : (ax + x^2) = x^3 : (a + x)$. Est igitur ANR curva secundi generis affinitatem quandam habens cum Cissoide; sed quæ peculiari nomine destituitur.

Sit curva genetrix ellipsis: erit $PM^2 = (abx - bx^2) : a$, adeoque $y^2 = ax^4 : (abx - bx^2)$ hoc est $by^2 = ax^3 : (a - x)$.

SCHO-

SCHOLIUM I.

582. Si circuli superiorum generum sumuntur pro genetrice, Cissoïdes superiorum generum erunt genite.

PROBLEMA CCXXX.

Tab. XIII. Fig 127.

583. Sit curva genetrix AMK, recta AT ad axem AX normalis, AS magnitudinis constantis, investigare naturam curvæ, in qua est punctum N, quod determinatur, demissa ex S perpendiculari SR ad semiordinatam genetricis PM & ducta recta QN per punctum curvæ genetricis M axi AX parallela, rectæ AN ex vertice A per punctum R ductæ occurrente in N.

Sit $AS = a$, $AQ = x$, $QN = y$, erit ob parallelas SR & QN (§. 268. Geom.).

$$AS : (SR) QM = AQ : QN$$

$$a : QM = x : y$$

$$\text{adeoque } \frac{QM \cdot x}{a} = y$$

Sit AMK parabola Apolloniana, erit $QM = x^2 : a$. Est igitur.

$$y = x^3 : a^2$$

$$a^2 y = x^3$$

quæ est æquatio ad parabolam secundi generis (§. 519).

Sit AMK quædam ex infinitis parabolis, erit $QM = x^n : a^{n-1}$ (§ cit.), adeoque $y = x^{n+1} : a^n$ consequenter $a^n y = x^{n+1}$. Est igitur curva genita parabola proxime superior genetrice, patetque simul modus describendi parabolas omnes in infinitum, quæ continentur sub æquatione $a^{m-1} x = y^m$.

C A P U T V I I.

De Locis Geometricis.

DEFINITIO LX.

584. **L**ocus Geometricus est linea, per quam construitur problema indeterminatum. In specie Locus ad rectam dicitur, si linea recta æquationi construendæ sufficit; Locus ad circumulum, si circulo utendum & ita porro.

DEFINITIO LXI.

385. Loca ad lineam rectam & circumulum veteres dixere *Loca plana*: quæ vero sunt ad parabolam, ellipsin aut hyperbolam, *Loca solida*. Commodius Loca in ordines distinguuntur secundum *Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.*

numerum dimensionum, ad quem assurgunt quantitates indeterminatæ. Sic Locus primi ordinis est, si æquatio $x = ay : c$. Locus secundi seu quadratici ordinis, si e. gr. $y^2 = ax$ vel $y = a^2 - x^2$ &c. Locus tertii seu cubici ordinis, si e. gr. $y^3 = a^2 x$, vel $y^3 = ax^2 - x^3$ &c.

PROBLEMA CCXXXI.

585. Construere loca ad rectam.

Si $y = ax : b$; $y = ax : b + c$, $y = ax : b - c$, $y = c - ax : b$; Locus semper est ad rectam. Sit enim angulus datus CAB, in quo fiat $AI = b$, $IE = a$:
ductis
Bb b

Tab. VII. Fig. 71.

ductis ipsi EI parallelis quibuscunque PM, *pm* &c. erit AP=*x*, PM=*y*. Est enim (§. 268. *Geom.*)

$$AI : IE = AP : PM$$

$$b : a = x : y$$

Ergo $ax : b = y$

Quodsi EI continuetur in G, ita ut sit IG=*c*, per G, agatur DF ipsi AB & ex A, AD ipsi EI parallela, erit AP=DQ=*x*, QM,=*y*. Est enim PM=*ax* : *b*, per demonstr. PQ=*c* (§. 257 *Geom.*). Ergo QM=*ax* : *b* + *c* = *y*.

Si LG=*b*, GE=*a* & LQ vel Lq = *x* : erit QM vel *qm* = *ax* : *b*, per demonstr. Fiat IG=*c* & per I ducatur ipsi DF parallela AB, erit PQ=*pq* = *c* (§. 257. *Geom.*), consequenter PM vel *pm* = *ax* : *b* - *c*.

Tab. VII. Fig. 72. Denique sit AC=*c* & AD=*b*; ducatur per D recta EF ipsi AC parallela fiatque DE=*a*. Ducatur recta AL & per C ipsi AL parallela CB. Quodsi alia parallela MN ad EF agatur: erit AP=*x*, PM=*y*. Est enim (§. 268. *Geom.*),

$$AD : DE = AP : PN$$

$$b : a = x : \frac{ax}{b}$$

Sed MN=AC=*c* (§. 257. *Geom.*). Ergo PM=*c* - *ax* : *b*.

PROBLEMA CCXXXII.

587. *Invenire theorematum generalia construendi omnes aequationes ad parabolam.*

Duo theorematum nobis investiganda: in quorum altero *y* refertur ad concavitatem, in altero autem ad convexitatem parabolae.

Tab. VII. Fig. 75. Sint KP & DL, itemque KD & QM inter se parallelae, & LDH angu-

lus quicunque. Sit porro DH=*q*, LH=*r*, DL=*f*, DK=PN (§. 257. *Geom.*) = *n*, KA=*p*, & parametro *t* describatur parabola AM, cujus axis vel diameter AP. Sit porro DQ=*x*, QM=*y*: erit (§. 268. *Geom.*)

$$DH : DL = DQ : DN (=PK)$$

$$q : f = x : \frac{fx}{q}$$

$$DH : HL = DQ : QN$$

$$q : r = x : \frac{rx}{q}$$

Ergo AP=PK - KA = $\frac{fx}{q} : q - p$

$$\& PM = QM - KD - QN = y - \frac{rx}{q} - n$$

Quare cum sit PM=*t*. AP (§. 388), erit

$$y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2 = \frac{tfx}{q} - tp$$

hoc est,

$$y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2 = 0$$

$$- \frac{tfx}{q} + tp$$

Sit denuo in casu altero, ubi IM parallela ipsi DQ & DI ipsi QM, DH=*q*, LH=*r*, DL=*f*, KA=*p*, DK=PN (§. 257. *Geom.*) = *n*, IM=DQ=*y*, QM=*x*. Parabola AM denuo parametro *t* describatur.

Erit (§. 268. *Geom.*).

$$DH : DL = DQ : DN$$

$$q : f = y : \frac{fy}{q}$$

$$DH : HL = DQ : QN$$

$$q : r = y : \frac{ry}{q}$$

Ergo AP=DN - AK = $\frac{fy}{q} : q - p$ & PM = QM

Tab. VII. Fig. 76

$QM - QN - PN = x - ry : q - n.$

Quare cum sit $PM^2 = t$. AP; erit (§. 288. 419.)

$$x^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2y^2}{q^2} - 2nx + \frac{2nry}{q} + n^2 = \frac{t}{q} - tp$$

hoc est,

$$x^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2y^2}{q^2} - 2nx + \frac{2nry}{q} + n^2 = 0$$

$$- \frac{t}{q} + tp$$

Tab. VII. Sit e. gr. $y^2 - ax = 0$, erit $-\frac{2r}{q} = 0$ adeo-

que $\frac{rz}{q^2} = 0$, & $f = q$. porro $n = 0$ & $tf : q = a$,

hoc est, $a = t$. Cadit ergo punctum D in A & Q in P, nec alia re opus est, quam ut parametro a parabola AM describatur: erit enim $AP = x$, $PM = y$.

Sit $y^2 + ay - bx + \frac{1}{4}aa = 0$; erit $2r : q = 0$, consequenter H cadit in L, adeoque $f = q$. Porro $a = -2n$: ergo $-\frac{1}{2}a = n$. Item $-t = -b$, adeoque $t = b$. Denique $n^2 + tp = \frac{1}{4}aa$,

hoc est, $\frac{1}{4}a^2 + bp = \frac{1}{4}a^2$, adeoque $p = 0$. Cadit adeo punctum K in A. Parametro itaque

Tab. VII. b describenda parabola AM & in A erigen-

Fig. 74. da perpendicularis $AB = \frac{1}{2}a$. Ducta enim BS axi AB parallela, erit ob $n = \frac{1}{2}a$, $MS = y$ & $BS = x$.

Sit $yy - ay - bx + cc = 0$, erit $\frac{2r}{q} = 0$,

adeoque $q = f$

$$\frac{-2n = -a}{n = \frac{1}{2}a} \quad \frac{-t = -b}{t = b} \quad \frac{n^2 + tp = -cc}{tp = -c^2 - \frac{1}{4}a^2}$$

$$p = \frac{-c^2 - \frac{1}{4}a^2}{b}$$

Parametro ergo b describenda parabola Fig. 74. AHM & quia KA sive p est quantitas negativa, auferenda est ex AP, ita ut origo indeterminata x statuatur in R vel N. Denique ob $n = \frac{1}{2}a$; fit $AD = \frac{1}{2}a$ & ducatur DQ parallela axi AP, erit $NQ - RP = x$ & $QM = y$.

Sit $x^2 - ay + bb = 0$: erit vi theorematum secundi $r : q = 0$, adeoque $q = f$. Porro $n = 0$ &

$$\frac{-t = -a}{t = a} \quad \frac{tp = bb}{ap = \frac{bb}{b}} \quad p = \frac{bb}{a}$$

Construitur adeo parabola AHM parametro a , factaque $AK = bb : a$; erit $KP = x$, $PM = y$.

Sit $y^2 - \frac{axy}{b} + \frac{a^2x^2}{4b^2} - cx = 0$, erit

$$\frac{-\frac{2r}{q} = -\frac{a}{b}}{\frac{r}{q} = \frac{a}{2b}} \quad \frac{2n = 0}{n = 0} \quad \frac{-\frac{tr}{q} = -c}{t = \frac{qc}{s} = \frac{2bc}{s}}$$

$$n^2 + tp = 0 \quad p = 0$$

Construat itaque parametro $2bc : f$ parabola AHM & factis $AO = 2b$ atque RO ad AP normalis $= a$, ducatur recta AT; erit Fig. 74. TM ipsi OR parallela $= y$, $AT = x$.

Ceterum loca esse rite constructa patet, si affiuntis valoribus, prout per regulam determinantur, quaeratur aequatio ad curvam eademque cum proposita reperiatur. Etenim si in exemplo ultimo $AO = 2b$, $RO = a$, parameter $= 2bc : s$, $AT = x$, $TM = y$, cum sit

$$AO : AR = AT : AP$$

$$2b : f = x : \frac{fx}{2b}$$

erit t . $AP = 2bcfx : 2bf = cx$.

Et quia $AO : OR = AT : TP$

$$2b : a = x : \frac{ax}{2b}$$

erit $PM = TM - TP = y - \frac{ax}{2b}$

adeoque $PM^2 = y^2 - \frac{axy}{2b} + \frac{a^2x^2}{4b^2}$

Quare $y^2 - \frac{axy}{b} + \frac{a^2x^2}{4b^2} = cx$, consequenter

$y^2 - \frac{axy}{b} + \frac{a^2x^2}{4b^2} - cx = 0$, quae est aequatio ad construendum proposita.

PROBLEMA CCXXXIII.

588. Invenire theorema generale construendi omnia loca solida ad ellip. in.

Tab. VII. Circa diametrum AB descripta sit ellipsis AMB, sintque KD & LH semior-
 dinatæ PM, DL diametro AB parallela. Sit KD=PN=n, KC=p, DH=q, LH=r, DL=f, semidiameter AC vel CB=m, parameter=t, DQ=x, QM=y. Erit (§. 257. Geom.) KP=DN & (§. 268. Geom.)

$$DH:HL = DQ:QN$$

$$q:r = x:\frac{rx}{q}$$

$$DH:DL = DQ:DN$$

$$q:f = x:\frac{fx}{q}$$

Quare CP=DN, KC=fx : q-p & PM=QM, QN=PN=y, rx:q = n, Jam ex natura ellipsis (§. 420).
 $t:2m = PM^2:AP.PB.$

Est vero $PM^2 = y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2 x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2$, $AP = m + \frac{fx}{q} - p$ & $PB = m - \frac{fx}{q} + p$, adeoque $AP.PB = m^2 - p^2 + \frac{2pfx}{q} - \frac{f^2 x^2}{q^2}$. Ergo (§.

$$cit.) y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2 x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2 = \frac{tm^2 - tp^2}{2m} + \frac{2tpfx}{2mq} - \frac{tf^2 x^2}{2mq^2}$$

Unde tandem habetur.

$$y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2 x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2 = 0 + \frac{tf^2 x^2}{2mq^2} - \frac{2tpfx}{2mq} - \frac{tm^2}{2m} + \frac{tp^2}{2m}$$

Sit. gr. $y^2 + \frac{cx^2}{b} - \frac{ac}{b} = 0$. Quia in æquatione non habentur xy, y & x: erunt r:q=0,

q=f, n=0, p=0 hinc t:2m=c:b, hoc est, c:b exprimit rationem parametri ad diametrum. Erit porro $-\frac{tm^2}{2m} = -\frac{aac}{b}$, hoc est, substituto pro t:2m valore ipsius ante invento c:b, $\frac{m^2 c}{b} = \frac{aac}{b}$. Quare $m^2 = aa$, & hinc semidiameter $m = a$. Jam quoniam $2m:t = b:c$, erit $t = \frac{2ac}{b}$. Parametro igitur $\frac{2ac}{b}$ & axe 2a construatur ellipsis AMB; erit CP=x, PM=y.

Sit $y^2 + \frac{cx^2}{b} - \frac{cdx}{b} - \frac{aac}{b} = 0$. Quia in æquatione non habentur xy & y, erit r:q=0, n=0, consequenter f=q. Quare $\frac{t}{2m} = -\frac{c}{b}$, adeoque ratio diametri AB ad parametrum est = b:c. Porto $\frac{2rp}{2m} = \frac{cd}{b}$, hoc est, ob t:2m=c:b, 2p=d, seu p= $\frac{1}{2}d$. Denique $-\frac{tm^2}{2m} + \frac{tp^2}{2m} = -\frac{aac}{b}$, hoc est, ob t:2m=c:b $m^2 - p^2 = aa$, seu $m^2 = aa + \frac{1}{4}dd$. Est itaque semidiameter $\sqrt{aa + \frac{1}{4}dd}$. Quodsi ergo semidiametro $\sqrt{aa + \frac{1}{4}dd}$ & parametro $2c\sqrt{aa + \frac{1}{4}dd}:b$ describatur ellipsis, fiatque KC= $\frac{1}{4}d$; erit KP=x, PM=y.

Sit $y^2 - dxy: f + bx^2: c - aa = 0$. Erit 2r:q = d:f, adeoque r:q = d:2f. Porro $r^2:q^2 + f^2:2mq^2 = b:c$, hoc est $d^2:4f^2 + f^2:2m.4f^2 = b:c$, consequenter t:2m = (4bf^2 - f^2):cf^2. Est denique n=0, p=0 & -tm^2:2m = -aa, consequenter $m^2 = a^2 cf^2:(4bf^2 - cd^2)$, adeoque $m = \sqrt{a^2 cf^2:(4bf^2 - cd^2)}$. Hinc vero porro ob datam rationem 2m:t reperitur parameter t. Quare si parametro t & diametro 2m ellipsis construatur fiatque CF=2f, DF=d, ducta recta CQ ex C per F semiordinatæ PM continuatæ in Q occurrente, erit QM=y, CQ=x.

Locum rite esse constructum, eodem modo quo in Parabola ostenditur. Etenim

Tab. VII. Fig. 77.

$$CF : DF = CQ : QP$$

$$2f : d = x : \frac{dx}{2f}$$

Quare $PM = y - \frac{dx}{2f}$, consequenter

$$PM^2 = y^2 - \frac{dxy^2}{f} + \frac{d^2x^2}{4f^2}$$

Porro $CF : CD = CQ : CP$

$$2f : f = x : \frac{fx}{2f}$$

Quare $AP = \frac{\sqrt{aacf^2}}{\sqrt{(4bf^2 - cd^2)}} + \frac{fx}{2f}$ & $PB =$

$$\frac{\sqrt{aacf^2}}{\sqrt{(4bf^2 - cd^2)}} - \frac{fx}{2f}$$
, consequenter $AP \cdot PB =$

$$\frac{aacf^2}{4bf^2 - cd^2} - \frac{f^2x^2}{4f^2}$$
. Est itaque $\frac{t}{2m} \cdot AP \cdot PB$

$$= (4bf^2 - cd^2) a^2 c f^2 : c f^2 (4bf^2 - cd^2) - (4bf^2 f^2 x^2 + cd^2 f^2 x^2) 4cf^2 f^2 = a^2 - \frac{bx^2}{c}$$

+ $\frac{d^2x^2}{4f^2}$, consequenter cum sit in ellipsi

$$\frac{t}{2m} \cdot AP \cdot PB = PM^2$$
 (§. 420), $y^3 - \frac{dxy}{f}$

$$+ \frac{d^2x^2}{4f^2} = a^2 - \frac{bx^2}{c} + \frac{d^2x^2}{4f^2}$$
. Ergo $y^2 -$

$$\frac{dxy}{f} + \frac{bx^2}{c} - a^2 = 0$$
.

COROLIARIUM.

589. Cum in ellipsi sit $b : a = y^2 : ax - x^2$ (§. 420); si $b = a$, hoc est, si parameter diametro æqualis, erit $y^2 = ax - x^2$, seu $y^2 - ax + x^2 = 0$, quæ est æquatio ad circulum (§. 377). Æquatio itaque localis ad ellipsin degenerat in æquationem localem ad circulum: si ponatur $t = 2m$ & angulus ad P rectus: quo facto erit

$$y^2 - 2rxy + \frac{r^2x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2 = 0,$$

$$+ \frac{f^2x^2}{q^2} - \frac{2p^2x}{q} - \frac{m^2}{p^2}$$

Ceterum cum ex comparatione formulæ propositæ cum generali demum intelligatur, num $t = 2m$; eadem formula pro construendis locis ad ellipsin atque ad circulum sufficit.

Ponamus e.gr. $y^2 + x^2 - by - cx = 0$. Quoniam xy deest, erit $r : q = 0$, consequenter $f = q$. Quare $t : 2m = 1$, hoc est, $t = 2m$. Locus adeo planus est ad circulum. Porro

$$\frac{-2n = -b}{n = \frac{1}{2}b} \quad \frac{-2tp : 2m = -c}{2p = c, \text{ ob } t = 2m,}$$

$$p = \frac{1}{2}c$$

Denique $n^2 - m^2 + p^2 = 0$

$$n^2 + p^2 = m^2$$

h. e. $\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{4}c^2 = m^2$

$$m = \sqrt{(\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{4}c^2)}$$

Quare ducta linea recta AB & in ea assumpta CN = GD = $\frac{1}{2}b$, si porro fiat GN = CD & ad AB perpendicularis = $\frac{1}{2}c$ atque ex centro C radio CG describatur circulus; erit GR = NP = x & RM = y . Tab. VII. Fig. 73.

Cum enim sit $CG^2 = CD^2 + GD^2$ (§. 417. Geom.), erit $CG^2 = \sqrt{(\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{4}c^2)}$. Porro ob PR = GN (§. 257. Geom.) = $\frac{1}{2}c$, est $PM = y - \frac{1}{2}c$, adeoque $PM^2 = y^2 - cy + \frac{1}{4}cc$. Similiter $CP = PN - NC = x - \frac{1}{2}b$, adeoque $CP^2 = x^2 - bx + \frac{1}{4}b^2$. Quare cum sit $CP^2 + PM^2 = CM^2$ (§. 417. Geom.); erit $y^2 - cy + \frac{1}{4}c^2 + x^2 - bx + \frac{1}{4}b^2 = \frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{4}c^2$, adeoque $y^2 + x^2 - cy - bx = 0$: quæ est æquatio localis ad construendum proposita.

PROBLEMA CCXXXIV.

590. Invenire theorema generale construendi omnia loca ad hyperbolam circa diametrum descriptam. Tab. VIII. Fig. 80.

Diametro transversa AB = $2m$ & parametro t descripta sit hyperbola AM, cujus centrum in C, ductisque KD & LH cum QM, DL vero cum BP parallelis, fiat KD = PN = n , KC = p , DH = q , LH = r , DL = f , DQ = x , QM = y , erit (§. 257. Geom.) KP = DN & (§. 268. Geom.)

$$DH : HL = DQ : QN$$

$$q : r = x : \frac{rx}{q}$$

DH : DL = DQ : DN

$$q : f = x : \frac{fx}{q}$$

Quare CP = DN — KC = $\frac{fx}{q} - p$ &

PM = QM — QN — PN = $y - rx : q - n$.
Jam (§. 459.)

$t : 2m = PM^2 : AP \cdot PB$

Est vero $PM^2 = y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2x^2}{q^2} - 2ny$

$+ \frac{2nrx}{q} + n^2$ & AP · PB = (CP — CA)

(CP + CA) = CP² — CA² (§. 499.) =

$\frac{f^2x^2}{q^2} - \frac{2pfx}{q} + p^2 - m^2$. Unde habetur

$\frac{t^2x^2}{2mq^2} - \frac{2tpfx}{2mq} + \frac{tp^2}{2m} - \frac{tm^2}{2m} = y^2 - \frac{2rxy}{q} +$

$\frac{r^2x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2$.

Quare æquatio generalis pro quovis loco hyperbolico.

$$y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2x^2}{q^2} - 2ny + \frac{2nrx}{q} + n^2 = 0$$

$$- \frac{t^2x^2}{2mq^2} + \frac{2tpf}{2mq} + \frac{tm^2}{2m}$$

$$- \frac{tp}{2m}$$

Quando contingit, reperiri $t = 2m$, hyperbola est æquilatera (§. 505).

Eadem formula reperitur, si hyperbola ad diametrum conjugatam refertur, nisi quod $tm^2 : 2m$ signo — afficiatur.

Sit e. gr. $y^2 - \frac{cx^2}{b} + \frac{acx}{b} = 0$. Cum in æquatione non habeantur xy, y & x ; erit $r : q = 0, n = 0, p = 0, f = q$, consequenter $-t : 2m = -c : b$, adeoque ratio parametri t ad diametrum $2m = c : b$. Porro $tm^2 : 2m = ac : b$, hoc est, ob $t : 2m = c : b, m^2 = aa$. Diameter adeo hyperbolæ $2a$: unde ob rationem diametri ad parametrum datam reperiri dia-

meter potest. Quare si datis diametro & Tab. parametrum hyperbola AML construatur; erit VIII. CP = $x, PM = y$. Est enim AC = CB = a , Fig. 79. adeoque BP = $a + x$ & AP = $x - a$, consequenter AP · PB = $x^2 - a^2$. Quare $c : b = y^2 : x^2 - a^2$ (§. 459.) Est itaque $y^2 - \frac{cx^2}{b} + \frac{acx}{b} = 0$.

Sit $y^2 - \frac{cx^2}{b} + \frac{acx}{b} = 0$. Quoniam in æquatione desiderantur xy, y & quantitas pure cognita; erit $r : q = 0, n = 0$ & quia (ob $r = 0$), DL coincidit cum DH, $f = q$. Quamobrem Fig. 80. $-t : 2m = -c : b$, hoc est, ratio parametri t ad diametrum $2m$ denuo = $c : b$. Porro $2tp : 2m = ac : b$, hoc est, (ob $t : 2m = c : b$), $2p = a$ seu $p = \frac{1}{2}a$: Denique quia ultimus terminus deficit, erit $n^2 + \frac{t^2n^2}{2m} - \frac{tp^2}{2m} = 0$ seu

$m^2 = p^2 = \frac{1}{4}aa$, adeoque $m = \frac{1}{2}a$.

Quare cum ob rationem diametri ad pa- Fig. 79. rametrum datam detur etiam parameter = $\frac{ac}{b}$; constructa hyperbola AML, erit BP = $x, PM = y$: quod ostenditur ut ante.

Sit $y^2 - x^2 + by - ax = 0$. Quia xy desideratur; erit $r : q = 0$, consequenter $f = q$. Quare $-t : 2m = 1$, hoc est, $t = 2m$. Et itaque locus ad hyperbolam æquilateram (§. 505). Porro

$$\frac{-2n = +b}{n = -\frac{1}{2}b} \quad \frac{2tp : 2m = -a}{2p = -a, \text{ ob } t = 2m}$$

$$p = -\frac{1}{2}a.$$

$$\frac{n^2 + \frac{tm^2}{2m} = \frac{tp^2}{2m}}{n^2 + m^2 = p^2}$$

$$m^2 = p^2 - n^2$$

hoc est, $m^2 = \frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}bb$

Diametro itaque $2\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)}$ conf- Tab. truatur hyperbola æquilatera AML, fiatque VIII. CR = Fig. 79.

CR = $\frac{1}{2}a$, KR = GP = $\frac{1}{2}b$; erit KG = RP = x , GM = y . Est enim PB = CB + CR + RP = $\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)} + \frac{1}{2}a + x$ & AP = AR + RP = CR - CA + RP = $\frac{1}{2}a - \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)} + x$, adeoque AP. PB = $ax + x^2 + \frac{1}{4}b^2$. Porro PM = GM + GP = $y + \frac{1}{2}b$: adeoque PM² = $y^2 + by + \frac{1}{4}b^2$. Quare cum sit PM² = AP. PB (§. 567); erit $y^2 + by + \frac{1}{4}b^2 = ax + x^2 + \frac{1}{4}b^2$, adeoque $y^2 + by = ax + x^2$, consequenter $y^2 - x^2 + by - ax = 0$.

Sit $y^2 - x^2 - by + ax = 0$. Quia xy desideratur, erit $r:q = 0$, adeoque $r = 0$ & $q = f$. Quare $t:2m = 1$, seu $t = 2m$. Est itaque locus ad hyperbolam æquilateram. Porro

$$\frac{-2n = -b}{n = \frac{1}{2}b} \quad \frac{2p = a}{p = \frac{1}{2}a} \quad \frac{n_2 + m^2 - p^2 = 0}{m^2 = p^2 - n^2} = \frac{\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2}{m = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)}}$$

Fig. 79. Diametro $2\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)}$ construatur hyperbola æquilatera AML, factaque CF ex centro C = $\frac{1}{4}a$ & FH ad FP perpendiculari = $\frac{1}{2}b$, ductisque HN ipsi FP & NM ipsi FH parallelis; erit HN = x , NM = y . Est enim BP = FP - BF = $x - \frac{1}{2}a + \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)}$, AP = FP - FA = $x - \frac{1}{2}a - \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}b^2)}$, adeoque AP. PB = $x^2 - ax + \frac{1}{4}b^2$. Porro PM = MN - PN = $y - \frac{1}{2}b$, adeoque PM² = $y^2 - by + \frac{1}{4}b^2$. Quare cum sit PM² = AP. PB (§. 507.), erit $y^2 - by + \frac{1}{4}b^2 = x^2 - ax + \frac{1}{4}b^2$, adeoque $y^2 - x^2 - by + ax = 0$.

PROBLEMA CCXXXV.

Tab. VIII. Fig. 81. §91. Invenire theorema generale construendi omnia loca solida ad hyperbolam intra asymptotos.

Sint SA & AR asymptoti hyperbolæ MI. Ducatur DL uni earum AR parallela & huic jungatur utcunque recta DH. Sint denique KD, QM, IR, LH alteri asymptotorum SA parallelæ. Ponamus denuo KD = PN = n , KA = p ,

DH = q , LH = r , DL = f , DQ = x , QM = y , RI = m , AR = DL = f : erit (§. 268. Geom.)

DH: HL = DQ: QN

$q : r = x : \frac{rx}{q}$

DH: DL = DQ: DN

$q : f = x : \frac{fx}{q}$

Ergo AP = DN - AK = $\frac{fx}{q} - p$ &

PM = QM - PN - NQ = $y - n - rx : q$.

Quare ob AR. RI = AP. PM (§. 502.).

$$ms = \frac{fyx}{q} - \frac{frx^2}{q^2} - py - \frac{fnx}{q} + \frac{prx}{q} + pn$$

$$msq = \frac{fyx - frx^2 - pqy - fnx + prx + pnq}{q}$$

$$mq = xy - \frac{rx^2}{q} - \frac{pqy}{f} - nx + \frac{prx}{f} + \frac{pnq}{f}$$

$$xy - \frac{rx^2}{q} - \frac{pqy}{f} + \frac{prx}{f} + \frac{pnq}{f} = 0$$

— nx — mq

Invenitur adhuc regula alia pro locis ad hyperbolam intra asymptotos, si valor ipsius x ponatur esse QM. Tab. VIII. Fig. 82.

Sit nimirum IM hyperbola, cujus asymptoti RA & AS. Ducantur DT, HL & QM cum asymptoto AS, DL vero cum altera KR & DH ipsi TM parallela. Sit ut ante AK = p , KD = PN = n , DH = q , DL = AR = f , HL = r , RI = m , QM = x , DQ = TM = y . Erit (§. 268. Geom.).

DH: DL = DQ: DN

$q : f = y : \frac{fy}{q}$

DH: HL = DQ: QN

$q : r = y : \frac{ry}{q}$

Et

Ergo $AP = DN - AK = sy : q - p$ &
 $PM = QM - QN - NP = x - ry : q - n$.

Quare ob AR. RI = AP.PM (§. 502):

$$ms = \frac{fxy}{q} - \frac{rfy^2}{q^2} - \frac{fny}{q} - px + \frac{pry}{q} + pn.$$

Unde tandem eodem modo, quo ante usi sumus, reperitur.

$$xy - \frac{ry^2}{q} - \frac{pqx}{f} + \frac{pry}{f} + \frac{pnq}{f} = 0.$$

$$-ny \quad -mq$$

Sit e. gr. $xy + \frac{fdy}{c} - \frac{abd}{c} = 0$: erit $r : q = 0$, adeoque $r = 0$ & hinc $q = f$, quia L cadit in H, $-pq : f = +fil : c$, hoc est, ob $q = f$, $p = -fd : c$. Porro $+pr : f - n = 0$, quia x in aequatione praesente deficit, & hinc, ob $r = 0$, $n = 0$. Denique $pnq : s - mq = -abd : c$. Sed $pnq : s = 0$; ergo $mq = ms = abd : c$. Quare si $f = ab : c$; erit $m = d$. Fiat igitur $AR = ab : c$ & $IR = d$, atque constructa hyperbola intra asymptotos porro $OA = fd : c$; erit $OP = x$, $PM = y$. Nam $AP = x + fd : c$ adeoque $AP . PM = xy + fdy : c$. Quare cum sit $AR . RI = abd : c$ erit

$$xy + fdy : c = abd : c$$

$$\text{adeoque } xy + \frac{fdy}{c} - \frac{abd}{c} = 0.$$

$$\text{Sit } xy - \frac{bxx}{a} - cy = 0. \text{ Erit } r : q =$$

$-b : a$, hoc est, $r = b$, $q = a$, Porro $-pq : f = -c$. Ergo $p = fc : a$. Cum x in aequatione desit; $pr : f - n = 0$, seu $pr : f = n$, hoc est, $bc : a = n$. Denique quoniam terminus ultimus itidem deficit, $pnq : f - mq = 0$, seu $pnq : f = mq$, vel $pn : f = m$, hoc est, $bc^2 : a^2 = m$. Cognitis valoribus rectorum AK, KD, DH, HL, AR, RI; constructio loci manifesta est. Est enim $AK = fc : a$, $KD = bc : a$, $DH = a$, $HL = b$, $DL = AR = f$, $RI = bc^2 : a^2$, $DQ = x$, $QM = y$: His enim positus, erit AR, RI

$= fbc^2 : a^2$. Porro (§. 268. Geom.).

$$DH : DL = DQ : DN$$

$$a : f = x : \frac{fx}{a}$$

Quare cum sit $KA = fc : a$, erit $AP = (fx - fc) : a$. Est vero etiam

$$DH : LH = DQ : QN$$

$$a : b = x : \frac{bx}{a}$$

Quare cum sit $KD = PN = bc : a$ & $QM = y$, erit $PM = y - bx : a - bc : a$.

Habemus adeo AP. PM = $\frac{fxy}{a} - \frac{fcy}{a} - \frac{bfx^2}{a^2} + \frac{bfc^2}{a^2}$.

Quoniam itaque AR. RI = AP. PM, erit $\frac{fxy}{a} - \frac{fcy}{a} - \frac{bfx^2}{a^2} + \frac{bfc^2}{a^2} = \frac{bfc^2}{a^2}$; unde reperitur $xy - cy - \frac{bx^2}{a} = 0$.

SCHOLIION.

592. Ut usus hujus doctrine appareat; exempla aliquot problematum indeterminatorum in medium afferenda. Antequam tamen id fiat, tradenda sunt criteria, unde iudicium fieri possit, cum quam formularum antecedentium comparanda sit aequatio ad construendum proposita. Nimirum duo occurrere possunt casus: aut enim in aequatione proposita habetur xy , aut minus. Si in priori casu quadratorum indeterminatorum neutrum occurrat, vel saltem alterutrum, locus est hyperbola intra asymptotos; si quadrata indeterminatarum x^2 & y^2 diversis signis afficiuntur, locus est hyperbola circa diametrum descripta; si eadem quadrata eodem signo afficiuntur, sitque coefficientis dimidius facti xy aequalis radici coefficientis quadrati x^2 , locus est parabola; si minor, hyperbola; si major, ellipsis. In casu posteriori si unum tantum quadratorum indeterminatorum adsit, locus est parabola; si utrumque eodem signo afficiatur, ellipsis vel circulus; si signis diversis gaudeant, hyperbola. Nempe in casu ultimo hyperbola est aequilatera, in penultimo circulus, si terminus x^2 a fractione liber. Quae omnia manifesta sunt ex accurata formularum generalium inter se collatarum consemplatione.

Quod

Fig. 81.

Quod si quantitatis alicujus valor per regulam generalem eruitur negativus, quantitas ista ex parte opposita sumenda est, quemadmodum in exemplis propositis a nobis factum.

PROBLEMA CCXXXVI.

593. Construere rhomboidem ea conditione, ut rectangulum ex lateribus sit aequale quadrato dato.

Sit quadratum datum a^2 , sint latera rhombi x & y : erit per conditionem problematis $xy = a^2$. Construenda itaque est hyperbola intra asymptotos CG & CR, cujus potentia $AI = a$. Erit CQ latus unum rhomboidis, QM alterum (§. 488).

PROBLEMA CCXXXVII.

594. Quadratum construere, quod sit aequale rectangulo, cujus latera differunt recta data.

Sit recta data $= b$, latus unum rectanguli $= x$, erit alterum $= b + x$. Unde per conditionem problematis $y^2 = bx + x^2$: qui est locus ad hyperbolam æquilateram, cujus parameter $= b$ (§. 505).

Id etiam ex formula generali elicuitur. Quoniam enim $y^2 - x^2 - bx = 0$, erit (§. 590) $2r: q = 0$, adeoque $r = 0$, $q = f$, $r^2: q^2 = 0$; porro $2n = 0$ & hinc $2nr: q = 0$, $n^2 = 0$. Est vero $-t^2: 2mq^2 = -1$, hoc est, ob $q^2 = f^2$, $t: 2m = 1$ seu $t = 2m$. Unde apparet, locum esse ad hyperbolam æquilateram. Est præterea $2tpf: 2mq = -b$, hoc est, ob $t = 2m$ & $f = q$, $2p = -b$, unde $p = -\frac{1}{2}b$. Denique $tm^2: 2m - tp^2: 2m = 0$, quia quantitas mere cognita in formula data non habetur, hoc est, $m^2 - p^2 = 0$, seu $m^2 = p^2 = \frac{1}{4}bb$. Unde $m = \frac{1}{2}b$. Constructio ex constructione generali haud

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

difficiliter elicitur. Nimirum pro diametro transversa $AB = 2m$ pone b . Quia $KC = -\frac{1}{2}b$. punctum K cadet in partem contrariam & quidem in A, quia semidiametro in hoc casu æqualis. Unde origo indeterminata x erit in A, nam ob $DK = PN = 0$, punctum D in K, consequenter in nostro casu in A cadit. Porro ob $HL = 0$ puncta H & L, adeoque & puncta Q & N, & ob $PN = 0$, puncta N & P, consequenter Q & P coincidunt: unde origo alterius indeterminata y est in P.

Est enim $BP = b + x$, adeoque AP . $PB = bx + x^2$, Quare cum $PM^2 = y^2$; erit $y^2 = bx + x^2$.

PROBLEMA CCXXXVIII.

595. Super data recta AB triangulum construere, ita ut quadrata laterum AC & CB sint in ratione data. Tab. VIII. Fig. 83.

Sit ratio data $= b: c$ $DB = x$
 $AB = a$ $DC = y$
 erit $AD = a - x$

Quoniam (§. 417. Geom.) $AC^2 = y^2 + a^2 - 2ax + x^2$ & $CB^2 = x^2 + y^2$; erit per conditionem problematis

$$\frac{b: c = y^2 + a^2 - 2ax + x^2: x^2 + y^2}{bx^2 + by^2 = cy^2 + a^2c - 2acx + cx^2}{by^2 - cy^2 + bx^2 - cx^2 + 2acx - a^2c = 0}$$

$$y^2 + x^2 + \frac{2acx}{b-c} - \frac{a^2c}{b-c} = 0$$

Hæ æquatio comparanda est cum æquatione generali locorum ad ellipsin, quia deest xy , & y^2 atque x^2 eodem signo afficiuntur (§. 592). Reperitur adeo (§. 588).

$$\frac{2n}{q} = 0 \quad -2n = 0 \quad \frac{r^2: q^2 + t^2: 2mq^2 = 1}{t: 2m = 1}$$

hinc:
 $r = 0$ & $q = f$ $2nr: q = 0$ h. e. $t = 2m$

C c c

Cum

Cum diameter $2m$ parametro æqualis sit; locus ad construendum propositus est circulus.

Porro

$$\frac{2nr}{q} - \frac{2tpf}{2mq} = \frac{2ac}{b-c} \quad n^2 - \frac{tm^2}{2m} + \frac{tp^2}{2m} = \frac{a^2c}{b-c}$$

h. e. $2p = \frac{2ac}{b-c} \quad p^2 - m^2 = \frac{a^2c}{b-c}$

$$p = \frac{ac}{b-c} \quad p^2 + \frac{a^2c}{b-c} = m^2$$

$$\frac{a^2c^2}{(b-c)^2} + \frac{a^2c}{b-c} = m^2$$

h. e. $\frac{a^2c^2 + a^2bc - a^2c^2}{(b-c)^2} = m^2$

$$\frac{a^2bc}{(b-c)^2} = m^2$$

$$\frac{a\sqrt{bc}}{b-c} = m$$

Est ergo radius circuli $= a\sqrt{bc} : (b-c)$. Quodsi igitur $AL = ac : (b-c)$ & radio $CL = a\sqrt{bc} : (b-c)$ describatur circulus ECF: erit $AD = x$, $DC = y$. Nam ponatur brevitatis gratia $AL = p$, $LF = m$; erit $DL = p - x$, $ED = m - p + x$ & $DF = m + p - x$, consequenter, ob $ED \cdot DF = DC^2$, $m^2 - p^2 + 2px - x^2 = y^2$

$$y^2 + x^2 - 2px + p^2 = 0$$

hoc est, substitutis valoribus p & $p^2 = m^2$

$$\text{erit } y^2 + x^2 + \frac{2acx}{b-c} - \frac{a^2c}{b-c} = 0.$$

PROBLEMA CCXXXIX.

Tab. VIII. Fig. 84. 596. *Duas rectas AB & CD ita secare in E & F, ut AE. EB = CF. FD.*

Sit $AB = a$, $AE = x$
 $CD = b$, $CF = y$
 erit $EB = a - x$
 $FD = b - y$

Quare $ax - xx = by - yy$

$$y^2 - x^2 - by + ax = 0$$

Hæc æquatio comparanda cum æquatione locali pro hyperbola. Est nempe.

$$\frac{2r}{q} = 0 \text{ \& hinc } \frac{q = f}{q^2 = f^2} \quad \frac{r^2}{q^2} = 0 \quad \frac{2nr}{q} = 0$$

$$\frac{t^2}{2mq^2} = -1 \quad \frac{-2n = -b}{n = \frac{1}{2}b} \quad \frac{2tpf}{2mq} = a$$

$$t : 2m = 1$$

$$2p = a$$

$$t = 2m$$

$$p = \frac{1}{2}a$$

$$n^2 + \frac{tm^2}{2m} - \frac{tp^2}{2m} = 0$$

$$n^2 + m^2 - p^2 = 0$$

$$m^2 - p^2 - n^2 = \frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}bb$$

$$m = \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}bb\right)}$$

¶ Quoniam $t = 2m$, hoc est, parametro diametro æqualis; hyperbola est æquilatera (§. 505), diametro $= 2\sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}bb\right)}$ construenda. Cum diametro determinata AB agatur parallela HN & cum MN altera FH , ita ut sit $FH = PN = \frac{1}{2}b$ & $CF = \frac{1}{2}a$, erit $HN = x$ & $MN = y$. Est enim $CP = x - \frac{1}{2}a$; $PM = y - \frac{1}{2}b$, & $AC = \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}bb\right)}$. Quare, ob $AP \cdot PB = CP^2 - AC^2 = PM^2$, $x^2 - ax + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}bb = y^2 - by + \frac{1}{4}bb$

$$x^2 - ax = y^2 - by$$

$$y^2 - x^2 - by + ax = 0$$

Tab. VIII. Fig. 79.

PRO-

PROBLEMA CCXL.

Tab. VIII. Fig. 85.

597. Super recta AB descriptus sit semicirculus ANB, & alius minor ERD. Ex puncto quocunque N demittatur ad AB perpendicularis PN, ductoque radio CN, ex puncto R perpendicularis alia RM. Determinare locum, in quo sunt omnia puncta M eodem modo determinata.

Sit $AB = a$, $ED = d$, $AP = x$, $PM = y$: erit $PB = a - x$, $PN = \sqrt{(ax - x^2)} = v$ (§. 377.), $PC = \frac{1}{2}a - x$, $NR = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}d$ & (§. 268. Geom.)

$NC : NP = NR : NM$

$\frac{1}{2}a : v = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}d : \frac{(a-d)v}{a}$

Quare $PM = v - \frac{av - dv}{a} =$

$\frac{av - av + dv}{a} = \frac{dv}{a}$, consequenter

$PM^2 = y^2 = d^2 v^2 : a^2$. Unde habetur $a^2 y^2 = d^2 (ax - x^2)$, substituto nimirum valore ipsius v^2 , quæ aequatio in sequentem resolvitur analogiam:

$y^2 : ax - x^2 = d^2 : a^2$

h. c. $PM^2 : PA \cdot PB = CF^2 : AC^2$

Unde intelligitur locum punctorum M esse ellipsin, cujus axes conjugati AB & BD (§. 430).

SCHOLIUM.

598. Apatet adeo curvam, quam fornicibus construendis aptam predicat Serlius (k) esse ellipsin.

COROLLARIUM.

599. Quoniam $PN = v$, $PM = \frac{1}{2}dv : \frac{1}{2}a$,

erit $PN : PM = v : \frac{\frac{1}{2}dv}{\frac{1}{2}a}$

hoc est (§. 124.) $= \frac{1}{2}av : \frac{1}{2}dv = \frac{1}{2}a : \frac{1}{2}d$,
 $= CG : CF$

(k) Architect. lib. 1. c. 1. f. m. 9. b.

PROBLEMA CCXLI.

Tab. VIII. Fig. 86.

600. Super recta HI describatur semicirculus HGI. Sit recta quæcunque AB bifariam divisa in C & ex C erecta perpendicularis $CD = GF$. Erecta perpendicularis LN fiat $DC : AC = HL : AP$ & in P erigatur perpendicularis $PM = NL$. Determinare locum, in quo sunt omnia puncta M eodem modo inventa.

Sit $HF = GF = DC = d$, $AC = a$, $AP = x$, $PM = y$: erit ex hypothesi $AC : DC = AP : HL$

$a : d = x : \frac{dx}{a}$

Quare $LI = 2d - dx : a = (2ad - dx) : a$, & hinc $LN^2 = (2addx - ddx) : aa$ (§. 367). Habemus itaque ex hypothesi:

$y^2 = (2addx - ddx) : aa$

adeoque, $aa : 2ax - xx = dd : y^2$.

Est igitur locus quæsitus ellipsis, cujus semiaxes conjugati AC & CD (§. 430).

SCHOLIUM.

601. Evidens adeo est, curvam, quam Albertus Duretus & cum ipso Daniel Hartmannus (l) fornicibus construendis aptam predicant, esse ellipsin Apollonianam.

PROBLEMA CCXLII.

602. Rectam DB ita secare in P simulque invenire aliam rectam y, ita ut rectangulum ex y in datam CA sit æquale rectangulo ex segmentis partium DP & PB. Tab. VIII. Fig. 87.

Sit $DB = a$, $AC = b$, $DP = x$, erit $PB = a - x$, consequenter per conditionem problematis

$CCc 2 \quad ax -$

(l) In der Bürgerlichen Bau-Kunst, f. 7. & seqq.

$$\frac{ax - xx = by}{x^2 - ax + by = 0.}$$

Est itaque locus ad parabolam (§. 592).

Quodsi cum æquatione locali ad parabolam generali modo inventam compares; erit (§. 587.)

$$\frac{-2r}{q} = 0 \quad -2n = -a \quad -1f: q = b$$

$$\text{hinc } q = f \quad n = \frac{1}{2}a \quad t = -b$$

$$nn + tp = 0$$

$$\frac{1}{4}aa - bp = 0$$

$$\frac{1}{4}aa = bp$$

$$\frac{1}{4}aa : b = p$$

Est adeo parameter = -b. Quare parametro b describenda est parabola deorsum tendens AMB, cujus pars altera AD, seu quod perinde est, describitur parabola circa axem AK (§. 393) & in eo fit AK = $\frac{1}{4}aa : b$, erit KB = $\frac{1}{2}a$ (§. 388.) = $\frac{1}{2}$ DB, adeoque DB linea ad fecandum proposita. Ducta igitur PM ipsi AK parallela, erit PB = x, PM = y. Nam KP = RM = $\frac{1}{2}a - x$ & AR = $\frac{1}{4}aa : b - y$. Quare (§. 388) $\frac{1}{4}aa - ax + xx = \frac{1}{4}aa - by$, consequenter $x^2 - ax + by = 0$.

PROBLEMA CCXLIII.

603. *Datam rectam MN in tres partes continue proportionales secare.*

Tab. VIII. Fig. 88. Sit MN = a, pars prima = x, secunda = y, erit tertia = yy : x & per conditionem problematis.

$$\frac{x + y + yy : x = a}{xx + xy + yy = ax}$$

$$\frac{yy + xy + xx - ax = 0$$

Cum locus sit ad circulum (§. 592.); æquatio comparanda est, cum formula generali ad circulum.

Erit ergo $\frac{2r}{q} = 1$, hoc est, $\frac{r}{q} = \frac{1}{2}$, nempe r = -1 & q = 2.

Porro:

$$\frac{r^2}{q^2} + \frac{f^2}{q^2} = 1 \quad 2n = 0.$$

$$\frac{\frac{1}{4} + \frac{f^2}{4} = 1}{\text{hinc } \frac{2nr}{q} = 0}$$

$$\frac{1 + f^2 = 4}{n^2 = 0}$$

$$\frac{f^2 = 3}{-\frac{2pf}{q} = -a}$$

$$\frac{f = \sqrt{3}}{\frac{2p\sqrt{3}}{2} = a}$$

$$\frac{m^2 = n^2 + p^2 = p^2}{p = \frac{a}{\sqrt{3}}}$$

Describatur ergo radio AC = a : $\sqrt{3}$ semicirculus, fiat (ob valorem negativum ipsius r) HL : AL = 1 : $\sqrt{3}$. Tab. VIII. Fig. 88.

ob valorem scilicet ipsius r negativum triangulum ALH contraria ratione conftruendum, ita ut angulus rectus sit in L, qui in formula generali supponitur in H: ita enim prodit f = $\sqrt{3}$, quemadmodum ex regula eruitur per theorema Pythagoricum. Ducatur porro recta AHR. Quodsi inter C & B erigatur perpendicularis PM: erit AQ = x, QM = y. Nam (§. 268. Geom.)

$$\text{AH} : \text{HL} = \text{AQ} : \text{QP}$$

$$2 : 1 = x : \frac{1}{2}x$$

$$\text{Unde } \text{PM} = y + \frac{1}{2}x \text{ \& } \text{PM}^2 = y^2 + xy + \frac{1}{4}x^2$$

$$\text{Porro } \text{AH} : \text{AL} = \text{AQ} : \text{AP}$$

$$2 : \sqrt{3} = x : \frac{x\sqrt{3}}{2}$$

Unde

Unde $PB = AB - AP = \frac{2a}{\sqrt{3}} - \frac{x\sqrt{3}}{2}$
 & $AP \cdot PB = ax - \frac{3}{4}x^2$ Habemus adeo
 (§. 377).

$$\frac{y^2 + xy + \frac{1}{4}xx = ax - \frac{3}{4}x^2}{y^2 + xy + x^2 - ax = 0.}$$

SCHOLIION.

604. Eodem modo æquationes locales inveniri possunt pro Curvis superiorum generum ad construenda loca hypersolidi. Primus formulas generales computavit Joannes Craigius (a) earumque usum deinde uberius exposuit Hospitalius (b).

C A P U T V I I I.

De Constructione Æquationum Superiorum.

PROBLEMA CCXLIV.

605. **Æ**quationem quamcunque geometricè construere.

1. Introducatur in æquationem datam nova indeterminata, &
2. Hujus ope æquatio in alias locales ad diversas curvas transformetur, in quibus nempe sint duæ indeterminatæ.
3. Construantur duæ æquationes locales. Communis enim intersectio radices determinabit.

SCHOLIION.

606. Genuinum hoc æquationes construendi artificium primus aperuit Renatus Franciscus Slusius, Canonicus Leodiensis (c): quem postea secuti sunt alii de hac materia commentati. Ut autem methodi vim intelligamus; eam exemplis cubicarum imprimis & quadrato-quadraticarum æquationum illustrabimus, quoniam ad has construendas sufficiunt, quæ de locis planis & solidis in capite præcedente tradidimus.

(a) In Tractatu de figurarum curvilinearum Quadraturis & Locis geometricis p. 62. & seqq.

(b) Traité analytique des Sect. con. lib. 3. p. 206. & seqq.

(c) Mesolabo Part. 2. integra.

PROBLEMA CCXLV.

607. Construere æquationem cubicam.
 $y^3 + aby = aac.$

Æquatio proposita $y(y^2 + ab) = aac.$ in hanc resolvitur analogiam

$$a : y = y^2 + ab : ac.$$

ut nova indeterminata in æquationem introducatur & ejus ope æquationes locales ad diversas curvas eliciantur, fiat

$$\frac{a : y = y : x}{erit I. ax = y^2. \quad Hinc x = y^2 : a}$$

Porro $y : x = yy + ab : ac$ (§. 167. Arithm.)

hoc est, $\frac{= ax + ab : ac}{seu (§. 124.) = x + b : c}$

$$\frac{= x + b : c}{II. \quad x^2 + bx = cy}$$

$$ax = y^2$$

$$\frac{x^2 + bx = cy}{III. ax - x^2 - bx = y^2 - cy}$$

$$ax = y^2$$

$$\frac{x^2 + bx = cy}{IV. x^2 + ax + bx = y^2 + cy}$$

$$III. ax - x^2 - bx = y^2 - cy$$

$$x^2 + bx = cy$$

$$x^2 + \frac{by^2}{a} = cy$$

$$V. y^2 + \frac{ax^2}{b} = \frac{acy}{b}$$

$$y^3 + aby = aao$$

$$\frac{y^3}{a} + by = ac$$

$$VI. xy + by = ac$$

Habemus adeo æquationes locales:

$$I. y^2 - ax = 0$$

$$II. x + bx - cy = 0$$

$$III. y^2 + x^2 - cy + bx = 0$$

$$IV. y^2 - x^2 + cy - ax = 0$$

$$V. y^2 + \frac{ax^2}{b} - \frac{acy}{b} = 0$$

$$VI. xy + by - ac = 0$$

Locus primus & secundus sunt ad parabolam; tertius ad circulum; quartus ad hyperbolam æquilateram; quintus ad ellipsin; sextus ad hyperbolam intra asymptotos.

Equidem constructio æquationis absolvi potest, duobus quibuscunque locis combinatis; præstat tamen nonnisi circulum cum una ex sectionibus conicis combinari, non tam quod circulus sit locus planus (ut vulgo cum *Cartesio* sentiunt); sed quia facilius describitur sectionibus coni.

Agedum itaque, construamus æquationem propositam primum ope æquationis ad parabolam $y^2 - ax = 0$ & alterius ad circulum $y^2 + x^2 - cy + bx - ax = 0$.

Locus prior construitur, si parametro a parabola describatur: erit origo

indeterminatæ x in vertice, nempe AP Tab. IX.

$=x$, PM $=y$ (§. 587).
Pro circulo erit vi theorematis generalis (§. 589).

$$\frac{2n}{q} = 0 \quad \frac{2n}{q} = c \quad -2p = b - a$$

$$\& \text{ hinc } q = f \quad n = \frac{1}{2}c \quad -p = \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$$

$$(r^2 + s^2): q^2 = 1$$

$$\text{feu } f = q$$

$$n^2 + p^2 = m^2$$

$$\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb = m^2$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb)} = m$$

Quodsi ergo radio AL $= m$ semicirculus AMB describatur, sumaturque LK $= \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$ deorsum, quia valor ipsius p negativus, & KD $= \frac{1}{2}c$, atque DQ ipsi AB, QM vero inter K & A ob valorem ipsius p negativum, si $b > a$, ipsi KD parallela ducatur: erit (§. 588. 589.) origo indeterminatæ x in D, nempe DQ $= x$ & QM $= y$.
Tab. IX. Fig. 90.

Si jam circulus cum parabola combinandus, quo eadem sit indeterminata- & 89. rum origo, punctum D in A & DQ super AP cadere debet. Quare si fiat perpendicularis AK $= \frac{1}{2}c$ & altera KL $= \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$: erit centrum circuli L & radius LA. Quodsi is describatur, secabit parabolam in unico puncto M. Dico, semiordinatam parabolæ PM esse radicem veram æquationis, radices duas reliquas nonnisi imaginarias.

Est nimirum AK $= PR = \frac{1}{2}c$, KL $= \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$, adeoque LA $= \sqrt{(\frac{1}{4}bb - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc)}$, qui est radius circuli per superius demonstrata, &, si PM $= y$, MR $= y - \frac{1}{2}c$. Porro AP $= KR = yy: a$ (§. 391), consequenter LR $= y^2: a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$ & hinc ob LM² seu LA² $= LR^2$.

$$\begin{aligned} &= LR^2 + MR^2 \text{ (§. 417. Geom.) } \frac{1}{4}bb \\ &- \frac{1}{2}ab + ac + \frac{1}{4}cc = \frac{y^4}{aa} + \frac{by^2}{a} + \frac{1}{4}bb - y^2 \\ &- \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}aa + y^2 - cy + \frac{1}{4}cc, \\ &\text{hoc est,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{y^4}{aa} + \frac{by^2}{a} - cy &= 0 \\ \frac{y^4 + aby^2 - aacy}{y} &= 0 \\ y^3 + aby - aac &= 0 \end{aligned}$$

Fig. 90. Quodsi fuerit $a > b$, erit $p = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$, consequenter cum valor ipsius p sit positivus, punctum K cadet ultra centrum L versus B, & $KL = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$, $KD = \frac{1}{2}c$ ut ante. Cetera fiunt ut ante. Cadit vero tum centrum L infra AK.

Construamus porro eandem æquationem combinato circulo cum ellipsi. Quoniam locus ad ellipsin est $y^2 + \frac{ax^2}{b} - \frac{acy}{b} = 0$; erit (§. 588).

$$\begin{aligned} \frac{2r}{q} = 0 \quad \frac{t}{2m} = \frac{a}{b} \quad 2n &= \frac{ac}{b} \\ \text{hinc } r = 0 \quad n &= \frac{ac}{2b} \\ \& \text{ } q = f \\ \frac{2nr}{q} - \frac{2tps}{2mq} = 0 \quad n^2 - \frac{tm^2}{2m} + \frac{tp^2}{2m} &= 0 \\ - \frac{2tp}{2m} = 0 \quad n^2 &= \frac{tm^2}{2m} \\ p = 0 \quad \frac{a^2c^2}{4b^2} &= \frac{am^2}{b} \\ & \frac{ac^2}{4b} = m^2 \\ \frac{1}{2} \sqrt{\frac{ac^2}{b}} &= m \end{aligned}$$

Est itaque ratio parametri t ad diametrum $2m$ ut a ad b : ellipsis diametro $AB = \sqrt{(ac^2 : b)}$ & parametro t describenda & in centro C erecta per-

pendulari $CF = ac : 2b$, ductisque FQ Tab. ipfi AC & QM ipfi CF parallelis, erit IX. $FQ = x$ & $QM = y$, origo nempe in Fig. 91. determinatæ x in F. Circulus itaque ita combinandus cum ellipsi, ut punctum D in F & DK super FC cadat, hoc est, $FC = \frac{ac}{2b}$ continetur in K, donec fiat $FK = \frac{1}{2}c$ (est enim $b > a$, hinc $bc > ac$, consequenter $c > ac : b$) & in K erigatur perpendicularis $KL = \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$: erit enim per præcedentia L centrum, LF radius circuli, qui descriptus ellipsin in M secabit. Dico QM esse radicem æquationis.

Ponamus enim $QM = y$. Quoniam $CF = PQ = ac : 2b$ & $FQ = CP = x$, $AC = \frac{1}{2}\sqrt{(ac^2 : b)}$ erit $PM = QM - PQ = y - ac : 2b$, $AP = \frac{1}{2}\sqrt{(ac^2 : b)} - x$, $PB = \frac{1}{2}\sqrt{(ac^2 : b)} + x$, $PM^2 = y^2 - acy : b + a^2c^2 : 4b^2$ & $AP \cdot PB = ac^2 : 4b - x^2$, & ex natura ellipsis (§. 420).

$$\begin{aligned} b : a &= \frac{ac^2}{4b} - x^2 : y^2 - \frac{acy}{b} + \frac{a^2c^2}{4b^2} \\ \frac{a^2c^2}{4b^2} - \frac{ax^2}{b} &= y^2 - \frac{acy}{b} + \frac{a^2c^2}{4b^2} \\ y^2 + \frac{ax^2}{b} - \frac{acy}{b} &= 0 \\ \frac{ax^2}{b} = \frac{acy}{b} - y^2 \\ x^2 &= cy - by^2 : a \end{aligned}$$

Porro $KR = QF = x$, $KL = \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$, $KF = QR = \frac{1}{2}c$, adeoque $MR = MQ - QR = y - \frac{1}{2}c$, $RL = x + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$, consequenter (§. 417. Geom.) $LF^2 = KL^2 + KF^2 = \frac{1}{4}bb - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc = ML^2 = MR^2 + RL^2 = y^2 - cy + \frac{1}{4}cc$ ✱ $x^2 + bx + \frac{1}{4}bb - ax - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}aa$.

Unde

Unde habemus

$$\begin{aligned}
 & y^2 + x^2 - cy + bx - ax = 0 \\
 \text{hoc est, ob } x^2 &= cy - by^2 : a \\
 & \frac{y^2 + cy - \frac{by^2}{a} - cy + bx - ax = 0}{\frac{ay^2 - by^2}{a} + bx - ax = 0} \\
 \text{feu } \frac{ay^2 - by^2}{a} &= ax - bx \\
 & \frac{y^2}{a} = x \\
 & \frac{y^4}{aa} = x^2 \\
 & \frac{y^4}{aa} = cy - \frac{by^2}{a} \\
 & y^4 = aacy - aby^2 \\
 & y^3 = aac - aby \\
 & y^3 + aby - aac = 0
 \end{aligned}$$

Construamus denique eandem æquationem combinatis loco ad hyperbolam intra asymptotos $xy + by - ac = 0$ & loco ad circulum $y^2 + x^2 - cy + bx - ax = 0$. Posterioris constructionem jam tradidimus: alterius constructio elicitur comparatione æquationis propositæ cum formula generali pro locis ad hyperbolam intra asymptotos instituta. Est nempe (§. 591).

$$\begin{aligned}
 \frac{r}{q} = 0 \quad p = 0 \quad -n = b \quad -mq = -ac \\
 q = f \quad \frac{pr}{f} = 0 \quad n = -b \quad m = c \quad q = a
 \end{aligned}$$

Tab. IX. Jungantur ipsi AR = a recta RI = c & indefinita AS ad angulos rectos, quæ

erunt asymptoti hyperbolæ æquilateræ per punctum I describendæ (§. 489). Fiat AD = b, quia valor ipsius b negativus: erit DT = x NM =, TM = y (§. cit.) Quod si jam circulus cum hyperbola combinari debet; punctum D in D & recta DQ super DT cadere debet. Scilicet ex D in K transferatur DK = $\frac{1}{2}c$ & ex K in L, KL = $\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$. Radio DL describatur circulus & ex puncto intersectionis circuli atque hyperbolæ M demittatur perpendicularis TM: dico hanc esse radicem æquationis.

Quoniam enim AR = a, RI = c, AD = FN = b, NM = DT = x, TM = AP = y; erit AT = PM = b + x & ob AR. RI = AP. PM (§. 501.) by + xy = ac, consequenter $x = \frac{ac}{y} - b$. Porro Kr = NM = x, LK = $\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$, DK = Tr = $\frac{1}{2}c$. Ergo Lr = x + $\frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a$, rM = y - $\frac{1}{2}c$, & ob LM² = Lr² + rM² (§. 417. Geom.) $x^2 + bx + \frac{1}{4}bb - ax - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}a^2 + y^2 - cy + \frac{1}{4}c^2 = \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc$, hoc est,

$$\begin{aligned}
 y^2 - cy &= ax - x^2 - bx \\
 \text{feu} &= (a - x - b)x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 y^2 - cy &= \left(a - \frac{ac}{y} + b - b\right) \left(\frac{ac}{y} - b\right) \\
 &= \left(a - \frac{ac}{y}\right) \left(\frac{ac}{y} - b\right)
 \end{aligned}$$

hoc est,

$$\begin{aligned}
 y^2 - cy &= \frac{aac}{y} - \frac{a^2c^2}{y^2} - ab + \frac{abc}{y} \\
 y^4 - cy^3 &= a^2cy - a^2c^2 - aby^2 + abcy \\
 y^3 &= a^2c - aby \\
 y^3 + aby - a^2c &= 0
 \end{aligned}$$

SCHO-

Fig. 92.

Tab. IX. Fig. 90. & 92.

SCHOLIUM.

608. Mirabuntur forte, qui tyrones sunt in altioribus, quod tam operose construxerimus æquationem, quæ per regulam Cartesii ope circuli & parabole admodum facile construitur. Sed notent velim, geometricas æquationum constructiones nullius fere in praxi esse usus, cum eidem satisfaciat methodus extrahendi radices per approximationem. Faciunt vero ad exercendam ingenii vim & recludendos inventionum fontes. Quamobrem methodus inveniendi constructiones istiusmodi quam maxime explicari debet.

PROBLEMA CCXLVI.

609. Construere æquationem cubicam $y^3 - aby = aac$.

Æquatio proposita in hanc resolvitur analogiam:

$$a : y = yy - ab : ac$$

Ut nova indeterminata in æquationem introducatur & æquationes locales diversæ inde eliciantur, fiat

$$a : y = y : x$$

erit $\frac{a}{y} = \frac{y}{x}$

$$I. ax = y^2 \text{ \& hinc } y^2 : a = x$$

$$\text{Porro : } y : x = yy - ab : ac$$

$$\text{hoc est, } = ax - ab : ac$$

$$\text{feu (§. 124.) } = x - b : c$$

$$II. x^2 - bx = cy.$$

$$ax = y^2$$

$$x^2 - bx = cy$$

$$III. ax - x^2 + bx = y^2 - cy$$

$$ax = y^2$$

$$cy = x^2 - bx$$

$$IV. ax = cy = y^2 = x^2 + bx$$

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

$$x^2 - bx = cy$$

$$x^2 - \frac{by^2}{a} = cy$$

$$V. \frac{ax^2}{b} - y^2 = \frac{acy}{b}$$

$$y^3 - aby = aac$$

$$\frac{y^3}{a} - by = ac$$

$$VI. xy - by = ac$$

Habemus adeo æquationes locales

$$I. y^2 - ax = 0$$

$$II. x^2 - bx - cy = 0$$

$$III. y^2 + x^2 - cy - bx = 0$$

$$IV. y^2 - x^2 + cy + bx = 0$$

$$V. y^3 - \frac{ax^2}{b} + \frac{acy^2}{b} = 0.$$

$$VI. xy - by - ac = 0$$

Locus primus & secundus sunt ad parabolam; tertius ad circulum; quartus ad hyperbolam æquilateram; quintus ad hyperbolam scalenam; sextus ad hyperbolam intra asymptotos.

Cum æquationes locales nonnisi signis differant ab iis; in quas æquationem problematis præcedentis resolvimus; æquatio præsentis eodem fere modo construitur, quo præcedentem construximus: id quod in unico casu, quo circulus cum parabola combinatur, ostendisse suffecerit.

Locus ad parabolam $y^2 - ax = 0$ construitur ut in problemate præcedente

Tab.

IX.

Fig. 93

D d d

fi

Tab. si parametro a parabola describatur :
 IX. erit origo indeterminatæ x in vertice ,
 Fig. 93. nempe $AP = x$, $PM = y$.

Pro loco ad circulum $y^2 + x^2 = cy$
 $-bx - ax = 0$, erit vi theorematis ge-
 neralis (§. 589) $2r = 0$ & hinc $q = f$

$$\underline{2n = c} \quad 2p = b + a$$

$$n = \frac{1}{2}c \quad p = \frac{b + a}{2}$$

$$\underline{n^2 + p^2 = m^2}$$

$$\frac{\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}bb + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}aa = m^2}{\sqrt{(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}bb + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}aa) = m}}$$

Quia ergo in circulo origo indeter-
 minatæ x distat a centro quantitate $\frac{1}{2}b$
 $+ \frac{1}{2}a$ & alterius y quantitate $\frac{1}{2}c$, fiat AD
 $= \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$ & perpendicularis $DH = \frac{1}{2}c$
 atque radio AH describatur per verti-
 cem parabolæ A circulus, erit PM ra-
 dix vera æquationis; QN & qn erunt
 falsæ.

Nam $AH^2 = MH^2 = HD^2 + DA^2$
 $= \frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc$ (§. 417. *Geom.*),

$AP = yy: a$ (§. 391.), $PD = HR = \frac{yy}{a} - \frac{1}{2}a$

$- \frac{1}{2}b$, $MR = y - \frac{1}{2}c$, consequenter ob
 $HM^2 = HR^2 + MR^2$ (§. 417. *Geom.*) $\frac{1}{4}aa$

$+ \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bb + \frac{1}{4}cc = \frac{y^4}{aa} - y^2 + \frac{1}{4}aa - \frac{byy}{a}$

$+ \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + y^2 - cy + \frac{1}{4}cc$, hoc est.

$$\frac{y^4}{aa} - \frac{byy}{a} - cy = 0$$

$$\underline{y^4 - abyy - aacy = 0}$$

$$\underline{y^4 - aby - aac = 0}$$

PROBLEMA CCXLVII.

610. *Construere æquationem cubicam*
 $y^3 - aby = -aac$.

Æquatio proposita $y^3 - aby = -aac$, hoc est, $aac = aby - y^3$ in hanc re-
 solvitur analogiam :

$$a : y = ab - yy : ac$$

ut nova indeterminata introducatur, fiat

$$a : y = y : x$$

erit I. $ax = y^2$. Hinc $x = y^2 : a$

Porro $y : x = ab - yy : ac$

hoc est, $= ab - ax : ac$

scu (§. 124) $= b - x : a$.

I. $bx - xx = cy$

$$ax = y^2$$

$$bx - xx = cy$$

III. $ax - bx + xx = yy - cy$

$$ax = yy$$

$$cy = bx - xx$$

IV. $ax - cy = yy - bx + xx$

$$bx - xx = cy$$

$$\frac{by^2}{a} - xx = cy$$

V. $y^2 - \frac{ax^2}{b} = \frac{acy}{b}$

$$aac = aby - y^3$$

$$ac = by - \frac{y^3}{a}$$

VI. $ac = by - xy$

Habemus adeo æquationes locales :

I. $y^2 - ax = 0$

II. $x^2 - bx + cy = 0$

III. $y^2 - x^2 - cy + bx = 0$
 $- ax$

IV. $y^2 + x^2 + cy - bx = 0$
 $- ax$

V. $y^2 - \frac{ax^2}{b} - \frac{acy}{b} = 0$

VI. $xy - by + ac = 0$

Locus primus & secundus sunt ad parabolam, tertius ad hyperbolam æquilateram, quartus ad circulum, quintus ad hyperbolam scalenam, sextus ad hyperbolam intra asymptotos.

Æquationes locales denuo nonnisi signis differunt ab iis, quas in problemate 245. (§. 607) reperimus. Quare denuo nobis suffecerit constructionem ope parabolæ & circuli ostendisse.

Tab. IX. Fig. 94. Quoniam locus ad parabolam $y^2 = ax$; parabola denuo construitur parametro a & origo indeterminatæ x est in vertice axis A.

Pro circulo, cujus æquatio $y^2 + x^2 + cy - bx - ax = 0$, vi theorematis generalis (§. 589)

$$\frac{2r}{q} = 0 \quad -2n = c \quad -2p = -b - a$$

hinc

$$q = f \quad n = -\frac{1}{2}c \quad p = \frac{b + a}{2}$$

$$\frac{n^2 + p^2 = m^2}{\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb = m^2}$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb\right)} = m$$

Tab. IX. Fig. 95. Describatur ergo radio AC = m femicirculus, ductaque FLS intervallo CL = $\frac{1}{2}c$ diametro AB parallela; erit SQ = x , QM = y .

Tab. IX. Fig. 94. Quamobrem si circulus cum parabola combinatur, punctum S super A & SL super AD cadet. Quare si fiat AD = $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$ & erigatur perpendicularis DH = $\frac{1}{2}c$; erit AH = $\sqrt{\left(\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc\right)}$ radius circuli per verticem de-

scribendi & PM radix vera æquationis.

Nam AP = $yy : a$ (§. 391), hinc DP = HR = $yy : a - \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$. Porro MR = $y + \frac{1}{2}c$. Quare ob $HM^2 = MR^2 + HR^2$ (§. 417 Geom.), $\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}cc = \frac{y^4}{aa} - y^2 + \frac{1}{4}aa - \frac{byy}{a}$

$$+ \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + y^2 + cy - \frac{1}{4}cc,$$

hoc est,

$$\frac{y^4}{aa} - \frac{byy}{a} + cy = 0$$

$$\frac{y^4 - abyy + aacy}{aa} = 0$$

$$y^4 - abyy + aacy = 0$$

$$y^3 - aby + aac = 0$$

COROLLARIUM.

612. Si circulus parabolam tangit; duæ interfectiones coincidunt, adeoque æquatio duas habet radices æquales. Si eam nec tangit, nec fecat; radices omnes sunt impossibiles.

SCHOLIUM.

613. Constructiones per circulum & parabolam, quas dedimus, coincidunt cum iis, quas habet Cartesius (a), etsi alio modo erutæ.

PROBLEMA CCXLVIII.

614. Construere æquationem cubicam $y^3 + ay^2 - aby = aac$.

Ut nova indeterminata in æquationem introducatur, fiat

$$a : y = y : x$$

erit I. $ax = y^2$. Hinc $x = y^2 : a$ Substituatur ax pro y^2 in æquatione data.

$$\text{erit } axy + aax - aby = aac$$

$$\text{II. } xy + ax - by = ac$$

$$\frac{xy^2 + axy - by^2 - axy - a^2x + aby = acy - a^2c}{y - a}$$

$$\frac{xy^2 - by^2 - a^2x = acy - aby - a^2c}{ax^2 - abx - a^2x = acy - aby - a^2c}$$

$$\text{Ddd } 2 \quad \text{III.}$$

(a) Geomet. lib. III. p. 85. & seqq.

$$\text{III. } x^2 - bx - ax = cy - by - ac$$

$$\frac{ax = y^2}{\text{---}}$$

$$\text{IV. } 2ax - x^2 + bx = y^2 - cy + by + ac$$

$$\frac{x^2 - bx - ax = cy - by - ac}{ax = y^2}$$

$$\text{V. } x^2 - bx = y^2 + cy - by - ac$$

$$\frac{x^2 - \frac{by^2}{a} = ax + cy - by - ac}{\text{---}}$$

$$\text{VI. } \frac{ax^2}{b} - y^2 = \frac{a^2x}{b} + \frac{acy}{b} - ay - \frac{a^2c}{b}$$

Habemus adeo æquationes locales :

- I. $y^2 - ax = 0$
- II. $xy + ax - by - ac = 0$
- III. $x^2 - bx - cy + ac = 0$
 $- ax + by$
- IV. $y^2 + x^2 - cy - 2ax + ac = 0$
 $+ by - bx$
- V. $y^2 - x^2 + cy + bx - ac = 0$
 $- by$
- VI. $y^2 - \frac{ax^2}{b} + \frac{acy}{b} - \frac{a^2c}{b} = 0$
 $- ay$

Locus primus & tertius sunt ad parabolam; secundus ad hyperbolam intra asymptotos; quartus ad circulum; quintus ad hyperbolam æquilateram; sextus ad hyperbolam scalenam.

Tab. IX. Fig. 26. Construamus æquationem combinando circulum cum parabola. Locus ad parabolam $y^2 - ax = 0$ constructur, si parametro a parabola describitur; cujus vertex A origo ipsius x .

Pro circulo $y^2 + x^2 - cy + by - 2ax - bx + ac = 0$ erit vi theorematis generalis (§. 589).

$$\frac{2r}{q} = 0 \quad -2n = -c + b \quad -2p = -2a - b$$

hinc

$$q = f \quad n = \frac{1}{2}c - \frac{1}{2}b \quad p = a + \frac{1}{2}b$$

$$n^2 + p^2 - m^2 = ac$$

$$\frac{n^2 + p^2 - ac = m^2}{\text{---}}$$

$$\frac{\frac{1}{4}c^2 - \frac{1}{2}bc + \frac{1}{4}bb + a^2 + ab + \frac{1}{4}bb - ac = m^2}{\text{---}}$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}b^2 + (a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c)^2)} = m$$

Jungatur ipsi IL = a ad angulos rectos LR ipsi æqualis & refecetur LH = PN = $\frac{1}{2}c - \frac{1}{2}b$; erit HR = $a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$. Fiat LD = HC = $\frac{1}{2}b$; erit CR = m , adeoque radius circuli, quo descripto habebitur IP = x & PM = y Tab. X. Fig. 97.

Est enim NM = PM - PN = $y + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$, adeoque NM² = $y^2 + by + \frac{1}{4}b^2 - cy - \frac{1}{2}bc + \frac{1}{4}c^2$. Porro DP = IP - ID = $x - a - \frac{1}{2}b$, adeoque DP² CN² = $x^2 - 2ax - bx + a^2 + ab + \frac{1}{4}b^2$. Quare cum sit CR² = CM² = NM² + CN² (§. 417. Geom.) & CR² = CH² + HR² = $\frac{1}{4}bb + aa + \frac{1}{4}ab + \frac{1}{4}bb - ac - \frac{1}{2}bc + \frac{1}{4}cc$, erit $y^2 + x^2 - cy + by - 2ax = bx + ac = 0$, quæ est æquatio ad construendum proposita. Circulus itaque rite constructus.

Si jam circulus cum parabola combinatur, punctum I in verticem parabolæ A & IP super AP cadit. Quare fiat AL = a ; erit LR² = aa (§. 388.), hoc est, LR = a . Fiat porro LH = $\frac{1}{2}c - \frac{1}{2}b$; erit HR = $a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$. Fiat denique LD = HC = $\frac{1}{2}b$; erit CR radius circuli per punctum parabolæ R ex centro C describendi & semiordinata PM radix æquationis.

Nam PN = LH = $\frac{1}{2}c - \frac{1}{2}b$; hinc NM = $y + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$. Ex natura parabolæ $y^2 : a = AP$; unde DP = CN = $\frac{y^2}{a} - a - \frac{1}{2}b$. Quare cum sit (§. 417. Geom.) CM² (= CR²) = CN² + NM² erit $\frac{1}{4}b^2 + a^2 + ab + \frac{1}{4}bb - ac - \frac{1}{2}bc + \frac{1}{4}cc = \frac{y^4}{a^2} - 2y^2 + aa - \frac{by^2}{a}$

Tab. IX. Fig. 96. & Tab. X. Fig. 97.

$$\frac{y^4}{a^2} - 2y^2 + aa - \frac{by^2}{a}$$

†

$$\begin{aligned} &+ ab + \frac{1}{4}bb + y^2 + by + \frac{1}{4}bb - cy - \frac{1}{2}bc \\ &+ \frac{1}{4}cc, \end{aligned}$$

hoc est,

$$\frac{y^2}{aa} - y - \frac{by^2}{a} + by - cy + ac = 0$$

$$y^2 - a^2y^2 - aby^2 + a^2by - a^2cy + a^3c = 0$$

$$y^2 + ay^2 - aby - a^2c = 0.$$

SCHOLIUM.

615. Satis liquet, quomodo æquationum cubicarum casus reliqui construi debeant, ut adeo plura addere supervacaneum judicemus.

PROBLEMA CCXLIX.

616. Æquationem biquadraticam $y^4 + aby^2 + a^2cy = a^3d$ construere.

Ut nova indeterminata in æquationem introducatur, fiat

$$a : y = y : x$$

erit I. $ax = y^2$. Hinc $x = y^2 : a$

Hoc valore in æquatione data substituto prodibit

$$a^2x^2 + aby^2 + a^2cy = a^3d \quad (ab)$$

$$\text{II. } y^2 + \frac{ax^2}{b} + \frac{acy}{b} = \frac{a^2d}{b}$$

$$\text{Item } a^2x^2 + a^2bx + a^2cy = a^3d \quad (a^2)$$

$$x^2 + bx + cy = ad$$

$$\text{III. } x^2 + bx = ad - cy$$

$$ax = y^2$$

$$\text{IV. } x^2 + bx + ax = y^2 + ad - cy$$

$$ax = y^2$$

$$x^2 + bx = ad - cy$$

$$\text{V. } ax - x^2 - bx = y^2 - ad + cy$$

Habemus adeo æquationes locales ;

$$\text{I. } y^2 - ax = 0$$

$$\text{II. } y^2 + \frac{ax^2}{b} + \frac{acy}{b} - \frac{a^2d}{b} = 0$$

$$\text{III. } x^2 + bx + cy - ad = 0$$

$$\text{IV. } y^2 - x^2 - cy - bx + ad = 0$$

$$-ax$$

$$\text{V. } y^2 + x^2 + cy + bx - ad = 0$$

$$-ax$$

Locus primus & tertius est parabola, secundus ellipsis, quartus hyperbola æquilatera, quintus denique circulus.

Construamus primum æquationem, circulo cum parabola $ax = y^2$ combinato. Construat parabola MDN parametro a , erit $DQ = x$, $QM = y$.

Tab. X.

Pro circulo $y^2 + x^2 + cy + bx - ax - ad = 0$. erit vi theorematis generalis (§. 589).

Fig. 98.

$$\frac{r}{q} = 0 \quad \frac{f^2}{q^2} = 1 \quad \frac{-2n}{q} = c \quad \frac{-2p}{q} = b - a$$

$$f = q \quad n = -\frac{1}{2}c \quad p = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$$

$$n^2 + p^2 - m^2 = -ad$$

$$n^2 + p^2 + ad = m^2$$

$$\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + ad = m^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + ad\right)} = m$$

Erecta in D perpendiculari $DK = QP$ Tab. $= \frac{1}{2}c$ ob valorem ipsius c negativum, X. ducatur per K recta indefinita AB fiat Fig. 98.

que $KC = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$ erit (§. 417. Geom.).

$DC = \sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb\right)}$.

Fiat porro $DI = a$ & continuata DC

in H, donec $HD = d$, quærat media proportionalis DL (§. 327. Geom.),

quæ erit \sqrt{ad} : consequenter $LC =$

$\sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + ad\right)}$

(§. 417. Geom.) est radius circuli ex centro C per L describendi, qui cum parabola fecerit in M & N; erit QM

radix æquationis vera, RN falsa.

Est enim $PM = y + \frac{1}{2}c$; $DQ = KP = y^2 : a$ (§. 388), $CP = KP - KC = \frac{y^2}{a} - \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$. Quare (§. 417. *Geom.*) ob CL^2 feu $MC^2 = PM^2 + PC^2$, $\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + ad = y^2 + cy + \frac{1}{4}cc + \frac{y^4}{aa} - y^2 + \frac{1}{4}aa + \frac{by^2}{a} - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb$, hoc est,

$$\frac{y^4}{aa} + \frac{by^2}{a} + cy = ad$$

$$y^4 + aby^2 + aacy = a^3d$$

Combinemus eundem circulum cum ellipsi, quam definit æquatio superius

reperita $y^2 + \frac{ax^2}{b} + \frac{ac}{b}y - \frac{a^2d}{b} = 0$

Erit vi theorematis generalis (§. 588)

$$\frac{r}{q} = 0 \quad \frac{t}{2m} = \frac{a}{b} \quad - 2n = \frac{ac}{b} \quad p = 0$$

hinc

$$q = f \quad n = -\frac{ac}{2b}$$

$$n^2 = \frac{tm^2}{2m} = -\frac{a^2d}{b}$$

$$\frac{a^2c^2}{4b^2} - \frac{am^2}{b} = -\frac{a^2d}{b}$$

$$\frac{ac^2}{4b} + ad = m^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{ac^2}{4b} + ad\right)} = m$$

Construatur locus ad circulum, ut ante, nempe ut sit $DK = \frac{1}{2}c$, $KC = \frac{1}{2}a$

Tab.X. Fig.99. $= \frac{1}{2}b$, $DI = a$, $DH = d$ adeoque $DL = \sqrt{ad}$ (§. 327. *Geom.*), consequenter $LC = \sqrt{\left(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + ad\right)}$ (§. 417 *Geom.*).

Jam cum origo indeterminatæ x sit in D , & valor ipsius n in ellipsi etiam negativus & $p = 0$; ex DK refecetur $DG = ac : 2b$ & per G ducatur AB ipsi DQ & KP parallela fiatque $AG = BG = \sqrt{(ad + ac^2 : 4b)}$. Tandem circa AB tanquam axem describatur e liphs AMB , in qua axis AB ad parametrum $= b : a$. Dico QM esse radicem æquationis veram. Est enim $GR = DQ = x$, $MR = MQ + QR = MQ + DG = y + ac : 2b$; ratio diametri ad parametrum $= b : a$; $AG = \sqrt{(ad + ac^2 : 4b)}$. Quare ex natura ellipsis (§. 431)

$$a:b = RM^2 : AG^2 - GR^2 (= BR.RA)$$

$$= y^2 + \frac{acy}{b} + \frac{a^2c^2}{4b^2} : ad + \frac{a^2}{4b} - x^2$$

$$\frac{by^2}{a} + cy + \frac{ac^2}{4b} = ad + \frac{ac^2}{4b} - x^2$$

$$x^2 = ad - \frac{by^2}{a} - cy$$

Porro $PM = MQ + QP = MQ + DK = y + \frac{1}{2}c$; $CP = KP - KC = DQ - CK = x - \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$.

Quamobrem ob $LC^2 = MC^2 = PM^2 + PC^2$ (§. 417 *Geom.*) $\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb + ad = y^2 + cy + \frac{1}{4}cc + x^2 - ax + \frac{1}{4}aa + bx - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb$, hoc est,

$$y^2 + x^2 + cy - ax + bx = ad$$

$$x^2 = ad + ax - bx - y^2 - cy$$

Habemus ergo

$$ad - \frac{by^2}{a} - cy = ad + ax - bx - y^2 - cy$$

$$bx - ax = \frac{by^2}{a} - y^2$$

$$x = y^2 : a$$

$$x^2 = y^4 : aa$$

hoc

hoc est, $\frac{y^4}{a^2} = ad - \frac{by^2}{a} - cy$, vi superiorum.

$$\frac{y^4 - a^3d - aby^2 - a^2cy}{y^4 + aby^2 + a^2cy} = a^2$$

$$y^4 + aby^2 + a^2cy = a^3d$$

PROBLEMA CCL.

617. *Construere æquationem biquadraticam*

$$y^4 + aby^2 - a^2cy = a^3d$$

Ut nova indeterminata in æquationem introducatur, fiat

$$a : y = y : x$$

erit I. $yy = ax$. Hinc $x = y^2 : a$

Si valor ipsius y^2 in æquatione proposita substituitur: prodibit

$$\frac{a^2x^2 + aby^2 - a^2cy}{ab} = a^3d$$

II. $\frac{ax^2}{b} + y^2 = \frac{acy}{b} - \frac{a^2d}{b}$

Item $\frac{a^2x^2 + a^2bx - a^2cy - a^3d}{ab}$

III. $x^2 + bx = cy - ad$
 $ax = y^2$

IV. $x^2 + bx + ax = y^2 + cy - ad$
 $ax = y^2$
 $x^2 + bx = cy - ad$

V. $ax - x^2 - bx = y^2 - cy + ad$
 Habemus adeo æquationes locales

I. $y^2 - ax = 0$

II. $y^2 + \frac{ax^2}{b} - \frac{acy}{b} + \frac{a^2d}{b} = 0$

III. $x^2 + bx - cy + ad = 0$

IV. $y^2 - x^2 + cy - bx - ad = 0$
 $- ax$

V. $y^2 + x^2 - cy + bx + ad = 0$
 $- ax$

Locus primus & tertius sunt parabolæ; secundus est ellipsis; quartus hyperbola æquilatera; quintus denique circulus.

Dabimus constructionem per circumulum & parabolam, cujus æquatio $y^2 - ax = 0$. Est ergo parameter $= a$, $AP = x$, $PM = y$. Tab.X. Fig. 100.

Pro circulo vi theorematis generalis (§. 589)

$$\frac{r}{q} = 0. \quad -2n = -c \quad -2p = -a + b$$

hinc $q = f$ $n = \frac{1}{2}c$ $p = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$

$$n^2 + p - m^2 = ad$$

$$n^2 + p^2 - ad = m^2$$

$$\sqrt{(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb - ad)} = m$$

Ducatur recta CR & sumatur C pro centro circuli. Erigatur $CK = \frac{1}{2}c$ ad CR perpendicularis & per K ducatur AP eidem parallela. Fiat $AK = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b$; erit in A origo indeterminatæ x & $AC = \sqrt{(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb)}$. Fiat $AL = d$, $AH = a$; quæraturque media proportionalis $AL = \sqrt{ad}$ (§. 327 *Geom.*). Porro super AC describatur semicirculus & in eo applicetur $GA = AL = \sqrt{ad}$; erit $GC = \sqrt{(\frac{1}{4}cc + \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{4}bb - ad)}$ (§. 417 *Geom.*) adeoque radius circuli. Tab.X. Fig. 100.

Quoniam in parabola, cujus æquatio $y^2 - ax = 0$ origo indeterminatæ x in verticem axis cadit; circa axem AP parametro a describatur parabola: dico PM esse radicem æquationis veram.

Est.

Est enim $MR=PM-PR=PM-CK=y-\frac{1}{2}c$; $AP=y^2: a$ & $CR=KP=AP-AK=\frac{y^2}{a}-\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b$, consequenter ob $CG^2=CM^2=CR^2+MR^2$ (§. 417. *Geom.*) $\frac{1}{4}cc+\frac{1}{4}aa-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb-ad=\frac{y^4}{aa}-y^2+\frac{1}{4}aa+\frac{by^2}{a}-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb+y^2-cy+\frac{1}{4}cc$, hoc est,

$$\frac{y^4}{aa} + \frac{by^2}{a} - cy = -ad$$

$$y^4 + aby^2 - aacy = -a^3d$$

Cum loco ad circulum descripto eodem modo, quo in problemate præcedente, combinatur locus ad ellipsin. Lubet vero adhuc constructionem dare per circulum & hyperbolam æquilateram $y^2-x^2+cy-bx-ax-ad=0$.

Est autem vi theorematis generalis (§. 590)

$$\frac{r}{q}=0 \quad -\frac{t}{2m}=-1 \quad -2n=c \quad 2p=-a-b$$

$$t=2m \quad n=-\frac{1}{2}c \quad p=-\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b$$

$$n^2+m^2-p^2=-ad$$

$$m^2=p^2-n^2=ad$$

$$m^2=\frac{1}{4}aa+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb-\frac{1}{4}cc-ad$$

$$m^2=\sqrt{(\frac{1}{4}aa+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb-\frac{1}{4}cc-ad)}$$

Tab. X. Fig. 101. Constructo nempe circulo ut ante, ita ut sit $AK=\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b$, $CK=\frac{1}{2}c$, adeoque $CA=\sqrt{(\frac{1}{4}aa-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb+\frac{1}{4}cc)}$, $AH=a$, $AI=d$, adeoque $AL=AG=\sqrt{ad}$, consequenter $GC=MC=\sqrt{(\frac{1}{4}aa-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb+\frac{1}{4}cc-ad)}$; quia origo indeterminatæ y in hyperbola ob valorem ipsius n negativum ab axe ver-

fus finistram distat intervallo $\frac{1}{2}c$, fiat $KT=\frac{1}{2}c$, ducaturque per T recta OS ipsi AP parallela & ad hanc AF perpendicularis.

Quoniam porro ob valorem ipsius p negativum indeterminatæ x origo a centro distat intervallo $\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b$, fiat $FO=\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b$ & $OQ=\sqrt{(\frac{1}{4}aa+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb-\frac{1}{4}cc-ad)}$; erit O centrum & Q vertex hyperbolæ æquilateræ; quæ si circa axem QS describatur, circulum in M fecabit. Dico PM esse radicem æquationis veram.

Est enim $CR=KP=AP-AK=x-\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b$ & $MR=MP-RP=MP-CK=y-\frac{1}{2}c$, consequenter ob $MC^2=CR^2+RM^2$ (§. 417 *Geom.*) $\frac{1}{4}aa-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{2}bb+\frac{1}{4}cc-ad=x^2-ax+\frac{1}{4}aa+bx-\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb+y^2-cy+\frac{1}{4}cc$, hoc est,

$$x^2-ax+bx+y^2-cy=-ad$$

$$x^2=ax-bx+cy-y^2-ad$$

Porro $MS=MP+PS=MP+KT=y+\frac{1}{2}c$, $SO=FS+FO=AP+FO=x+\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b$, consequenter ob $SO^2-QO^2=MS^2$ (§. 509) $x^2+ax+\frac{1}{4}aa+bx+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{4}bb-\frac{1}{4}aa-\frac{1}{2}ab-\frac{1}{4}bb+\frac{1}{4}cc+ad=y^2+cy+\frac{1}{2}cc$, hoc est,

$$x^2+ax+bx+ad=y^2+cy$$

seu substituto valore ipsius x^2

$$ax-bx+cy-y^2-ad+ax+bx+ad=y^2+cy$$

$$2ax=2y^2 \text{ seu } ax=y^2$$

$$x^2=y^2: a$$

$$x^2=y^4: aa$$

His valoribus ipsorum x^2 & x in æquatione

$x^2 + ax + bx + ad = y^2 + cy$
 substiutis, prodit

$$y^2 + cy = \frac{y^4}{aa} + y^2 + \frac{by^2}{a} + ad$$

$$cy = \frac{y^4}{aa} + \frac{by^2}{a} + ad$$

$aacy = y^4 + aby^2 + a^3d$
 seu $y^4 + aby^2 - a^2cy = -a^3d$.

PROBLEMA CCLI.

618. *Construere æquationem biquadraticam* $y^4 + 2by^3 + a^2cy = a^3d$.

Quoniam $y^4 + 2by^3 = a^3d - a^2cy$; æquatio data in hanc resolvitur analogiam:

$$a^2 : y^2 = y^2 + 2by : ad - cy$$

Ut nova indeterminata introducat, fiat

$$a : y = b + y : x$$

erit I. $ax = by + y^2$
 $ax - by = y^2$, consequenter
 $a^2 : ax - by = ax + by : ad - cy$

II. $a^3d - a^2cy = a^2x^2 - b^2y^2$

Substituatur in hac æquatione ulterius valor ipsius y^2 ; prodibit

$$a^3d - a^2cy = a^2x^2 - ab^2x + b^3y$$

h. e. $a^3d - a^2cy - b^3y = a^2x^2 - ab^2x$

III. $ad - cy - \frac{b^3y}{a^2} = x^2 - \frac{b^2x}{a}$
 $yy + by = ax$

IV. $ad - cy - \frac{b^3y}{a^2} + y^2 + by = x^2 - \frac{b^2x}{a} + ax$

$$ad - cy - \frac{b^3y}{a^2} = x^2 - \frac{b^2x}{a}$$

$$y^2 + by = ax$$

V. $y^2 + by - ad + cy + \frac{b^3y}{a^2} = ax - x^2 + \frac{b^2x}{a}$

Habemus adeo æquationes locales:

I. $y^2 + by - ax = 0$

II. $y^2 - \frac{a^2x^2}{b^2} - \frac{a^2cy}{b^2} + \frac{a^3d}{b^2} = 0$

III. $x^2 - \frac{b^2x}{a} + cy - ad = 0$
 $+ \frac{b^3y}{aa}$

IV. $y^2 - x^2 - \frac{b^3y}{a^2} + \frac{b^2x}{a} + ad = 0$
 $+ by - ax$
 $- cy$

V. $y^2 + x^2 + \frac{b^3y}{a^2} - \frac{b^2x}{a} - ad = 0$
 $+ by - ax$
 $+ cy$

Construamus æquationem per circulum & parabolam. Pro circulo cum sit $y^2 + x^2 + \frac{b^3y}{a^2} + by + cy - \frac{b^2x}{a} - ax - ad = 0$; erit vi theorematis generalis (§. 589)

$$r = 0 \quad \frac{f^2}{q^2} = 1 \quad -2z = \frac{b^3}{a^2} + b + c.$$

$$f = q \quad n = -\frac{b^3}{2a^2} - \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c$$

$$-2p = -\frac{b^2}{a} - a$$

$$p = \frac{b^2}{2a} + \frac{1}{2}a$$

$$n^2 + p^2 - m^2 = -ad$$

$$n^2 + p^2 + ad = m^2$$

$$\sqrt{(n^2 + p^2 + ad)} = m$$

Circulus ergo eodem prorsus modo Tab.X
 construitur, quo in problemate 249. Fig.

(§. 616). Fit nempe $DC = p = b^2 : 2a + \frac{1}{2}a$, $DO = n = b^3 : 2a^2 + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$, $HO = a$, $OI = d$; erit $OC = \sqrt{(n^2 + p^2)}$, $OL = \sqrt{ad}$ & hinc $LC = \sqrt{(n^2 + p^2 + ad)}$. Ducatur OQ ipsi DC parallela, erit ob valorem OD negativum origo indeterminata x in O .

Porro pro parabola, ad quam $y^2 \mp by - ax = 0$, erit vi theorematis generalis (§. 587).

$$\begin{array}{l} \frac{r}{q} = 0 \quad \frac{-2n = b}{n = -\frac{1}{2}b} \quad -\frac{tf}{q} = -a \\ \text{hinc } r = 0 \quad n = -\frac{1}{2}b \quad t = a \\ q = f \end{array}$$

$$\frac{n^2 + tp = 0}{\frac{1}{4}bb + ap = 0}$$

$$\frac{ap = -\frac{1}{4}bb}{p = -\frac{bb}{4a}}$$

$$p = -\frac{bb}{4a}$$

Ob valorem itaque ipsius n negativum fiat $OK = \frac{1}{2}b$ ducaturque per K recta AR ipsi OQ parallela; ob valorem ipsius p negativum fiat $KA = bb : 4a$; erit in A parabolæ vertex parametro a circa axem AR describendæ, quæ circumulum secabit in M . Dico QM esse radicem æquationis veram.

Sit enim $QM = y$: erit $MR = y + \frac{1}{2}b$, adeoque $RA = \frac{yy + by + \frac{1}{4}bb}{a}$

(§. 391), consequenter $KR = AR - AK = \frac{yy + by}{a}$. Hinc $PC = OQ$

sive $KR - CD = \frac{yy + by}{a} - p$ & PM

$= QM + QP = QM + DO = y + n$.

Quare cum sit $LC^2 = MC^2 = PM^2 + PC^2$ (§. 417. *Geom.*); habebitur

$$\begin{aligned} \text{tandem } n^2 \mp p^2 \mp ad &= \frac{y^4}{aa} + \frac{2by^3}{aa} \\ + \frac{b^2y^2}{aa} - \frac{2py^2}{a} - \frac{2pby}{a} + p^2 \mp y^2 \\ \mp 2ny \mp n^2, \text{ hoc est, } &\frac{y^4}{aa} + \frac{2by^3}{aa} + \\ \frac{b^3y^2}{aa} - \frac{2py^2}{a} - \frac{2pby}{a} + y^2 + 2ny &= ad. \end{aligned}$$

Substituantur valores p & n ex æquatione ad circumulum: Quoniam $p = \frac{1}{2}a + b^2 : 2a$ & $n = \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c + b^3 : 2a^2$; prodibit $\frac{y^4}{aa} + \frac{2by^3}{aa} + \frac{b^2y^2}{aa} - y^2 - \frac{b^2y^2}{aa} - by - \frac{b^3y}{aa} + y^2 + by + cy + \frac{b^3y}{aa} = ad$,

hoc est,

$$\frac{y^4}{aa} + \frac{2by^3}{aa} + cy = ad$$

$$y^4 + 2by^3 + a^2cy = a^3d$$

SCHOLIUM.

619. *Æquationes locales, in quas æquationes construendas resolvimus, sunt ad curvam aliquam determinatam; sed plurimum amplificatur methodus, si exemplo Slusii ad curvam indeterminatam revocentur: tum enim non amplius ellipsis vel hyperbola unica, sed infinita constructioni inserviunt. Potest etiam æquatio localis ad curvam datam revocari, sicque problema per sectionem conicam datam construi. Agedum itaque! videamus, quomodo utrumque præstetur.*

PROBLEMA CCLII.

620. *Æquationem datam resolvere in æquationes locales, quæ sint ad curvas indeterminatas.*

a) Substituatur pro y radice æquationis $ax: v$, ubi pro v recta qualibet assumi potest, & nova, quæ prodit, æquatio in locales ut supra resolvatur: id quod exemplo unico ostendisse sufficit.

Sit

Sit $y^3 \mp aby = aac$. Quoniam $y = az : v$; erit
 $y^3 = a^3 z^3 : v^3$ consequenter

$$\frac{a^3 z^3}{v^3} \mp \frac{a^2 b z}{v} = aac$$

$$z^3 \mp \frac{v^3 b z}{a} = \frac{v^2 c}{a}$$

Hæc æquatio in sequentem resolvitur analogiam :

$$v : z = z^2 \mp \frac{v^2 b}{a} : \frac{v^2 c}{a}$$

Ut nova indeterminata in æquationem introducatur, fiat

$$v : z = z : x$$

erit I. $z^2 = vx$. Hinc $z^2 : v = x$

Porro $z : x = z^2 \mp \frac{v^2 b}{a} : \frac{v^2 c}{a}$

hoc est, $= vx \mp \frac{v^2 b}{a} : \frac{v^2 c}{a}$

seu (§. 124.) $= x \mp \frac{vb}{a} : \frac{vc}{a}$

$$\text{II. } x^2 \mp \frac{vbx}{a} = \frac{vcx}{a}$$

$$vx = z^2$$

$$\text{III. } x^2 \mp \frac{vbx}{a} \mp vx = \frac{vcx}{a} \mp z^2$$

$$vx = z^2$$

$$x^2 \mp \frac{vbx}{a} = \frac{vcx}{a}$$

$$\text{IV. } vx - x^2 - \frac{vbx}{a} = z^2 - \frac{vcx}{a}$$

$$x^2 \mp \frac{vbx}{a} = \frac{vcx}{a}$$

hoc est, ob $x = z^2 : v$

$$\text{V. } x^2 \mp \frac{bz^2}{a} = \frac{vcz}{a}$$

$$z^3 \mp \frac{v^2 bz}{a} = \frac{v^3 c}{a}$$

$$\frac{z^3}{v} \mp \frac{vbz}{a} = \frac{v^2 c}{a}$$

$$\text{VI. } zx \mp \frac{vbz}{a} = \frac{v^2 c}{a}$$

Habemus adeo æquationes locales ad infinitas sectiones Conicas nempe

$$\text{I. } z^2 - vx = 0$$

$$\text{II. } x^2 \mp \frac{vbx}{a} - \frac{vcx}{a} = 0$$

} ad infinitas parabolas.

$$\text{III. } z^2 - x^2 \mp \frac{vcz}{a} - \frac{vbx}{a} = 0$$

$$- vx$$

ad infinitas hyperbolas æquilateras.

$$\text{IV. } z^2 \mp x^2 = \frac{vcz}{a} \mp \frac{vbx}{a} = 0$$

$$- vx$$

ad infinitos circulos.

$$\text{V. } z^2 \mp \frac{ax^2}{b} - \frac{vcz}{b} = 0$$

ad infinitas ellipses.

$$\text{VI. } zx \mp \frac{vbz}{a} - \frac{v^2 c}{a} = 0$$

ad infinitas hyperbolas intra asymptotos.

β) Si fieret $\frac{az}{v} : y = y : x$; locus

primus $y^2 = \frac{a^2 x}{v}$ foret ad infinitas parabolas, nec radix æquationis y (id quod maxime commodum videri poterat) mutaretur in aliam: sed cum locus ad circulum degeneret in locum ad ellipsin, simplicitati constructionis minime confuleretur. Loca tamen ad hyperbolam & ellipsin determinatam ita reduci possunt ad hyperbolas & ellipses infinitas, ut utraque indeterminata y & x eadem maneat.

E. gr. Pro æquatione proposita construenda eliciamus supra (§. 607).

$$\text{I. } y^2 - ax = 0$$

$$\text{II. } x^2 \mp bx - cy = 0$$

} loca ad parabolas.

$$\text{III. } y^2 \mp x^2 - cy - ax = 0$$

$$\mp bx$$

locum ad circulum.

Ecc 2 Quo.

Quoniam
erit $\frac{y^2}{v} = \frac{ax}{v}$
& ob $cy = x^2 + bx$
 $\frac{ay^2}{v} - cy = \frac{a^2x}{v} - x^2 - bx$
 $y^2 - \frac{vcy}{a} = \frac{ax^2}{a} - \frac{v^2}{a} - \frac{vbx}{a}$
Item $\frac{ay^2}{v} = \frac{a^2x}{v}$
 $cy = x^2 + bx$

$$\frac{ay^2}{v} + cy = x^2 + \frac{a^2x}{v} + bx$$

$$y^2 + \frac{vcy}{a} = \frac{vx^2}{a} + ax + \frac{vbx}{a}$$

En locum ad infinitas ellipses $y^2 + \frac{x^2}{a} - \frac{vcy}{a} + \frac{vbx}{a} - ax = 0$ & locum ad infinitas hyperbolas $y^2 - \frac{vx^2}{a} + \frac{vcy}{a} - ax - \frac{vbx}{a} = 0$: quorum uterque cum loco ad circulum $y^2 + x^2 - cy - ax + bx = 0$ construi potest.

PROBLEMA CCLIII.

621. *Æquationem localem reducere ad aliam ejusdem speciei, quæ sit ad curvam datam.*

1. Ex æquatione locali eliciendus est valor linearum, per quas datur, aut, quod perinde est, ratio earundem.
2. Hi valores cum sint æquales lineis, per quas datur curva, ad quam æquatio reducenda: æquationes prodeunt, quarum reductione legitime facta prodibunt valores coefficientium in æquatione data substituendi, ut in quæsitam degeneret.

E. gr. Æquatio ad parabolam $y^2 - ax = 0$ mutanda est in aliam, quæ sit ad parabolam,

cujus parameter r . Quoniam a parameter parabolæ, ad quam æquatio data existit; erit $r = a$, consequenter æquatio quæsitæ $y^2 - rx = 0$.

Similiter reducenda sit æquatio $y^2 + x^2 + by - ay - cx = 0$ ad circulum, cujus radius r . Quoniam radius æquationis circuli, ad quam est æquatio data,

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{1}{4}cc}$$

erit $\left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{1}{4}cc = r^2$

$$\left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b\right)^2 = r^2 - \frac{1}{4}cc$$

$$\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b = \sqrt{\left(r^2 - \frac{1}{4}cc\right)}$$

$$\frac{1}{2}a = \frac{1}{2}b + \sqrt{\left(r^2 - \frac{1}{4}cc\right)} = f$$

$$\frac{1}{2}b = \frac{1}{2}a - \sqrt{\left(r^2 - \frac{1}{4}cc\right)} = g$$

$$\frac{1}{2}c = \sqrt{\left(r^2 - \left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b\right)^2\right)} = h$$

His valoribus in æquatione proposita substitutis; prodit æquatio ad circulum desideratum

$$y^2 + x^2 + 2gy - 2fy - 2hx = 0.$$

PROBLEMA CCLIV.

622. *Invenire regulam generalem construendi omnes æquationes tam cubicas quam biquadraticas.*

Sit descripta parabola & ex centro H radio AH circulus secans eam in N, N Tab. X.
Fig. 103.
& M. Sit AD = b , DH = d , AQ = c ; erit AH² = $dd + bb$. Sit porro PM = x parameter parabolæ = a , erit OM = $x + c$, RM = $x + d$. Quoniam (§. 404)

$$a : OM + AQ = PM : AP$$

$$a : x + 2c = x : \frac{x^2 + 2cx}{a}$$

erit DP = HR = $\frac{x^2 + 2cx}{a} - b$, adæoque:

$$HR^2 = \frac{x^4}{a^2} + \frac{4cx^3}{a^2} + \frac{4c^2x^2}{a^2} - \frac{2bx^2}{a} -$$

$$\frac{4bcx}{a} + bb \text{ \& } RM^2 = x^2 + 2dx + dd.$$

Habe-

Habemus adeo :

$$\frac{x^4}{a^2} + \frac{4cx^3}{a^2} + \frac{4c^2x^2}{a^2} - \frac{2bx^2}{a} - \frac{4bcx}{a} + bb$$

$$+ x^2 + 2dx + dd = bb + dd$$

$$\frac{x^4}{a^2} + \frac{4cx^3}{a^2} + \frac{4c^2x^2}{a^2} - \frac{4bcx}{a} = 0$$

$$- \frac{2xb^2}{a} + 2dx$$

$$+ x^2$$

$$x^3 + 4cx^2 + 4c^2x - 4abc = 0$$

$$- 2abx + 2a^2d$$

$$+ a^2x$$

Apparet adeo, si habetur terminus secundus positivus, radices veras cadere versus dextram. Sit adeo æquatio cum ea comparanda

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0; \text{ erit}$$

$$4c = p \quad 4c^2 - 2ab + a^2 = q$$

$$c = \frac{1}{4}p \quad 4c^2 + a^2 - q = 2ab$$

$$\frac{4}{16}p^2 + a^2 - q = 2ab$$

$$\frac{p^2}{8a} + \frac{1}{2}a - \frac{q}{2a} = b$$

vel

$$a^2 + 4c^2 - 2ab = -q$$

$$a^2 + \frac{1}{16}p^2 + q = 2ab$$

$$\frac{1}{2}a + \frac{p^2}{8a} + \frac{q}{2a} = b$$

Porro

$$2a^2d - 4abc = r$$

$$2a^2d = r + 4abc$$

$$d = \frac{r}{2a^2} + \frac{2bc}{a}$$

$$\text{h. est } d = \frac{r}{2a^2} + \frac{1}{4}p + \frac{p^3}{16a^2} + \frac{pq^2}{4a^2}$$

vel

$$2aad - 4abc = -r$$

$$2aad = 4abc - r$$

$$d = \frac{2bc}{a} - \frac{r}{2a^2}$$

$$\text{h. e. } d = \frac{1}{4}p + \frac{p^3}{16a^2} + \frac{pq}{4a^2} - \frac{r}{2a^2}$$

Sit jam $pN = x$; reliqua sint ut an-Tab.X: te: erit $Nr = pN - rp = pN - DH = \text{Fig.}$
 $x - d$, $No = x - c$, $pm = x - 2c$. Quo- 103.
 niam (§. 404)

$$a: oN + AQ = pm: Ap$$

$$a: x = x - 2c: \frac{xx - 2cx}{a}$$

erit $Dp = Hr = \frac{x^2 - 2cx}{a} - b$. Habemus adeo $NH^2 = Hr^2 + Nr^2$ (§. 417 *Geom.*)

$$\frac{x^4}{a^2} - \frac{4cx^3}{a^2} + \frac{4c^2x^2}{a^2} - \frac{2bx^2}{a} + \frac{4bcx}{a} + bb$$

$$+ x^2 - 2dx + dd = bb + dd$$

$$\frac{x^4}{a^2} - \frac{4cx^3}{a^2} + \frac{4c^2x^2}{a^2} + \frac{4bcx}{a} = 0$$

$$- \frac{2bx^2}{a} - 2dx$$

$$+ x^2$$

$$x^3 - 4cx^2 + 4c^2x + 4abc = 0$$

$$- 2abx - 2a^2d$$

$$+ a^2x$$

Apparet adeo, si terminus secundus sit negativus, radicem æquationis veram esse versus sinistram. Sit adeo æquatio cum ea comparanda $x^3 - px^2 + qx + r = 0$; erit

$$-p = -4c$$

$$\frac{1}{4}p = c$$

$$4c^2 - 2ab + a^2 = q$$

$$a^2 + 4c^2 - q = 2ab$$

$$\frac{1}{2}a + \frac{2c^2}{a} - \frac{q}{2a} = b$$

Ecc. 3;

h.e.

$$h. e. \frac{1}{2}a + \frac{p^2}{8a} - \frac{q}{2a} = b$$

Vel

$$4c^2 - 2ab + a^2 = -q$$

$$\frac{a^2 + 4c^2 + q = 2ab}{2a}$$

$$\frac{1}{2}a + \frac{2c^2}{a} + \frac{q}{2a} = b$$

$$h. e. \frac{1}{2}a + \frac{p^2}{8a} + \frac{q}{2a} = b$$

Porro

$$4abc - 2a^2d = r$$

$$\frac{4abc - r = 2a^2d}{4abc - r = 2a^2d}$$

$$\frac{2bc}{a} - \frac{r}{2a^2} = d$$

$$h. e. \frac{1}{4}p + \frac{p^3}{16a^2} + \frac{pq}{4a^2} - \frac{r}{2a^2} = d$$

Vel

$$4abc - 2a^2d = -r$$

$$\frac{4abc + r = 2a^2d}{4abc + r = 2a^2d}$$

$$\frac{2bc}{a} + \frac{r}{2a^2} = d$$

$$h. e. \frac{1}{4}p + \frac{p^3}{16a^2} + \frac{pq}{4a^2} + \frac{r}{2a^2} = d$$

Est ergo in omnibus æquationibus cubicis completis

$$AQ = \frac{1}{4}p$$

$$DA = \frac{1}{2}a + \frac{p^2}{8a} + \frac{q}{2a}$$

$$DH = \frac{1}{4}p + \frac{p^3}{16a^2} + \frac{pq}{4a^2} + \frac{r}{2a^2}$$

Nimirum in regula q seu coëfficiens termini tertii semper afficitur signo contrario ejus, quod in æquatione habet. Habetur autem in regula $-r$, si p & r diversis signis afficiuntur: alias semper est $+r$.

Quoniam coëfficientes illorum terminorum evanescent, qui nihilo æquales ponuntur; evidens est ejusdem regulæ ad æquationes incompletas applicatio.

Denique si quadratum radii MH vel HN ponatur $bb + dd + af$; æquatio manebit biquadratica. Quare si biquadratica æquatio fuerit $x^4 + px^3 + qx^2 + rx + f = 0$; reliqua omnia manebunt ut ante, sed

$$\frac{f = a^3 f}{f: a^3 = f}$$

Unde radius circuli invenitur ut in problemate 250. (§. 617), si fuerit $+f$, vel ut in problemate 251. (§. 618), si fuerit $-f$. His observatis, regula eadem constructioni æquationum biquadraticarum satisfacit.

S C H O L I O N.

623. Atque hæc est regula, quam Thomas Bakerus (a) centralem vocat & ad omnes casus æquationum cubicarum & biquadraticarum applicat. Sed verum ejus fundamentum latet in iis, qua superius tradidimus. Restat, ut usum hujus doctrinæ aliquot exemplis illustremus.

P R O B L E M A C C L V.

624. Inter duas lineas datas invenire duas medias continue proportionales.

Si datarum quæsitæ
major = b minor = y ,
minor = a major = x

erit per conditionem problematis:

$$\frac{a: y = y: x}{ax = yy}$$

I. $ax = yy$

$$\frac{y: x = x: b}{xx = by}$$

II. $xx = by$

III.

(a) In Clave Geometrica catholica p. 6.

$$a : y = x : b$$

III. $ab = xy$

$$x^2 = by$$

$$ax = y^2$$

IV. $x^2 - ax = by - y^2$

$$ax = y^2$$

$$x^2 = by$$

V. $x^2 + ax = y^2 + by$

$$x^2 = by$$

$$\frac{ax^2}{v} = \frac{aby}{v}$$

$$ax = y^2$$

VI. $\frac{ax^2}{v} + ax = \frac{aby}{v} + y^2$

$$ax = y^2$$

$$\frac{ax^2}{v} = \frac{aby}{v}$$

VII. $ax - \frac{ax^2}{v} = y^2 - \frac{aby}{v}$

I. $y^2 - ax = 0$

II. $x^2 - by = 0$

III. $xy - ab = 0$ ad hyperbolam intra asymptotos.

IV. $y^2 + x^2 - by - ax = 0$ ad circulum.

V. $y^2 - x^2 + by - ax = 0$ ad hyperbolam æquilateram.

VI. $y^2 - \frac{ax^2}{v} + \frac{aby}{v} - ax = 0$ ad infinitas hyperbolas scalenas.

VII. $y^2 + \frac{ax^2}{v} - \frac{aby}{v} - ax = 0$ ad infinitas ellipses.

Quodsi in æquatione ad hyperbolam intra asymptotos $xy = ab$ substituatur valor ex æquatione ad parabolam $ax = y^2$; prodibit $y^3 - a^2b = 0$.

Constructio itaque multis modis fieri

potest, nimirum per circulum & hyperbolam intra asymptotos, per circulum & hyperbolam æquilateram, per circulum & infinitas hyperbolas, per circulum & infinitas ellipses, vel per duas hyperbolas &c. vel denique per regulam centram Bakeri.

Pro circulo, ad quem est $y^2 + x^2 - by - ax = 0$, habetur vi theorematis generalis (§. 589)

$$\frac{r}{q} = 0 \quad 2n = b \quad 2p = a$$

$$\frac{f^2}{q^2} = 1 \quad n = \frac{1}{2}b \quad p = \frac{1}{2}a$$

$$f = q \quad n^2 + p^2 = m^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}aa\right)} = m$$

Quoniam in parabola parametro a Tab. descipita, ad quam $ax = y^2$ origo ipsius x IX. in vertice A existit; circulus per ejus Fig. 93. verticem describendus radio $= \sqrt{\left(\frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}aa\right)}$. Fiat itaque $AD = \frac{1}{2}a$, $DH = \frac{1}{2}b$; erit centrum circuli in H & $PM = y$, $PA = x$: id quod facile ostenditur eodem, quo superius, modo.

Pro ellipsi, ad quam est $y^2 + \frac{ax^2}{v}$

$$- \frac{aby}{v} - ax = 0$$
, habetur vi theore-

matis generalis (§. 588)

$$\frac{2r}{q} = 0 \quad \frac{t}{2m} = \frac{a}{v} \quad 2n = \frac{ab}{v}$$

hinc $f = q$. $n = \frac{ab}{2v}$

$$\frac{2tp}{2m} = a = \frac{2ap}{v} \quad n^2 + \frac{tp^2}{2m} = \frac{tm^2}{2m}$$

$$\frac{2ap = av}{p = \frac{1}{2}v} \quad n^2 + \frac{ap^2}{v} = \frac{am^2}{v}$$

$$2ap$$

$$\frac{vn^2}{a} + p^2 = m^2$$

$$\frac{ab^2}{4v} + \frac{1}{4}v^2 = m^2$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{ab^2}{v} + v^2\right)} = m$$

Tab.
X.
Fig.
104.

Constructio itaque problematis per circulum & ellipsin hæc est : Jungantur DF = b & DE = a ad angulos rectos. Fiat DK = $\frac{1}{2}b$ & erecta perpendiculari KC = $\frac{1}{2}a$; erit DC = $\sqrt{\left(\frac{1}{4}bb + \frac{1}{4}aa\right)}$. Ex centro itaque C radio DC describatur circulus : ita locus prior erit constructus atque origo indeterminatæ x in D. Quare pro ellipsi fiat DH = ab : 2v & per H ducatur ipsi DE parallela IN. Fiat HL = $\frac{1}{2}v$ & LI = LN = $\frac{1}{2}\sqrt{(ab^2 : v + v^2)}$; erit L centrum, IN axis ellipsis : quæ si describatur, secabit circulum in M. Dico esse DQ = x, QM = y, consequenter DE, QM, DQ, DF quatuor continue proportionales.

Est enim CP = x - $\frac{1}{2}a$ & PM = y - $\frac{1}{2}b$, adeoque ob DC² = CM² = CP² + PM² (§. 417 Geom.), $\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}bb = xx - ax + \frac{1}{4}aa + yy - by + \frac{1}{4}bb$, hoc est, yy + xx - by - ax = 0 : qui est locus ad circulum. Porro OM = y - ab : 2v, LO = x - $\frac{1}{2}v$ adeoque ob

$$v : a = IL^2 - LO^2 : OM^2 \text{ (§. 431)}$$

$$I : \frac{a}{v} = \frac{ab^2}{4v} - x^2 + vx : y^2 - \frac{aby}{v} + \frac{a^2b^2}{4v^2}$$

$$\frac{a^2b^2}{4v^2} - \frac{ax^2}{v} + ax = y^2 - \frac{aby}{v} + \frac{a^2b^2}{4v^2}$$

$$y^2 + \frac{ax^2}{v} - \frac{aby}{v} - ax = 0$$

$$\text{sed } y^2 + x^2 - by - ax = 0$$

$$\text{Ergo } \frac{ax^2}{v} - \frac{aby}{v} + by - x^2 = 0$$

$$x^2 - by = 0$$

$$x^2 = by$$

Substituatur hic valor in æquatione $y^2 + x^2 - by - ax = 0$; prodibit $y^2 + by - by - ax = 0$
 $y^2 = ax$

Quare a : y = y : x & (ob x² = by) y : x = x : b. Sunt adeo a, y, x, & b quatuor continue proportionales.

Eodem modo problema constituitur per circulum & infinitas hyperbolas scalenas.

Constructionem per circulum & hyperbolam intra asymptotos adhuc apponimus. Jungantur nempe RI = a & AR = b ad angulos rectos, & per I describatur hyperbola intra asymptotos RA, AT. Fiat RD = $\frac{1}{2}b$ & in D erigatur perpendicularis DC = $\frac{1}{2}a$, tandemque ex centro C radio CR describatur circulus secans hyperbolam in M : erit TM = y & AT = x.

Tab.
XI.
Fig.
105.

Nam ex natura hyperbolæ (ob AR. RI = AT. TM) ab = xy & CK = x - $\frac{1}{2}a$, KM = y - $\frac{1}{2}b$, adeoque ob CM² = CK² + KM², $\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}bb = xx - ax + \frac{1}{4}aa + yy - by + \frac{1}{4}bb$, consequenter yy + xx - ax - by = 0 seu xx - ax = by - yy. Est ergo vi æquationis prioris:

$$a : x = y : b$$

Quare x - a : a = b - y : y (§. 124) Porro vi æquationis posterioris

$$x - a : b - y = y : x$$

$$\text{Ergo (§. 124) } a : y = y : x$$

$$\text{Est vero etiam } a : y = x : b \text{ (§. cit.)}$$

$$\text{Ergo } a : y = y : x = x : b \text{ (§. 167 Arith.)}$$

Quod-

Tab. XIII. Fig. 122. Quodsi AR & AS jungantur ad angulos rectos & circa axem AR parametro a describatur Parabola AMH, circa AS vero parametro b parabola altera AMI secans priorem in M; erit $AP = x$, $PM = y$: quem modum invenit *Menechmus* ex conditione problematis absque calculo analytico facile eruendum, & nos ideo apponimus, quia inde enata est methodus construendi æquationes per duorum locorum combinationem. Est enim vi parabolæ primæ $y^2 = ax$ & vi secundæ $x^2 = by$, adeoque $a : y = y : x$ & $y : x = x : b$.

COROLLARIUM.

625. Sit latus cubi $= a$, latus cubi dupli $= y$; erit $2a^3 = y^3$, seu ponendo $2a = b$, $aab = y^3$. Quærendæ igitur sunt inter latus cubi & ejus duplum duæ mediæ continue proportionales, eritque earum prima latus cubi dupli. Et in genere pro tantuplicatione cubi est $ma^3 = y^3$, adeoque inter a & ma quærendæ sunt duæ mediæ.

SCHOLION.

626. Coincidit adeo problema *Deliacum* de duplicando cubo, quod *Deliis* remedium contra pestem quærentibus oraculum proposuisse fertur, cum problemate de inveniendis duabus mediis continue proportionalibus (quod primus observavit *Hipocrates Chius*): unde & ipsum problema *Deliacum* appellari solet. Celebre hoc problema jam olim inter *Geometras Græcos* extitit, quos inter *Plato*, *Heron Alexandrinus*, *Apollonius Pergæus*, *Eratosthenes*, *Pappus Alexandrinus*, *Sporus*, *Menechmus*, *Architas Tarentinus*, *Philo Byzantius*, *Philoponus*, *Diocles* & *Nicomedes* modis diversis ab *Eutocio* (a) conservatis solverunt.

(a) In Commentariis in lib. 2. *Archimedis* de Sphæra & Cylindro.

PROBLEMA CCLVI.
627. Rectam AB utcumque divisam in C ulterius dividere in D, ita ut sit $CD : DB = AC^2 : CD^2$.

Tab. XI. Fig. 106.

Sit $AC = a$, $CB = b$, $CD = y$, erit $DB = b - y$, consequenter per conditionem problematis

$$y : b - y = a^2 : y^2$$

Ut nova indeterminata introducatur, cum ob $y^3 = a^2b - a^2y$ problema solidum esse facile intelligatur, fiat

$$a : y = y : x$$

erit I. $ax = y^2$ & hinc
 $y : b - y = a^2 : ax$
 $= a : x$ (§. 124)

II. $xy = ab - ay$

Porro ob $y : b - y = a : x$
 $y^2 : by - y^2 = a : x$ (§. 124)
 $ax : by - y^2 = a : x$
 $x : by - y^2 = 1 : x$ (§. cit.)

III. $x^2 = by - y^2$
 $ax = y^2$ add.

IV. $x^2 + ax = by$
 $ax = y^2$ add.²

V. $x^2 + 2ax = by + y^2$
 Denique ob $ax = y^2$ (I.)
 & $x^2 = by - y^2$ (III.) subtr.

VI. $ax - x^2 = 2y^2 - by$

Habemus adeo æquationes locales

- I. $y^2 - ax = 0$ ad parabolam.
- II. $xy + ay - ab = 0$ ad hyperbolam intra asymptotos.
- III. $y^2 + x^2 - by = 0$ ad circulum.
- IV. $x^2 + ax - by = 0$ ad parabolam.
- V. $y^2 - x^2 + by - 2ax = 0$ ad hyperbolam æquilateram.
- VI. $y^2 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}by - \frac{1}{2}ax = 0$ ad ellipfin.

Nos duas dabimus constructiones, alteram per parabolam & circulum; alteram per circulum & ellipsin.

Quoniam æquatio ad parabolam $y^2 - ax = 0$; non alia re opus est, quam ut parametro a parabola describatur: erit origo indeterminatæ x in vertice (§. 388).

Pro circulo, ad quem est $y^2 + x^2 - by = 0$, vi theorematis generalis (§. 589)

$$r = 0 \quad \frac{2n = b}{n = \frac{1}{2}b} \quad \frac{n^2 = m^2}{m = n = \frac{1}{2}b}$$

In vertice adeo parabolæ erigatur perpendicularis $AD = \frac{1}{2}b$ & ex centro D , radio $AD = \frac{1}{2}b$ describatur circulus; erit $PM = y$.

Demissa enim perpendiculari DR , erit $MR = PM - PR = PM - AD = y - \frac{1}{2}b$ & (§. 391) $AP = DR = y^2 : a$, consequenter ob $DA^2 = DM^2 = MR^2 + DR^2$ (§. 417 *Geom.*), $y^4 : aa + y^2 - by + \frac{1}{4}bb = \frac{1}{4}bb$, hoc est,

$$\frac{y^4 + y^2 - by = 0}{aa} \quad y : aa$$

$$y^3 + a^2y - a^2b = 0$$

Pro ellipsi ad quam $y^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}by - \frac{1}{2}ax = 0$, vi theorematis generalis (§. 588)

$$\frac{2r}{q} = 0 \quad \frac{t}{2m} = \frac{1}{2} \quad \frac{2n}{2m} = \frac{1}{2}b \quad \frac{2tp}{2m} = \frac{1}{2}a$$

hinc

$$q = f \quad n = \frac{1}{4}b \quad p = \frac{1}{2}a$$

$$\frac{n^2 + \frac{tp^2}{2m} = \frac{tm^2}{2m}}{n^2 + \frac{1}{2}p^2 = \frac{1}{2}m^2}$$

$$\frac{\frac{1}{16}bb + \frac{1}{8}a^2 = \frac{1}{2}m^2}{\sqrt{\left(\frac{1}{8}bb + \frac{1}{4}a^2\right)} = m}$$

Tab. XI. Fig. 107.

Describatur ergo ellipsis, cujus axis $AB = 2\sqrt{\left(\frac{1}{8}bb + \frac{1}{4}a^2\right)}$ & parameter $= \sqrt{\left(\frac{1}{8}bb + \frac{1}{4}a^2\right)}$ ob $2m : t = 2 : 1$. Ex centro C demittatur perpendicularis $CH = n = \frac{1}{4}b$ & ducta DE per H axi AB parallela fiat $HD = p = \frac{1}{2}a$; erit in D origo indeterminatæ x .

Quare circulum cum ea combinaturus erige perpendicularem $DL = \frac{1}{2}b$ & ex L radio DL describatur circulus: erit $QM = y$, $DQ = x$.

Est enim $PC = QH = DQ - DH = x - \frac{1}{2}a$, $PM = y - \frac{1}{4}b$, adeoque $PC^2 = x - ax + \frac{1}{4}a^2$, $PM^2 = y^2 - \frac{1}{2}by + \frac{1}{16}b^2$. Est porro $AC^2 = \frac{1}{8}b^2 + \frac{1}{4}a^2$, consequenter ob $t : 2m = 1 : 2$ (§. 431)

$$1 : 2 = PM^2 : AC^2 - PC^2$$

$$1 : 2 = y^2 - \frac{1}{2}by + \frac{1}{16}bb : \frac{1}{8}bb - x^2 + ax$$

$$2y^2 - by + \frac{1}{8}bb = \frac{1}{8}bb + ax - xx$$

$$2y^2 - by = ax - xx$$

Porro $RM = y - \frac{1}{2}b$, $LR = DQ = x$, $LM = \frac{1}{2}b$, consequenter ob $LM^2 = LR^2 + RM^2$ (§. 417 *Geom.*)

$$\frac{\frac{1}{4}bb = y^2 - by + \frac{1}{4}bb + xx}{y^2 - by = xx}$$

Quo valore ipsius $y^2 - by$ in æquatione superiore substituto, prodit

$$\frac{y^2 - xx = ax - xx}{y^2 = ax}$$

$$y^2 : a = x$$

$$y^4 : aa = x^2$$

Hinc ob $y^2 - by + x^2 = 0$

$$\frac{y^4 + y^2 - by = 0}{aa} \quad y : aa$$

$$y^3 + a^2y - a^2b = 0$$

Quod ellipsis transeat per puncta D & L , ita ostenditur. Est $KL = DL = \frac{1}{4}b$, adeoque $KL^2 = \frac{1}{16}b^2$, $AC = \sqrt{\left(\frac{1}{8}a^2\right)}$

Tab. XI. Fig. 108.

$\sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{8}b^2)}$ & $KC = DH = \frac{1}{2}a$, adeoque $AK = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{8}b^2)} - \frac{1}{2}a$ & $KB = \sqrt{(\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{8}b^2)} + \frac{1}{2}a$, consequenter $AK \cdot KB = \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{8}b^2 - \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{8}b^2$. Sed $2KL^2 = \frac{1}{16}b^2 = \frac{1}{8}b^2$. Est itaque $2KL^2 = AK \cdot KB$, consequenter punctum L , adeoque & punctum D in Ellipsi (§.420).

PROBLEMA CCLVII.

628. Dato parallelepipedo cubum aequalem construere.

Sint latera parallelepipedi a, b & c ; latus cubi sit y ; erit (§. 536 Geom.)

$$abc = y^3$$

hoc est, $a : y = y^2 : bc$

Ut nova indeterminata in æquationem introducatur; fiat

$$a : y = y : x$$

erit I. $ax = y^2$

& ob $a : y = ax : bc$

$$II. xy = bc$$

Porro $a : y = y : x$

$$a : y = ax : bc$$

adeoque $y : x = ax : bc$ (§.167 Arithm.)

$$ax^2 = bcy$$

$$III. x^2 = bcy : a$$

$$ax = y^2 \text{ subst.}$$

$$IV. x^2 - ax = bcy : a - y^2$$

$$V. x^2 + ax = y^2 + \frac{bcy}{a}$$

Denique ob $x^2 = bcy : a$

$$2ax = 2y^2$$

$$VI. 2ax - x^2 = 2y^2 - bcy : a$$

$$\text{\& VII. } 2ax + x^2 = 2y^2 + bcy : a$$

Habemus adeo æquationes locales

I. $y^2 - ax = 0$ ad parabolam.

II. $xy - bc = 0$ ad hyperbolam intra asymptotos.

III. $x^2 - \frac{bcy}{a} = 0$ ad parabolam.

IV. $y^2 + x^2 - \frac{bcy}{a} - ax = 0$ ad circulum.

V. $y^2 - x^2 + \frac{bcy}{a} - ax = 0$ ad hyperbolam æquilateram.

VI. $y^2 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{bcy}{2a} - ax = 0$ ad ellipsin.

VII. $y^2 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{bcy}{2a} - ax = 0$ ad hyperbolam scalenam.

Pro loco ad circulum, ad quem y^2

$+ x^2 - \frac{bcy}{a} - ax = 0$, vi theorematum generalis (§. 589)

$$\frac{2n = bc : a}{n = bc : 2a} \quad \frac{2p = a}{p = \frac{1}{2}a}$$

$$\frac{n^2 + p^2 = m^2}{\sqrt{(\frac{b^2c^2}{4a^2} + \frac{1}{4}aa)} = m}$$

$$\sqrt{(\frac{b^2c^2}{4a^2} + \frac{1}{4}aa)} = m$$

Cum in parabola, ad quam $-y^2 - ax = 0$, parametro a descripta origo indeterminata x sit in vertice A , fiat $AD = \frac{1}{2}a$, $DH = n = bc : 2a$; erit H centrum circuli radio HA describendi: qui si describatur, secabit parabolam in M , eritque $MP = y$.

Est enim $AH^2 = AD^2 + DH^2 = \frac{1}{4}aa + b^2c^2 : 4a^2$, $PA = yy : a$ (§.391) & hinc $DP = HR = yy : a - \frac{1}{2}a$, $MR = y - bc : 2a$. Quare ob $AH^2 = HM^2 = HR^2$

$$+ MR^2 = \frac{1}{4}aa + b^2c^2 : 4a^2 = \frac{y^4}{aa} - yy$$

$$+ \frac{1}{4}aa + y^2 - \frac{bcy}{a} + \frac{bbcc}{4aa}$$

$$\text{hoc est, } \frac{y^4}{aa} - \frac{bcy}{a} = 0$$

$$\frac{y^4}{aa} - \frac{bcy}{a} = 0$$

$$y^3 - abc = 0$$

Tab. XI. Fig. 105.

Jungantur $RI = b$ & $RA = c$ ad angulos rectos, ducatur indefinita AS ipsi RI parallela & intra asymptotos RA & AS per I describatur hyperbola; erit origo indeterminatae x in A . Porro ut circulus cum ea combinetur, fiat $AD = n = bc : 2a$ & DC ad AD perpendicularis $= p = \frac{1}{2}a$; ex centro C radio AC describatur circulus hyperbolam in M interfecans, erit TM ipsi AR parallela $= y$.

Est enim ob AR . $RI = AT$. TM (§. 502) $bc = xy$. Præterea $CM^2 = AC^2 = AL^2 + CL^2$ (§. 417 *Geom.*) $= \frac{1}{4}aa + b^2c^2 : 4aa$, $CK = LT = AT - AL = x - \frac{1}{2}a$ & $MK = TM - TK = TM - AD = y - bc : 2a$; unde ob $CM^2 = CK^2 + KM^2$ elicitur $\frac{1}{4}aa + b^2c^2 : 4aa = x^2 - ax + \frac{1}{4}aa + y^2 - \frac{bcy}{a} + \frac{bbcc}{4aa}$

hoc est, $y^2 - \frac{bcy}{a} + x^2 - ax = 0$

feu $y^2 - \frac{bcy}{a} = ax - x^2$

Substituatur pro bc valor ipsius xy ; prodibit

$$\begin{aligned} y^2 - \frac{xy^2}{a} &= ax - x^2 \\ \hline ay^2 - xy^2 &= aax - axx \\ \hline y^2 &= ax \\ \hline y^2 &= a^2 x^2 \\ \hline y^4 &= a^2 x^2 \end{aligned}$$

Quare ob $y^2 - \frac{bcy}{a} + x^2 - ax = 0$

$ax - \frac{bcy}{a} + \frac{y^4}{a^2} - ax = 0$

$$\frac{y^4}{aa} - \frac{bcy}{a} = 0$$

$$y^3 - abc = 0$$

Pro ellipsi, adquam est $y^2 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{bcy}{2a} - ax = 0$, vi theorematis generalis (§. 588)

$$\frac{r}{q} = 0 \quad \frac{t}{2m} = \frac{1}{2} \quad - \frac{2tp}{2m} = -a$$

$$q = f \quad 2n = \frac{bc}{2a} \quad \frac{2p}{2} = n$$

$$n = \frac{bc}{4a} \quad p = a$$

$$n^2 + \frac{tp}{2m} = \frac{tm^2}{2m}$$

$$\frac{n^2 + \frac{1}{2}p^2}{2n^2 + p^2} = \frac{\frac{1}{2}m^2}{m^2}$$

$$\sqrt{\left(\frac{b^2c^2}{8aa} + aa\right)} = m$$

Describatur ergo ellipsis, cujus axis $AB = 2\sqrt{(a^2 + b^2c^2 : 8aa)}$, parameter $\sqrt{(a^2 + b^2c^2 : 8aa)}$, quia est ad axem in ratione subdupla. Ex centro C

Tab. XI. Fig. 109.

excitetur perpendicularis $CH = \frac{bc}{4a}$ & per H agatur DE ipsi AB parallela. Fiat $DH = a$: erit D origo indeterminatae x . Ut circulus cum eadem combinetur, fiat $DI = bc : 2a$ & $IL = \frac{1}{2}a$, & radio LD ex centro L describatur circulus, qui ellipsin secabit in M . Dico QM esse $= y$ & $DQ = x$.

Est enim $CP = HQ = DQ - DH = x - a$ & $PM = QM - PQ = QM - DK = y - bc : 4a$. Ex natura ellipsis (§. 431)

$$2 : 1 = AC^2 - CP^2 : PM^2$$

$$2 : 1 = \frac{b^2c^2}{8aa} + a^2 - x^2 + 2ax - aa : y^2 - \frac{bcy}{2a} + \frac{b^2c^2}{16a^2}$$

b^2c^2

$$\frac{b^2c^2}{8aa} - x^2 + 2ax = 2y^2 - \frac{bcy}{a} + \frac{b^2c^2}{8a^2}$$

$$2ax - x^2 = 2y^2 - bcy : a$$

Porro MR=QM—RQ=QM—DI
 =y—bc:2a, LR=DQ—IL=x—½a.
 Quare ob DL²=LM²=LR²+RM²
 $\frac{1}{4}aa + b^2c^2 : 4a^2 = x^2 - ax + \frac{1}{4}aa + y^2$
 —bcy: a + b²c²: 4a², hoc est,
 $x^2 - ax + y^2 - bcy : a = 0$

feu $y^2 - \frac{bcy}{a} = ax - x^2$

Substituto valore ipsius ax—xx in æquatione superiori, prodit

$$ax + y^2 - \frac{bcy}{a} = 2y^2 - \frac{bcy}{a}$$

$$\frac{ax = y^2}{x = y^2 : a}$$

$$x^2 = y^4 : a^2$$

His valoribus ipsorum x & x² denuo in æquatione superiore substitutis prodit

$$2y^2 - y^4 : a^2 = 2y^2 - \frac{bcy}{a}$$

$$\frac{y^4}{aa} = \frac{bcy}{a}$$

$$y^3 = abc$$

Non absimili modo fit constructio per circulum & hyperbolam.

PROBLEMA CCLVIII.

629. Datum angulum ACB trifecare.

Concipiamus angulum ACB esse trifariam sectum in ACE, ECD & DCB ducanturque arcuum æqualium subtensa cognomines AE, ED, DB, quæ æquales sunt (§.289. Geom.). Sit AC = b, AB = a, AE = y, EG = x,

Jam anguli EAB mensura est arcus DB (§.314. Geom.). Anguli vero

ACE mensura cum sit arcus AE (§.57 Geom.) ipsi DB æqualis per hypoth. anguli EAG & ACE æquales sunt (§.142 Geom.). Quoniam itaque præterea angulus AEC utrique triangulo EAG & EAC communis; erit (§.267 Geom.)

AC:AE=AE:EG AC:EC=AE:AG
 b:y=y:x sed AC=EC

I. yy = bx ergo AE = AG

Ducatur EF ipsi DC parallela: erit EFH=GHC (§.233 Geom.)=EDC (§.312 & 233 Geom.). Porro EGF=HGC (§.156. Geom.)=CED (§.312 & 233. Geom.). Est igitur (§.267. Geom.)

EC:ED=EG:GF

b:y=x:xy/b

Quoniam DB=ED=AE, & DB= BH, EA=AG, per demonstr. ED= FH (§.257 Geom.): erit AE + ED + DB = AG + BH + GH + FG hoc est, 3AE = AB + FG, consequenter.

3y = a + xy : b

II. 3by = ab + xy feu 3by - xy = ab quæ æquatio in hanc resolvitur analogiam:

b:y = 3b - x : a

y:x = 3b - x : a (§.167 Arith.)

III. ay = 3bx - xx
 yy = bx add.

IV. ay + yy = 4bx - xx
 ay = 3bx - xx
 yy = bx subtr.

V. ay - yy = 2bx - xx

Fff 3.

ay

Tab. XI. Fig. 110.

$$\begin{aligned} ay &= 3bx - xx \\ 2yy &= 2bx \text{ add.} \end{aligned}$$

VI. $2yy + ay = 3bx - xx$

$$\begin{aligned} ay &= 3bx - xx \\ 2yy &= 2bx \text{ subtr.} \end{aligned}$$

VII. $ay - 2yy = bx - xx$

Habemus adeo æquationes locales

- I. $yy - bx = 0$ ad parabolam.
- II. $xy - 3by + ab = 0$ ad hyperbolam intra asymptotos.
- III. $xx - 3bx + ay = 0$ ad parabolam.
- IV. $yy + xx + ay - 4bx = 0$ ad circumulum.
- V. $yy - xx - ay + 2bx = 0$ ad hyperbolam æquilateram.
- VI. $yy + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}ay - \frac{5}{2}bx = 0$ ad ellipsin.
- VII. $yy - \frac{1}{2}xx - \frac{1}{2}ay + \frac{1}{2}bx = 0$ ad hyperbolam scalenam.

Pro circulo, ad quem est $yy + xx + ay - 4bx = 0$, vi theorematis generalis (§. 89)

$$\begin{aligned} \frac{2n}{n} &= \frac{a}{\frac{1}{2}a} & \frac{2p}{p} &= \frac{4b}{2b} \\ n &= \frac{1}{2}a & p &= 2b \\ \frac{n^2 + p^2}{\sqrt{\frac{1}{4}aa + 4bb}} &= m \end{aligned}$$

Quare parabola, ad quam $yy - bx = 0$,

Tab. IX. parametris b descripta, fiat $AD = 2b$, $DH = \frac{1}{2}a$ & ex centro H radio DH describatur circulus; erit $QN = y$, $AQ = x$.

Est enim his positis $bx = y^2$ (§. 388), consequenter $x = y^2 : b$, atque hinc $DQ = KH = 2b - y^2 : b$. porro $KN = QN + QK = QN + DH = y + \frac{1}{2}a$. Quare ob $HN^2 = KH^2 + KN^2 = \frac{1}{4}aa + 4bb = 4bb - 4y^2 + y^4 : bb + yy + ay + \frac{1}{4}aa$, hoc est.

$$\begin{aligned} \frac{y^4}{bb} - 3y^2 + ay &= 0 \\ \frac{y^4}{bb} - 3y^2 + ay &= 0 \end{aligned}$$

Eadem vero æquatio prodit, si in superius inventa secunda æquatione $3y = a + xy : b$ substituitur valor ipsius $x = y^2 : b$

ex prima. Est nempe $3y = a + y^2 : b$, hoc est, $y^3 - 3by + abb = 0$.

Constructio per circumulum & hyperbolam intra asymptotos ita absolvitur. Jungantur $KL = 2b$ & $CL = \frac{1}{2}a$ ad angulos rectos; erit $CK = \sqrt{4bb + \frac{1}{4}aa}$ radius circuli ex centro C per K describendi. Producatur CL in I , donec $LI = a$ & KL in T , donec $LT = b$, seu $KT = 3b$. Intra asymptotos KTS per I describatur hyperbola. Dico QM esse radicem veram quæsitam seu subtensam trientis arcus, qui metitur angulum trifecandum, radio b descripti: seu $QM = y$ & $KQ = x$.

Est enim $QT = KT - KQ = 3b - x$, adeoque ob IL . $LT = QT$. QM (§. 502), $3by - xy = ab$. Porro $PC = QL = KL - KQ = 2b - x$ & $PM = y + \frac{1}{2}a$, adeoque ob $KC^2 = MC^2 = PM^2 + PC^2$ (§. 417. *Geom.*), $\frac{1}{4}aa + 4bb = y^2 + ay + \frac{1}{4}aa + 4bb - 4bx + xx$, hoc est, $y^2 + ay = 4bx - x^2$.

Æquatio prior ad hyperbolam in hanc resolvitur analogiam;

$$\frac{3b - x}{b} : \frac{b}{a} = \frac{a}{y}$$

Ergo $\frac{3b - x}{b} : \frac{b}{a} = \frac{a}{y}$ (§. 124)
 $4b - x : a + y = b : y$

Æquatio posterior ad circumulum hanc suppeditat analogiam:

$$\frac{4b - x}{b} : \frac{y}{a} = \frac{y}{x}$$

Quare $b : y = y : x$ (§. 167. *Arithm.*)

Unde $bx = y^2$ & $y^2 : b = x$, $y^4 : b^2 = x^2$, substitutis his valoribus in æquatione ad circumulum $y^2 + ay = 4bx - x^2$, prodit

$$\begin{aligned} \frac{y^2 + ay}{ay} &= \frac{4y^2 - y^4 : b^2}{3y^2 - y^4 : b^2} \\ \frac{y^2 + ay}{ay} &= \frac{4y^2 - y^4 : b^2}{3y^2 - y^4 : b^2} \end{aligned}$$

$$ab^2 = 3b^2y - y^3$$

seu $y^3 - 3b^2y + ab^2 = 0$ ut ante.

Notan-

Tab. XI. Fig. III.

Tab. XI. Fig. 110. 111. Notandum vero est, cum eadem æquatio prodeat si ponatur $q^m = y$, esse q^m trientis complementi ad circulum subtensam AI.

Constructiones reliquas facile proprio Marte addent, qui superiora rite perceperunt.

PROBLEMA CCLIX.

630. Numerum irrationalem datum per lineam exprimere.

Sit potentia imperfecta quæcunque x & radix ex ea extracta irrationalis $x^{1:m}$.

Ponatur $x^{1:m} = y$

erit $x = y^m$

hoc est, a pro unitate assumta

$a^{m-1} x = y^m$

quæ est æquatio ad infinita parabolæ genera (§. 519). Quare si parametro a parabola primi generis sit descripta & abscissa sit ad parametrum ut numerus sub signo radicali. e. gr. ut 3 ad 1, si $\sqrt{3}$ desideretur, vel ut 3 ad 2, si quærat $\sqrt{\frac{2}{3}}$; ejus semiordinata exprimet numerum quæsitum.

Est enim in casu primo, si $a=1$, $x=3$, $y^2=3$, adeoque $y=\sqrt{3}$. Et si fuerit $a=1$, $a: x=3:2$, erit $3x=2a=2$, consequenter $x=\frac{2}{3}$. Hinc $y^2=\frac{2}{3}$, adeoque $y=\sqrt{\frac{2}{3}}$. Eodem modo patet, describendam esse parabolam secundi generis seu cubici ordinis, si radices cubicæ dentur; parabolam vero tertii generis seu biquadratici ordinis, si radices dentur biquadraticæ & ita porro.

Sed possunt etiam parabolæ inferiores satisfacere radicibus superioribus. Sit enim e. gr. quærenda linea y , quæ eandem habeat rationem ad lineam da-

tam a , quam habet 1 ad $\sqrt[3]{5}$. Per conditionem problematis erit

$$\frac{1 : \sqrt[3]{5} = a : y}{a \sqrt[3]{5} = y}$$

$$\frac{5a^3 = y^3}{5a^3 = y^3}$$

Constructur adeo problema per parabolam primi generis & circulum, quærendo nempe inter a & $5a$ duas medias continue proportionales.

Fiat enim $a : y = y : x$

erit I. $y^2 = ax$

Æquatio proposita $5a^3 = y^3$ resolvitur in hanc analogiam :

$$\begin{aligned} a : y &= y^3 : 5a^2 \\ &= ax : 5a^2 \\ &= x : 5a \end{aligned}$$

unde $y : x = x : 5a$

$x^2 = 5ay$

$y^2 = ax$ vi num. I.

II. $y^2 + x^2 = 5ay + ax$

Æquatio prima est ad parabolam & secunda ad circulum. Unde æquatio $y^2 = 5a^3$ constructur ut supra.

PROBLEMA CCLX.

631. Invenire puncta quotcunque, quæ sint in curva data æquationis.

1. Ducta linea recta, quæ pro axe curvæ describendæ assumatur, pro arbitrio determinentur abscissæ quotcunque.
2. Erigantur perpendiculares indeterminatæ ad singulas abscissas.
3. Quoniam abscissa determinata est, æquatio data pro determinata recte habetur. Construatur itaque per methodum supra expositam: ita enim invenietur semiordinata abscissæ respondens.

E. gr.

E. gr. Sit construenda parabola secundi generis seu cubici ordinis $axv = y^3$. Assumta igitur pro abscissa v recta determinata, nova quaedam indeterminata introducatur. Fiat nempe

$$\text{I. } \frac{a:y=y:x}{ax=y^2}$$

Æquatio proposita in hanc resolvitur analogiam :

$$\begin{array}{l} a:y=y^2:av \\ \text{hoc est} \quad ax:av \\ \text{seu} \quad x:v \quad (\S. 124) \end{array}$$

Quare $y:x = x:v$ (§. 167) *Aritbm.*

$$\begin{array}{l} x^2 = vy \\ \text{addatur } y^2 = ax \\ \text{erit II. } y^2 + x^2 - vy - ax = 0 \end{array}$$

Ope igitur æquationis ad parabolam $y^2 - ax = 0$ & alterius ad infinitos circulos (quia v infinitis modis determinari potest & debet) $y^2 + x^2 - vy - ax = 0$ puncta quotcunque in paraboloide cubicali inveniuntur. Est enim pro circulo vi theorematis generalis (§. 589)

$$\begin{array}{l} \frac{2n = v}{n = \frac{1}{2}v} \quad \frac{2p = a}{p = \frac{1}{2}a} \\ v^2 + p^2 = m^2 \\ \sqrt{\left(\frac{1}{4}vv + \frac{1}{4}aa\right)} = m \end{array}$$

Tab. XI. Fig. 112.

Quare parabola parametro a descripta, fiat portio axis $AK = \frac{1}{2}a$ & erecta perpendiculari indefinita KG , ex ejus puncto quocunque C per verticem A describatur circulus, erit QM semiordinata respondens abscissæ in paraboloide cubicali, quæ est ipsius KC dupla. Ut igitur plures semiordinatæ determinantur, ex quotcunque aliis punctis rectæ KG per verticem parabolæ ducendi sunt circuli alii in punctis adhuc aliis parabolam interfecantes.

Nam si $KC = \frac{1}{2}v$ & $QM = y$; erit $AQ = yy$; a , $KQ = CP = AQ - AK = yy - a - \frac{1}{2}a$, $PM = y - \frac{1}{2}v$. Quamobrem ob $AC^2 = AK^2 + KC^2 = CM^2 = CP^2 + PM^2$ (§. 417. *Geom.*) $\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}vv = y^4: aa - y^2 + \frac{1}{4}aa + y^2 - vy + \frac{1}{4}vv$, hoc est,

$$\frac{y^4: aa = vy}{y^3 = aav} \quad y:aa$$

Est ergo $2KC$ abscissa & QM ipsi respondens semiordinata in paraboloide cubicali.

Sit construendus circulus secundi generis, ad quem est $y^3 = av^2 - v^3$. Æquatio in hanc abit analogiam :

$$v:y=y^2:av-v^2$$

Cum in constructione v determinetur, introducatur nova indeterminata x ; ponendo

$$v:y=y:x$$

$$\begin{array}{l} \text{erit I. } vx = yy \\ \text{Porro } v:y = vx:av-v^2 \\ \text{hoc est } y:x = x:a-v \quad (\S. 124) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Itaque } ay - yv = xx \\ \text{Addatur } vx = yy \\ \text{erit II. } yy + xx + vy - ay - vx = 0. \end{array}$$

Ope itaque æquationis prioris ad infinitas parabolæ & posterioris ad infinitos circulos determinantur quotcunque semiordinatæ ad abscissas quotcunque in circulo secundi generis assumtas.

Parametro nimirum v describitur parabola, in qua abscissa x , semiordinata y . Pro circulo vero est vi theorematis generalis (§. 589)

$$\begin{array}{l} \frac{2r = 0}{r = 0} \quad \frac{-2n = v - a}{n = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}v} \\ \text{hinc } r = 0 \\ q = f \\ \frac{-2pf}{q} = -v \quad m^2 = n^2 + p^2 \\ \frac{-2p = -v}{p = \frac{1}{2}v} \quad \frac{= \frac{1}{4}aa - av + \frac{1}{2}v^2}{m = \sqrt{\left(\frac{1}{4}aa - av + \frac{1}{2}v^2\right)}} \end{array}$$

Fiat itaque $AD = \frac{1}{2}v$, $DH = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}v$ & radio $AH = \sqrt{\left(\frac{1}{4}a^2 - av + \frac{1}{2}v^2\right)}$ describatur circulus ex centro H transiens per verticem parabolæ A , erit $AP = x$ & $PM = y$.

Ipsa tamen constructio molestior est antecedente, quia continuo nova parabola describenda, ob indeterminatam parametrum v .

Tab. X. Fig. 93.

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.




Fig. 4.

Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7.

Fig. 8.





Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 9.





Fig. 13.



No. 2.




Fig. 14.




Fig. 12.




Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 17.




Fig. 19.




Fig. 18.




Fig. 23.

















Fig. 20.









Fig. 33.



f Fig. 36.




Fig. 35.




Fig. 38.




Fig. 37.




Fig. 40.




Fig. 39.




Fig. 44.




Fig. 42.




Fig. 41.




Fig. 43.













Fig: 52.




Fig: 53.




Fig: 54.




Fig: 55.




Fig: 56.





Fig: 60.













Fig. 69.




Fig. 70.




Fig. 71.




Fig. 72.




Fig. 73.




Fig. 74.




Fig. 75.




Fig. 76.




Fig. 77.




Fig. 78.






Fig. 79.




Fig. 80.




Fig. 81.




Fig. 82.




Fig. 83.




Fig. 85.




Fig. 84.



Fig. 86.




Fig. 87.




Fig. 88.






Fig: 89.




Fig: 90.




Fig: Algebr: Tab: IX.

Fig: 91.





Fig: 92.

Fig: 93.




Fig: 94.




Fig: 95.





Fig: 96.










Fig: 100.




Fig: 101.




Fig: 102.




Fig: 103.




Fig: 104.






Fig: 105.




Fig: 100.




Fig: 107.




Fig: 108.




Fig: 109.




Fig: 110.




Fig: 111.




Fig: 112.




Fig. 113.




Fig. 115.




Fig. 114.




Fig. 116.




Fig. 118.




Fig. 117.




Fig. 119.




Fig. 120.




Fig. 121.






Fig. 122.




Fig. 123.




Fig. 124.





Fig. 127.





Fig. 126.





ELEMENTORUM
ANALYSEOS MATHEMATICÆ.

PARS SECUNDA,

ELEMENTA ANALYSEOS
INFINITORUM TRADIT.

SECTIO PRIMA,

DE CALCULO DIFFERENTIALI.

CAPUT PRIMUM.

De natura Calculi differentialis.

DEFINITIO I.

1. **C**ALCULUS *differentialis* est Methodus quantitates differentiandi, hoc est, inveniendi quantitatem infinite parvam, quæ infinities sumta datam adæquat.

DEFINITIO II.

2. *Infinitefima* seu *quantitas infinite parva* est particula quantitatis adeo exigua, ut eidem incomparabilis existat, seu quæ omni assignabili minor.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

COROLLARIUM I.

3. Infinitefima itaque respectu ejus quantitatis, cui incomparabilis existit, pro nihilo habenda. Si enim negligitur, error committitur omni assignabili minor, hoc est, nullus.

COROLLARIUM II.

4. Hinc duæ quantitates infinitefima differentes æquales sunt. Cum enim infinitefima neglecta nullum producat errorem in quantitibus (S. 3.); una alteri substitui potest. Sunt igitur æquales (S. 15. *Arithm.*).

Ggg

SCHO-

S C H O L I O N.

5. Ut natura infinitesimalum rite intelligatur, ad sequentia animum advertisse juvat. Ponamus, te dimetiri montis altitudinem; dum vero per dioptras collineas, flatu venti pulvisculum abigi: montis ergo altitudo diametro unius pulvisculi censetur imminuta. Enimvero quoniam eadem altitudo montis invenitur, sive pulvisculum illud vertici adhareat, sive abigatur; quantitas ejus diametri in presente negotio pro nihilo habenda, hoc est, infinite parva existit. Similiter in Astronomia diameter Telluris respectu fixarum habetur pro puncto seu infinitesima: idem enim observaretur motus primus, si tellus esset punctum individuum. Eodem etiam modo in eclipsibus lunaribus computandis terra pro sphaera perfecta, consequenter montium, multoque magis adium ac turrium altitudines pro infinitesimis habentur: neque enim aliter nobis appareret umbra telluris super disco Lunæ, si terra sphaera perfecta esset. Idem vero in abstractis quantitibus locum habere, dudum agnovere veteres & inter eos demonstratores rigidissimi, Euclides (a) atque Archimedes (b). E. gr. si a linea data auferatur ipse dimidium, ut habet Euclides, seu, quod perinde est, pars alia quantacunque, & a residuo rursus ipse dimidium aut pars alia similis primum ablata, atque ita porro: devenietur tandem ad aliquam quantitatem quolibet data minorem, hoc est, ad infinitesimam. Apparet adeo hinc, nomen infinitesimæ esse respectivum: involvit nempe relationem ad aliam quantitatem datam, cujus respectu infinitesima dicitur. E. gr. diameter telluris in eclipsibus lunaribus est infinite magna respectu altitudinis montium; sed eadem tamen est infinite parva respectu distantia fixarum in ordine ad motum primum. Cavendum vero, ne cum illis, qui imaginaria cum realibus

(a) Element. Lib. 10. prop. 1.

(b) In præfatione ad quadraturam parabolæ & in scriptis ejus omnibus.

confundunt, propterea quod distincta continui ac infiniti notione destituti nescio quæ phantasmata sibi fingunt, infinitesimas & infinitesimalum infinitesimas pro entibus realibus habeas: a quo ipse calculi infinitesimalis inventor, illustris Leibnitiuss, alienus. (c)

D E F I N I T I O III.

6. Infinitesimæ dicuntur differentia- lia, item quantitates differentiales, si spectantur ut differentia duarum quantitatum. Vir summus Newtonus (quem Angli sequuntur) infinitesimas Fluxiones vocat, quia eas considerat veluti momentanea quantitatum incrementa, e. gr. lineæ fluxu puncti, aut superficiæ fluxu lineæ; aut solidi fluxu superficiæ genita.

C O R O L L A R I U M.

7. Cum itaque solæ quantitates variabiles continuo augeantur, vel minuantur, constantibus vero nihil accedat, (S. 375. *Analys. finit.*); differentiale quantitatis constantis nullum est, sed variabiles tantum ali- quod admittunt.

H Y P O T H E S I S.

8. Quantitatum differentia- lia exprimentur per eandem litteram, quibus variabiles denotantur, præfixa tamen littera d. E. gr. differentiale ipsius x dicatur dx; differentiale ipsius y dicatur dy. Est autem dx quantitas positiva, si x continuo crescit; negativa, si decrescit.

S C H O L I O N.

9. Angli cum Newtono pro dx scribunt x; pro dy vero y; sed commodior est Leibniti-
nitiana

(c) Vide Acta Eruditorum A. 1712. p. 167.

nitiana differentialium designatio, qua omnes reliqui utuntur, quia si differentialia denuo differentiantur facile oritur punctorum confusio: ut taceam typhetas facilius puncta negligere, quam litteram d omittere.

COROLLARIUM I.

10. Quoniam quantitates constantes primis alphabeti litteris indigitamus (§. 376. *Analys. finit.*); erit $da = 0$, $db = 0$, $dc = 0$, (§. 7).

COROLLARIUM II.

11. Quare $d(x + y - a) = dx + dy$ & $d(x - y + a) = dx - dy$. Facilis adeo est differentiatio quantitatum per additionem aut subtractionem compositarum.

PROBLEMA I.

12. Differentiare quantitates se mutuo multiplicantes.

RESOLUTIO.

I. Si quantitates duæ se mutuo multiplicent, ut xy ; differentiale unius factoris ducatur in factorem alterum; summa duorum factorum, quæ hac ratione procedunt, $xdy + ydx$ erit differentiale quæsitum, hoc est, $d(xy) = xdy + ydx$.

DEMONSTRATIO.

xy repræsentat rectangulum ABDC, cujus latus unum $AC = x$, alterum $DC = y$. Si concipiamus latus utrumque augeri quantitate differentiali, nempe ut CA degeneret in $CL = x + dx$ & CD in $CE = y + dy$; rectangulum CABD abit in majus CLGE. Differentiale adeo ipsius xy est differentia inter rectangulum CABD & CLGE (§.6). Quare $d(xy) = xy + ydx + xdy + dx dy$

$- xy = ydx + xdy + dx dy$, nempe ALBH + DBFE + BHGF. Quodsi, in rectangulo ALHB $= ydx$, AL $= dx$ sumatur pro constante; erit HGFB $= dx dy$ differentiale ejus (§. 6). Eodem modo patet, esse idem rectangulum BHGF differentiale ipsius DEFB. Quamobrem HBEF seu $dx dy$ respectu rectangulorum ALHB & DBEF, seu ydx & $x dy$, habetur pro nullo, consequenter differentia inter rectangula CABD & CLGE, seu differentiale ipsius xy est $ydx + xdy$. Q. e. d.

II. Si plures quantitates se mutuo multiplicent, e. gr. si fuerit vxy ; fiat $vx = t$, erit $vxy = ty$, consequenter $d(vxy) = tdy + ydt$, per cas. I. Sed $dt = vdx + xdv$, per cas. I. Ergo his valoribus in differentiali antecedente $tdy + ydt$ substitutis prodit $d(vxy) = vxdy + vydx + xydv$. Patet adeo factum ex binis ducendum esse in differentiale tertii.

III. Eodem modo reperitur, quid factu opus sit, si plures quantitates se mutuo multiplicent. Sit enim e. gr. quantitas differentianta $vxyz$. Fiat $vxy = t$, erit $vxyz = tz$, consequenter $d(tz) = zdt + t dz$, per cas. I. Sed $dt = d(vxy) = vxdy + vydx + xydv$, per cas. 2. Ergo $d(vxyz) = zdt + t dz = zvx dy + zvy dx + zxy dv + vx y dz$.

IV. Quodsi crescente una variabili altera y decresceret; evidens est, fore $ydx - xdy$ differentiale ipsius xy .

Tab. J.
Fig. I.

COROLLARIUM I.

13. Ergo $d(x^2) = xdx + xdx = 2xdx$, $d(x^3) = x^2 dx + x^2 dx + x^2 dx = 3x^2 dx$ &c. & in genere $d(x^m) = mx^{m-1} dx$. Unde patet, quomodo potentia differentientur.

COROLLARIUM II.

14. Cum 1, 2, 3, 4 &c. exponentes dignitatum x^1, x^2, x^3, x^4 , &c. sint earundem logarithmi, posito logarithmo unitatis = 0 (§. 334. Arithm.); logarithmi vero dignitatum decrecentium $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x^3}, \frac{1}{x^4}$, &c. sint -1, -2, -3, -4 &c. (§. 358. Arithm.) erit $\frac{1}{x} = x^{-1}, \frac{1}{x^2} = x^{-2}, \frac{1}{x^3} = x^{-3}$. &c. & in genere $\frac{1}{x^m} = x^{-m}$, consequenter $d(1:x^m) = d(x^{-m}) = -mx^{-m-1} dx$ (§. 13). Vel cum sit $1 = x^0$ (§. 55. part. I.), erit $1 : x^m = x^2 : x^m = x^{-m}$ (§. 54. part. I.), adeoque $d \frac{1}{x^m} = -mx^{-m-1} dx$ (§. 13).

COROLLARIUM III.

15. Et quia $\sqrt[m]{x^n} = x^{n:m}$ (§. 57. Analys. finit.) & $1 : \sqrt[m]{x^n} = 1 : x^{n:m} = x^{-n:m}$ (§. cit. & præc.); erit $d \sqrt[m]{x^n} = \frac{n}{m} x^{n:m-1} dx = \frac{n}{m} x^{(n-m):m} dx = \frac{n}{m} dx \sqrt[m]{x^{n-m}}$ & $d(1 : \sqrt[m]{x^n}) = \frac{n}{m} x^{-n:m-1} dx = 0 - \frac{n}{m} x^{(-n-m):m} dx = -ndx : m \sqrt[m]{x^{n+m}}$

SCHOLIION.

16. Quod si cuipiam non satis manifestum videatur, quomodo corollaria duo posteriora ex priore inveniantur; is differentialia potentiarum imperfectarum alio adhuc modo investigare potest: quem in sequente problema-

te exponimus, imprimis cum ejusdem methodi usus esse possit, quoties in formulis compositis differentiandis aqua haret.

PROBLEMA II.

17. Differentiare $1 : x^m$, item $\sqrt[m]{x^n}$ & $1 : \sqrt[m]{x^n}$.

RESOLUTIO.

I. Fiat $1 : x^m = v$

$$\text{erit } 1 = x^m v$$

$$(\S. 10. 12.) 0 = mx^{m-1} v dx + x^m dv$$

$$-mx^{m-1} v dx = x^m dv$$

$$\frac{-mx^{m-1} v dx}{x^m} = dv$$

$$\frac{-mx^{m-1} dx}{x^m} = \frac{dv}{x^m} \quad (\S. 42. 54. part. 1.)$$

h. e. $-mx^{-m-1} dx = dv$ (§. 54. part. I.)

II. Fiat $\sqrt[m]{x^n} = y$

$$x^n = y^m$$

$$nx^{n-1} dx = my^{m-1} dy \quad (\S. 13):$$

hoc est, $nx^{n-1} dx = \frac{my^m dy}{y} \quad (\S. 54. part. I.)$

$$nyx^{n-1} dx = my^m : y$$

$$\frac{nyx^{n-1}}{my^m} dx = dy$$

seu $\frac{nx^{n:m} x^{n-1}}{mx^n} dx = dy$

$$\frac{nx^{n:m}}{m} x^{-1} dx = dy \quad (\S. 54. part. I.)$$

h. e. $\frac{n}{m} x^{(n-m):m} dx = dy$

III. Fiat denique $1 : \sqrt[m]{x^n} = z$

$$\text{erit } 1 = z \sqrt[m]{x^n} = zx^{n:m}$$

$$0 = \frac{n}{m} x^{(n-m):m} z dx + x^{n:m} dz \quad (\text{II. 12.})$$

$$\frac{nx^{(n-m):m}}{m} z dx = x^{n:m} dz$$

$$\frac{nx^{(n-m):m}}{mx^{n:m}} dx = x^{n:m} dz$$

$$-nx \frac{(n-m):n}{mx^{2n:m}} dx = dz (\S. 42. 54 \text{ part. I.})$$

$$-\frac{n}{m} x^{(n-m):m} dx = dz (\S. 54. \text{ part. I.})$$

h. e. $\frac{ndx}{m \sqrt[n]{x^{n+m}}} = dz (\S. 14).$

En in omnibus casibus easdem formulas, quas superius eliciimus (§. 14. 15.).

SCHOLIUM.

18. Me non monente clarum esse arbitror, formulas in problemate repertas subire vicem regularum, juxta quas in casibus similibus instituitur differentiatio.

PROBLEMA III.

19. Differentiare quantitates se mutuo dividentes $x : y$.

RESOLUTIO.

I. Sit $x : y = v$

erit $x = vy$

$$dx = vdy + ydv (\S. 12.)$$

$$dx - vdy = ydv$$

h. e. $dx - \frac{xdy}{y} = ydv$

$$\frac{dx}{y} - \frac{xdy}{y^2} = dv$$

seu $(ydx - xdy) : y^2 = dv$

Regula I. Differentiale divisoris ducatur in dividendum & contra differentiale dividendi in divisorem. 2. Factum prius ex posteriore auferatur. 3. Residuum per quadratum divisoris dividatur. Quotus est differentiale quantitatum se mutuo dividendum :

II. Si fuerit $xy : vz$ differentianda : ponatur $xy = t$ & $vz = w$; erit $xy : vz = t : w$. Sed $d(t : w) = (wdt - tdw) : w^2$ per cas. I. & $dt = xdy + ydx$, $dw = vdz + zdv$ (§. 12). Ergo $d(t : w) = d(xy : vz) = (vzx dy + vzy dx - xyvdz - xyzdv) : v^2z^2$. Patet adeo, regulam præcedentem huic quoque casui satisfacere.

C A P U T II.

De usu Calculi differentialis in tangentibus curvarum determinandis.

PROBLEMA IV.

20. Invenire subtangentem in curva Algebraica quacunque;

RESOLUTIO.

Sit semiordinata pm alteri PM infi-

nite propinqua, erit Pp differentiale Tab. I. abscissæ, & demissa perpendiculari Fig. 24. $MR = Pp$ (§. 226. Geom.) Rm differentiale semiordinatæ. Ducatur tangens TM : arculus infinite exiguus

Mm non differet a linea recta, adeoque MmR triangulum rectilineum rectangulum: quod *Triangulum curvæ characteristicum* appellari solet, quia lineæ curvæ per illud a se invicem distinguuntur. Ob parallelismum rectarum PM & pm (§. 37 part. I). angulus MmR = TMP (§. 233 *Geom.*). Quare $\triangle MmR \sim \triangle TMP$ (§. 267 *Geom.*). Sit itaque AP = x, PM = y: erit Pp = MR = dx & RM = dy (§. 8), consequenter (§. 267 *Geom.*)

$$Rm : RM = PM : PT$$

$$dy : dx = y : \frac{ydx}{dy}$$

Quodsi ex æquatione curvæ cujuscunque data in expressione subtangentis PT generali $ydx : dy$ valor ipsius dx substituat: quantitates differentiales evanescent proditque valor subtangentis in quantitatibus communibus.

Tab. I. Idem valor eruitur, si convexitas
Fig. 4. curvæ refertur ad axem AT.

COROLLARIUM I.

21. Pro parabola Apolloniana est:

$$ax = y^2 \quad (\S. 388 \text{ part. I.})$$

Hinc $adx = 2ydy$

$$dx = 2ydy : a$$

$$PT = ydx : dy = 2y^2 dy : a dy = 2y^2 : a = 2ax : a = 2x : \text{profus ut supra} (\S. 410 \text{ part. I.})$$

COROLLARIUM II.

22. Pro infinitis parabolis (§. 519. Part. I.)

$$a^{m-1} x = y^m$$

$$\frac{a^{m-1} dx = my^{m-1} dy}{(\S. 12)}$$

$$dx = my^{m-1} dy : a^{m-1}$$

$$PT = ydx : dy = my^{m-1} dy : a^{m-1} dy = my^m : a^{m-1} = ma^{m-1} x : a^{m-1} = mx.$$

E. gr. Cum in paraboloido cubicali $m = 3$; erit subtangens = $3x$: cum in surdofolidali $m = 5$; erit subtangens = $5x$.

COROLLARIUM III.

23. Pro circulo est (§. 377. part. I.)

$$ax - xx = yy$$

$$adx - 2x dx = 2y dy$$

$$dx = 2y dy : (a - 2x)$$

$$PT = ydx : dy = 2y^2 dy : (a - 2x) dy =$$

$$2y^2 : (a - 2x) = (2ax - 2xx) : (a - 2x) = (ax - xx) : (\frac{1}{2}a - x), \text{ hoc est, PC : Tab. Fig.}$$

PB = AP : PT, consequenter $\square PC.PT = AP.PB$ (§. 378 *Geom.*) = PM^2 (§. 377 part. I.)

Ergo $AT = (ax - xx) : (\frac{1}{2}a - x) - x = (ax - xx - \frac{1}{2}ax + xx) : (\frac{1}{2}a - x) = \frac{1}{2}ax : (\frac{1}{2}a - x)$ hoc est, PC : PA = CA : AT.

COROLLARIUM IV.

24. Pro infinitis circulis est (§. 524. part. I.)

$$ax^m - x^{m+1} = y^{m+1}$$

$$\frac{max^{m-1} dx - (m+1)x^m dx = (m+1)y^m dy}{(m+1)y^m dy}$$

$$dx = \frac{max^{m-1} - (m+1)x^m}{(m+1)y^m}$$

$$PT = ydx : dy = (m+1)y^{m+1} : (max^{m-1} - (m+1)x^m) = (m+1)(ax^m - x^{m+1}) :$$

$$(max^{m-1} - (m+1)x^m) = (m+1)(ax - x^2) : (ma - mx - x) \& AT = (m+1)(ax - x^2) : (ma - (m+1)x) - x = (max + ax - mx^2 - x^2 - max + mx^2 + x^2) :$$

$$(ma - (m+1)x) = ax : (ma - (m+1)x).$$

Cum itaque in circulo secundæ generis $m = 2$; erit $AT = ax : (2a - 3x)$ & $PT = (2ax - 3x^2) : (2a - 3x)$

COROLLARIUM V.

25. Pro ellipsi Apolloniana est (§. 420 part. I.)

$$ay^2 = abx - bx^2$$

Hinc

Hinc $2aydy = abdx - 2bxdx$
 $2aydy : (ab - 2bx) = dx$

PT = $ydx : dy = 2ay^2 : (ab - 2bx) =$
 $2abx - 2bx^2 : (ab - 2bx) = (2ax -$
 $2x^2) : (a - 2x)$, prorsus ut supra (S. 440. part. 1.)

COROLLARIUM VI.

226. Pro infinitis ellipsis est (S. 532. part. 1.)

$ay^{m+n} = bx^m (a - x)^n$
 $(m+n)ay^{m+n-1}dy = mbx^{m-1}(a-x)dx$
 $- nbx^m(a-x)^{n-1}dx$
 $(m+n)ay^{m+n-1}dy$
 $dx =$
 $mbx^{m-1}(a-x)^n - nbx^m(a-x)^{n-1}$

PT = $\frac{ydx}{dy} = \frac{(m+n)ay^{n+n}}{mbx^{m-1}(a-x)^n - nbx^m(a-x)^{n-1}}$
 $= (m+n)bx^m(a-x)^n : (mbx^{m-1}(a-x)^n -$
 $nbx^m(a-x)^{n-1}) = [divisione per$
 $bx^{m-1}(a-x)^{n-1} facta] (m+n)(ax - x^2) :$
 $(ma - mx - nx)$ & hinc

AT = $(max - mx^2 + nax - nxx) :$
 $(ma - mx - nx) - x = (max - mx^2 + nax$
 $- nx^2 - max + mx^2 + nx^2) : (ma - mx$
 $- nx) = nax : (ma - (m+n)x)$.

Cum adeo in elliptoide cubicali sit $m=2$,
 $n=1$; erit PT = $(3ax - 3x^2) : (2a - 3x)$ &
 AT = $ax : (2a - 3x)$.

COROLLARIUM VII.

27. Pro hyperbola Apolloniana est (S. 459. part. 1.)

$ay^2 = abx + bxx$

$2aydy = abdx + 2bxdx$

$2aydy : (ab + 2bx) = dx$

PT = $ydx : dy = 2ay^2 : (ab + 2bx)$
 $= (2abx + 2bxx) : (ab + 2bx)$
 $= (2ax + 2xx) : (a + 2x)$ prorsus ut
 supra (S. 491. part. 1.)

COROLLARIUM VIII.

28. Pro infinitis hyperbolis cum fit
 $ay^{m+n} = bx^m (a + x)^n$ (S. 525. part. 1.):
 reperietur ut ante pro infinitis ellipsis
 PT = $(m+n)(ax + x^2) : (ma + [m+n]x)$
 & AT = $nax : (ma + [m+n]x)$.

COROLLARIUM IX.

29. Pro hyperbola intra asymptotos est
 (S. 502. part. 1.)

$xy = aa$
 $x dy + y dx = 0$
 $y dx = -x dy$

PT = $ydx : dy = -x dy : dy = -x$

Quoniam valor subtangentis est negati- Tab. I.
 vus, id indicio est, subtangentem PT esse su- Fig. 4.
 mendam in oppositum originis abscissae AP.
 Differentiale enim ipsius xy esse debebat ydx
 - xdy, quia y decrefcit (S. 12.).

COROLLARIUM X.

30. Pro infinitis hyperbolis intra asymp-
 totos est.

$a^{m+n} = x^n y^m$

$0 = nx^{n-1}y^m dx + mx^n y^{m-1} dy$

$- mx^n y^{m-1} dy = nx^{n-1} y^m dx$

$- mx dy : ny = dx$

PT = $ydx : dy = -mx y dy : ny dy = -\frac{mx}{n}$.

COROLLARIUM XI.

31. Pro Cissoide Dioclis est (S. 548. part. 1.)

$y^2 = x^3 : (a - x)$

$2y dy = (3ax^2 dx - 3x^3 dx + x^3 dx) : (a - x)^2$

$2y(a - x)^2 dy : (3ax^2 - 2x^3) = dx$

PT = $ydx : dy = 2y^2(a - x)^2 : (3ax^2 - 2x^3)$
 $= 2x^3(a - x) : (3ax^2 - 2x^3) = 2(ax - xx) :$
 $(3a - 2x)$.

Habemus itaque :

$3a - 2x : a - x = 2x : PT$

five $\frac{3}{2}a - x : a - x = x : PT$

h. c. PB + GB : PB = AP : PT.

Tab.
 VI.
 Algeb.
 Fig.
 63.

COROL-

COROLLARIUM XII.

32. Denique pro omnibus curvis algebraicis est (§. 385. part. 1.)

$$ay^m + bx^n + cy^r x^s + f = 0$$

$$\frac{may^{m-1} dy + nbx^{n-1} dx + scy^r x^{s-1} dx + rcy^{r-1} x^s dy}{nbx^{n-1} dx + scy^r x^{s-1} dx} = \frac{-may^{m-1} dy - rcy^{r-1} x^s dy}{nbx^{n-1} dx + scy^r x^{s-1} dx}$$

$$\frac{dx}{dx} = \frac{-may^{m-1} dy - rcy^{r-1} x^s dy}{nbx^{n-1} dx + scy^r x^{s-1} dx}$$

$$PT = \frac{y dx}{dy} = \frac{may^m - rcy^r x^s}{nbx^{n-1} + scy^r x^{s-1}}$$

Sit e. gr. $y^2 - ax = 0$, erit comparatione cum formula generali facta,

$$\frac{ay^m = y^2}{a = 1 \quad m = 2} \quad \frac{bx^n = -ax}{b = -a \quad n = 1}$$

$$\frac{cy^r x^s = 0}{c = 0 \quad r = 0 \quad s = 0} \quad f = 0.$$

His valoribus in formula subtangentis generalissima substitutis prodit subtangens parabola primae generis ($-2.1.y^2 - 0.0.y^0 x^0$): ($1. - ax^{1-1} + 0. 0y^0 x^{0-1}$) = $-2y^2 : -a = 2y^2 : a$, ut supra (§. 21).

Similiter sit pro circulo $y^2 - ax + x^2 = 0$: erit

$$\frac{ay^m = y^2}{a = 1 \quad m = 2} \quad \frac{bx^n = -ax}{b = -a \quad n = 1}$$

$$\frac{bx^n = x^2}{b = 1 \quad n = 2} \quad \frac{cy^r x^s = 0}{c = 0 \quad r = 0 \quad s = 0}$$

$$PT = \frac{-2.1.y^2}{1. - ax^0 + 2.1.x} = \frac{-2y^2}{-a + 2x} = \frac{2y^2}{a - 2}$$

ut supra (§. 23).

Sit $y^3 - x^3 - axy = 0$, erit

$$\frac{ay^m = y^3}{a = 1 \quad m = 3} \quad \frac{bx^n = -x^3}{b = -1 \quad n = 3}$$

$$\frac{cy^r x^s = -axy}{c = -a \quad r = 1 \quad s = 1} \quad f = 0$$

His valoribus in formula subtangentis generali substitutis, prodit subtangens curvae, ad quam est aequatio data $PT = (-3.1.y^3 - 1. - ayx) : (3. - 1x^2 + 1. - ayx^0) = (-3y^3 + ayx) : (-3x^2 - ay) = (3y^3 - ayx) : (3x^2 + ay)$, consequenter $AT = (3y^3 - ayx) : (3x^2 + ay) - x = (3y^3 - axy - 3x^3 - 2axy) : (3x^2 + ay)$, (substituto nempe ex aequatione ad curvam ipsius $y^3 - x^3$ valore axy , hoc est, $axy : (3x^2 + ay)$).

SCHOLIUM.

33. In applicatione formulae generalis bx^n , & $cy^r x^s$ totidem terminis sigillatim comparantur, quot in dato casu speciali eisdem respondent, singulique valores simul in formula subtangentis substituuntur, propterea quod bx^n representat omnes terminos, in quibus sola indeterminata x occurrit, & $cy^r x^s$ omnes terminos, in quibus utraque indeterminata x & y locum habet (§. 385. part. 1.).

COROLLARIUM.

34. Quia $PT = y dx : dy$, $PM = y$; erit Tab. I. (§. 417. Geom.) $TM = \sqrt{(y^2 dx^2 : dy^2 + y^2)}$ Fig. 2. $= y \sqrt{(dx^2 + dy^2) : dy}$.

PROBLEMA.

35. Determinare subnormalem PH in linea Algebraica quacunque.

RESOLUTIO.

Sit $PM = y$, $AP = x$, erit $TP = y dx : dy$ (§. 20) & $TP : PM = PH$ (§. 409 Tab. I. Fig. 2.)

hoc est, $\frac{y dx}{dy} : y = y : \frac{y dy}{dx}$

Quodsi ut in problemate praecedente in expressione subnormalis PH generali valor ipsius dy substituatur; differentiales quantitates evanescunt & valor subnormalis in quantitatibus ordinariis prodit.

COROLLARIUM I.

36. In parabola Apolloniana $dy = adx: 2y$, (S. 21). Ergo $PH = ydy: dx = ay: 2ydx = \frac{1}{2}a$, ut supra reperimus (S. 410. part. 1.)

COROLLARIUM II.

37. In infinitis parabolis $dy = a^{m-1} dx: my^{m-1}$ (S. 22). Itaque $PH = ydy: dx = a^{m-1} y: my^{m-1} = a^{m-1} y^2: my^m$ (S. 54. part. 1.) $= a^{m-1} y^2: ma^{m-1} x$ (S. 519. part. 1.) $= y^2: mx$, ut adeo sit $mx: y = y: PH$.

COROLLARIUM III.

Tab. I. Fig. 3. 38. In circulo $adx - 2xdx = 2ydy$ (S. 23). hoc est, $\frac{1}{2}a - x = ydy: dx = PC$. Apparet adeo, in circulo omnes ad peripheriam normales in centro concurrere, consequenter tangentem TM radio CM ad angulos rectos insistere.

COROLLARIUM IV.

39. In infinitis circulis $(max^{m-1} dx - (m+1)x^m dx): (m+1)y^m = dy$. Unde subnormalis $PH ydy = (max^{m-1} y - (m+1)x^m y): (m+1)y^m = (max^{m-1} y^2 - (m+1)x^m y^2): (m+1)y^{m+1} = (max^{m-1} y^2 - (m+1)x^m y^2): (m+1)(ax^m - x^{m+1}) = (may^2 - (m+1)xy^2): (m+1)(ax - x^2)$. Est itaque $ax - x^2: y^2 = \frac{m}{m+1}a - x: PH$.

COROLLARIUM V.

Tab. I. Fig. 2. 40. In infinitis ellipsis $dy = (mbx^{m-1} (a-x)^n dx - nbx^m (a-x)^{n-1} dx): (m+n)ay^{m+n-1}$ (S. 26). Unde $PH = ydy: dx = (mbx^{m-1} (a-x)^n y - nbx^m (a-x)^{n-1} y): (m+n)ay^{m+n-1} = (mbx^{m-1} (a-x)^n y^2 - nbx^m (a-x)^{n-1} y^2): (m+n)ay^{m+n}$ sive $(m+n)bx^m (a-x)^n = (my^2 (a-x) - nxy^2): (m+n)(ax - x^2)$. Est itaque $ax - x^2: y^2 = \frac{m}{m+n}a - x: PH$.

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

COROLLARIUM VI. Tab. I.

42. Pro hyperbola intra asymptotos (S. 29.) Fig. 4. $dy = -ydx: x$. Unde $PH = ydy: dx = -y^2: x$. Valor negativus indicio est, subnormalem PH cadere versus sinistram. Quia $xy = a^2$, adeoque $y = a^2: x$ & $y^2 = a^4: x^2$, erit $PH = a^2 y: x^2$ vel $a^4: x^3$, consequenter $x^2: a^2 = y: PH$ & $x^3: a^3 = a: PH$, hoc est, semiordinata habet ad subnormalem rationem duplicatam, & ad latus potentiae hyperbolae rationem triplicatam abscissae ad latus potentiae hyperbolae.

COROLLARIUM VIII.

43. In Cissoide Dioclis $2ydy = (3ax^2 dx - 2x^3 dx): (a-x)^2$ (S. 31). Igitur subnormalis $ydy: dx = (3ax^2 - 2x^3): 2(a-x)^2$. Est adeo $(a-x)^2: x^2 = \frac{3}{2}a - x: PH$.

COROLLARIUM IX.

44. Quia $PH = ydy: dx$ (S. 35.) & PM Tab. I. $= y: PH$ erit $MH = \sqrt{(y^2 dy^2: dx^2 + y^2)} = y \sqrt{(dy^2 + dx^2): dx^2}$.

SCHOLIUM.

45. Equidem data per problema praecedens subtangente subnormalis reperitur facillime absque calculo differentiali (S. 409.): quoniam tamen subinde subnormalis inveniri debet data tantummodo aequatione ad curvam: ideo in problemate praesente docendum erat, quomodo independenter a subtangente ex aequatione eruenda.

PROBLEMA VI.

46. Determinare curvarum algebraicarum asymptotos.

RESOLUTIO.

I. Quoniam asymptotos CD cum Tab. I. Fig. 2. curva non concurrat, nisi inter vallo infinito emenso; haberi potest pro tangente in puncto, cui abscissa infinita respondet. Quantitates ergo constantes respectu variabilium x & y sunt infinite parvae

Hhh

COROLLARIUM XII.

32. Denique pro omnibus curvis algebraicis est (S. 385. part. 1.)

$$ay^m + bx^n + cy^r x^s + f = 0$$

$$may^{m-1} dy + nbx^{n-1} dx + scy^r x^{s-1} dx + rcy^{r-1} x^s dy = 0$$

$$nbx^{n-1} dx + scy^r x^{s-1} dx = -may^{m-1} dy - rcy^{r-1} x^s dy$$

$$dx = \frac{-may^{m-1} dy - rcy^{r-1} x^s dy}{nbx^{n-1} + scy^r x^{s-1}}$$

$$PT = \frac{y dx}{dy} = \frac{may^m - rcy^r x^s}{nbx^{n-1} + scy^r x^{s-1}}$$

Sit e. gr. $y^2 - ax = 0$, erit comparatione cum formula generali facta,

$$\frac{ay^m = y^2}{a = 1 \quad m = 2} \quad \frac{bx^n = -ax}{b = -a \quad n = 1}$$

$$\frac{cy^r x^s = 0}{c = 0 \quad r = 0 \quad s = 0} \quad f = 0.$$

His valoribus in formula subtangentis generalissima substitutis prodit subtangens parabola primae generis ($-2.1.y^2 - 0.0.y^0 x^0$): ($1. - ax^{1-1} + 0.0.y^0 x^{0-1}$) = $-2y^2 : -a = 2y^2 : a$, ut supra (S. 21).

Similiter sit pro circulo $y^2 - ax + x^2 = 0$: erit

$$\frac{ay^m = y^2}{a = 1 \quad m = 2} \quad \frac{bx^n = -ax}{b = -a \quad n = 1}$$

$$\frac{bx^n = x^2}{b = 1 \quad n = 2} \quad \frac{cy^r x^s = 0}{c = 0 \quad r = 0 \quad s = 0}$$

$$PT = \frac{-2.1.y^2}{1. - ax^0 + 2.1x} = \frac{-2y^2}{-a + 2x} = \frac{2y^2}{a - 2}$$

ut supra (S. 23).

Sit $y^3 - x^3 - axy = 0$, erit

$$\frac{ay^m = y^3}{a = 1 \quad m = 3} \quad \frac{bx^n = -x^3}{b = -1 \quad n = 3}$$

$$\frac{cy^r x^s = -axy}{c = -a \quad r = 1 \quad s = 1} \quad f = 0$$

His valoribus in formula subtangentis generali substitutis, prodit subtangens curvae, ad quam est aequatio data $PT = (-3.1y^3 - 1. - ax^3) : (3. - 1x^2 + 1. - ax^0) = (-3y^3 + ayx) : (-3x^2 - ay) = (3y^3 - axy) : (3x^2 + ay)$, consequenter $AT = (3y^3 - axy) : (3x^2 + ay) - x = (3y^3 - axy - 3x^3 - 2axy) : (3x^2 + ay)$, (substituto nempe ex aequatione ad curvam ipsius $y^3 - x^3$ valore axy , hoc est, $axy : (3x^2 + ay)$).

SCHOLIUM.

33. In applicatione formulae generalis bx^n , & $cy^r x^s$ totidem terminis sigillatim comparantur, quot in dato casu speciali eisdem respondent, singulique valores simul in formula subtangentis substituantur, propterea quod bx^n representat omnes terminos, in quibus sola indeterminata x occurrit, & $cy^r x^s$ omnes terminos, in quibus utraque indeterminata x & y locum habet (S. 385. part. 1.).

COROLLARIUM.

34. Quia $PT = y dx : dy$, $PM = y$; erit Tab. (S. 417. Geom.) $TM = \sqrt{(y^2 dx^2 : dy^2 + y^2)}$ Fig. $= y \sqrt{(dx^2 + dy^2)} : dy$.

PROBLEMA.

35. Determinare subnormalem PH in linea Algebraica quacunque.

RESOLUTIO.

Sit $PM = y$, $AP = x$, erit $TP = y dx : dy$ (S. 20) & $TP : PM = PH$ (S. 409 Tab. Fig. part. I.)

hoc est, $\frac{y dx}{dy} : y = y : \frac{y dy}{dx}$

Quodsi ut in problemate precedente in expressione subnormalis PH generali valor ipsius dy substituaturs; differentiales quantitates evanescunt & valor subnormalis in quantitatibus ordinariis prodit.

COROLLARIUM I.

36. In parabola Apolloniana $dy = adx: 2y$, (S. 21). Ergo $PH = ydy: dx = ay dx: 2ydx = \frac{1}{2}a$, ut supra reperimus (S. 410. part. I.)

COROLLARIUM II.

37. In infinitis parabolis $dy = a^{m-1} dx: my^{m-1}$ (S. 22). Itaque $PH = ydy: dx = a^{m-1} y: my^{m-1} = a^{n-1} y^2: my^m$ (S. 54. part. I.) $= a^{m-1} y^2: ma^{m-1} x$ (S. 519. part. I.) $= y^2: mx$, ut adeo fit $mx:y = y:PH$.

COROLLARIUM III.

Tab. I. 38. In circulo $adx - 2xdx = 2ydy$ (S. 23). Fig. 3. hoc est, $\frac{1}{2}a - x = ydy: dx = PC$. Apparet adeo, in circulo omnes ad peripheriam normales in centro concurrere, consequenter tangentem TM radio CM ad angulos rectos insistere.

COROLLARIUM IV.

39. In infinitis circulis $(max^{m-1} dx - (m+1)x^m dx): (m+1)y^m = dy$. Unde subnormalis $PH ydy = (max^{m-1} y - (m+1)x^m y): (m+1)y^m = (max^{m-1} y^2 - (m+1)x^m y^2): (m+1)y^{m+1} = (max^{m-1} y^2 - (m+1)x^m y^2): (m+1)(ax^m - x^{m+1}) = (may^2 - (m+1)xy^2): (m+1)(ax - x^2)$. Est itaque $ax - x^2: y^2 = \frac{m}{m+1}a - x: PH$.

COROLLARIUM V.

Tab. I. 40. In infinitis ellipsis $dy = (mbx^{m-1} (a-x)^n dx - nbx^m (a-x)^{n-1} dx): (m+n) ay^{m+n-1}$ (S. 26). Unde $PH = ydy: dx = (mbx^{m-1} (a-x)^n y - nbx^m (a-x)^{n-1} y): (m+n) ay^{m+n-1} = (mbx^{m-1} (a-x)^n y^2 - nbx^m (a-x)^{n-1} y^2): (m+n) ay^{m+n}$ five $: (m+n) bx^m (a-x)^n = (my^2 (a-x) - nxy^2): (m+n)(ax - x^2)$. Est itaque $ax - x^2: y^2 = \frac{m}{m+n} a - x: PH$.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

COROLLARIUM VI. Tab. I.

42. Pro hyperbola intra asymptotos (S. 29.) Fig. 4. $dy = -ydx: x$. Unde $PH = ydy: dx = -y^2: x$ Valor negativus indicio est, subnormalem PH cadere versus sinistram. Quia $xy = a^2$, adeoque $y = a^2: x$ & $y^2 = a^4: x^2$, erit $PH = a^2 y: x^2$ vel $a^4: x^3$, consequenter $x^2: a^2 = y: PH$ & $x^3: a^3 = a: PH$, hoc est, semiordinata habet ad subnormalem rationem duplicatam, & ad latus potentia hyperbolae rationem triplicatam abscissae ad latus potentia hyperbolae.

COROLLARIUM VIII.

43. In Cissoide Dioclis $2ydy = (3ax^2 dx - 2x^3 dx): (a-x)^2$ (S. 31). Igitur subnormalis $ydy: dx = (3ax^2 - 2x^3): 2(a-x)^2$. Est adeo $(a-x)^2: x^2 = \frac{3}{2}a - x: PH$.

COROLLARIUM IX.

44. Quia $PH = ydy: dx$ (S. 35.) & $PM = y: MH = \sqrt{(y^2 dy^2: dx^2 + y^2)} = y \sqrt{(dy^2 + dx^2): dx}$ Tab. I. Fig. 2.

SCHOLIUM.

45. Equidem data per problema praecedens subtangente subnormalis reperitur facillime absque calculo differentiali (S. 409.): quoniam tamen subinde subnormalis inveniri debet data tantummodo aequatione ad curvam: ideo in problemate praesente docendum erat, quomodo independenter a subtangente ex aequatione eruenda.

PROBLEMA VI.

46. Determinare curvarum algebraicarum asymptotos.

RESOLUTIO.

I. Quoniam asymptotos CD cum Tab. I. Fig. 2. curva non concurrat, nisi inter vallo infinito emenso; haberi potest pro tangente in puncto, cui abscissa infinita respondet. Quantitates ergo constantes respectu variabilium x & y sunt infinite parvae

Hhh parvae

parvæ (§. 2.). Quamobrem si ex valore ipsius AT adjiciantur, quæ in nul'am variabilem ducuntur; prod bit valor ipsius AC, per quem punctum C determinatur, ex quo asymptotus CD ducitur.

2. Quodsi idem fiat in æquatione pro curva, & facta differentiatione inveniatur ratio $dx : dy$; haud difficulter quoque eruitur valor ipsius AE: est enim in illo casu $\triangle MR^m \sim \triangle CAE$. Quod ut clarius intelligatur, ponamus abscissam AP esse infinitam, adeoque TM asymptotum; evidens est $\triangle MR^m \sim \triangle TPM$ (§. 20). Sed $\triangle TPM \sim \triangle TAG$ (§. 268. *Geom.*). Ergo $\triangle TAG \sim \triangle MR^m$, consequenter $MR : mR = TA : AG$ (§. 267 *Geom.*). Surrogetur jam in locum $\triangle TAG$ alterum CAE; erit $MR : mR = CA : AE$, hoc est, $dx : dy = CA : AE$.

COROLLARIUM I.

47. In hyperbola Apolloniana $AT = ax$ $2(a + 2x)$ §. 491. part. 1. Ergo $AT = ax : 2x = \frac{1}{2}a = AC$ prorsus ut supra habetur (§. 474. part. 1). Porro ad hyperbolam Apollonianam

$ay^2 = bx(a + x)$
hoc est in nostro casu ob a infinitesimam
 $ay^2 = bxx$
consequenter $y\sqrt{a} = x\sqrt{b}$
 $dy\sqrt{a} = dx\sqrt{b}$
 $dx : dy = \sqrt{a} : \sqrt{b}$
adeoque ob $dx : dy = CA : AE$ (§. 46)
 $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \frac{1}{2}a : AE$

Unde habetur $AE = \frac{1}{2}\sqrt{a} \cdot b : \sqrt{a} = \frac{1}{2}\sqrt{ab}$ denuo ut supra (§. 474 part. 1.).

Idem etiam adhuc aliter invenitur. In casu infiniti seu asymptotico $TP = CP = \frac{1}{2}a$ $+ x = x$, ob $\frac{1}{2}a = 0$ quia $x = \infty$. Porro ob similitudinem $\triangle TPM$ & CAE est

$$TP : PM = CA : AE$$

$$x : \frac{x\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \frac{1}{2}a : AE$$

$$1 : \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \frac{1}{2}a : AE$$

$$AE = \frac{1}{2}a\sqrt{b} : \sqrt{a} = \frac{1}{2}\sqrt{ab}.$$

COROLLARIUM II.

48. Pro infinitis hyperbolicis est $AT = nax$ $:(ma + mx + nx)$ §. 28. adeoque in casu asymptotico, in quo $x = \infty$, $AC = nax$ $:(mx + nx) = na : (m + n)$ §. 46. Quoniam porro (§. 425 part. 1.).

$$ay^{m+n} = bx^m(a + x)^n$$

$$\text{erit } ay^{m+n} = bx^{m+n} \text{ (§. 46).}$$

hoc est, si fiat brevitatis gratia $m + n = r$,

$$ay^r = bx^r$$

$$ya^{1:r} = xb^{1:r}$$

$$dy a^{1:r} = dx b^{1:r}$$

$$dx : dy = a^{1:r} : b^{1:r} = CA : AE$$

Unde ob $ca = na : r$, reperitur AE

$$\frac{na\sqrt[r]{b}}{r\sqrt[r]{a}} = \frac{n\sqrt[r]{a^{r-1}b}}{r}$$

PROBLEMA VII.

49. Determinare subtangentem & subnormalem in Conchoide.

Quoniam Conchois est curva algebraica (§. 382. 535 part. 1); subtangens ejus inveniri potest per probl. 4. & subnormalis per probl. 5. (§. 20. & 35). Enim vero quia ob æquationem ejus admodum prolixam expressio utraque non satis concinna prodit; ideo consultius judicamus alia methodo utramque investigari, qua & in casibus aliis similibus commode utendum.

Sit

Tab. I.
Fig. 5.

Sit nempe $AP = x$, $PM = y$. Intel-
ligatur pm ipsi PM infinite propinqua :
erit $Pp = MR = dx$ & $Rm = dy$, unde
 $PT = ydx : dy$, ut supra (§. 20). Sit
porro $AB = QM$ (§. 535. part. I.) $= a$,
 $CM = z$, $BC = b$; erit $PB = a - x$,
 $PC = a + b - x$. Ut valor ipsius dx
ex natura curvæ inveniatur; fiat:

$$\frac{a-x=v}{\text{erit } -dx=dv} \quad \frac{a+b-x=t}{-dx=dt}$$

Porro (§. 268 *Geom.*)

$$PB : MQ = PC : MC$$

$$v : a = t : z$$

$$at = zv$$

$$adt = zdv + vdz$$

Denique (§. 417 *Geom.*) $CM^2 = PC^2$
+ PM^2 , hoc est,

$$z^2 = t^2 + y^2$$

$$\frac{2zdz = 2tdt + 2ydy}{zdz = tdt + ydy}$$

Substituantur ex æquationibus dua-
bus prioribus valores ipsorum differen-
tialium dt & dv in duabus posteriori-
bus: prodibit

$$\frac{-adx = -zdx + vdz}{zdx - adx = vdz} \quad \frac{zdz = -tdx + ydy}{dz = \frac{-tdx + ydy}{z}}$$

Quamobrem

$$\frac{zdx - adx}{v} = \frac{ydy - tdx}{z}$$

$$\frac{z^2dx - azdx = vydy - vtdx}{z^2dx - azdx + vtdx = vydy}$$

$$dx = \frac{vydy}{z^2 - az + vt}$$

Hinc $PT = ydx : dy = vy^2 : (z^2 - az + vt) = v(z^2 - t^2) : (z^2 - az + tv)$ ob
 $y^2 = z^2 - t^2$, & subnormalis $ydy : dx$
habetur $= (z^2 - az + vt) : v = t + (z^2 - az) : v$.

Aliter.

Sit TC fecans regulam in I perpen-
dicularis ad MC & mc ipsi CM infinite
propinqua. TM tangat Conchoidem
in M . Radio CQ describatur arcus
 Qt & radio CM arcus Mr . Sit $QM = a$,
 $CQ = x$, $CM = y$; erit $tS = dx$,
 $mr = dy$. Quoniam in $\triangle Qts$ angulus t
rectus est (§. 38.) & QCI itidem rec-
tus (§. 78. *Geom.*) & ob angulum infi-
nite parvum $QCS = 0$ (§. 3) angulus
 $IOC = QSt$ (§. 239 *Geom.*), erit \triangle
 $Qts \sim \triangle QIC$, (§. 267. *Geom.*), adeo-
que

$$CQ : CI = tS : Qt$$

$$x : b = dx : \frac{bdx}{x}$$

Quoniam Qt & Mr sunt arcus con-
centrici intra crura ejusdem anguli des-
cripti, erit (§. 138. 412. *Geom.*)

$$CQ : Qt = CM : Mr$$

$$x : \frac{bdx}{x} = y : \frac{bydx}{x^2}$$

Denique cum eodem, quo supra;
modo ostendatur, esse $\triangle Mrm \sim \triangle$
 MCT , erit

$$mr : Mr = MC : CT$$

$$dy : \frac{bydx}{x^2} = y : \frac{by^2dx}{x^2dy}$$

Ex natura Conchoidis (§. 535. part. I.)

$$\frac{y = x + a}{\text{adeoque } dy = dx}$$

$$\text{Ergo } CT = \frac{by^2dx}{x^2dy} = \frac{by^2}{x^2}$$

Tab.
IV.
Fig. 43.

Ducatur itaque GM parallela regula IQ; erit (§. 268. *Geom.*).

$$CQ : CM = CI : CG$$

$$x : y = b : \frac{by}{x}$$

Quare si porro TM ducatur parallela ipsi GQ; erit (§. *cit.*)

$$CQ : CG = CM : CT$$

$$x : \frac{by}{x} = y : \frac{by^2}{x^2}$$

adeoque CT subtangens, consequenter TM tangens qualita.

PROBLEMA VIII.

Tab. I. 50. *Determinare subtangentem in Spirali Archimedea & infinitis spiralibus aliis.*

Sit semidiameter circuli AB = a, peripheria = b, arcus BD = x, AG = y. Intelligatur radius AC alteri AD infinite propinquus, & ducatur radio AG arculus EG; erit CD = dx & EF = dy & (§. 138. 412. *Geom.*)

$$AD : AG = DC : GE$$

$$a : y = dx : \frac{ydx}{a}$$

Quoniam EG ad AE perpendicularis (§. 38); ducatur HA ad AG normalis; quæ est subtangens spiralis: erit EG parallela ipsi AH (§. 256 *Geom.*) adeoque cum sit FA = AE sive AG ob infinite parvam EF (§. 268 *Geom.*)

$$FE : EG = FA : AH$$

$$dy : \frac{ydx}{a} = y : \frac{y^2 dx}{ady}$$

Jam pro spirali Archimedea (§. 571. *part. 1.*)

$$ax = by$$

$$adx = bdy$$

$$\text{Hinc subtangens AH} = \frac{y^2 dx}{ady} = by^2 : a^2 = xy : a.$$

Pendet adeo determinatio subtangentis a quadratura circuli, cum pro arcu x assumenda sit recta.

Pro infinitis spiralibus est, (§. 572 *part. 1.*)

$$a^m x^n = b^n y^m$$

$$na^m x^{n-1} dx = mb^n y^{m-1} dy$$

$$dx = mb^n y^{m-1} dy : na^m x^{n-1}$$

$$AH = y^2 dx : ady = mb^n y^{m+1} : na^{m+1} x^{n-1} = ma^m x^n y : ma^{m+1} x^{n-1} = mxy : na$$

COROLLARIUM.

51. Quodsi ponamus arcum BC esse ad FC ut est abscissa curvæ algebraicæ ad semiordinatam; erit BC = x, CD = dx, FC = y, & (ducto radio AF arculo FI) GI = FE = dy, atque (§. 138. 412. *Geom.*) ob AG = AF (§. 4)

$$AC : CD = AG : EG$$

$$a : dx = a - y : \frac{adx - ydx}{a}$$

$$FE : EG = FA : AH$$

$$dy : \frac{adx - ydx}{a} = a - y : \frac{(a - y)^2 dx}{ady}$$

Quodsi ergo ex æquatione curvæ algebraicæ, quæ exprimit relationem BC ad FC, substituat in expressione subtangentis AH valor ipsius dx, prodibit subtangens quæ sita. Sit e. gr. relatio arcus BC ad rectam FC contenta æquatione

$$\frac{bx}{y} = y^2$$

$$\text{erit } bdx = 2ydy$$

$$\text{unde AH} = (a - y)^2 dx : ady = 2y(a - y)^2 : ab.$$

PROBLEMA IX.

52. *Determinare subtangentem PT in Cycloide.* Tab. I. Fig. 7.

Sit

Sit APB circulus genitor cycloidis AMC, KP tangens circuli. Ducatur TM, quæ cycloidem in M tangat; erit TP subtangens. Rectæ QM per utrumque contactus punctum P & M transeunti intelligatur ipsa *qm* parallela & infinite propinqua; demittantur perpendiculares PO & MS: agatur denique MR ipsi PT parallela. Erit MS=PO (§. 226. *Geom.*) & MR=Pp, quia arcus Pp infinite exiguus, habetur pro parte rectæ pT, (§. 257 *Geom.*). Sit jam AP=x, PM=y; erit Pp=MR=dx, mR=dy. Ob parallelas MP & mR, per construct: angulus MmR=TMP & ob parallelas MR & TP, itidem per constr. mRM=mpT=MPT (§. 233 *Geom.*), consequenter (§. 267. *Geom.*)

$$mR : RM = MP : PT$$

$$dy : dx = y : \frac{ydx}{dy}$$

Est vero in cycloide $y=x$ (§. 575. *part. I*), consequenter $dy=dx$ & hinc $ydx : dy$ seu $PT=y$. Ducta igitur recta PT, quæ circulum tangit in P, facillime quoque ducitur TM, quæ cycloidem in puncto respondente M tangit.

COROLLARIUM.

53. Si APB fuerit linea algebraica alia, cujus arcus AP sint abscissæ transcendentis AMC; eodem modo determinatur subtangens, cum in omni casu reperiat $PT = ydx : dy$. Ponamus e. gr.

$$bx = ay$$

$$\text{erit } bdx = ady$$

$$dx = ady : b$$

$$PT = ydx : dy = ay : by = ay : b.$$

PROBLEMA X.

54. Determinare subtangentem PT in Logistica.

Sit AP=x, PM=y, *pm* ipsi PM Tab. I. parallela; erit MR=Pp=dx & Rm Fig. 8. =dy & vi eorum, quæ in problemate 4. (§. 20) demonstrata sunt.

$$mR : RM = PM : PT$$

$$dy : dx = y : \frac{ydx}{dy}$$

Sit abscissa alia ipsa AP major vel minor = v & semiordinata eidem respondens = z; erit subtangens = zdv : dz. Quoniam ex natura Logistica abscissæ in progressionem arithmetica progrediuntur (§. 555 *part. I.*) erit $dx = dv$. Quoniam vero semiordinatæ progrediuntur in geometrica (§. *cit.*); erit

$$y : y + dy = z : z + dz$$

$$y : dy = z : dz \text{ (§. 193 Arithm.)}$$

$$dx = dv$$

$$ydx : dy = zdv : dz$$

Theorema. In Logistica omnes subtangentes sunt inter se æquales, seu subtangens PT est constans.

PROBLEMA XI.

55. Determinare subtangentem MH Tab. I. in quadratrice Dinostratis. Fig. 9.

Per punctum datum M ducatur radius CN sitque TM tangens, MK ad CM & TK ad MK perpendicularis, Cn ipsi CN & *pm* ipsi PM infinite propinqua, AP=y, AN=x, CM=p, ANB=a, AC=b; erit MI=b-y, Pp=MR=dy, Nn=dx. Quoniam arcus infinite parvus radio CM descriptus coincidit cum recta MH, erit (§. 138. 412. *Geom.*)

$$CN : Nn = CM : MH$$

$$b : dx = p : \frac{pdx}{b}$$

Hhh 3 Perro.

Porro cum TK (*per hypoth.*) & CH (§. 37) sint ad MK perpendiculares; erit mH ipsi KT parallela (§. 256. *Geom.*), adeoque (§. 268. *Geom.*)

$$Mm : MT = MH : MK.$$

Similiter mR & TI, quia ad MI perpendiculares (*per hypoth.*), inter se parallelae (§. 256. *Geom.*), adeoque (§. 268. *Geom.*)

$$Mm : MT = MR : MI$$

consequenter (§. 167. *Arithm.*)

$$MR : MI = MH : MK$$

$$dy : b - y = \frac{pdx}{b} : \frac{pdx}{dy} - \frac{pydx}{bdy}$$

Est vero ex natura quadratricis (§. 518. *part. I.*)

$$bx = ay$$

$$bx : a = y$$

Item, $dx = ady : b$

Substitutis ergo in valore ipsius MK pro dx & y valoribus modo inventis,

$$\text{prodit } MK = \frac{ap}{b} - \frac{abpx}{abb} = (ap - px) :$$

$$b = (a - x)p : b = NB. MC : AC.$$

Est vero NB arcus radio NC descriptus adeoque constructio a rectificatio-
ne arcus illius, seu a quadratura circuli pendet.

PROBLEMA XII.

Tab. I. 56. Intra angulum QTH describere Fig. 2. curvam desideratam algebraicam, quae rectam TQ in dato puncto M tangat.

RESOLUTIO.

Demittatur ex M ad TH perpendicularis PM, erit TP subtangens, PM semiordinata curvae quaesitae. Sit $TP = v$, $PM = y$, erit (§. 20.)

$$TP : PM = MR : mR$$

$$v : y = dx : dy$$

$$vdy = ydx$$

Quare si ex aequatione curvae determinatur valor ipsius dx vel dy & in aequatione modo inventa substituitur; per communes Algebrae regulas determinantur tum abscissa x semiordinatae PM datae respondens, ut habeatur vertex curvae A; tum lineae rectae, quibus datus curva datur. Quodsi vero contingat, aliquas ex his determinari non posse; id quidem indicio est, eam variis modis assumi posse adeoque plures curvas ejusdem speciei satisfacere proposito.

COROLLARIUM I.

57. Si curva AMO parabola primi generis esse debet; erit (§. 388. *part. I.*)

$$ax = y^2$$

$$\frac{adx = 2ydy}{dx = 2ydy : a}$$

Quodsi hic valor in aequatione $vdy = ydx$ pro dx substituitur; habebimus

$$\frac{vdy = 2y^2 dy : a}{av = 2y^2 \text{ seu } a = 2y^2 : v}$$

Porro ex aequatione ad parabolam $a = y^2 : x$ Quare

$$2y^2 : v = y^2 : x$$

$$\frac{2 : v = 1 : x}{2v = x}$$

$$x = \frac{1}{2}v$$

Divisa nempe TP bifariam in A, habetur vertex parabolae A, ut jam ex superioribus (§. 21.) constat. Parametro itaque $2y^2 : v$ circa axem AH parabola describenda (§. 401. *part. I.*)

COROLLARIUM II.

58. Si curva AMO hyperbola aequaliter: erit (§. 505. *part. I.*)

$$ax + xx = y^2$$

$$\frac{adx + 2xdx = 2ydy}{dx = 2ydy : (a + 2x)}$$

$$dx = 2ydy : (a + 2x)$$

Quod.

Quodsi in æquatione $vty = ydx$ pro dx substituatur valor modo inventus, prodibit.

$$\frac{vdy = 2y^2 dy : (a \mp 2x)}{av \mp 2vx = 2y^2}$$

$$\frac{av = 2y^2 - 2vx}{a = 2y^2 : v - 2x}$$

hoc est, si fiat $y^2 : v = m$
 $a = 2m - 2x$

Porro ex æquatione ad hyperbolam æquilateram

$$\frac{ax \mp xx = y^2}{a = yy : x - x}$$

Unde $y^2 : x - x = 2m - 2x$

$$\frac{yy - xx = 2mx - 2xx}{yy = 2mx - xx}$$

seu $xx - 2mx = -yy$
 $\frac{m^2}{m^2}$

$$\frac{x^2 - 2mx \mp m^2 = m^2 - yy}{x - m \left. \vphantom{\begin{matrix} x - m \\ m - x \end{matrix}} \right\} = \sqrt{(m^2 - y^2)}}$$

$$\frac{m - x}{m^2} = \sqrt{(m^2 - y^2)}$$

Dato itaque valore ipsius x , datur vertex hyperbolæ æquilateræ, datur etiam parameter $a = 2m - 2x$, consequenter hyperbola describi potest (S. 472 part. 1.)

COROLLARIUM III.

§9. Quoniam pro circulo $ax - x^2 = y^2$, eodem, quo ante, modo reperitur $a = 2y^2 : v \mp 2x$ seu, si fiat $y^2 : v = m$, $a = 2m \mp 2x$, & $x = \sqrt{(mm \mp yy)} - m$.

COROLLARIUM IV.

60. Si curva AMO ellipsis primi generis; erit S. 421. part.)

$$y^2 = bx - bx^2 : a$$

$$\frac{2ydy = bdx - 2bx dx : a}{dy = (abdx - 2bx dx) : 2ay}$$

Quodsi in æquatione $vdy = ydx$ substituatur valor modo inventus, prodibit

$$\frac{abv - 2bv x = 2ay^2}{b = 2ay^2 : (av - 2vx)}$$

Ex natura curvæ est

$$b = ay^2 : (ax - xx)$$

Unde $\frac{2ay^2}{av - 2vx} = \frac{ay^2}{ax - xx}$

$$\frac{2ax - 2xx = av - 2vx}{-\frac{1}{2}av = xx - ax - vx}$$

Si fiat $a - v = 2m$

erit $m^2 - \frac{1}{2}av = xx - 2mx \mp mm$

$$\sqrt{(m^2 - \frac{1}{2}av)} = \begin{cases} x - m \\ m - x \end{cases}$$

$$m \pm \sqrt{(m^2 - \frac{1}{2}av)} = x$$

Quoniam ipsius a seu axis transversi nullus valor erui potest; pro arbitrio assumi debet. Quodsi minor fuerit quam v ; erit $x = m \mp \sqrt{(m^2 - \frac{1}{2}av)}$.

CAPUT III.

De usu Calculi differentialis in Methodo de maximis & minimis.

DEFINITIO IV.

61. **S**I femiordinatæ alicujus curvæ usque ad certum terminum continuo crescunt vel decrescunt, quem prætergressæ denuo decrescunt vel crescunt; methodus, per quam determinatur earum maxima vel minima, dicitur *Methodus de maximis & minimis*.

SCHOLIION.

62. Potest vero hæc methodus etiam ad determinandas quantitates alias, quæ ad certum aliquem terminum crescunt vel decrescunt, adhiberi. Sed representandæ sunt per curvarum femiordinatas, ut exempla inferius adducenda loquuntur.

PROBLEMA XIII.

Tab. I. 63. Determinare maximam vel minimam applicatam in curva algebraica.

11.

RESOLUTIO.

Quoniam in curvis maximum vel minimum habentibus tangens TM degenerat tandem in DE & axi parallela evadit, adeoque normalis MH coincidit cum maxima vel minima applicata CG; erit in casu maximi vel minimi subtangens TP infinita atque subnormalis PH nihilo æqualis. Est vero $PH = ydy : dx$. Quodsi ergo ponatur $ydy : dx = 0$; reperietur $dy = 0$ & ob $PT = ydx : dy = \infty$ (quæ est nota infinitatis) $dx = \infty$.

Fieri potest, ut tangens HG in direc-

tum jaceat femiordinatæ GC : quo in Tab. I. casu subtangens PT nihilo æquatur & Fig. 12. subnormalis PH fit infinita. Est vero $PT = ydx : dy = 0$ (§. 20.) quare si ponatur $ydx : dy = 0$ habebimus $dx = 0$. Vel ob $PH = ydy : dx = \infty$ reperitur $dy = \infty$. Sunt nimirum tam dx , quam y intuitu dy infinitefimæ.

Ex æquatione itaque curvæ quærendus est valor ipsius dy , & vel nihilo, vel infinito æquandus, ut habeatur valor abscissæ, cui maxima applicata coordinatur.

COROLLARIUM I.

64. Quoniam in circulo (§. 377. part. I.)

$$\frac{ax - xx = y^2}{\text{erit } adx - 2xdx = 2ydy}$$

$$(adx - 2xdx) : 2y = dy = 0$$

$$\frac{a - 2x = 0}{a = 2x}$$

$$\frac{1}{2}a = x$$

Nempe maxima femiordinata in circulo erigitur ex centro, uti ex elementis constat (§. 299. Geom.).

Quodsi porro valor ipsius x in æquatione $ax - xx = y$ substituatur; prodibit $\frac{1}{2}aa - \frac{1}{4}aa = yy$ hoc est, $\frac{1}{4}aa = yy$. Unde $\frac{1}{2}a = y$: id quod denuo ex elementis manifestum est.

Quodsi ponamus $2ydy : (a - 2x) = dx = \infty$: erit $a - 2x$ respectu numeratoris $2ydy$ infinite parva, adeoque (§. 3) $a - 2x = 0$, ut ante.

COROL.

COROLLARIUM II.

65. Pro infinitis circulis (S. 24.)

$$\overline{max^{m-1} dx - (m+1)x^m dx = (m+1)y^m dy = 0}$$

$$\overline{max^{m-1} = (m+1)x^m}$$

$$ma : (m+1) = x$$

E. gr. sit $m=3$ seu æquatio ad circulum tertii generis $y^4 = ax^3 - x^4$; erit $x = \frac{3}{4}a$, consequenter $y^4 = \frac{27}{64}a^4 - \frac{81}{256}a^4 = \frac{9}{256}a^4$ — $\frac{81}{256}a^4 = \frac{27}{256}a^4$. Unde $y = \frac{3}{4}a \sqrt[4]{27}$.

COROLLARIUM III.

76. Pro ellipsis infinitis (S. 26.)

$$\overline{+n)ay^{m+n-1}dy = mbx^{n-1}(a-x)^ndx - nbx^m(a-x)^{n-1}dx = 0}$$

$$\overline{mbx^{n-1}(a-x)^n = nbx^m(a-x)^{n-1}}$$

$$ma - mx = nx$$

$$ma = mx + nx$$

$$ma : (m+n) = x.$$

Sit e. gr. ellipsis primi generis; erit $m=1$ & $n=1$, adeoque $x = \frac{1}{2}a$, & ob $y^2 = bx - bxx : a$ (S. 421. part. 1.), $y^2 = \frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}ab = \frac{1}{4}ab$. Unde $y = \sqrt{\frac{1}{4}ab}$.

COROLLARIUM IV.

67. Si $x^3 + y^3 = axy$

erit $\overline{3x^2 dx + 3y^2 dy = ax dy + ay dx}$

$$\overline{3x^2 dx - ay dx = ax dy - 3y^2 dy = 0}$$

$$\overline{3x^2 = ay}$$

$$3x^2 : a = y$$

$$27x^6 : a^3 = y^3$$

$$\overline{x^3 + 27x^6 : a^3 = 3x^3}$$

$$\overline{27x^6 = 2a^3 x^3}$$

$$\overline{27x^3 = 2a^3}$$

$$\overline{3x = a \sqrt[3]{2}}$$

$$x = \frac{1}{3}a \sqrt[3]{2}$$

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

Porro

$$y = 3x^2 : a = \frac{3}{5}a \sqrt[3]{4} = \frac{1}{3}a \sqrt[3]{4}$$

COROLLARIUM V.

68. Sit $y - a = a^{1/3} (a - x)^{2/3}$

$$\text{erit } dy = -2a^{1/3} dx : 3(a - x)^{2/3}$$

Quodsi hic valor ipsius dy ponatur nihilo æqualis; erit $-2a^{1/3} = 0$. Quamobrem cum nullus valor ipsius x inde eruatur; ponatur

$$-2a^{1/3} : 3(a - x)^{2/3} = \infty$$

erit ob denominatorem respectu numeratoris infinite parvum (S. 3)

$$\overline{3(a - x)^{1/3} = 0}$$

$$\overline{a - x = 0}$$

$$a = x$$

Unde $y - a = a^{1/3} (a - x)^{2/3} = a^{1/3} \cdot 0 = 0$

adeoque $\overline{y - a = 0}$

$$y = a.$$

COROLLARIUM VI.

69. Sit $y^5 = a^2 x^3 - x^5 + b^2 c^2 x$

$$\text{erit } \overline{5y^4 dy = 3a^2 x^2 dx - 5x^4 dx + b^2 c^2 dx = 0}$$

$$\overline{3a^2 x^2 - 5x^4 + b^2 c^2 = 0}$$

$$\overline{5x^4 - 3a^2 x^2 = -b^2 c^2}$$

$$x^4 - \frac{3}{5}a^2 x^2 = -\frac{1}{5}b^2 c^2$$

$$\cdot \frac{5}{25}a^4 \quad \frac{5}{25}a^4$$

$$\overline{x^4 - \frac{3}{5}a^2 x^2 + \frac{9}{25}a^4 = \frac{9}{25}a^4 - \frac{1}{5}b^2 c^2}$$

$$\left. \begin{matrix} x^2 - \frac{3}{5}a^2 \\ \frac{3}{5}a^2 - x^2 \end{matrix} \right\} = \sqrt{\left(\frac{9}{25}a^4 - \frac{1}{5}b^2 c^2\right)}$$

$$\overline{x^2 = \frac{3}{5}a^2 \pm \sqrt{\left(\frac{9}{25}a^4 - \frac{1}{5}b^2 c^2\right)}}$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{3}{5}a^2 \pm \sqrt{\left(\frac{9}{25}a^4 - \frac{1}{5}b^2 c^2\right)}\right)}$$

I i i

Fiat

Fiat $x = m$
 erit $y^3 = a^2 m^3 - m^5 + b^2 c^2 m$
 $y = \sqrt[3]{(a^2 m^3 - m^5 + b^2 c^2 m)}$

COROLLARIUM VII.

70. Sit $b^2 x^2 + a^4 = cxy^2 + x^3 y$

erit $2b^2 x dx = 2cxy dy + cy^2 dx + 3x^2 y dx + x^3 dy$
 $2b^2 x dx - cy^2 dx - 3x^2 y dx = 2cxy dy + x^3 dy = 0$

$2b^2 x - cy^2 - 3x^2 y = 0$

$2b^2 x = cy^2 + 3x^2 y$

$2b^2 x^2 = cxy^2 + 3x^3 y$

$b^2 x^2 = cxy^2 + x^3 y - a^4$

$b^2 x^2 = 2x^3 y + a^4$

$b^2 x^2 - a^4 = 2x^3 y$

$\frac{b^2 x^2 - a^4}{2x^3} = y$

$\frac{b^4 x^4 - 2a^4 b^2 x^2 + a^8}{4x^6} = y^2$

$\frac{b^4 cx^4 - 2a^4 b^2 cx^2 + a^8 c}{4x^6} = cy^2$

$\frac{3b^2 x^2 - 3a^4}{2x} = 3x^2 y$

adeoque ob

$2b^2 x - cy^2 - 3x^2 y = 0$

$2b^2 x - \frac{b^4 cx^4 - 2a^4 b^2 cx^2 + a^8 c}{4x^6} - \frac{3b^2 x^2 - 3a^4}{2x} = 0$

h. e. $\frac{1}{2} b^2 x - \frac{b^4 cx^4 - 2a^4 b^2 cx^2 + a^8 c}{4x^6} + \frac{3a^4}{2x} = 0$

$2b^2 x^7 + 6a^4 x^5 - b^4 cx^4 + 2a^4 b^2 cx^2 - a^8 c = 0$

$x^7 + \frac{3a^4 x^5}{b^2} - \frac{1}{2} b^2 cx^4 + a^4 cx^2 - \frac{a^8 c}{2b^2} = 0$

quæ est æquatio exprimens valorem ipsius x , seu abscissæ semiordinatæ maximæ respondentis.

PROBLEMA XIV.

71. Ex dato puncto R in axe AX curvæ Algebraicæ ducere ad perimetrum *Tab. I. Fig. 13.*
 curvæ rectam MR , quæ sit minima omnium ex eodem puncto R ducendarum.

RESOLUTIO.

Sit $AP = x$, $PM = y$, $AR = c$, erit $PR = c - x$ & ob $PM^2 + PR^2 = MR^2$ (§. 417. *Geom.*), $MR^2 = c^2 - 2cx + x^2 + y^2$. Concipiamus ergo curvam, cujus applicata sit MR (§. 62) erit
 $c^2 - 2cx + x^2 + y^2 = z^2$

$-2cdx + 2xdx + 2ydy = 2zdz = 0$

$ydy + xdx - cdx = 0$

Quodsi ex æquatione ad curvam Algebraicam data pro ydy substituatur valor ejus; valorem ipsius x eruere licet.

COROLLARIUM I.

72. In parabola (§. 21.)

$\frac{1}{2} adx = ydy$

Ergo $\frac{1}{2} adx + xdx - cdx = 0$

$x = c - \frac{1}{2} a$ & $\frac{1}{2} a = c - x$

Hinc $ax = ac - \frac{1}{2} aa = y^2$ & $(c - x)^2 + y^2 = \frac{1}{4} aa + ac - \frac{1}{2} aa = ac - \frac{1}{4} aa = z^2$ Unde $MR = z = \sqrt{(ac - \frac{1}{4} aa)}$. Est adeo $MR^2 : PM^2 = ac - \frac{1}{4} aa : ac - \frac{1}{2} aa = c - \frac{1}{4} a : c - \frac{1}{2} a$.

Quia $PR = c - x = \frac{1}{2} a$, evidens est PR esse subnormalem (§. 36), consequenter MR normalem, unde patet

Theorema. Perpendicularis ad parabolam est minima, quæ ex dato in axe puncto ad eam duci potest.

COROLLARIUM II.

73. In hyperbola æquilatera (§. 505. part. 1.)

$$\frac{ax + xx = y^2}{adx + 2xdx = 2ydy}$$

$$\frac{\frac{1}{2}adx + xdx = ydy}{}$$

Quare $\frac{\frac{1}{2}adx + xdx + xdx - cdx = 0}{}$ (§. 71)

$$\frac{2x = c - \frac{1}{2}a}{x = \frac{1}{2}c - \frac{1}{4}a}$$

Sive PR = $c - x = \frac{1}{2}c + \frac{1}{4}a$

Quoniam subnormalis reperitur $x + \frac{1}{2}a$ (§. 35.), PR = $c - x = \frac{1}{2}c + \frac{1}{4}a$ est denuo subnormalis, consequenter &

Theorema. In hyperbola æquilatera normalis est brevissima omnium rectorum, quæ ex dato in axe puncto ad eam duci possunt.

COROLLARIUM III.

74. In ellipsi primi generis est (§. 420 part. 1.)

$$\frac{ay^2 = abx - bx^2}{2aydy = abdx - 2bxdx}$$

$$ydy = (abdx - 2bxdx) : 2a$$

Quare $\frac{\frac{1}{2}bdx - bxdx : a + xdx - cdx = 0}{}$

$$\frac{\frac{1}{2}b - c - bx : a + x = 0}{}$$

$$x - \frac{bx}{a} = c - \frac{1}{2}b$$

$$\frac{ax - bx = ac - \frac{1}{2}ab}{}$$

$$x = (ac - \frac{1}{2}ab) : (a - b)$$

$$c - x = (\frac{1}{2}ab - bc) : (a - b).$$

Cum subnormalis reperiatur $\frac{1}{2}b - bx : a$ (§. 35), erit PR = $c - x = \frac{1}{2}b - (bc - \frac{1}{2}bb) : (a - b) = (\frac{1}{2}ab - bc) : (a - b)$, ut adeo PR denuo sit subnormalis, consequenter &

Theorema. In ellipsi normalis sit linea recta brevissima, quæ ex dato in axe puncto ad eam duci potest.

COROLLARIUM IV.

75. Eodem modo in hyperbola scalena reperitur $x = (ac - \frac{1}{2}ab) : (a + b)$.

COROLLARIUM V.

76. Quoniam $ydy + xdx - cdx = 0$ (§. 71)

$$\frac{ydy = cdx - xdx}{}$$

$$\frac{ydy}{dx} = c - x = PR$$

Est adeo PR subnormalis (§. 35), atque adeo patet generale

Theorema: In omni curva perpendicularis est linea recta brevissima, quæ ex dato puncto in axe ad eam duci potest.

PROBLEMA XV.

77. A puncto C extra curvam Algebraicam dato ducere rectoram CM, que Fig. 14. sit minima omnium ex eodem puncto C ad curvam ducendarum.

RESOLUTIO.

Ob punctum C datum datur quoque perpendicularis ad axem CD, itemque AD. Sit AD = p, CD = q, AP = x, PM = y; erit MH = AP - AD = x - p & CH = CD - PM = q - y, consequenter MC² = CH² + HM² = q² - 2qy + yy + x² - 2px + pp. Cum adeo MC² sit minimum quoddam; erit ejus differentiale nihilo æquale (§. 63.) hoc est, - 2qdy + 2ydy + 2xdx - 2pdx = 0

$$\text{feu } (y - q) dy + (x - p) dx = 0.$$

Reliqua peragenda sunt ut in probleme præcedente (§. 71).

COROLLARIUM I.

78. Si curva AMO fuerit parabola primi generis; erit

$$\frac{ax = y^2}{adx = 2ydy}$$

$$\frac{dx = 2ydy : a}{}$$

$$\begin{aligned} \text{Unde } y - q + (x - p) 2y : a &= 0 \\ \frac{ay - aq + 2xy - 2py}{ay - aq + 2y^2 : a - 2py} &= 0 \\ \frac{aay - aaq + 2y^3 - 2apy}{aay - aaq + 2y^3 - 2apy} &= 0 \end{aligned}$$

h. e. $y^3 + \frac{1}{2}a^2y - \frac{1}{2}aaq = 0$
 $- apy$

Tab. I. Quodsi hæc æquatio ope parabolæ datæ at-
 que circuli construat (S. 622. part. I.);
 una eademque opera determinantur & AP
 & PM, & punctum M. Nimirum (vi S. cit.)
 fieri debet $AL = \frac{1}{2}a - \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}p = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}p$
 & $IL = \frac{1}{4}q$, atque centro I per verticem
 parabolæ A describendus est circulus, qui
 eam in puncto desiderato M secabit. Erit
 autem $AL = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}p$; si ex A in G trans-
 feratur $\frac{1}{2}a$ & DG bifariam secetur in L.
 Nam $AD = p$, adeoque $DG = \frac{1}{2}a - p$.
 Ergo $DL = \frac{1}{4}a - \frac{1}{2}p$, consequenter AL
 $= \frac{1}{4}a - \frac{1}{2}p + p = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}p$. His factis AP
 $= x$, $PM = y$. Etenim ex natura parabolæ
 $AP = y^2 : a$, adeoque $LP = IR = y^2 : a - \frac{1}{4}a$
 $- \frac{1}{2}p$, consequenter $IR^2 = y^4 : a^2 - \frac{1}{2}y^2$
 $+ \frac{1}{16}a^2 - py^2 : a + \frac{1}{4}ap + \frac{1}{4}p^2$. Porro
 $MR = y - \frac{1}{4}q$, adeoque $MR^2 = y^2 - \frac{1}{2}yy$
 $+ \frac{1}{16}q^2$. Habemus itaque (S. 417 Geom.)
 $MI^2 = IR^2 + MR^2 = y^4 : a^2 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{16}a^2$
 $- py^2 : a + \frac{1}{4}ap + \frac{1}{4}p^2y^2 - \frac{1}{2}yy + \frac{1}{16}q^2$.
 Est vero $MI^2 = AI^2 = IL^2 + LA^2 = \frac{1}{16}a^2$
 $+ \frac{1}{4}ap + \frac{1}{4}p^2 + \frac{1}{16}q^2$. Quare

$$\frac{y^4}{a^2} + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}yy = 0$$

$$\frac{py^2}{a}$$

$$\frac{y^4 + \frac{1}{2}a^2y^2 - \frac{1}{2}a^2yy}{-apy^2} = 0$$

$$\frac{y^3 + \frac{1}{2}a^2y - \frac{1}{2}a^2q}{-apy} = 0$$

quæ est æquatio ad construendum proposita,

COROLLARIUM II.

79. Quoniam (S. 77)
 $(y - q) dy + (x - p) dx = 0$

erit $\frac{(x - p) dx = (q - y) dy}{\frac{(x - p)y - ydy}{q - y} \frac{dx}{dx}}$

Jam porro (S. 268 Geom.)

CH: MH = CD: Dr

$q - y : x - p = q : Dr$

adeoque $Dr = \frac{qx - pq}{q - y}$, consequenter

ob $DP = x - p$, $Pr = \frac{qx - pq}{q - y} - x + p =$
 $(qx - pq - qx + pq + xy - py) : (q - y) =$
 $(x - p)y : (q - y)$. Est adeo $PR = ydy : dx$ sub-
 normalis (S. 35.) Patet adeo denuo generale

Theorema. In omni curva AMO linea ad
 eam perpendicularis est brevissima omnium,
 quæ ex dato extra eam puncto C ad eam
 duci possunt.

SCHOLIUM.

80. Ex allato exemplo liquet, si proble-
 ma non fuerit planum, consultius esse ut in
 expressione generali valor potius ipsius dx,
 quam dy substituatur. Nec absimili modo in
 curvis algebraicis determinatur punctum in-
 tra earum ambitum datum, a quo ad earum
 perimetros ducantur rectæ minimæ: quemad-
 modum ex sequente problemate patet.

PROBLEMA XVI.

81. A puncto C intra curvam alge- Tab.
 braicam dato ducere rectam CM, que IV.
 sit minima omnium ex eodem puncto C Fig. 44
 ad curvam ducendarum.

Sit $AD = p$, $CD = q$, $AP = x$, PM
 $= y$, erit $HC = PD = p - x$ & MH
 $= y - q$, consequenter $MC^2 = MH^2$
 $+ HC^2$ (S. 417 Geom.) $= y^2 - 2gy$
 $+ q^2 + p^2 - 2px + x^2$. Cum
 MC^2 sit minimum quoddam ex hy-
 pothesi: erit ejus differentiale nihilo
 aqua-

æquale (§. 63), hoc est, $2ydy - 2qdy - 2pdx + 2xdx = 0$ feu $(y - q) dy - dx(p - x) = 0$. Reliqua peragenda sunt ut in problemate 14 (§. 71).

COROLLARIUM I.

82. Quoniam $(y - q) dy = (p - x) dx$

$$\text{erit } \frac{dy}{dx} = \frac{p - x}{y - q}$$

$$\frac{ydy}{dx} = \frac{(p - x)y}{y - q} = \frac{\text{HC. PM}}{\text{MH}}$$

Quare cum sit $\text{MH} : \text{HC} = \text{PM} : \text{PR}$ (§. 268 *Geom.*); erit PR subnormalis (§. 35). Patet adeo denuo.

Theorema. In omni curva AMO linea normalis est brevissima, quæ a dato intra eam puncto C ad eam duci potest.

COROLLARIUM II.

83. Linea itaque ad curvam normalis est brevissima omnium, quæ a dato quocunque in eodem plano puncto ad eam duci potest (§. 76. 79. 82).

PROBLEMA XVII.

Tab. II. Fig. 15. 84. *Lineam rectam AB ita secare in D, ut rectangulum ex AD & DB sit maximum eorum, quæ hac ratione conftrui possunt.*

Sit $\text{AB} = a$, $\text{AD} = x$, erit $\text{DB} = a - x$, consequenter $\text{AD} \cdot \text{DB} = ax - xx$ maximum aliquod, atque hinc (§. 63) ejus differentiale nihilo æquale: concipitur nempe esse ad circulum, ad quem

$$\frac{ax - xx = yy}{ax - xx = yy}$$

$$\text{Quare } \frac{adx - 2xdx = 2ydy = 0}{a - 2x = 0}$$

$$\frac{1}{2}a = x$$

Linea igitur AB est secanda in duas partes æquales, estque quadratum om-

nium rectangulorum maximum, quorum altitudines & bases junctim sumtæ inter se æquantur.

PROBLEMA XVIII.

85. *Lineam rectam AB ita secare in D, ut $\text{AD}^m \cdot \text{DB}^n$ sit maximum factorum simili modo formatorum.* Tab. II. Fig. 15.

Sit denuo $\text{AB} = a$, $\text{AD} = x$, erit $\text{DB} = a - x$, consequenter $\text{AD}^m \cdot \text{DB}^n = x^m (a - x)^n$. Erit igitur x abscissa respondens semiordinatæ maximæ in infinitis circulis, ad quos $x^m (a - x)^n = y^{m+n}$ (§. 517. part. I.) & hinc (§. 63)

$$\frac{mx^{m-1}(a-x)^n dx - nx^m(a-x)^{n-1} dx = 0}{mx^{m-1}(a-x)^n = nx^m(a-x)^{n-1}}$$

$$\frac{m(a-x) = nx}{ma = mx + nx}$$

$$\frac{ma : (m + n) = x$$

Sit e. gr. $m = 2$, $n = 1$, erit $x = \frac{2}{3}a$, hoc est, si recta $\text{AD} = \frac{2}{3}a$ & $\text{BD} = \frac{1}{3}a$, atque BD sumatur pro altitudine prismatis, AD pro latere quadrati, quod est basis ejusdem; erit prismatis omnium maximum eorum, quæ ex divisione rectæ AB in duas partes formari possunt.

PROBLEMA XIX.

86. *Super recta AB tanquam hypotenusa triangulum rectangulum maximum construere.* Tab. II. Fig. 16.

Sit $\text{AB} = a$, $\text{AC} = x$, erit (§. 417 *Geom.*) $\text{BC} = \sqrt{aa - xx}$, area (§. 392. *Geom.*) $= \frac{1}{2} \text{AC} \cdot \text{CB} = \frac{1}{2} x \sqrt{aa - xx}$. Habemus adeo æquationem ad curvam quarti generis

$$\frac{x\sqrt{aa - xx} = 2y^2}{\text{feu } aaxx - x^4 = 4y^4}$$

Unde $2a^2x dx - 4x^3 dx = 16y^3 dy = 0$

$$\frac{2a^2x}{4x^3} = \frac{16y^3}{16y^3}$$

$$\frac{1}{2}a^2 = x^2$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}a^2} = x$$

Pater adeo triangulum maximum esse æquicrurum. Nam si $AB^2 = aa$ & $AC^2 = \frac{1}{2}aa$, erit etiam $CB^2 = \frac{1}{2}aa$, consequenter $AC = CB$.

PROBLEMA XX.

Tab. II. 87. *Inter omnes Conos æquales determinare eum, qui maximam habet superficiem.*

Sit soliditas conorum æqualium a^3 , ratio radii ad peripheriam $r : p$, radius Coni $AC = x$; erit $r : p = x : \frac{px}{r}$. Hæc peripheria basis $px : r$ ducta in $\frac{1}{2}x$ dat basin Coni $px^2 : 2r$ (§. 429 *Geom.*): per quam si dividatur a^3 , habetur $\frac{1}{2}DC = 2a^3r : px^2$ (§. 548 *Geom.*). Unde $DC = 6a^3r : px^2$ &

$$DC^2 = 36a^6r^2 : p^2x^4$$

$$AC^2 = x^2$$

$$AD^2 = x^2 + 36a^6r^2 : p^2x^4 \text{ (§. 417 } \textit{Geo.})$$

$$AD = \sqrt{(p^2x^6 + 36a^6r^2) : px^2}$$

$\frac{1}{2}$ peripheria Bas. $px : 2r$

$$\text{Superf. Coni } \sqrt{(p^2x^6 + 36a^6r^2) : 2rx} \text{ (§. 548 } \textit{Geom.})$$

Habemus itaque vi methodi de maximis & minimis (§. 63.)

$$(p^2x^6 + 36a^6r^2) : 4r^2x^2 = y^2$$

h. e. $p^2x^4 : 4r^2 + 9a^6 : x^2 = y^2$

$$4p^2x^3 dx : 4r^2 - 18a^6 dx : x^4 = 2y dy = 0$$

$$p^2x^3 dx : r^2 - 18a^6 dx : x^3 = 0$$

$$p^2x^3 : r^2 = 18a^6 : x^3$$

$$p^2x^6 = 18a^6r^2$$

$$px^3 = 3a^3r\sqrt{2}$$

$$x^3 = 3a^3r\sqrt{2} : p$$

$$x = a\sqrt[3]{(3r\sqrt{2} : p)}$$

Quoniam $px^3 = 3a^3r\sqrt{2}$, erit $x^3 : a^3 = 3r\sqrt{2} : 1p$, consequenter evidens est

Theorema. Cubus radii Coni inter æquales maximam superficiem habentis est ad ipsum Conum in ratione composita radii ad peripheriam & $3\sqrt{2}$ ad 1.

PROBLEMA XXI.

88. *Sit ADB semicirculus & curva AMD ejus natura, ut sit BP : PN = AP : PM; determinare punctum M, in quo MN est maxima linea earum, que simili modo determinantur.*

Sit diameter semicirculi $AB = a$, Tab. AP = x ; erit $PB = a - x$ & $PN = \sqrt{(ax - x^2)}$ (§. 327. 377 *Geom.*). Est *Fig. 45.* vero per *hypoth.*

$$BP : PN = AP : PM$$

$$a - x : \sqrt{(ax - x^2)} = x : PM$$

$$\text{adeoque } PM = \frac{x\sqrt{(ax - x^2)}}{a - x} = \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{(a - x)}}$$

consequenter $NM = PN - PM = \sqrt{(ax - x^2)} - \sqrt{x^3} : \sqrt{(a - x)}$ & hinc $MN^2 = a^2x - 2ax^2 + 2x^3 - 2\sqrt{(a^2x^4 - 2ax^5 + x^6) : (a - x)} = (ob \sqrt{(a^2x^4 - 2ax^5 + x^6)} = ax^2 - x^3) : \frac{a^2x - 4ax^2 + 4x^3}{a - x}$. Qua-

re cum NM^2 sit maximum aliquod erit (§. 63)

$$\frac{(a^2 - 8ax + 12x^2)(a - x)dx + (a^2 - 4ax^2 + 4x^3)dx}{(a - x)^2} = 0$$

$$(a^2 - 8ax + 12x^2)(a - x) + a^2x - 4ax^2 + 4x^3 = 0$$

h. e.

$$\begin{array}{r}
 h. c. \left. \begin{array}{l} a^3 - 8a^2x + 12ax^2 \\ - a^2x + 8ax^2 - 12x^3 \\ + a^2x - 4ax^2 + 4x^3 \end{array} \right\} = 0 \\
 \hline
 a^3 - 8a^2x + 16ax^2 - 8x^3 = 0 \\
 \hline
 a^2 - 6ax + 4x^2 = 0 \\
 \hline
 4x^2 - 6ax = -a^2 \\
 \hline
 x^2 - \frac{3}{2}ax = -\frac{1}{4}a^2 \\
 \hline
 \frac{9}{16}a^2 = \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{16}a^2 \\
 \hline
 x^2 - \frac{3}{2}ax + \frac{9}{16}a^2 = \frac{1}{16}a^2 \\
 \hline
 \frac{3}{4}a - x = \frac{1}{4}\sqrt{5}a^2 \\
 \hline
 x = \frac{3}{4}a - \frac{1}{4}\sqrt{5}a^2
 \end{array}$$

Dividatur radius CB bifariam in E, erit CE = $\frac{1}{4}a$, adeoque ob CD = $\frac{1}{2}a$ DE = $\sqrt{\frac{5}{16}a^2} = \frac{1}{4}\sqrt{5}a^2$. Fiat EP = ED: erit PB = $\frac{1}{4}a + \frac{1}{4}\sqrt{5}a^2$, consequenter AP = AB - PB = $\frac{3}{4}a - \frac{1}{4}\sqrt{5}a^2$.

PROBLEMA XXII.

Tab. 89. Determinare maximam applica-
 IV. tam QN in curva AMND ejus natu-
 Fig.46. ra, ut ducta recta FM per punctum D,
 in quo recta AE lineam CB positione
 datam secat, sit eidem AE constanter
 aequalis.

Sit FM = AE = a, DE = b, EP = MG = x, erit DP = x - b & FG = $\sqrt{(a^2 - x^2)}$ (§. 417. Geom.). Jam cum anguli ad P & G sint recti per construct. & ob parallelas FG & MP (§. 256. Geom.) o = n (§. 233. Geom.), erit $\triangle FGM \sim \triangle PDM$ & ideo (§. 267. Geom.)

$$\begin{array}{l}
 MG : GF = DP : PM \\
 x : \sqrt{(a^2 - x^2)} = x - b : PM
 \end{array}$$

$$\text{adeoque } PM = \frac{(x-b)\sqrt{(a^2-x^2)}}{x} = \left(1 - \frac{b}{x}\right)\sqrt{(a^2-x^2)}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{Hinc } PM^2 = \left(1 - \frac{2b}{x} + \frac{b^2}{x^2}\right)(a^2 - x^2) \\
 = a^2 - \frac{2a^2b}{x} + \frac{a^2b^2}{x^2} - x^2 + 2bx - b^2
 \end{array}$$

Habemus adeo (§. 63)

$$\begin{array}{l}
 \frac{2a^2bdx}{x^2} - \frac{2a^2b^2dx}{x^3} - 2xdx + 2bdx = 0 \\
 \hline
 \frac{a^2b}{x^2} - \frac{a^2b^2}{x^3} - x + b = 0 \\
 \hline
 a^2bx - a^2b^2 - x^4 + bx^3 = 0 \\
 \hline
 a^2b - x^3 = 0 \\
 \hline
 x^3 = a^2b \\
 \hline
 x = \sqrt[3]{a^2b}
 \end{array}$$

Parametro a circa axem EB describatur parabola EIR (§. 400 part. I.) fiatque (§. 222. part. I.) EO = $\frac{1}{2}a$ & OK ad EB perpendicularis = $\frac{1}{2}b$. Ex centro K radio KE describatur circulus EIT secans parabolam in I, erit IL ad EB perpendicularis (=EQ) = x, adeoque QN perpendicularis ad AE transiens per I maxima applicata.

Eft enim IS = IL = SL = x - $\frac{1}{2}b$, & cum EL = $x^2 : a$ (§. 391 part. I.) LO = SK = $\frac{1}{2}a - x^2 : a$. Quare SI² = $x^2 - bx + \frac{1}{4}b^2$ & SK² = $\frac{1}{4}a^2 - x^2 + x^4 : a^2$, consequenter EK² = IK² = $\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}b^2 - bx + x^4 : a^2$. Unde ob EK² = $\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}b^2$ habetur $x^4 : a^2 - bx = 0$, adeoque $x^3 - a^2b = 0$.

PROBLEMA XXIII.

90. Determinare maximam applica-
 Tab. tam PM curvae AME ejus natura, ut
 IV. diameter circuli ANB sit axi AE &
 Fig.47. recte per A ducte MN in quolibet cur-
 va puncto M aequalis.

Sit MN = AB = AE = a, AM = x, PM = y, erit AN = a - x. Jam cum AB & PM sint ad AE perpendiculares per hypo-
 th. erunt eadem inter se parallelae (§. 256 Geom.). Quare cum porro angulus ad P rectus sit (§. 78. Geom.) & ANB, qui

qui est, in semicirculo, sit itidem rec-
 rus, (§. 317 *Geom.*); erit $\triangle AMP$
 $\simeq \triangle ANB$ (§. 267 *Geom.*) &

$$\begin{aligned} PM : AM &= AN : AB \\ y : x &= a-x : a \\ \hline ay &= ax - x^2 \\ \hline ady &= adx - 2xdx = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a - 2x &= 0 \\ \hline a &= 2x \\ \hline \frac{1}{2}a &= x \end{aligned}$$

Hinc porro $y = x - \frac{x^2}{a} = \frac{1}{2}a - \frac{1}{4}a = \frac{1}{4}a$

Est igitur in casu applicatae maxi-
 mae $AM = \frac{1}{2}a$: unde reperitur AP
 $= \frac{1}{4} \sqrt{3a^2}$ (§. 417. *Geom.*)

S E C T I O S E C U N D A.

D E C A L C U L O I N T E G R A L I S E U S U M M A T O R I O.

C A P U T I.

De natura Calculi integralis.

D E F I N I T I O V.

91. **C**alculus Integralis seu Sum-
 matorius est Methodus quan-
 titates differentiales summandi, hoc est,
 ex quantitate differentiali data inve-
 niendi eam, ex cujus differentiatione
 resultat differentiale datum.

C O R O L L A R I U M.

92. Integrationis itaque seu summationis
 rite peractae indicium est, si quantitas inven-
 ta juxta regulas Cap. I. Sect. I. traditas
 differentiatam eam producit, quae ad summan-
 dum proponebatur.

S C H O L I O N.

93. Quoniam Angli differentialem quanti-
 tatum fluxiones vocant (§ 6); Calculum,
 quem nos differentialem dicimus, Methodum
 fluxionum; quem vero integralem vocamus
 & qui a differentiis ad summas, seu, ut
 cum Anglis loquar, a fluxionibus ad quan-
 titates fluentes (ita nimirum variables di-
 cunt) ascendit, Methodum fluxionum inver-
 sam appellant.

H Y P O T H E S I S.

94. Signum summae aut quantitatis in-

tegralis sit \int , ita ut $\int y dx$ denotet sum-
 mam seu integrale differentialis $y dx$.

P R O B L E M A XXIV.

95. Quantitatem differentialem inte-
 grare seu summare.

R E S O L U T I O.

Ex superioribus manifestum est, quod sit

I. $\int dx = x$ (§. 8).

II. $\int (dx + dy) = x + y$ (§. 11).

III. $\int (x dy + y dx) = xy$ (§. 12).

IV. $\int m x^{m-1} dx = x^m$ (§. 13).

V. $\int (n:m) x^{(n-m):m} dx = x^{n:m}$ (§. 17).

VI. $\int (y dx - x dy) : y^2 = x : y$ (§. 19).

Ex his casus quartus & quintus fre-
 quentius occurrunt, in quibus quantitas
 differentialis summatur, si exponenti va-
 riabilis unitas additur, & ea, quae prodit,
 dividitur per novum exponentem duc-
 tum in differentiale radicis e. gr. in casu
 quarto per $(m-1+1) dx$, hoc est,
 per mdx .

Quodsi quantitas differentialis ad sum-
 mandum

mandum proposita nulli illarum formularum similis; aut reducenda est ad summabilem finitam, aut ad seriem infinitam cujus singuli termini summari possunt, vel etiam ad quadraturas & rectificationes Curvarum simpliciorum, quæ quadrari vel rectificari nondum possunt, veluti ad Quadraturam Circuli, vel rectificationem arcus circuli: quas reductiones exemplis potius, quam regulis docemus, ne calculi tyronibus nauseam moveamus.

Et quia eadem differentialia prodeunt, si variabilibus constantes quantitates adjiciantur, quam si eadem abfuerint (§. 10); itaque fieri potest, ut fdx sit $x + a$ vel $x - a$, $\int(xdy + ydx) = xy \mp a^2$, vel $xy \pm ab$, ita porro. Sed quid de quantitate adjicienda tenendum sit, docebitur paulo post.

SCHOLIUM.

96. Quemadmodum in analysi finitorum qualibet quantitas ad quemcunque dignitatis gradum evehi, sed non vice versa ex qualibet radix extrahi potest desiderata; ita similiter in analysi infinitesimali quantitas qualibet variabilis aut ex variabilibus & constantibus quomodocunque composita haud difficulter differentiat, sed non vice versa quodlibet differentiale integrari potest. Quemadmodum autem porro in analysi finitorum non ex omnibus æquationibus radices extrahendi Methodus hactenus inventa, neque enim atas nostra transcendit limites ultra seculum & quod excurrit Algebrae jam assignatos: ita similiter in analysi infinitorum calculus integralis suam perfectionem nondum est affectus. Sicuti autem in analysi finitorum ad methodos extrahendi radicem per approximationem recurrimus, ubi perfectam extrahere non datur; ita similiter in analysi infinitorum ad series infinitas confugimus, ubi perfectam summationem dare non valemus.

CAPUT II.

De usu Calculi integralis in quadraturis curvarum.

DEFINITIO VI.

Tab. I. 97. **D**ifferentialiale seu elementum areæ dicitur rectangulum PMRP ex semiordinata PM in differentiale abscisse Pp.

COROLLARIUM I.

98. Si ergo semiordinata $PM = y$ abscissa $AP = x$, erit $Pp = MR = dx$, consequenter Elementum areæ PM. $MR = ydx$.

COROLLARIUM II.

99. Quoniam $mR = dy$ & $MR = dx$; erit $\Delta MRm = \frac{1}{2} dx dy$ (§. 392 Geom.). Sed $\frac{1}{2} dx dy$ est ipsius ydx infinitesima (§. 12.), consequenter trapezium PMmp æquale est rectangulo PMRp in præsentem nimirum casu ubi pm ipsi PM infinite propinqua intelligitur (§. 4.). Quæ Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

re cum area AMP in infinita istiusmodi trapezia resolvi possit; erit ea $\int ydx$ (§. 91. 94.).

COROLLARIUM III.

100. Quod si itaque ex æquatione ad curvam datam substituatur valor ipsius y , & ydx integrabile evadat; integratione peracta habetur quadratura curvæ. Curvam igitur quadrare idem est ac summare ydx .

PROBLEMA XXV.

101. Invenire aream trianguli.

Sit $CP = x$, $MN = y$, $CD = a$, $AB = b$; Tab. II. erit ob MN ipsi AB parallelam, (§. 268. Fig. 18. 396. Geom.)

$$CP : MN = CD : AB$$

$$x : y = a : b$$

$$y = bx : a$$

Kkk

Ergo

Ergo clementum $MN_{nm} = ydx$ (§. 98) $= bxdx$: a Unde habetur $\int ydx = bx^2$: $2a$ (§. cit.): quæ est area indefinita CMN. Quodsi pro CP seu x substituaturs CD seu a ; prodibit area totius trianguli $ACB = ba^2$: $2a = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}AB \cdot CD$, prorsus ut in Elementis Geometriæ (§. 392) demonstratum.

SCHOLIION.

102. Hoc exemplum ideo attulimus, ut tyrones, quibus principia Calculi summatorii sub initium duriora videntur, intelligant, per eum non alia reperiri, nisi quæ demonstrationibus rigidis firmantur; tum ut methodi applicationem in exemplo obvio facilius perspiciant.

PROBLEMA XXVI.

103. Parabolam quadrare. Pro parabola Apolloniana (§. 388 part. I.)

$$\frac{ax = y^2}{a^{1:2}x^{1:2} = y}$$

$$\frac{ydx = a^{1:2}x^{1:2}dx}{\int ydx = \frac{2}{3}a^{1:2}x^{3:2} = \frac{2}{3}xy}$$

substituto valore ipsius $a^{1:2}x^{1:2}$.

COROLLARIUM.

104. Est ergo spatium parabolicum ad rectangulum ex semiordinata in abscissam ut $\frac{2}{3}xy$ ad xy , hoc est, ut 2 ad 3 (§. 124. part. I.).

PROBLEMA XXVII.

105. Infinitas parabolâs quadrare. Pro infinitis parabolis & curvis agnatis (§. 519 part. I)

$$\frac{a^n x^m = y^r}{a^{n:r} x^{m:r} = y}$$

$$\frac{ydx = a^{n:r} x^{m:r} dx}{\int ydx = \frac{r}{m+r} a^{n:r} x^{m:r+1} = \frac{r}{m+r} xy}$$

ob $a^{n:r} x^{m:r} = y$.

COROLLARIUM.

106. Spatium parabolicum aut paraboloidicum quodcumque est ad rectangulum ex semiordinata in abscissam, ut axy : $(m+r)$ ad xy , hoc est, ut r ad $m+r$ (§. 124 part. I.).

PROBLEMA XXVIII.

107. Quadrare segmentum spatii parabolici PMQN inter duas semiordina- Tab. II. Fig. 19. tas PM & QN interceptum.

I. Quoniam AP constans est & origo abscissæ indeterminatæ in P: fit $AP = b$, $PQ = x$, $QN = y$, $AQ = b + x$. Sit porro parameter $= a$, erit (§. 388 part. I.)

$$\frac{ab + ax = y^2}{\sqrt{ab + ax} = y}$$

$$ydx = dx \sqrt{ab + ax}$$

Ut hoc elementum integrabile redatur; fiat

$$\frac{\sqrt{ab + ax} = v}{ab + ax = v^2}$$

$$\frac{adx = 2v dv}{dx = 2v dv : a}$$

$$\frac{ydx = 2v^2 dv : a}{\int ydx = \frac{2}{3}v^3 : a = \frac{2}{3}(ab + ax) \sqrt{ab + ax}}$$

$$ax) : a = \frac{2}{3}(b + x) \sqrt{ab + ax}.$$

Quoniam in P, $x = 0$, & spatium quoque QNMP evanescit; si in integrali inventa ponatur $x = 0$, quod relinquitur $\frac{2}{3}b \sqrt{ab}$, ostendit quid ei adiciendum vel demendum, ut spatium QNMP nihilum evadat in P, consequenter ut integrale fiat quadratura ipsius QNMP. Habemus nempe in nostro casu subtrahendum $\frac{2}{3}b \sqrt{ab}$: unde

unde ipsius QNMP area = $\frac{2}{3} (b + x)$
 $\sqrt{(ab + ax)} - \frac{2}{3} b \sqrt{ab}$.

II. Sit AQ constans, & = b, origo
 ipsius x in Q, erit QP = x,

PM = y, AP = b - x & (§. 351)

$$ab - ax = y^2$$

$$\sqrt{(ab - ax)} = y$$

$$y dx = dx \sqrt{(ab - ax)}$$

Fiat ut ante $ab - ax = v^2$

$$\text{erit } -adx = 2v dv$$

$$dx = -2v dv : a$$

$$y dx = -2v^2 dv : a$$

$$\int y dx = -\frac{2}{3} v^3 : a = -\frac{2}{3} (b-x) \sqrt{(ab-ax)}$$

Ut intelligatur, quid integrali sit ad-
 jiciendum, quo spatii PMNQ mensuram
 constituat; ponatur ut ante $x = 0$, re-
 linquetur $-\frac{2}{3} b \sqrt{ab}$. Unde manifestum
 est, si illi adjiciatur $+\frac{2}{3} b \sqrt{ab}$, haberi
 spatium PMNQ = $\frac{2}{3} \sqrt{ab} - \frac{2}{3} (b-x) \sqrt{(ab-ax)}$

SCHOLIION.

108. Spatium PMNQ, esse in casu
 priore $\frac{2}{3} (b+d) \sqrt{(ab + ax)} - \frac{2}{3} b \sqrt{ab}$, in
 posteriore $\frac{2}{3} b \sqrt{ab} - \frac{2}{3} (b-x) \sqrt{(ab-ax)}$ etiam
 ex problemate 26. (§. 103.) manifestum
 est. Nimirum PMNQ = ANQ - AMP.
 Sed in casu priore AMQ = $\frac{2}{3}$ AQ. QN
 = $\frac{2}{3} (b+x) \sqrt{(ab + ax)}$, & AMP = $\frac{2}{3}$ AP.
 PM = $\frac{2}{3} b \sqrt{ab}$. Unde PMNQ = $\frac{2}{3} (b+x)$
 $\sqrt{(ab + ax)} - \frac{2}{3} b \sqrt{ab}$. In posteriore ANQ
 = $\frac{2}{3}$ AQ. QN = $\frac{2}{3} b \sqrt{ab}$ & AMP = $\frac{2}{3}$ AP.
 PM = $\frac{2}{3} (b-x) \sqrt{(ab-ax)}$. Unde QNMP
 = $\frac{2}{3} b \sqrt{ab} - \frac{2}{3} (b-x) \sqrt{(ab-ax)}$.

COROLLARIUM.

109. Quodsi adeo curva non supponatur
 descripta, sed tantum æquatio ad eam de-
 tur, ut adeo non constet, ubi origo ipsius
 x sit statuenda; evidens est, ex resolutione
 problematis præsentis, quod in integrali po-
 ni debeat $x = 0$ & deletis iis, quæ per x
 multiplicantur, residuum, si quod fuerit,
 sub signo contrario ipsi sit adjiciendum, ut
 habeatur quadratura quæsitæ.

PROBLEMA XXIX.

110. Quadrare curvam, ad quam
 $xy^3 = a^4$. Quoniam

$$y = a^{4/3} x^{-1/3}$$

$$\text{erit } y dx = a^{4/3} x^{-1/3} dx$$

$$\int y dx = \frac{2}{5} a^{4/3} x^{2/3} = \frac{2}{5} \sqrt[3]{a^4 x^2} = \frac{2}{5} a \sqrt[3]{ax^2}$$

PROBLEMA XXX.

111. Quadrare curvam Cartesii (d),
 ad quam $b^2 : x^2 = b - x : y$.

Quoniam $b^2 y = bx^2 - x^3$

$$\text{erit } y = (bx^2 - x^3) : b^2$$

$$y dx = (bx^2 dx - x^3 dx) : b^2$$

$$\int y dx = x^3 : 3b - x^4 : 4b^2$$

PROBLEMA XXXI.

112. Quadrare curvam, ad quam x^6
 $+ ax^4 + a^2 x^3 + a^3 x^2 + a^4 = a^4 y$.

Quoniam $y = x^5 : a^4 + x^4 : a^3 + x^3 : a^2 + x^2 : a + a$

$$\text{erit } y dx = \left(\frac{x^5}{a^4} + \frac{x^4}{a^3} + \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^2}{a} + a \right) dx$$

$$\int y dx = \frac{x^6}{6a^4} + \frac{x^5}{5a^3} + \frac{x^4}{4a^2} + \frac{x^3}{3a} + ax$$

PROBLEMA XXXII.

113. Quadrare curvam, ad quam
 $y^2 = x^4 + a^2 x^2$.

Quoniam $y = x \sqrt{(x^2 + a^2)}$

$$\text{erit } y dx = x dx \sqrt{(x^2 + a^2)}$$

Kkk 2

Ut

(d) Epist. Tom. III. pag. 219.

Ut elementum integrabile reddatur, fiat

$$\sqrt{x^2 + a^2} = v$$

$$\text{erit } x^2 + a^2 = v^2$$

$$2x dx = 2v dv$$

$$x dx = v dv$$

$$x dx \sqrt{x^2 + a^2} = v^2 dv$$

$\int y dx = \frac{1}{2} v^3 = \frac{1}{2} (x^2 + a^2) \sqrt{x^2 + a^2}$.
 Ponatur $x = 0$, erit residuum $\frac{1}{2} a^2 \sqrt{a^2}$
 sive $\frac{1}{2} a^3$. Ergo quadratura curvæ
 $\frac{1}{2} (x^2 + a^2) \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{1}{2} a^3$ (§. 109).

PROBLEMA XXXII.

114. Quadrare curvam, ad quam
 $y^2 = x^3 + ax^2$.

Quoniam $y = x \sqrt{x + a}$

$$\text{erit } y dx = x dx \sqrt{x + a}$$

Ut elementum integrabile evadat, fiat

$$\sqrt{x + a} = v$$

$$\text{erit } x + a = v^2 \text{ \& } x = v^2 - a$$

$$dx = 2v dv$$

$$y dx = 2v^3 dv - 2av^2 dv$$

$\int y dx = \frac{2}{5} v^5 - \frac{2}{3} av^3 = \frac{2}{5} (x + a)^2 \sqrt{x + a}$
 $- \frac{2}{3} a (x + a) \sqrt{x + a} = \frac{6}{15} ((x^2 + 2ax + a^2) - \frac{10}{15} (ax + aa)) (\sqrt{x + a}) = (6x^2 + 2ax - 4aa) \sqrt{x + a}$: 15. Ponatur
 $x = 0$; relinquetur $-\frac{4}{15} aa \sqrt{a}$. Area
 igitur curvæ $\frac{1}{15} \sqrt{x + a} (6x^2 + 2ax - 4aa) + \frac{4}{15} aa \sqrt{a}$ (§. 109).

PROBLEMA XV.

115. Quadrare curvam, ad quam
 $y^2 = x^2 (x + a)$.

Quoniam $y = x \sqrt{x + a}$

$$\text{erit } y dx = x dx \sqrt{x + a}$$

$$\text{Ponatur } \sqrt{x + a} = v$$

$$\text{erit } x + a = v^2$$

$$x = v^2 - a$$

$$dx = 2v dv$$

$$x dx \sqrt{x + a} = (2v^3 dv - 2av dv) v = 2v^4 dv - 2adv$$

$\int y dx = \frac{2}{5} v^5 - 2av = \frac{2}{5} (x + a) \sqrt{x + a} - 2a \sqrt{x + a} = (2x + 2a - 6a) \frac{1}{5} \sqrt{x + a} = \frac{2}{5} \sqrt{x^3 - 3ax^2 + 4a^3}$. Reductio ad me-
 re surdam necessaria, ut appareat, si
 fiat $x = 0$, quinam termini nullefcant,
 propterea quod $x - 2a$ signis afficitur
 diversis.

Ponatur $x = 0$; relinquetur $\frac{2}{5} \sqrt{4a^3} = \frac{4}{5} a \sqrt{a}$. Area igitur curvæ $= \frac{2}{5} \sqrt{x^3 - 3ax^2 + 4a^3} - \frac{4}{5} a \sqrt{a}$ (§. 109) = $\frac{2}{5} (x - 2a) \sqrt{x + a} - \frac{4}{5} a \sqrt{a}$.

PROBLEMA XXXIV.

116. Quadrare omnes curvas, que
 comprehenduntur sub equatione gene-
 rali $y = \sqrt[m]{x + a}$.

Quoniam $y = (x + a)^{1:m}$

$$\text{erit } y dx = dx (x + a)^{1:m}$$

Ut elementum integrabile fiat, ponatur

$$(x + a)^{1:m} = v$$

$$\text{erit } x + a = v^m$$

$$dx = m v^{m-1} dv$$

$$y dx = m v^m dv$$

$$\int y dx = \frac{m v^{m+1}}{m+1} = \frac{m}{m+1} (x+a)^{\frac{m+1}{m}} \sqrt[m]{x+a}$$

Fiat $x = 0$: erit residuum $\frac{m}{m+1} a^{\frac{m+1}{m}} \sqrt[m]{a}$.

Unde area curvæ $\frac{m}{m+1} (x + a)^{\frac{m+1}{m}} \sqrt[m]{x + a}$

$$- \frac{m}{m+1} a^{\frac{m+1}{m}} \sqrt[m]{a} \text{ (§. 109).}$$

PROBLEMA XXXV.

117. Quadrare omnes curvas, quae definiuntur hac equatione generali $y = ax^m : \sqrt{(b + cx^{m+1})}$.

Elementum harum curvarum $ydx = ax^m dx : \sqrt{(b + cx^{m+1})}$. Ut integrabile reddatur, fiat

$$\frac{\sqrt{(b + cx^{m+1})} = v}{\text{erit } (b + cx^{m+1}) = v^2}$$

$$\frac{(m+1)cx^m dx = 2v dv}{x^m dx = 2v dv : c(m+1)}$$

$$\frac{ydx = 2av : (m+1)c}{= 2a \sqrt{(b + cx^{m+1})} : (m+1)c}$$

Fiat $x=0$, relinquetur $2a\sqrt{b} : (m+1)c$
 Est igitur area $\frac{2a\sqrt{(b + cx^{m+1})} - 2a\sqrt{b}}{(m+1)c}$

PROBLEMA XXXVI.

118. Quadrare innumeras hyperbolas intra asymptotos.

Pro infinitis hyperbolis intra asymptotos $a^{m+n} = y^m x^n$.

Fiat $a=1$

erit $1 = y^m x^n$

$$\frac{x^{-n} = y^m}{x^{-n:m} = y}$$

$$ydx = x^{-n:m} dx$$

$$\int ydx = \frac{m}{m-n} x^{-n:m+1} = \frac{m}{m-n} x^m x^{-n}$$

$$= \frac{m}{m-n} \sqrt[m]{x^m y^m} = \frac{m}{m-n} x^m y^m$$

Tab. I. Si $m > n$; spatii interminati
 Fig. 4. $\int MPAS$ quadratura semper habetur: si $m < n$, ob valorem negativum reperitur quadratura spatii $IMPCK$: si vero $m = n$, spatium neutrum quadratur, Sit enim $xy^2 = a^2$; erit $m=2$, $n=1$.

adeoque $\int MPAS = 2xy$. Si $xy^2 = a$; erit $m=4$, $n=1$, adeoque $\int MPAS = \frac{4}{3}xy$. Si $x^2y = a$; theorema dat $a^3 : x = -xy$ seu xy pro spatium interminato $IMPCK$. Si $x^4y = a^5$; habetur $m=1$, $n=4$ adeoque $-\frac{1}{3}xy$, hoc est $\frac{1}{3}xy = \int IMPCK$. Sed si $xy = a^2$; erit $m=1$, $n=1$, adeoque $m : (m-n) = \frac{1}{0}$: est adeo numerator respectu denominatoris infinitus.

SCHOLIUM.

119. Johannes Wallisius (e) spatium $SAPMS$, eo in casu, ubi valor negativus, vocavit plusquam infinitum: ostendit vero celeberrimus Varignonius (f), virum ceteroquin magno suo merito celebrem aliquid humani passum esse, consentiente summo Leibnitio (g).

PROBLEMA XXXVII.

120. Hyperbolam Apollonianam intra asymptotos quadrare.

Quoniam ad hyperbolam intra asymptotos (§. 490. part. I.) $a^2 = by + xy$, seu si fiat $a=b=1$ (quod ponere licet, cum quantitatis b determinatio sit arbitraria, vi §. cit)

$$1 = y + xy$$

$$\text{erit } 1 : (1 + x) = y$$

hoc est, divisione actu facta, (§. 45. part. I.)

$$y = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 \&c.$$

$$y dx = dx - x dx + x^2 dx - x^3 dx + x^4 dx - x^5 dx + x^6 dx \&c. \text{ in infinit.}$$

$$\int y dx = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{7}x^7 \&c. \text{ in infinit.}$$

Kkk 3 SCHO-

(e) In Arithmet. infinit. Schol. prop. 101. fol. 407. & Prop. 104. fol. 409.

(f) Memoires de l'Academie Royale des Sciences A. 1706. p. m. 15.

(g) In Actis Eruditorum A. 1712. p. 167. &c. seqq.

SCHOLIION.

121. Hanc quadraturam hyperbolæ; pri-
mus dedit serierum infinitarum inventor Ni-
colaus Mercator (h). Cum autem seriem qua-
sivisset per divisionem; celeberrimi Geometra
Leibnitius atque Nevvtonus (i) methodum
hanc serierum infinitarum promoverunt, hic
quidem eas eliciens per radicum extractio-
nes, ille autem ex serie quadam præsupposita.
Utriusque exempla in sequentibus occurrunt.

PROBLEMA XXXVIII.

122. Quadrare curvam, in qua $x^2 y + y = 1$
 $+ y = 1$.

Quoniam $\frac{x^2 y + y = 1}{y = \frac{1}{x^2 + 1}}$

$y = \frac{1}{x^2 + 1}$

vel $y = \frac{1}{1 + x^2}$

$y dx = dx : (x^2 + 1)$

vel $= dx : (1 + x^2)$

Resolvatur $1 : (x^2 + 1)$ per divisio-
nem in seriem infinitam (§. 45. part. 1.),
reperietur

$y = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^6} - \frac{1}{x^8} \&c.$

$= x^{-2} - x^{-4} + x^{-6} - x^{-8} \&c.$

Quare

$y dx = x^{-2} dx - x^{-4} dx + x^{-6} dx - x^{-8} dx \&c.$

adeoque

$\int y dx = x^{-1} + \frac{1}{3} x^{-3} - \frac{1}{5} x^{-5} + \frac{1}{7} x^{-7} \&c.$

$= \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \frac{1}{7x^7} \&c.$

Resolvatur similiter $1 : (1 + x^2)$ in
seriem (§. cit.), reperietur

$y = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 \&c.$

adeoque

$y dx = dx - x^2 dx + x^4 dx - x^6 dx + x^8 dx \&c.$

Quare $\int y dx = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \frac{1}{9} x^9 \&c.$

Quoniam series exprimit aream,

(b) In Logarithmotechnia prop. 17. p. 31. & seqq.

(i) Vide Epistolæ ipsorum apud Wallisium vol.

quia convergit, hoc est, termini con-
tinuo fiunt minores, ut in casu singu-
lari tandem deveniatur ad particulam
inassignabilem, etiamsi terminorum nu-
merus sit finitus, series autem prior ci-
tius convergit posteriore; ideo uten-
dum est serie prima, si x fuerit satis
magna, secunda vero, si satis parva.

PROBLEMA XXXIX.

123. Quadrare hyperbolam AMP. Tab. I.

Quoniam in hyperbola $ay^2 = abx$ Fig. 2.
 $+ bx^2$ (§. 499 part. 1.); $y = \sqrt{(ax + x^2)}$ \sqrt{a}
 \sqrt{b} , adeoque $y dx = dx \sqrt{(ax + x^2)}$ \sqrt{a}
 \sqrt{b} consequenter $\int y dx = \int \sqrt{(a : b)} \sqrt{dx}$
 $\sqrt{(ax + x^2)}$. Quoniam $\int dx \sqrt{(ax + x^2)}$
est area hyperbolæ æquilateræ (§. 507.
part. 1) hac data datur etiam area hy-
perbolæ scalenæ. Quare ut elementum
areæ hyperbolæ æquilateræ integrabile
reddatur, solvatur $\sqrt{(ax + x^2)}$ in seriem
infinitam (§. 98. part. 1), erit in theore-
mate generali

$m = 1, n = 2, P = ax$

$Q = x : a = a^{-1} x$

$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} a^{1:2} x^{1:2} - a^{-1} x$

$= \frac{1}{2} a^{-1:2} x^{3:2} = B$

$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} a^{-1:2} x^{3:2} \cdot a^{-1} x$

$= -\frac{1}{2.4} a^{-3:2} x^{5:2} = C$

$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{1}{6} - \frac{1}{2.4} a^{-3:2} x^{5:2} \cdot a^{-1} x$

$= +\frac{1.3}{2.4.6} a^{-5:2} x^{7:2} = D$

$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{1.3}{2.4.6} a^{-5:2} x^{7:2} \cdot a^{-1} x$

$= -\frac{1.3.5}{2.4.6.8} a^{-7:2} x^{9:2} = E$

$\frac{m-4n}{5n} EQ = -\frac{7}{10} - \frac{1.3.5}{2.4.6.8} a^{-7:2} x^{9:2} \cdot a^{-1} x$

$= +\frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10} a^{-9:2} x^{11:2} \&c.$

Est

Est itaque

$$y = a^{1:2} x^{1:2} + \frac{1}{2} a^{-1:2} x^{3:2} - \frac{1}{2.4} a^{-3:2} x^{5:2} + \frac{1.3}{2.4.6} a^{-5:2} x^{7:2} - \frac{1.3.5}{2.4.6.8} a^{-7:2} x^{9:2} + \&c. \text{ in infinit.}$$

$$y dx = a^{1:2} x^{1:2} dx + \frac{1}{2} a^{-1:2} x^{3:2} dx - \frac{1}{2.4} a^{-3:2} x^{5:2} dx + \frac{1.3}{2.4.6} a^{-5:2} x^{7:2} dx - \frac{1.3.5}{2.4.6.8} a^{-7:2} x^{9:2} dx \&c. \text{ in infinit.}$$

adeoque

$$\int y dx = \frac{2}{3} a^{1:2} x^{3:2} + \frac{1}{5} a^{-1:2} x^{5:2} - \frac{1}{4.7} a^{-3:2} x^{7:2} + \frac{1.3}{4.6.9} a^{-5:2} x^{9:2} - \frac{1.3.5}{4.6.8.11} a^{-7:2} x^{11:2} + \frac{1.3.5.7}{4.6.8.10.13} a^{-9:2} x^{13:2} \&c.$$

Quoniam $a^{1:2} x^{1:2} = \sqrt{ax}$, erit

$$\int y dx = \sqrt{ax} \left(x^{\frac{2}{3}} + \frac{x^2}{5a} - \frac{x^3}{4.7a^2} + \frac{1.3.x^4}{4.6.9a^3} - \frac{1.3.5x^5}{4.6.8.11a^4} + \frac{1.3.5.7x^6}{4.6.8.10.13a^5} \&c. \text{ in infinit.} \right)$$

PROBLEMA XL.

124. Circulum quadrare.

Tab. I. Sit $AB = I$, $AP = x$, $PM = y$; Fig. 2. erit (§. 377. part. I.)

$$y = \sqrt{(x - xx)}$$

$$y dx = dx \sqrt{(x - xx)} = dx (x - xx)^{1:2}$$

Ut elementum integrabile reddatur, ex $x - xx$ extrahatur radix per theorema generale (§. 98 part. I), in quo erit

$$m = 1, n = 2, P = x, Q = -xx: x = -x \\ P^{m:n} = x^{1:2} = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} x^{1:2} \cdot -x = -\frac{1}{2} x^{3:2} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot -\frac{1}{2} x^{3:2} \cdot -x = -\frac{1}{2.4} x^{5:2} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2.4} x^{5:2} \cdot -x \\ = -\frac{1.3.x^{7:2}}{2.9.6} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{1}{8} \cdot \frac{1.3}{2.4.6} x^{7:2} \cdot -x \\ = -\frac{1.3.5}{2.4.6.8} x^{9:2} = E$$

$$\frac{m-4n}{5n} EQ = -\frac{7}{10} \cdot -\frac{1.3.5}{2.4.6.8} x^{9:2} \cdot -x \\ = -\frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10} x^{11:2} \&c. \text{ in infin.}$$

Habemus adeo $y dx = x^{1:2} dx - \frac{1}{2} x^{3:2} dx - \frac{1}{2.4} x^{5:2} dx - \frac{1.3}{2.4.6} x^{7:2} dx - \frac{1.3.5}{2.4.6.8} x^{9:2} dx - \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10} x^{11:2} dx \&c. \text{ in infin.}$

Hinc $\int y dx = \frac{2}{3} x^{3:2} - \frac{1}{5} x^{5:2} - \frac{1}{4.7} x^{7:2} - \frac{1.3}{4.6.9} x^{9:2} - \frac{1.3.5}{4.6.8.11} x^{11:2} \&c. \text{ in infin.} = \sqrt{x} \left(\frac{2}{3} x - \frac{1}{5} x^2 - \frac{1}{4.7} x^3 - \frac{1.3}{4.6.9} x^4 - \frac{1.3.5}{4.6.8.11} x^5 - \frac{1.3.5.7}{4.6.8.10.13} x^6 \&c. \text{ in infinit.} \right) = \sqrt{x} \left(\frac{2}{3} x - \frac{1}{5} x^2 - \frac{1}{2.8} x^3 - \frac{1}{7.2} x^4 - \frac{1}{7.0.4} x^5 - \frac{1}{16.6.4} x^6 \&c. \text{ in infin.} \right)$

Hæc nempe series exhibet quadraturam indeterminatam segmenti AMP.

Aliter.

Quoniam si radius circuli $= I$, $CP = x$, $PM = y$ (Tab. I. Fig. 3. §. 377. part. I.) $y = \sqrt{(I - x^2)} \& \sqrt{(I - x^2)} = I - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{16} x^6 - \frac{1}{128} x^8 - \frac{1}{256} x^{10} \&c. \text{ in infinit.}$ erit (§. 98 part. I.)

$$y dx = dx - \frac{1}{2} x^2 dx - \frac{1}{8} x^4 dx - \frac{1}{16} x^6 dx - \frac{1}{128} x^8 dx - \frac{1}{256} x^{10} dx - \&c. \text{ in infin.}$$

$$\int y dx = x - \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{40} x^5 - \frac{1}{112} x^7 - \frac{1}{1152} x^9 - \frac{1}{2816} x^{11} \&c. \text{ in infinit.}$$

Quando x radio CA æqualis evadit spatium $DCPM$ degenerat in quadrantem. Substituta itaque I pro x ; erit quadrans $I - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \frac{1}{1152} - \frac{1}{2816} \&c. \text{ in infinit.}$ quæ eadem series integræ circuli aream metitur, si diameter fuerit I .

Quodsi

Quodsi progressum in infinitum perspicere lubet, multiplicatio ut ante tantummodo indicanda, dum $\sqrt{(1-x^2)}$ in seriem resolvitur.

$$\text{Ita nimirum prodibit } y = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2.4}x^4 - \frac{1.3}{2.4.6}x^6 - \frac{1.3.5}{2.4.6.8}x^8 - \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10}x^{10} \text{ \&c. in infinit.}$$

$$ydx = dx - \frac{1}{2}x^2 dx - \frac{1}{2.4}x^4 dx - \frac{1.3}{2.4.6}x^6 dx - \frac{1.3.5}{2.4.6.8}x^8 dx - \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10}x^{10} dx \text{ \&c.}$$

$$\int ydx = x - \frac{1}{2.3}x^3 - \frac{1}{2.4.5}x^5 - \frac{1.3}{2.4.6.7}x^7 - \frac{1.3.5}{2.4.6.8.9}x^9 - \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10.11}x^{11} \text{ \&c. in infin.}$$

Dicatur terminus primus A, secundus B, tertius C, quartus D, quintus E &c. erit $A = x$

$$B = -\frac{1}{2.3}x^3 = -\frac{1.1}{2.3}Ax$$

$$C = -\frac{1}{2.4.5}x^5 = -\frac{1.3}{2.3.4.5}x^5 = -\frac{1.3}{4.5}Bx$$

$$D = -\frac{1.3}{2.4.6.7}x^7 = -\frac{1.3.5}{2.3.4.5.6.7}x^7 = -\frac{3.5}{6.7}Cx^2$$

$$E = -\frac{1.3.5}{2.4.6.8.9}x^9 = \frac{1.3.5.7}{2.3.4.5.6.7.8.9}x^9 = -\frac{5.7}{8.9}Dx^2$$

&c. *Aliter.*

Tab. II. Fig. 20. Sit tangens arcus dimidii $GB = x$, radius $BC = 1$; erit tangens integri seu dupli $KB = 2x : (1 - xx)$ (§. 327. part. I.)

$$\text{§. 269 } \textit{Geom.} \text{) } BG : BC = KG : KC$$

$$x : 1 = \frac{x+x^3}{1-xx} : \frac{1+x^2}{1-xx}$$

$$\text{Est enim } KG = 2x : (1 - xx) - x = (2x - x + xx) : (1 - xx) = (x + x^2) : (1 - xx)$$

Porro (§. 268 *Geom.*)

$$KC : KB = MC : PM$$

$$\frac{1+x^2}{1-x^2} : \frac{2x}{1-x^2} = 1 : \frac{tx}{1+x^2}$$

$$KC : BC = MC : PC$$

$$\frac{1+x^2}{1-x^2} : 1 = 1 : \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$\text{Unde } PB = 1 - (1 - x^2) : (1 + x^2) = (1 + x^2 - 1 + x^2) : (1 + x^2) = 2x^2 : (1 + x^2).$$

$$\text{Hinc differentiando eruitur } Pp = MR = (x4dx + 4x^3dx - 4x^3dx) : (1 + x^2)^2 = 4x dx : (1 + x^2)^2 \text{ \& } mR = (2dx + 2x^2 dx - 4x^2 dx) : (1 + x^2)^2 = (2dx - 2x^2 dx) : (1 + x^2)^2.$$

$$\text{Ob } MR^2 + mR^2 = Mm^2 \text{ (§. 417 } \textit{Geom.}) \text{ habetur } Mm^2 = 16x^2 dx^2 : (1 + x^2)^4 + (4dx^2 - 8x^2 dx^2 + 4x^4 dx^2) : (1 + x^2)^4 = (4dx^2 + 8x^2 dx^2 + 4x^4 dx^2) : (1 + x^2)^4 \text{ \& } Mm = (2dx + 2x^2 dx) : (1 + x^2)^2 = 2dx : (1 + x^2).$$

$$\text{Denique } Mm \cdot \frac{1}{2}MC = dx : (1 + x^2). \text{ Ut sector hic infinite parvus } MCm \text{ seu elementum sectoris } BCM, \text{ cujus dimidii tangens } x, \text{ summetur; resolvi debet } 1 : (1 + x^2) \text{ in seriem (§. 45. part. I.): quo facto reperitur } dx : (1 + x^2) = dx - x^2 dx + x^4 - x^6 dx + x^8 dx - x^{10} dx \text{ \&c. adeoque } \int dx : (1 + x^2) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 - \frac{1}{11}x^{11} \text{ \&c. qua} \text{e series exprimit sectorem } BCM, \text{ ita ut arcus dimidii tangens } GB = x.$$

$$\text{Quando arcus integer } BM \text{ in quadrantem degenerat; tangens dimidii } BG \text{ fit radius aequalis (§. 32. } \textit{Trig.}). \text{ Si ergo pro } x \text{ substituaturs } 1, \text{ series } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ \&c. in infinit. quadrantem circuli exprimit. Immo totam aream emetitur, si } 1 \text{ denotet diametrum circuli.}$$

$$\text{Brevius.}$$

$$\text{Quando arcus integer } BM \text{ in quadrantem degenerat; tangens dimidii } BG \text{ fit radius aequalis (§. 32. } \textit{Trig.}). \text{ Si ergo pro } x \text{ substituaturs } 1, \text{ series } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ \&c. in infinit. quadrantem circuli exprimit. Immo totam aream emetitur, si } 1 \text{ denotet diametrum circuli.}$$

$$\text{Brevius.}$$

$$\text{Quando arcus integer } BM \text{ in quadrantem degenerat; tangens dimidii } BG \text{ fit radius aequalis (§. 32. } \textit{Trig.}). \text{ Si ergo pro } x \text{ substituaturs } 1, \text{ series } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ \&c. in infinit. quadrantem circuli exprimit. Immo totam aream emetitur, si } 1 \text{ denotet diametrum circuli.}$$

$$\text{Brevius.}$$

$$\text{Quando arcus integer } BM \text{ in quadrantem degenerat; tangens dimidii } BG \text{ fit radius aequalis (§. 32. } \textit{Trig.}). \text{ Si ergo pro } x \text{ substituaturs } 1, \text{ series } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ \&c. in infinit. quadrantem circuli exprimit. Immo totam aream emetitur, si } 1 \text{ denotet diametrum circuli.}$$

$$\text{Brevius.}$$

$$\text{Quando arcus integer } BM \text{ in quadrantem degenerat; tangens dimidii } BG \text{ fit radius aequalis (§. 32. } \textit{Trig.}). \text{ Si ergo pro } x \text{ substituaturs } 1, \text{ series } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \text{ \&c. in infinit. quadrantem circuli exprimit. Immo totam aream emetitur, si } 1 \text{ denotet diametrum circuli.}$$

$$\text{Brevius.}$$

Brevius.

Tab. II. Fig. 20. Sit tangens KB = x, BC = 1 & secans CA alteri CK infinite propinqua ductusque arcus KL radio CK; erit AK = dx, KC = √(1+x²) (§. 417. Geom). Jam cum anguli ad B & L sint recti (§. 78.) & ob angulum infinite parvum KCL angulus BKC = KAC (§. 239. Geom. & §. 3. *Analys. infinit.*); erit (§. 267. Geom.)

$$KC : BC = KA : KL$$

$$\sqrt{(1+x^2)} : 1 = dx : \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)}}$$

Porro (§. 137. 412. Geom.)

$$CK : KL = CM : mM$$

$$\sqrt{(1+x^2)} : \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)}} = 1 : \frac{dx}{1+x^2}$$

Sector igitur CMm = ½ dx : (1+x²) = ½ (dx - x²dx + x⁴dx - x⁶dx + x⁸dx - x¹⁰dx &c). Unde per summationem eruitur sector BCM, cujus tangens KB = x, ½x - ⅙x³ + ⅒x⁵ - ⅓x⁷ + ⅕x⁹ - ⅗x¹¹ &c. in infinit. adeoque si BM octans circuli seu arcus 45°, sector erit (§. 32. *Trigon.*) ½ - ⅙ + ⅒ - ⅓ + ⅕ - ⅗ &c. in infinit. Hujus adeo seriei duplum 1 - ⅓ + ⅓ - ⅓ + ⅓ - ⅓ &c. in infinitum est quadrans circuli, immo integra area si diameter = 1.

SCHOLIION.

125. Seriem primam invenit Newtonus, alteram Jacobus Gregorius, & in eandem incidit Leibnitiu ignorans dubio procul prodituram seriem Gregorianam, cum ex tangente quæreret aream. Neque enim putandum est quod inventum seriei, quam a Gregorio repertam non ignorabit, etsi publice non constaret, sibi attribuerit absque ulla ratione vir probati alias condoris. Sed nullum est dubium quin i. geniosissimus Leibnitiu

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

methodo ab iis diversa, quas ego proposui, ad suam pervenerit. Cum enim methodum priorem, in quam incideram ante annos complures, amico percontanti, unde constet, (quod Leibnitiu in actis Eruditorum asseruerat) fdx : (1+x²) dependere a quadratura circuli & quomodo inde eruatur series Leibnitiu pro circulo 1 - ⅓ + ⅓ - ⅓ &c. responsum, judicio Leibnitiu submissem, eam equidem non improbat, monuit tamen, totum negotium brevius absolvi posse: unde etiam factum est, ut postea de breviori cogitarem.

PROBLEMA XL.

126. Ellipsin Apollonianam qua Tab. I. Fig. 10.

Sit AC = a, GC = c, PC = x; erit (§. 432. part. I.)

$$y^2 = c^2 (a^2 - x^2) : a^2$$

$$y = c\sqrt{(a^2 - x^2)} : a$$

$$\text{Est vero } \sqrt{(a^2 - x^2)} = a - \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3}$$

$$- \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} - \frac{7x^{10}}{256a^9} \&c. \text{ in infin.}$$

$$(\text{§. 81. part. I.}). \text{ Ergo } ydx = cdx - \frac{cx^2dx}{2a^2} - \frac{cx^4dx}{8a^4} - \frac{cx^6dx}{16a^6} - \frac{5cx^8dx}{128a^8}$$

$$- \frac{7cx^{10}dx}{256a^{10}} \&c. \text{ in infinit. consequenter}$$

$$\int ydx = cx - \frac{cx^3}{6a^2} - \frac{cx^5}{40a^4} - \frac{cx^7}{112a^6} - \frac{5cx^9}{1152a^8}$$

$$- \frac{7cx^{11}}{2816a^{10}} \&c. \text{ in infinit.}$$

Quodsi pro x ponatur a; erit quadrans ellipsis ac - ⅓ac - ⅓ac - ⅓ac - ⅓ac - ⅓ac - ⅓ac &c. in infinitum: quæ eadem series integram ellipsis aream exhibet, si a axem integrum denotet.

Aliter.

Tab. II. Quoniam elementum Ellipseos est
 Fig. 23. $cdx\sqrt{(a^2-x^2)} : a$; erit ECLR = $\frac{c}{a} \int dx$
 $\sqrt{(a^2-x^2)}$. Sed $\int dx \sqrt{(a^2-x^2)} =$
 DCLK (§. 124). Est itaque $a : c =$
 DCLK : ECLR, hoc est, area circularis
 DCLK est ad Ellipticam ECLR ut axis
 major AB (quæ est diameter circuli)
 ad minorem 2CE (§. 124). Pendet adeo
 quadratura ellipseos a quadratura cir-
 culi.

COROLLARIUM I.

127. Si fiat $rac = 1$, erit area ellipsis
 $= 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \frac{1}{1152} - \frac{1}{2816}$
 &c. in infinitum. Patet adeo ellipsin esse cir-
 culo æqualem, cujus diameter est media pro-
 portionalis inter axes ellipsis conjugatos (§.
 124.)

COROLLARIUM II.

128. Est ergo ellipsis ad circulum, cujus
 diameter axi majori æqualis, ut ac ad a^2 (§.
 408 Geom.), hoc est, ut c ad a (§. 124 part.
 1), seu ut axis minor ad majorem: quod
 idem de segmentis indefinitis ostendimus ana-
 lytice in resolutione.

COROLLARIUM III.

129. Data circuli quadratura dabitur etiam
 quadratura ellipsis & contra.

SCHOLIUM.

130. Quamvis circuli integri quadratura
 finita hætenus dari non potuerit, varias ta-
 men ejus portiones quadrarunt Geometra. Pri-
 mam quadraturam partialem alicujus lunula
 dedit jam olim Hippocrates Chius, ex mer-
 catore naufrago Geometra factus. Sit AEB se-
 micirculus & GC = BG. Describatur radio
 BC quadrans AFB; erit AEBFA Lunula Hip-
 pocratis. Quoniam $BC^2 = 2GB^2$ (§. 417.
 Geom.); erit quadrans AFBC semicirculo AEB
 æqualis (§. 408 Geom.). Ablato igitur utrin-
 que segmento communi AFBA; erit AEBFA =
 $\Delta ACB = GB^2$.

Tab. II.
 Fig. 21.

PROBLEMA XLII.

131. Cycloidem quadrare.

Quoniam TP = PM (§. 52): erunt in
 Δ PMT anguli M & T æquales (§. 184
 Geom.), adeoque TPQ = 2M. (§. 239
 Geom.). Est vero anguli APQ mensura
 arcus dimidius AP (§. 291. & 314 Geom.) Tab. I.
 & idem metitur angulum TPA (§. 322. Fig 7.
 Geom.). Ergo APQ = TPA (§. 142
 Geom.). Sed TPQ = TPA + APQ
 = 2APQ = 2TMP per demonstrata. Er-
 go APQ = TMP = MmS ob parallelas
 MP & mq (§. 255 Geom.). Quamobrem
 cum ad S & Q sint recti per constr.;
 erit (§. 267 Geom.)

$$AQ : QP = MS : Sm$$

Sit jam $AQ = x$, $AB = 1$, erit MS
 $= dx$, $PQ = \sqrt{(x-xx)}$ (§. 377. part.
 1.) & $mS = dx\sqrt{(x-xx)} : x$. Reper-
 imus autem supra (§. 124.) $\sqrt{(x-xx)}$
 $= x^{1/2} - \frac{1}{2}x^{3/2} - \frac{1}{8}x^{5/2} - \frac{1}{16}x^{7/2}$ &c.
 in infinitum. Ergo $dx\sqrt{(x-xx)} : x =$
 (quoniam ob divisionem per x factam
 numeratores exponentium duabus uni-
 tatibus minuuntur, §. 54 part. 1.) $x^{-1/2}$
 $dx - \frac{1}{2}x^{1/2} dx - \frac{1}{8}x^{3/2} dx - \frac{1}{16}x^{5/2} dx$
 &c. in infinitum, cujus summa $2x^{1/2} -$
 $\frac{1}{2}x^{3/2} - \frac{1}{20}x^{5/2} - \frac{1}{42}x^{7/2}$ &c. in infinitum,
 est semiordinata cycloidis QM ad axem
 AB relatæ. Hinc QM. dx seu elementum
 QMSq spatii cycloidici AMQ = $2x^{1/2} dx$
 $- \frac{1}{2}x^{3/2} dx - \frac{1}{20}x^{5/2} dx - \frac{1}{56}x^{7/2} dx$ &c.
 in infinitum: cujus summa = $\frac{4}{3}x^{3/2} -$
 $\frac{2}{15}x^{5/2} - \frac{1}{70}x^{7/2} - \frac{1}{252}x^{9/2}$ &c. in infinit.
 exprimit segmentum cycloidis AMQ.

Quodsi $mS = gG = dx\sqrt{(x-xx)} : x$
 ducatur in $GM = AQ = x$, reperie-
 tur elementum GMHg areae AMG =
 $dx\sqrt{(x-xx)}$: quod cum idem sit cum ele-
 mentu-

mento segmenti circuli APQ (§. 124), erit spatium AMG segmento circuli APQ, consequenter area ADC semicirculo APB æqualis.

COROLLARIUM.

132. Quoniam CB semiperipheriæ circuli æquatur (§. 574. part. 1.) si ea = p & AB = a; erit rectangulum BCDA = ap (§. 375 Geom.) & semicirculus APB, adeoque & spatium cycloïdicum externum ADC = $\frac{1}{4}ap$ (§. 406. Geom.). Ergo area semicycloïdis ACB = $\frac{3}{4}ap$ (& AMCBPA = $\frac{1}{2}ap$) consequenter area cycloïdis est circuli genitoris tripla.

PROBLEMA XLIII.

133. Cissoïdem Dioclis quadrare.

Quoniam $y^2 = x^3 : (2 - x)$, si I diameter circuli genitoris (§. 548 part. 1.); erit

$y = x\sqrt{x} : \sqrt{(1 - x)} = x^{3/2} (1 - x)^{-1/2}$
 Extrahatur ergo ex I: $\sqrt{(1 - x)}$ actu radix per theorema generale (§. 98 part. 1.) in quo erit $m = -1$, $n = 2$, $P = 1$, $Q = -x$ & hinc
 $Pm^n = 1 = A$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot -x = \frac{1}{2}x = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1x}{2} \cdot -x = \frac{1 \cdot 3x^2}{2 \cdot 4} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{5}{6} \cdot \frac{1 \cdot 3x^2}{2 \cdot 4} \cdot -x = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^3}{2 \cdot 4 \cdot 6} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{7}{8} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot -x = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7x^4}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}$$

&c. in infinitum.

Unde $ydx = x^{3/2} (1 - x)^{-1/2} dx =$

$$x^{3/2} dx + \frac{1}{2} x^{5/2} dx + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^{7/2} dx +$$

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^{9/2} dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} x^{11/2} dx \text{ \&c. cu-}$$

jus summa $\frac{2}{5} x^{5/2} + \frac{1}{7} x^{7/2} + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 9} x^{9/2} +$

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 8} x^{11/2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} x^{13/2} \text{ \&c. in in-}$$

finitum = $\sqrt{x} (\frac{2}{5} x^2 + \frac{1}{7} x^3 + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 9} x^4 +$

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 8} x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} x^6 \text{ \&c. in infini-}$$

tum) exprimit spatium APM.

Aliter.

Sit AP = x, PN = v, PM = y, AB = a; Tab. II. erit (§. 548 part. 1.) Fig. 22.

$$ay^2 - xy^2 = x^3$$

$$2aydy - 2xydy - y^2dx = 3x^2dx$$

$$2(a-x)dy - ydx = 3x^2dx : y$$

Quoniam (§. 547 part. 1.) $x^2 = vy$; erit $x^2 : y = v$. Fiat præterea $a - x = PB = z$: habebimus

$$2zdy - ydx = 3vdx$$

$$2\int zdy - \int ydx = 3\int vdx$$

Est vero vdx elementum circuli PNnp; $\int zdy$ ob $z = PB = OM$ & $dy = mR = oO$ elementum $mMOo$ areæ AMOB & ydx elementum $PMmp$ areæ AMP. Jam quando $\int zdy$ integram aream intra cissoïdem AI & ejus asymptotum BH exhibet, etiam $\int ydx$ est eadem area, adeoque $\int ydx = \int zdy$, consequenter $2\int zdy - \int ydx = \int zdy$. Quare cum in eodem casu $\int vdx$ semicirculum producat ANB; erit ob $\int zdy = 3\int vdx$ totum spatium cissoïdale in infinitum protensum semicirculi genitoris ANB triplum.

PROBLEMA XLIV.

134. Quadrare Logisticam seu Logarithmicam.

Sit subtangens PT = a (§. 54.), Tab. I. PM = y, Pp = dx; erit (§. cit.) Fig. 8.

$$ydx : dy = a$$

$$ydx = ady$$

$$\int ydx = ay$$

Spatium ergo interminatum HPMI aequatur rectangulo ex PM in PT.

COROLLARIUM I.

135. Sit $QS = z$; erit spatium interminatum ISQH $= az$, consequenter SMPQ $= ay - az = a(y - z)$, hoc est, spatium inter duas logisticæ semiordinatas interceptum æquatur rectangulo ex subtangente in differentiam semiordinatarum.

COROLLARIUM II.

136. Est itaque spatium BAPM ad spatium PMSQ ut differentia semiordinatarum AB & PM ad differentiam semiordinatarum PM & SQ (§. præc. & §. 124. part. I.).

PROBLEMA XLV.

137. Quadrare spirales.

Tab. I. Fig. 6. Sint omnia ut in problemate 8. (§. 50.); erit arcus $EG = ydx : a$, qui ductus in $\frac{1}{2} AG$ producit sectorem infinite parvum $GAE = y^2 dx : 2a$ (§. 435. *Geom.*). Est autem pro spirali Archimæda.

$$\frac{ax = by}{a^2 x^2 : b^2 = y^2}$$

$$\frac{y^2 dx : 2a = ax^2 dx : 2b^2}{\int y^2 dx : 2a = ax^3 : 6b^2}$$

Quodsi pro arcu x ponatur integra peripheria b ; erit spatium spirale integrum $\frac{1}{6} ab$. Similiter pro infinitis spiraliibus ad circulum relatis (§. 572. part. I.).

$$\frac{a^m x^n = b^n y^m}{a^m x^n : b^n = y^m}$$

$$\frac{ax^{n:m} : b^{n:m} = y}{a^2 x^{2n:m} : b^{2n:m} = y^2}$$

$$\frac{y^2 dx : 2a = ax^{2n:m} dx : 2b^{2n:m}}{\int y^2 dx : 2a = max^{2n+m:m} : (4n+2m)b^{2n:m}}$$

Quare si pro x ponatur integra peripheria circuli b , prodibit pro spatiis spiraliibus integris $mab^{2n:m+1} : (4n+2m)b^{2n:m} = mab : (4n+2m)$.

Quodsi ponamus arcum BC esse ad CF ut abscissa ad semiordinatam in curva aliqua algebraica, eodem modo reperitur spatium spirale. Sit enim e. gr. BC ad CF ut abscissa parabolæ ad semiordinatam, erit (sumto r pro parametro)

$$\frac{rx = a^2 - 2ay + yy}{dx = (2ydy - 2ady) : r}$$

$$\frac{y^2 dx : 2a = (y^3 dy - ay^2 dy) : ar}{\int y^2 dx : 2a = y^4 : 4ar - y^3 : 3r}$$

Nec absimili modo invenitur spatium inter arcum BC & spiralem BF comprehensum cujus elementum est trapezium CFID $= (CD + FI) \frac{1}{2} IC$ (§. 400. *Geom.*). Est vero $CD = dx$, $FI = ydx : a$, $FC = a - y$, adeoque CFID $= (dx + ydx : a) \frac{1}{2} (a - y) = (a^2 dx - y^2 dx) : 2a$.

Si jam spiralis sit parabolica pro dx substituatur valor ipsius $(2ydy - 2ady) : r$; erit elementum speciale $(ay^2 dy + a^2 ydy - y^3 dy - a^3 dy) : ar$, cujus summa $y^3 : 3r + ay^2 : 2r - y^4 : 4ar - a^2 y : r$ est spatium quaesitum BFC.

PROBLEMA XLVI.

138. Quadrare Conchoidem Nicomedis.

Tab. I. Fig. 5. Sit $AP = x$, $PM = y$, $BC = b$, $AB = a$ & OQ ad PM perpendicularis: erit $PB = OQ = a - x$, $PC = a + b - x$. Quoniam OQ & BA perpendiculares ad PM per hypoth. erunt inter se parallelæ (§. 256. *Geom.*), consequenter (§. 268. *Geom.*).

PC

PC : PM = OQ : OM

$a + b - x : y = a - x : OM$

& hinc $OM = y(a - x) : (a + b - x)$

adeoque $OM^2 = y^2(a - x)^2 : (a + b - x)^2$.

Porro $OQ^2 = (a - x)^2$ & $QM^2 = AB$. (§. 352 part. 1.) = a^2 . Quare (§. 417 Geom.)

$a^2 = a^2 - 2ax + x^2 + \frac{y^2(a - x)^2}{(a + b - x)^2}$

$$2ax - x^2 = y^2(a - x)^2 : (a + b - x)^2$$

$$\sqrt{(2ax - x^2)} = y(a - x) : (a + b - x)$$

$$y = \frac{a + b - x}{a - x} \sqrt{(2ax - x^2)}$$

Habemus itaque elementum areae

$PpMm = ydx = \frac{a + b - x}{a - x} dx \sqrt{(2ax - x^2)}$

nec alia re opus est, quam ut $\sqrt{(2ax - x^2)}$

resolvatur in seriem (§. 98 part. 1.), series hæc porro ducatur in $a + b - x$ &

factum tandem dividatur per $a - x$. Ita enim obtinetur series, quæ singulis ter-

minis in dx ductis exprimit elementum

areae atque eodem, quo ante, modo

summatur. Ne calculus perplexus tyrones

turbet, sumamus casum simplicissimum, in quo est $b = a$, adeoque $a + b$

$= 2a$, & ne $\sqrt{2}$ tories sit scribenda, ponamus $2a = c$, ut sit $a = \frac{1}{2}c$: erit

$ydx = \frac{c - x}{\frac{1}{2}c - x} dx \sqrt{(cx - x^2)}$. Est autem

$\sqrt{(cx - x^2)}$ semiordinata circuli, cujus

diameter c , atque adeo coincidit resolutio in seriem cum ea, quam dedimus

paulo ante (§. 124), nisi quod ibidem supposterimus $c = 1$. Quoniam tamen

hic consultius est c retineri & in resolutione in gratiam operationum sequentium

quædam notanda sunt; ideo non incon-

sultum ducimus vi theorematis *Newtoniani* (§. 98. part. 1.) resolutionem ipsam instituire. Erit itaque

$m = 1, n = 2, P = cx,$

$Q = -x^2 : cx = -x : c = -c^{-1}x$ (§. 54. 55 part. 1.)

adeoque

$p^n : n = c^{1:2} x^{1:2} = A$

$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} c^{1:2} x^{1:2} \cdot -c^{-1}x = -\frac{1}{2} c^{-1} x^{3:2} = B$

$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot -\frac{1}{2} c^{-1:2} x^{3:2} \cdot -c^{-1}x = -\frac{1}{8} c^{-3:2} x^{5:2} = C$

$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{3}{6} \cdot -\frac{1}{8} c^{-3:2} x^{5:2} \cdot -c^{-1}x = -\frac{1}{16} c^{-5:2} x^{7:2} = D$

$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{8} \cdot -\frac{1}{16} c^{-5:2} x^{7:2} \cdot -c^{-1}x = -\frac{5}{128} c^{-7:2} x^{9:2} \&c.$

Est itaque $\sqrt{(cx - x^2)} = c^{\frac{1}{2}} x^{1:2} -$

$\frac{1}{2} c^{-1:2} x^{3:2} - \frac{1}{8} c^{-3:2} x^{5:2} - \frac{1}{16} c^{-5:2} x^{7:2}$

$- \frac{5}{128} c^{-7:2} x^{9:2} \&c.$ in infinitum.

Quodsi hanc seriem multiplices per $c - x$,

prodibit $(c - x) \sqrt{(cx - x^2)} = 2c^{1:2} x^{1:2}$

$+ c^{-1:2} x^{3:2} + \frac{1}{4} c^{-3:2} x^{5:2} + \frac{1}{8} c^{-5:2} x^{7:2}$

$+ \frac{7 \cdot 5}{64} c^{-7:2} x^{9:2} \&c.$ in infinitum.

Multiplicatio & divisio modo ordinario

instituitur. Etenim si seriem multiplices

per c , prodit $c^{3:2} x^{1:2} - \frac{1}{2} c^{1:2} x^{3:2} -$

$\frac{1}{8} c^{-1:2} x^{5:2} - \frac{1}{16} c^{-3:2} x^{7:2} - \frac{5}{128} c^{-5:2} x^{9:2}$

$\&c.$ in infinit. Si porro eandem du-

cas in $-x$, prodit $-c^{1:2} x^{3:2} + \frac{1}{2} c^{-1:2} x^{5:2}$

$+ \frac{1}{8} c^{-3:2} x^{7:2} + \frac{1}{16} c^{-5:2} x^{9:2} \&c.$

Quodsi terminos homogeneos in unam

summam colligas, obtinetur series $c^{3:2}$

$x^{1:2} - \frac{3}{2} c^{1:2} x^{3:2} + \frac{3}{8} c^{-1:2} x^{5:2} + \frac{1}{16} c^{-3:2}$

$x^{7:2} + \frac{3}{128} c^{-5:2} x^{9:2} \&c.$ Hac porro di-

visa per $\frac{1}{2} c - x$ (§. 40. part. 1), prodit

quotus $2c^{1:2} x^{1:2} + c^{-1:2} x^{3:2}$

$+ \frac{1}{4} c^{-3:2} x^{5:2} + \frac{1}{8} c^{-5:2} x^{7:2} + \frac{7 \cdot 5}{64} c^{-7:2}$

$x^{9:2} \&c.$

Est adeo elementum areae Conchoidis

$$2c^{1:2} x^{1:2} dx + c^{-1:2} x^{1:2} dx + \frac{1}{4} c^{-3:2} x^{3:2} dx + \frac{45}{8} c^{-5:2} x^{7:2} dx + \frac{723}{64} c^{-7:2} x^{9:2} dx \text{ \&c. in infinit.}$$

Quare area AMP = $\frac{2}{5} c^{1:2} x^{3:2} + \frac{2}{7} c^{-1:2} x^{5:2} + \frac{11}{14} c^{-3:2} x^{7:2} + \frac{5}{4} c^{-5:2} x^{9:2} + \frac{723}{352} c^{-7:2} x^{9:2} \text{ \&c. in infin.}$

PROBLEMA XLVII.

139. Invenire rationem, quam habent spatia curvilinea juxta axem eundem vel axes aequales descripta, semiordinatis correspondentibus rationem constantem habentibus.

Sit elementum spatii curvilinei unius = ydx . Quoniam ordinatae ad aequales partes axis continuo applicantur, per *hypoth.* erit elementum spatii alterius zdx , posita nempe semiordinata hujus z , abscissa communi x . Sed cum in singulis elementis eadem semper sit ratio ipsius y ad z , per *hypoth.* erit $fydx : fzdax = ydx : zdx$ (§. 187. *Arithm.*) = $y : z$ (§. 181. *Arithm.*).

Theorema Spatia curvilinea aequae alta habent rationem basium, quibus insistant, si

femiordinatae correspondentes fuerint in ratione constante.

COROLLARIUM I.

140. Quare si ARB fuerit semiellipsis; Tab. II. AKB semicirculus & KL ad AB perpendicularis; erit KL ad RL in ratione constante DC ad EC (§. 598. *part. I.*), adeoque segmentum circulare BKL ad segmentum ellipticum BRL ut KL ad RL.

COROLLARIUM II.

141. Quodsi ex foco F ducantur rectae FR & FK, erunt quoque triangula FKL & FRL ut KL ad RL (§. 389. *Geom.*). Quamobrem sector circularis BFK est ad sectorem ellipticum BFR ut KL ad RL (§. 187. *Arithm.*). Cum itaque KL : RL = CD : CE (§. 598. *part. I.*) & ut CD ad CE ita circulus integer ad ellipsin integram (§. 124); erit quoque sector KFB ad sectorem RFB ut circulus ad ellipsin (§. 167. *Arithm.*), consequenter ut sector KFB ad aream integri circuli, ita sector RFB ad integram ellipsis aream (§. 173. *Arithm.*).

SCHOLIUM.

142. Quoniam sectores ex arcuum elementis derivantur; de iis quadrandis agemus capite sequente, ubi arcuum rectificatio docetur.

CAPUT III.

De usu Calculi integralis in Rectificatione Curvarum.

DEFINITIO VII.

143. **R**ectificatio curvae est inventio rectae, cui aequalis est linea curva.

COROLLARIUM.

144. Cum linea curva concipiatur con-

stare ex innumeris lineolis rectis infinite exiguis; si una earum inveniatur per calculum differentialem, summa dabit longitudinem curvae. Nimirum cum ex superioribus constet, esse $MR = dx$, $mR = dy$ (§. 20.); erit Mm seu elementum curvae $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ (§. 417. *Geom.*). Quodsi itaque ex aequatione differentiali ad curvam specialem substituat

Tab. I. Fig. 2.

fituatur valor vel ipsius dx^2 , vel ipsius dy^2 ; habetur elementum speciale: quod integratum prodit longitudinem curvæ.

SCHOLIUM.

145. Interdum elementum curvæ commodius ex circumstantiis specialibus eruitur, prout exempla mox afferenda loquentur.

PROBLEMA XLVIII.

146. Parabolam rectificare, Pro parabola $adx = 2ydy$ (§. 21.)

$$\frac{a^2 dx^2 = 4y^2 dy^2}{dx^2 = 4y^2 dy^2 : a^2}$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \sqrt{(dy^2 + 4y^2 dy^2 : a^2)} = dy \sqrt{(aa + 4yy) : a}$$

Ut hoc elementum curvæ integrabile fiat, resolvatur in seriem infinitam (§. 99. part. 1.); erit in theoremate generali

$$n=2, m=1, P = a^2, Q = 4y^2 : a^2$$

$$Pm:n = a = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} a \cdot 4y^2 : a^2 = 2y^2 : a = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{2y^2}{a} \cdot \frac{4y^2}{a^2} = -\frac{2y^4}{a^3} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{3}{6} \cdot -\frac{2y^4}{a^3} \cdot \frac{4y^2}{a^2} = \frac{4y^6}{a^5} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{4y^6}{a^5} \cdot \frac{4y^2}{a^2} = -\frac{10y^8}{a^7} \text{ \&c.}$$

in infinitum.

Quare $dy \sqrt{(aa + 4yy) : a} = dy + \frac{2y^2 dy}{a^2} - \frac{2y^4 dy}{a^4} + \frac{4y^6 dy}{a^6} - \frac{10y^8 dy}{a^8} \text{ \&c.}$

cujus integrale $y + \frac{2y^3}{3a^2} - \frac{2y^5}{5a^4} + \frac{4y^7}{7a^6}$

$-\frac{10y^9}{9a^8} \text{ \&c.}$ in infinitum exprimit arcum parabolicum.

COROLLARIUM I.

Tab. II. 147. Sint AC & DC semiaxes conjugati Fig. 24. hyperbolæ æquilatæræ; erit $AC = DC = a$

(§. 505. part. 1.). Sit $CQ = MP = 2y$; erit (§. 534. part. 1.) $QM = \sqrt{(4yy + aa)}$. Quod si qm intelligatur ipsi QM infinite propinquus; erit $Qq = dy$, adeoque elementum aræ $CQMA = dy \sqrt{(aa + 4yy)}$. Pendet itaque rectificatio parabolæ à quadratura spatii hyperbolici $CQMA$.

COROLLARIUM II.

148. Sit AMR parabola, cujus parameter AC , & circa communem axem descripta hyperbola æquilatera ANT , cujus axis $2CA$. Si fiat $CQ = AV = QN = 2PM$ & rectangulum $CORA$ spatio curvilineo $CQNA$ æquale; erit AR æqualis arcui AM (§. 146. 147.), consequenter $RV = AM - 2PM$, seu differentia inter ordinatam & arcum respondentem, & $ORVQ = VNA$.

Tab. IV. Fig. 48.

SCHOLIUM.

149. Probe notandum est, omnes summationes reduci ad quadraturas curvarum, quocunque in casu iisdem utamur. Unde ut sint perfectæ, in omnibus observanda est regula supra tractata de quadraturis (§. 109.).

PROBLEMA XLIX.

150. Rectificare parabolam secundi generis, ad quam $ax^2 = y^3$, seu sumto $a = 1, x^2 = y^3$.

Quoniam $x^2 = y^3$

erit $2xdx = 3y^2 dy$

$$\frac{4x^2 dx^2 = 9y dy^2}{4x^2 dx^2 = 9y dy^2}$$

$$\frac{dx^2 = 9y^4 dy^2 : 4x^2 = 9y dy^2 : 4y^3 = \frac{9}{4} y dy^2}{dx^2 = 9y^4 dy^2 : 4x^2 = 9y dy^2 : 4y^3 = \frac{9}{4} y dy^2}$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \sqrt{(\frac{9}{4} y dy^2 + dy^2)} = \frac{1}{2} \sqrt{(9y dy^2 + 4dy^2)} = \frac{1}{2} dy \sqrt{(9y + 4)}$$

Ut elementum integrabile reddatur, fiat

$$\frac{\sqrt{(9y + 4)} = v}{\sqrt{(9y + 4)} = v}$$

erit $9y + a = v^2$

$$\frac{9dy = 2v dv}{9dy = 2v dv}$$

$$\frac{\frac{1}{2} dy \sqrt{(9y + 4)} = \frac{1}{2} v^2 dv}{\frac{1}{2} dy \sqrt{(9y + 4)} = \frac{1}{2} v^2 dv}$$

$$\int \frac{1}{2} dy \sqrt{(9y + 4)} = \frac{1}{2} v^2 dv = \frac{1}{2} (9y + 4) \sqrt{(9y + 4)}$$

Ut

Ut vero summa exprimat longitudinem arcus, fiat $y = 0$; erit residuum $= \frac{4}{27} \sqrt{4} = \frac{8}{27}$: adeoque arcus $\frac{1}{27}(9y \mp 4) \sqrt{(9y \mp 4)} = \frac{8}{27}$ (§. 109).

COROLLARIUM.

Tab. II.
Fig. 19.

151. Sit parameter parabola Apolloniae r , $AP = 1$, $PQ = \frac{2}{4}y$, erit $AQ = \frac{2}{4}y \mp 1$ & ob parametrum r , $QN^2 = \frac{2}{4}y \mp 1 = (9y \mp 4) : 4$ (§. 388 part. 1.), consequenter $QN = \frac{1}{2} \sqrt{(9y \mp 4)}$. Est adeo elementum $QNNq$ spatii parabolici $PMNQ = \frac{1}{2} dy \sqrt{(9y \mp 4)}$: quod divisum per r sive parametrum dat elementum arcus parabola secundi generis, ad quam $ax^2 = y^3$. Pendet adeo rectificatio a quadratura parabola Apollonianae: quae cum dari possit (§. 103), mirum non est, illam quoque rectificabilem esse.

PROBLEMA L.

152. Infinitas parabolas rectificare.

Si parameter $= 1$, pro infinitis parabolis (§. 519 part. 1.)

$$\begin{aligned} y^m &= x \\ m y^{m-1} dy &= dx \\ m^2 y^{2m-2} dy^2 &= dx^2 \end{aligned}$$

h. e. si brevitatis gratia fiat $2m - 2 = r$
 $m^2 y^r dy^2 = dx^2$

$$\sqrt{(dx^2 \mp dy^2)} = \sqrt{(m^2 y^r dy^2 \mp dy^2)} = dy \sqrt{(m^2 y^r \mp 1)}$$

Ut elementum integrabile reddatur, ex $m^2 y^r \mp 1$ extrahenda est radix per theorema generale (§. 99. part. 1.); in quo erit

$$\begin{aligned} m &= 1, n = 2, P = 1, Q = m^2 y^r \\ P^{n:m} &= 1 = A \end{aligned}$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} m^2 y^r = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} m^2 y^r \cdot m^2 y^r = -$$

$$\frac{1}{2.4} m^4 y^{2r} = C$$

$$\frac{m-2n}{3^n} CQ = -\frac{3}{6} - \frac{1}{2.4} m^4 y^{2r} \cdot m^2 y^r = + \frac{1.3}{2.4.6} m^6 y^{3r} = D.$$

$$\frac{m-3n}{4^n} DQ = -\frac{5}{8} - \frac{1.3}{2.4.6} m^6 y^{3r} \cdot m^2 y^r = -\frac{1.3.5}{2.4.6.8} m^8 y^{4r} = E$$

$$\begin{aligned} \frac{m-4n}{5^n} EQ &= -\frac{7}{10} - \frac{1.3.5}{2.4.6.8} m^8 y^{4r} \cdot m^2 y^r \\ &= + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10} m^{10} y^{5r} \text{ \&c. in infinitum.} \end{aligned}$$

Habemus itaque $dy \sqrt{(1 \mp m^2 y^r)}$
 $= dy \mp \frac{1}{2} m^2 y^r dy - \frac{1}{2.4} m^4 y^{2r} dy + \frac{1.3}{2.4.6}$

$$m^6 y^{3r} dy - \frac{1.3.5}{2.4.6.8} m^8 y^{4r} dy \mp \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10} m^{10} y^{5r} dy \text{ \&c. in infinit.}$$

cujus integrale $y \mp \frac{1}{2(r+1)} m^2 y^{r+1} - \frac{1}{2.4(2r+1)} m^4 y^{2r+1}$

$$+ \frac{1}{2.4.6(3r+1)} m^6 y^{3r+1} - \frac{1.3.5}{2.4.6.8(4r+1)}$$

$$m^8 y^{4r+1} + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10(5r+1)} m^{10} y^{5r+1}.$$

&c. in infinitum indefinite exprimit arcum parabolicum cujuscunque generis.

Quodsi pro r substituatur valor ipsius $2m - 2$; prodibit idem arcus

$$= y + \frac{1}{2(2m-1)} m^2 y^{2m-1} - \frac{1}{2.4(4m-3)}$$

$$m^4 y^{4m-3} + \frac{1.3}{2.4.6(6m-5)} m^6 y^{6m-5}$$

$$- \frac{1.3.5}{2.4.6.8(8m-7)} m^8 y^{8m-7} \mp \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.10(10m-9)}$$

$m^{10} y^{10m-9}$ &c. in infinitum.

PROBLEMA LI.

152. Dato sinu PQ arcus AP inveni- Tab. I.
re arcum AP. Fig. 7.

Sit radius AI = 1, PQ = y, AQ = x; erit (§. 377. part. 1.)

$$\frac{2x - xx = yy}{2dx - 2xdx = 2ydy}$$

$$\frac{dx = ydy : (1 - x)}{dx^2 = y^2 dy^2 : (1 - 2x + xx) = y^2 dy^2 : (1 - y^2)}$$

$$\frac{dx^2 + dy^2 = \frac{y^2 dy^2}{1 - y^2} + dy^2}{= (y^2 dy^2 + dy^2 - y^2 dy^2) : (1 - y^2) = dy^2 : (1 - y^2)}$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dy : \sqrt{1 - y^2} = dy (1 - y^2)^{-1/2}$$

Resolvatur hoc elementum in seriem infinitam per extractionem radices vi theorematis generalis (§. 99 part. I), in quo erit

$$m = -1, n = 2, P = 1, Q = -y^2$$

$$P^{m:n} = 1 = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot -y^2 = \frac{1}{2} y^2 = B$$

$$\frac{m - n}{2n} BQ = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} y^2 \cdot -y^2 = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} y^4 = C$$

$$\frac{m - 2n}{3n} CQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} y^4 \cdot -y^2 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} y^6 = D$$

$$\frac{m - 3n}{4n} DQ = -\frac{7}{8} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} y^6 \cdot -y^2 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} y^8 \text{ \&c. in infin.}$$

$$\text{Est adeo } dy : \sqrt{(1 - y^2)} = dy + \frac{1}{2} y^2 dy + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} y^4 dy + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} y^6 dy + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} y^8 dy \text{ \&c.}$$

in infinitum, cujus integrale $y + \frac{1}{2} y^3$

$$+ \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} y^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} y^7 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} y^9 \text{ \&c.}$$

est arcus AP, cujus sinus PQ = y, sinu toto existente 1. Si terminus primus dicatur A, secundus B, tertius C, quartus D &c. & secundus multiplicetur per $\frac{1}{2}$, tertius per $\frac{3}{4}$, quartus per $\frac{3 \cdot 5}{3 \cdot 5}$ quintus per

$$\frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{3 \cdot 5 \cdot 7} \text{ \&c. cum sit}$$

$$A = y$$

$$B = \frac{1}{2 \cdot 3} y^3 = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} A y^2$$

Wolfii Oper. Mathem. Tom. I.

$$C = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} y^5 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} y^5 = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 5} B y^2$$

$$D = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} y^7 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} y^7 = \frac{5 \cdot 5}{6 \cdot 7} C y^2$$

$$E = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} y^9 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9} y^9 = \frac{7 \cdot 7}{8 \cdot 9} D y^2$$

series inventa in hanc degenerat: $y + \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3}$

$$A y^2 + \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 5} B y^2 + \frac{5 \cdot 5}{6 \cdot 7} C y^2 + \frac{7 \cdot 7}{8 \cdot 9} D y^2 \text{ \&c.}$$

Si Cofinus QI = x; erit (§. 417. Geom.) PQ = $\sqrt{(1 - xx)}$. Sit pq ipsi PQ infinite propinqua & PO ad pq perpendicularis: cum anguli Q & q sint recti per hyp. PO = Qq = dx & $\Delta\Delta$ pOP atque PQI rectangula. Quare cum OPQ sit rectus (§. 230 Geom.) & pPI itidem rectus (§. 38.); erit etiam pPO = IPQ (§. 91. Arithm.), consequenter (§. 267. Geom.)

$$PQ : PI = PO : Pp$$

$$\sqrt{(1 - xx)} : 1 = dx : \frac{dx}{\sqrt{(1 - xx)}}$$

Cum adeo hoc elementum coincidat cum anteriore, evidens est, si in serie anteriore pro y substituatur x, prodire seriem pro arcu, qui est illius complementum ad 90°.

COROLLARIUM I.

154. Quoniam elementum arcus Mm = $dy : \sqrt{(1 - y^2)}$, si MC = 1, PM = y (§. 143); Tab. II. erit sector elementaris MCM = $dy : 2\sqrt{(1 - y^2)}$ Fig. 20. (§. 415. Geom.), consequenter sector BCM = $\frac{1}{2} f dy : \sqrt{(1 - y^2)} = \frac{1}{2} y + \frac{1}{3} y^3 + \frac{3}{4 \cdot 5} y^5 + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 7} y^7 + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} y^9 \text{ \&c. in infinit.}$

M m m Co-

COROLLARIUM II.

155. Quodsi $MC = 1, PC = y$, erit denuo $Mm = dy: \sqrt{1 - y^2}$ (§. 153), consequenter & $MCm = dy: 2\sqrt{1 - y^2}$: Summa vero exhibet sectorem MCO.

COROLLARIUM III.

156. Si fiat $y = 1$, sector BCM vel MCO degenerat in quadrantem, qui adeo erit $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4.5} + \frac{1.3.5}{4.6.7} + \frac{1.3.5.7}{4.6.8.9}$ &c. sive $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2.0} + \frac{1}{3.0} + \frac{1}{3.7.6}$ &c. in infinitum. Eadem series integrum circulum exprimit, si fuerit diameter = 1.

PROBLEMA LII.

Tab. I. 157. Dato sinu verso AQ invenire Fig. 7. arcum AP.

Sit $AQ = x$, diameter $AB = 1$, erit $QP = \sqrt{(x - xx)}$ (§. 377 part. I.) & vi probl. præc. $Pp = dx: 2\sqrt{(x - xx)} = \frac{1}{2}dx (x - xx)^{-1:2}$. Cum adeo sit in theoremate generali (§. 99 part. I.) $m = -1, n = 2, P = x, Q = -x$; erit,

$$Pm:n = x^{-1:2} = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} x^{-1:2}, -x = -\frac{1}{2} x^{1:2} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{3}{4} \frac{1}{2} x^{1:2}, -x = \frac{1.3}{2.4} x^{3:2} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{5}{6} \frac{1.3}{2.4} x^{3:2}, -x = \frac{1.3.5}{2.4.6} x^{5:2} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{7}{8} \frac{1.3.5}{2.4.6} x^{5:2}, -x = \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8} x^{7:2}$$

&c. in infinitum.

Hinc $\frac{1}{2}dx: \sqrt{(x - xx)} = \frac{1}{2}x^{-1:2} dx + \frac{1}{4}x^{1:2} dx + \frac{1.3}{4.4}x^{3:2} dx + \frac{1.3.5}{4.4.6}x^{5:2} dx + \frac{1.3.5.7}{4.4.6.8}x^{7:2} dx$ &c. in infinitum, cujus integrale $x^{1:2} + \frac{1}{2.3}x^{3:2}$.

$+ \frac{1.3}{2.4.5}x^{5:2} + \frac{1.3.5}{2.4.6.7}x^{7:2} + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.9}x^{9:2}$ &c. in infinitum, seu $\sqrt{x}(1 + \frac{1}{2.3}x + \frac{1.3}{2.4.5}x^2 + \frac{1.3.5}{2.4.6.7}x^3 + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.9}x^4$ &c. in infinitum) exprimit arcum AP, quia $x^{1:2} = \sqrt{x}$.

PROBLEMA LIII.

158. Data tangente BK invenire ar- Tab. II. cum BM. Fig. 20

Sit tangens $BK = x$, radius $EC = 1$, erit $Mm = dx: (1 + x^2) = dx - x^2 dx + x^4 dx - x^6 dx + x^8 dx - x^{10} dx$ &c. in infinitum (§. 124). Hujus seriei summa $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 - \frac{1}{11}x^{11}$ &c. in infinitum dat arcum BM.

Cum tangens 45° sit radio æqualis (§. 32. Trigon.) si pro x ponatur 1; prodibit arcus 45° seu dimidius quadrans $\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11}$ &c. in infinitum, quæ eadem series quadranti satisfacit, si diameter = 1.

PROBLEMA LIV.

160. Dato arcu BM invenire si- Tab. II. num PM. Fig. 20

Sit sinus $PM = y$, radius $BC = 1$, arcus $BM = v$; erit $v = y + \frac{1}{6}y^3 + \frac{3}{40}y^5$ &c. in infinitum (§. 156). Valor ipse y invenietur extrahendo radicem ex $y + \frac{1}{6}y^3 + \frac{3}{40}y^5$ &c. in infinitum. Est nimirum in theoremate generali (§. 366. part. I.) $a = 1, c = \frac{1}{6}, e = \frac{3}{40}$ &c. adeoque

$$v : a = v$$

$$-acv^3 : a^3 = -\frac{1}{6}v^3$$

$$+ (3a^2c^2 - a^3e)v^5 : a^9 = (\frac{3}{36} - \frac{3}{40})v^5$$

$$= (\frac{1}{12} - \frac{3}{40})v^5$$

$$= \frac{40-36}{12.40}v^5$$

$$= \frac{4}{12.40}v^5 = \frac{1}{120}v^5$$

Hinc

Hinc $y = v - \frac{1}{6}v^3 + \frac{1}{120}v^5 \&c.$ in infinitum $= \frac{1}{1}v - \frac{1}{1.2.3}v^3 + \frac{1}{1.2.3.4.5}v^5 \&c.$ in infinitum : unde lex progressionis manifesta est. Nimirum $y = v - \frac{1}{1.2.3}v^3 + \frac{1}{1.2.3.4.5}v^5 + \frac{1}{1.2.3.4.5.6.7}v^7 - \frac{1}{1.2.3.4.5.6.7.8.9}v^9 \&c.$

Quodsi theorema generale supponere non libet, reperietur valor ipsius y eodem modo, quo (§. 366 part. I.) theorema generale investigavimus. Sit nempe

$$y = av + bv^3 + cv^5 + dv^7 + \&c.$$

erit (§. 95. part. I.)

$$y^3 = a^3v^3 + 3a^2bv^5 + 3ab^2v^7 + \&c.$$

$$+ 3a^2cv^7 + \&c.$$

$$y^5 = a^5v^5 + 5a^4bv^7 + \&c.$$

$$y^7 = a^7v^7 + \&c.$$

Habemus itaque

$$y = av + bv^3 + cv^5 + dv^7 \&c.$$

$$\frac{1}{6}y^3 = \frac{1}{6}a^3v^3 + \frac{1}{2}a^2bv^5 + \frac{1}{2}ab^2v^7 + \frac{1}{2}a^2cv^7 \&c.$$

$$\frac{3}{40}y^5 = \frac{3}{40}a^5v^5 + \frac{3}{8}a^4bv^7 + \&c.$$

$$\frac{5}{112}y^7 = \frac{5}{112}a^7v^7 + \&c.$$

$$a - 1 = 0 \quad b + \frac{1}{6} = 0$$

$$a = 1 \quad b = -\frac{1}{6}$$

$$c + \frac{1}{2}a^2b + \frac{3}{40}a^5 = 0$$

h.e. $c - \frac{1}{12} + \frac{3}{40} = 0$

$$c = \frac{1}{12} - \frac{3}{40} = \frac{40 - 36}{12 \cdot 40} = \frac{1}{120}$$

$$d + \frac{1}{2}ab^2 + \frac{1}{2}a^2c + \frac{3}{8}a^4b + \frac{5}{112}a^7 = 0$$

h.e. $d + \frac{1}{72} + \frac{1}{240} - \frac{1}{16} + \frac{5}{112} = 0$

feu $d + \frac{1}{50} = 0$

$$d = -\frac{1}{50}$$

Nimirum $\frac{1}{72} + \frac{1}{240} = \frac{13}{720} - \frac{1}{16} = -\frac{2}{45}$

tandem $\frac{1}{50} - \frac{2}{45} = \frac{1}{5040}$

Habemus itaque ut ante $y = v - \frac{1}{6}v^3 + \frac{1}{120}v^5 - \frac{1}{5040}v^7 \&c.$ in infin.

PROBLEMA LV.

161. Dato arcu BM invenire tangentem BK. Tab. II. Fig. 20.

Sit tangens = x , radius = 1, arcus = v ; erit (§. 158.) $v = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 - \frac{1}{11}x^{11} \&c.$ Unde eodem modo, quo in problemate præcedente, reperitur $x = v^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{5}v^{\frac{2}{3}} + \frac{1}{7}v^{\frac{3}{3}} \&c.$ (§. 366. part. I).

Est nimirum vi theorematis generalis

$$x = \frac{v}{a} + \frac{2b^2 - ac}{a^5} v^3 + \frac{14b^4 + 6a^2bd - 21ab^2c + 3a^2c^2 - a^3e}{a^9} \&c.$$

Jam vero $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}, d = 0, e = \frac{1}{5}$ per legem comparationis, adeoque

$$3a^2c^2 - a^3e = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{ac}{a^5} = -\frac{1}{5} \quad \text{h. e. } \frac{3}{5} - e = \frac{1}{5}$$

$$c = \frac{1}{5} \quad e = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$= \frac{5 - 3}{5} = \frac{2}{5}$$

Quare $x = v + \frac{1}{5}v^3 + \frac{2}{5}v^5 \&c.$

Potest etiam valor ipsius x eodem modo inveniri, quo in problemate præcedente.

Ponamus nempe $x = av + bv^3 + cv^5 + dv^7 \&c. = 0$; erit (§. 95 part. I)

$$x^3 = a^3v^3 + 3a^2bv^5 + 3ab^2v^7 + 3a^2cv^7 + \&c.$$

$$x^5 = a^5v^5 + 5a^4bv^7 + \&c.$$

$$x^7 = a^7v^7 + \&c.$$

Habemus adeo ob

$$x - \frac{1}{5}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{5}x^7 \&c. = v$$

Mmm 2 -v

$$\begin{aligned}
 -v &= -v \\
 x &= av + bv^3 + cv^5 + dv^7 \&c. \\
 -\frac{1}{3}x^3 &= -\frac{1}{3}a^3v^3 - a^2bv^5 - ab^2v^7 \&c. \\
 +\frac{1}{3} & \qquad \qquad \qquad -a^2cv^7 \\
 +\frac{1}{3}x^5 &= +\frac{1}{3}a^5v^5 + a^4bv^7 \&c. \\
 -\frac{1}{7}x^7 &= \qquad \qquad \qquad -\frac{1}{7}a^7v^7 \&c.
 \end{aligned}$$

Quamobrem

$$\begin{aligned}
 \frac{a-1=0}{a=1} \quad \frac{b-\frac{1}{3}=0}{b=\frac{1}{3}} \quad \frac{c-a^2b + \frac{1}{3}a^5=0}{c=b-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}} \\
 = \frac{5-3}{15} = \frac{2}{15} \\
 \frac{d-ab^2 - a^2c + a^4b - \frac{1}{7}a^7=0}{d-\frac{1}{9}-\frac{2}{15} + \frac{1}{3}-\frac{1}{7}=0} \\
 d = \frac{\frac{1}{9} + \frac{2}{15} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7}}{\frac{126 + 135 - 210}{945}} \\
 = \frac{51}{945} = \frac{17}{315}
 \end{aligned}$$

His ergo valoribus coefficientium a, b, c, d &c. in æquatione assumptitia $x = av + bv^3 + cv^5 + dv^7$ &c. substitutis, prodit $x = v + \frac{1}{3}v^3 + \frac{2}{15}v^5 + \frac{17}{315}v^7$ &c.

SCHOLIUM.

161. *Me non monente apparet, si plures termini desiderentur, assumptitiam quoque ex pluribus constandam esse.*

PROBLEMA LVI.

Tab. I. 163. *Dato arcu AP invenire sinum Fig. 7. versum AQ.*

Quodsi formulam desideres, quam *Newtonus* dedit (a); radius supponi debet 1. In formula superiori, quam pro arcu ex sinu verso eruimus (§. 157), diameter est 1. Quamobrem hæc prius eadem, qua supra usi sumus, methodo eruenda. Sit igitur $AI = 1$, $AQ = x$, erit $AB = 2$, $PQ = \sqrt{(2x - x^2)}$ & per demonstrata (§. 153)

$$\begin{aligned}
 PQ : PI = PO : Pp \\
 \sqrt{(2x - x^2)} : 1 = dx : Pp
 \end{aligned}$$

(a) In epistola ad *Leibnizium*, quæ legitur apud *Hallisium* Vol. III. Oper. f. 625.

consequenter $Pp = dx : \sqrt{(2x - x^2)} = dx (2x - x^2)^{-1/2}$ cumque sit (§. 99. part. I.)

$$m = -1, n = 2, P = 2x, Q = x^2, 2x = -\frac{1}{2}x, \text{erit}$$

$$P^{m:n} = (2x)^{-1/2} = \frac{x^{-1/2}}{\sqrt{2}} = A,$$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x^{-1/2}}{\sqrt{2}} \cdot -\frac{1}{2}x = + \frac{x^{1/2}}{4\sqrt{2}} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{3}{4} \cdot \frac{x^{1/2}}{4\sqrt{2}} \cdot -\frac{1}{2}x = + \frac{3x^{3/2}}{32\sqrt{2}} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{3x^{3/2}}{32\sqrt{2}} \cdot -\frac{1}{2}x = + \frac{5x^{5/2}}{128\sqrt{2}}$$

&c.

$$\text{Est itaque } Pp = \frac{x^{-1/2}dx}{\sqrt{2}} + \frac{x^{1/2}dx}{4\sqrt{2}} +$$

$$+ \frac{3x^{3/2}dx}{32\sqrt{2}} + \frac{5x^{5/2}dx}{128\sqrt{2}} \&c.$$

$$\text{adeoque arcus } AP = \frac{2x^{1/2}}{\sqrt{2}} + \frac{x^{3/2}}{6\sqrt{2}} + \frac{3x^{5/2}}{80\sqrt{2}}$$

$$+ \frac{5x^{7/2}}{448\sqrt{2}} \&c.$$

$$\text{Nam } \frac{x^{3/2}}{4\sqrt{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{2x^{3/2}}{3 \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{x^{3/2}}{6\sqrt{2}}$$

$$\frac{3x^{5/2}}{32\sqrt{2} \cdot \frac{5}{2}} = \frac{2 \cdot 3x^{5/2}}{5 \cdot 32\sqrt{2}} = \frac{3x^{5/2}}{80\sqrt{2}}$$

$$\frac{5x^{7/2}}{128\sqrt{2} \cdot \frac{7}{2}} = \frac{2 \cdot 5x^{7/2}}{128 \cdot 7\sqrt{2}} = \frac{5x^{7/2}}{448\sqrt{2}}$$

Sit jam $AP = v$,

$$\text{erit } v = \frac{2x^{1/2}}{\sqrt{2}} + \frac{x^{3/2}}{6\sqrt{2}} + \frac{3x^{5/2}}{80\sqrt{2}}$$

$$+ \frac{5x^{7/2}}{448\sqrt{2}} \&c.$$

adeoque

$$v^2 = \frac{4x}{2} + \frac{4x^2}{2 \cdot 6} + \frac{x^3}{2 \cdot 36} \&c.$$

$$+ \frac{4 \cdot 3x^2}{2 \cdot 80}$$

$$\text{hoc est, } v^2 = 2x + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{72}x^3$$

$$+ \frac{3}{40}x^2$$

Ponatur

Ponatur

$$\begin{aligned} x &= av^2 + bv^4 + cv^6 \text{ \&c.} \\ \text{erit } x^2 &= a^2v^4 + 2abv^6 \\ x^3 &= \quad \quad + a^3v^6 \end{aligned}$$

adeoque

$$\begin{aligned} 2x &= 2av^2 + 2bv^4 + 2cv^6 \text{ \&c.} \\ + \frac{1}{2}x^2 &= \quad + \frac{1}{2}a^2v^4 + \frac{2}{2}abv^6 \\ + \frac{1}{72}x^3 &= \quad \quad + \frac{1}{72}a^3v^6 \\ + \frac{1}{40}x^3 &= \quad \quad + \frac{3}{40}a^3v^6 \\ - v^2 &= -v^2 \end{aligned}$$

Quamobrem

$$\begin{aligned} \frac{2a - 1}{2a - 1} &= \frac{v}{v} & \frac{2b + \frac{1}{2}a^2}{2b - \frac{1}{3}a^2} &= \frac{0}{0} \\ a &= \frac{1}{2} & b &= -\frac{1}{6}a^2 = -\frac{1}{6.4} = -\frac{1}{24} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2c + \frac{2}{3}ab + \frac{1}{72}a^3 + \frac{3}{40}a^3 &= 0 \\ c &= -\frac{1}{3}ab - \frac{1}{144}a^3 - \frac{3}{80}a^3 \\ -\frac{1}{3}ab &= +\frac{1}{144} = +\frac{8}{144.8} \\ -\frac{1}{144}a^3 &= -\frac{1}{144.8} \\ -\frac{1}{3}ab - \frac{1}{144}a^3 &= \frac{7}{144.8} = \frac{7}{1152} \\ \frac{3a^3}{80} &= \frac{3}{80.8} = \frac{3}{640} \\ c &= \frac{4480 - 3456}{1152.640} = \frac{1024}{1152.640} \\ &= \frac{16}{1152.10} = \frac{1}{720} \end{aligned}$$

Est igitur $x = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{24}v^4 + \frac{1}{720}v^6 \text{ \&c.}$
 Enimvero $2 = 1.2, 24 = 1.2.3.4, 720 = 1.2.3.4.5.6.$ Quare $x = \frac{1}{1.2}v^2 - \frac{1}{1.2.3.4}v^4 + \frac{1}{1.2.3.4.5.6}v^6 \text{ \&c.}$ Quod si jam terminus primus dicatur A, secundus B, tertius C &c. erit $x = \frac{1}{1.2}v^2 - \frac{1}{3.4}Av^2 + \frac{1}{5.6}Bv^2 - \frac{1}{7.8}Cv^2 \text{ \&c.}$ in infinitum.

COROLLARIUM I.

164. Quoniam radius = 1, erit sinus complementi seu cosinus arcus $v = 1 - \frac{1}{1.2}v^2 + \frac{1}{1.2.3.4}v^4 - \frac{1}{1.2.3.4.5.6}v^6 + \frac{1}{1.2.3.4.5.6.7.8}v^8 \text{ \&c.}$

COROLLARIUM II.

165. Si $1 - \frac{1}{1.2}v^2 + \frac{1}{1.2.3.4}v^4$, sive $1 - \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{24}v^4$ praxi satisfacit pro sinu complementi arcus, & cosinus iste dicatur c; erit $c = 1 - \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{24}v^4$, consequenter $v = \sqrt{(6 + \sqrt{24c + 12})}$ (§. 143. part. 1).

PROBLEMA LVII.

166. Dato arcu BM invenire secantem KC. Tab. II. Fig. 20.

Sit BC = 1, arcus = v, erit KB = $v + \frac{1}{3}v^3 + \frac{1}{15}v^5 + \text{\&c.}$ (§. 161) adeoque $BC^2 = 1, KB^2 = v^2 + \frac{2}{3}v^4 + \frac{1}{9}v^6 + \frac{4}{15}v^8 \text{ \&c.}$ consequenter (§. 417. Geom.) $\frac{1}{9}v^6 + \frac{1}{15}v^8 = \frac{1}{45}v^6, KC^2 = 1 + v^2 + \frac{2}{3}v^4 + \frac{1}{45}v^6 \text{ \&c.}$ Quod si inde radix vulgari modo extrahatur, prodit KC = $1 + \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{24}v^4 + \frac{61}{720}v^6 \text{ \&c.}$ quemadmodum typus exempli ostendit.

$$1 + v^2 + \frac{2}{3}v^4 + \frac{1}{45}v^6 \text{ \&c.}$$

I

$$+ v^2 + \frac{2}{3}v^4 + \frac{1}{45}v^6 \text{ \&c.}$$

(2)

$$+ v^2 + \frac{1}{4}v^4$$

$$+ \frac{5}{12}v^4 + \frac{1}{45}v^6 \text{ \&c.}$$

(2 + v²)

$$+ \frac{5}{12}v^4 + \frac{1}{24}v^6 \text{ \&c.}$$

$$+ \frac{61}{720}v^6 \text{ \&c.}$$

(2 + v² + $\frac{5}{12}v^4$)

$$+ \frac{61}{720}v^6 \text{ \&c.}$$

&c. &c.

SCHOLIION.

167. Seriem pro sinu & sinu verso ex arcu, atque pro arcu ex iisdem determinando invenit Newtonus (l); seriem pro tangente & secante ex arcu, atque arcu ex tangente determinando, Jacobus Gregorius (m). Estimavit autem Leibnitius series istas Trigonometriam canonicam ad quantamcumque exactitudinem in numeris a Tabularum necessitate liberare.

Tab. I. PROBLEMA LVIII.
Fig. 7. 168. Rectificare cycloidem.

Sit $AQ = x$, $AB = 1$, erit $Qq = MS = dx$, $PQ = \sqrt{(1 - x^2)}$ (§. 377 part. I.) & hinc $AP = \int \sqrt{1 - x^2} dx = x^{1/2}$ (§. 417 Geom.), consequenter ob $\triangle APQ$ & MmS similitudinem supra demonstratam (§. 131).

$$AQ : AP = MS : Mm$$

$$x : x^{1/2} = dx : x^{-1/2} dx$$

Est ergo Mm differentiale arcus Cycloidici, $AM = \int x^{-1/2} dx$. Unde $\int x^{-1/2} dx = 2x^{1/2} = 2AP$ est arcus AM , seu arcus Cycloidis AM est chordæ arcus circuli genitoris ipsi respondentis AP duplus.

PROBLEMA LIX.

Tab. IV. 169. Data chorda arcus AP invenire arcum cognominem, quem subtendit.
Fig. 49. Sit $AB = 1$, $AP = x$: cum angulus APB sit rectus (§. 317. Geom.) erit $PB = \sqrt{(1 - x^2)}$ (§. 417 Geom.). Sit porro Ap ipsi AP infinite propinqua. Quoniam angulus $AQB = APB + PAp$ (§. 239. Geom.) & PAp , cujus mensura est $\frac{1}{2} Pp$ (§. 314. Geom.) infinite parvus; erit $AQB = APB$ (§. 4), consequenter rectus (§. 145 Geom.) Est igitur & $PQp = AQB$ (§. 156 Geom.) rectus (§. 145 Geom.) itidemque AQP

(l) Vide Commercium epistolicum D. Joh. Collins p. 40. 52.
(m) Ibidem p. 45.

rectus (§. 65. Geom. adeoque ipsi APQ æqualis (§. 145. Geom.) & hinc $AP = AQ$ (§. 253. 89. Geom.), consequenter QP differentiale chordæ AP (§. 6) = dx . Porro anguli PAB mensura est arcus dimidius PB & anguli QPp mensura $\frac{1}{2} pB$ (§. 314. Geom.): quare cum arcus PB & pB ob infinite parvum Pp sint æquales (§. 4.), erit angulus $PAB = QPp$ (§. 141. Geom.). Habemus itaque (§. 267. Geom.)

$$PB : AB = pQ : Pp$$

$$\sqrt{(1 - x^2)} : 1 = dx : Pp$$

adeoque $Pp = dx : \sqrt{(1 - x^2)}$ & hinc porro arcus $AP = \int dx : \sqrt{(1 - x^2)}$. Eadem igitur formula satisfacit arcui AP ex chorda cognomine determinando, quam supra invenimus pro eodem ex sinu PM determinando (§. 153), nimirum arcus $AP = x + \frac{1}{2.3} x^3 + \frac{1.3}{2.4.5} x^5 + \frac{1.3.5}{2.4.6.7} x^7 + \frac{1.3.5.7}{2.4.6.8.9} x^9$ &c. in infinitum.

Quodsi $PB = x$, erit $PQ = dx$ & $AP = \sqrt{(1 - x^2)}$, atque eodem prorsus modo reperitur arcus $PB = \int dx : \sqrt{(1 - x^2)}$, ut adeo eadem series satisfaciat utrique arcui AP & PB inveniendo.

PROBLEMA LX.

170. Data chorda arcus AP invenire segmentum circuli cognomine.

Sit diameter circuli $AB = 1$, chorda $AP = x$, erit per demonstrata in problemate præcedente $PB = \sqrt{(1 - x^2)}$ & $pQ = dx$, nec non $\triangle APB \sim \triangle PQp$: erit etiam (§. 267. Geom.)

$$PB : AP = pQ : PQ$$

$$\sqrt{(1 - x^2)} : x = dx : PQ$$

adeo-

adeoque $PQ = xdx : \sqrt{(1-x^2)}$, consequenter cum PQ haberi possit per arcu infinite parvo ex centro A radio AP descripto (§. 38), adeoque APQ pro sectore circulari, crit $APQ = x^2 dx : 2\sqrt{(1-x^2)}$ (§. 435 *Geom.*) $= \frac{1}{2} x^2 dx (1-x^2)^{-1:2}$.

Est vero $(1-x^2)^{-1:2}$ seu $I : \sqrt{(1-x^2)} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^6 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^8$ &c. (§. 153), adeoque

$APQ = \frac{1}{2}x^2 dx (1-x^2)^{-1:2} = \frac{1}{2}x^2 dx + \frac{1}{4}x^4 dx + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 4}x^6 dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 6}x^8 dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}x^{10} dx$ &c. in infinit:

Ergo segmentum circuli $AP = \frac{1}{2.3}x^3 + \frac{1}{4.5}x^5 + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 7}x^7 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 9}x^9 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 11}x^{11}$ &c. in infinitum.

PROBLEMA LXI.

Tab. IV. Fig. 49. 171. Dato arcu AP invenire chordam cognominem.

Sit diameter circuli $AB = I$, $AP = x$, erit arcus $AP = x + \frac{1}{2.3}x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}x^7$ &c. (§. 169.). Dicatur idem arcus v , erit $v = x + \frac{1}{2.3}x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5}x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}x^7$ &c. adeoque $AP = x = v - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}v^3 + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}v^5 - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}v^7 + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}v^9$ &c. in infinitum, ut supra (§. 160.).

Quodsi diameter dicatur d , non I . reperietur arcus $AP = x + \frac{1}{2 \cdot 3 d^2}x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 5 d^4}x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 d^6}x^7$ &c. & vicifim chorda $AP = v - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 d^2}v^3 + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4}v^5 - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6}v^7 + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 d^8}v^9$ &c. id quod calculus superiores repetenti apparet.

PROBLEMA LXII.

172. Rectificare arcum ellipsis GM.

Sit $CG = c$, $AC = a$, $PC = x$, $PM = y$, erit (§. 432 *part. 1*)

Tab. I. Fig. 10.

$$\begin{aligned} a^2 y^2 &= a^2 c^2 - c^2 x^2 \\ 2a^2 y dy &= -2c^2 x dx \\ a^4 y^2 dy^2 &= c^4 x^2 dx^2 \\ dy^2 &= \frac{c^4 x^2 dx^2}{a^4 y^2} = \frac{c^4 x^2 dx^2}{a^4 c^2 - a^2 c^2 x^2} = \frac{c^2 x^2 dx^2}{a^4 - a^2 x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 &= dx^2 + \frac{c^2 x^2 dx^2}{a^4 - a^2 x^2} \\ &= \frac{a^4 dx^2 - a^2 x^2 dx^2 + c^2 x^2 dx^2}{a^4 - a^2 x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(dx^2 + dy^2)} &= \frac{dx \sqrt{(a^4 - a^2 x^2 + c^2 x^2)}}{\sqrt{(a^4 - a^2 x^2)}} \\ &= \frac{dx \sqrt{(a^4 - a^2 x^2 + c^2 x^2)}}{a \sqrt{(a^2 - x^2)}} \end{aligned}$$

Ut elementum hoc integrabile reddatur, tam numerator $\sqrt{(a^4 - a^2 x^2 + c^2 x^2)}$, quam denominator $a \sqrt{(a^2 - x^2)}$, resolvendus est in seriem & series prior per posteriorem dividenda eo modo, quem mox subjiciemus. Est itaque (§. 99. *part. 1.*) in casu primo $m = 1, n = 2, P = a^4, Q = -(a^2 - c^2)x^2 : a^4$

Fiat:

Fiat $a^2 - c^2 = b^2$ ob commoditatem calculi, erit $Q = \frac{b^2 x^2}{a^4}$.

Unde porro obtinetur

$$P^{m:n} = a^2 = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} a^2 - \frac{b^2 x^2}{a^4} = \frac{b^2 x^2}{2a^4} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{b^2 x^2}{2a^4} - \frac{b^2 x^2}{a^4} = -\frac{b^4 x^4}{8a^6} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{1}{6} \cdot \frac{b^4 x^4}{8a^6} - \frac{b^2 x^2}{a^4} = -\frac{b^6 x^6}{16a^{10}} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{1}{8} \cdot \frac{b^6 x^6}{16a^{10}} - \frac{b^2 x^2}{a^4} = -\frac{5b^8 x^8}{128a^{14}} \text{ \&c.}$$

Est itaque $\sqrt{(a^4 - b^2 x^2)} = \sqrt{(a^4 - a^2 x^2 + c^2 x^2)} = a^2 - \frac{b^2 x^2}{2a^2} - \frac{b^4 x^4}{8a^6} - \frac{b^6 x^6}{16a^{10}} - \frac{5b^8 x^8}{128a^{14}}$
 &c. in infinitum = K

Enimvero $\sqrt{(a^2 - x^2)} = a - \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} - \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7}$ &c. in infin. (§. 126.)

Quare $a\sqrt{(a^2 - x^2)} = a^2 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{x^4}{8a^2} - \frac{x^6}{16a^4} - \frac{5x^8}{128a^6}$ &c. in infin. (§. 126) = L.

Seriem adeo primam K per alteram L divisurus probe observare debet omnes terminos in divisione emergentes in quibus x ad eandem dimensionem assurgit, haberi pro uno, cum pro coefficientibus omnibus simul sumtis substitui possit unus, qualis etiam in casu singulari revera prodiret, ubi a & b in numeris dantur, si fractiones ad eandem denominationem reductæ in unam summam colligerentur. Quamobrem terminus unusquisque dividendæ dividitur per a^2 , quotcunque partibus fuerit auctus in ipso divisionis actu, & integra series dividens ducitur in quotum atque a dividenda subtrahitur, quemadmodum in communi divisione fieri solet: id quod ex typo exempli subjecti attento lectori obvium.

	A.	B.	C.	D.	E.
K =	a^2	$\frac{b^2 x^2}{2a^2}$	$\frac{b^4 x^4}{8a^6}$	$\frac{b^6 x^6}{16a^{10}}$	$\frac{5b^8 x^8}{128a^{14}}$
L =	a^2	$-\frac{1}{2}x^2$	$-\frac{x^4}{8a^2}$	$-\frac{x^6}{16a^4}$	$-\frac{5x^8}{128a^6}$
Resid. I.	$\frac{b^2 x^2}{2a^2}$	$\frac{b^4 x^4}{8a^6}$	$\frac{b^6 x^6}{16a^{10}}$	$\frac{5b^8 x^8}{128a^{14}}$	
	$+\frac{1}{2}x^2$	$+\frac{x^4}{8a^2}$	$+\frac{x^6}{16a^4}$	$+\frac{5x^8}{128a^6}$	
L. B =	$-\frac{b^2 x^2}{2a^2}$	$+\frac{b^2 x^4}{4a^4}$	$+\frac{b^2 x^6}{16a^6}$	$+\frac{b^2 x^8}{32a^8}$	
	$+\frac{1}{2}x^2$	$-\frac{x^4}{2a^2}$	$-\frac{x^6}{16a^4}$	$-\frac{x^8}{132}$	
					$+\frac{35x^8}{128a^8}$
					Resid.

Resid. I I.

$$\begin{array}{r}
 -\frac{b^4x^4}{8a^6} - \frac{b^6x^6}{16a^{10}} - \frac{5b^8x^8}{128a^{14}} \\
 -\frac{b^2x^4}{4a^4} - \frac{b^2x^6}{16a^6} - \frac{b^2x^8}{32a^8} \\
 +\frac{3x^4}{8a^2} + \frac{x^6}{8a^4} + \frac{9x^8}{128a^6}
 \end{array}$$

L. C =

$$\begin{array}{r}
 -\frac{b^4x^4}{8a^6} + \frac{b^4x^6}{16a^8} + \frac{b^4x^8}{64a^{10}} \\
 -\frac{b^2x^4}{4a^4} + \frac{b^2x^6}{8a^6} + \frac{b^2x^8}{32a^8} \\
 +\frac{3x^4}{8a^2} - \frac{3x^6}{16a^4} - \frac{3x^8}{64a^6}
 \end{array}$$

Resid. III. =

$$\begin{array}{r}
 -\frac{b^6x^6}{16a^{10}} - \frac{5b^8x^8}{128a^{14}} \\
 -\frac{b^4x^6}{16a^8} - \frac{b^4x^8}{64a^{10}} \\
 -\frac{3b^2x^6}{16a^6} - \frac{b^2x^8}{16a^8} \\
 +\frac{5x^6}{16a^4} + \frac{15x^8}{128a^6}
 \end{array}$$

L. D =

$$\begin{array}{r}
 -\frac{b^6x^6}{16a^{10}} + \frac{b^6x^8}{32a^{12}} \\
 -\frac{b^4x^6}{16a^8} + \frac{b^4x^8}{32a^{10}} \\
 -\frac{3b^2x^6}{16a^6} + \frac{3b^2x^8}{32a^8} \\
 +\frac{5x^6}{16a^4} - \frac{5x^8}{32a^6}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -\frac{5b^2x^8}{128a^{14}} \\
 -\frac{b^6x^8}{32a^{12}} \\
 -\frac{3b^4x^8}{64a^{10}} \\
 -\frac{5b^2x^8}{32a^8} \\
 +\frac{35x^8}{128a^6}
 \end{array}$$

&c. &c.

Substituatur jam valor ipsius *b*. Quoniam

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 - c^2 \\ b^4 &= a^4 - 2a^2c^2 + c^4 \\ b^6 &= a^6 - 3a^4c^2 + 3a^2c^4 - c^6 \\ b^8 &= a^8 - 4a^6c^2 + 6a^4c^4 - 4a^2c^6 + c^8 \end{aligned}$$

erit

$$\begin{aligned} \frac{b^2x^2}{2a^4} &= \frac{x^2}{2a^2} + \frac{c^2x^2}{2a} \\ + \frac{x^2}{2a^2} &= + \frac{x^2}{2a^2} \\ \hline B &= + \frac{c^2x^2}{2a^4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{b^4x^4}{8a^8} &= \frac{x^4}{8a^4} + \frac{c^2x^4}{4a^6} - \frac{c^4x^4}{8a^8} \\ - \frac{b^2x^4}{4a^6} &= - \frac{x^4}{4a^4} + \frac{c^2x^4}{4a^6} \\ + \frac{3x^4}{8a^4} &= + \frac{3x^4}{8a^4} \\ \hline C &= + \frac{c^2x^4}{2a^6} - \frac{c^4x^4}{8a^8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{b^6x^6}{16a^{12}} &= \frac{x^6}{16a^6} + \frac{3c^2x^6}{16a^8} - \frac{3c^4x^6}{16a^{10}} \\ &\quad + \frac{c^6x^6}{16a^{12}} \\ - \frac{b^4x^6}{16a^{10}} &= - \frac{x^6}{16a^6} + \frac{c^2x^6}{8a^8} - \frac{c^4x^6}{16a^{10}} \\ - \frac{3b^2x^6}{16a^8} &= - \frac{3x^6}{16a^6} + \frac{3c^2x^6}{16a^8} \\ + \frac{5x^6}{16a^6} &= + \frac{5x^6}{16a^6} \\ \hline D &= + \frac{c^2x^6}{2a^8} - \frac{4c^4x^6}{16a^{10}} + \frac{c^6x^6}{16a^{12}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{5b^8x^8}{128a^{16}} &= \frac{5x^8}{128a^8} + \frac{5c^2x^8}{32a^{10}} - \frac{30c^4x^8}{128a^{12}} \\ &\quad + \frac{5c^6x^8}{32a^{14}} - \frac{5c^8x^8}{128a^{16}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{b^6x^8}{32a^{14}} &= \frac{x^8}{32a^8} + \frac{3c^2x^8}{32a^{10}} - \frac{3c^4x^8}{32a^{12}} \\ &\quad + \frac{c^6x^8}{32a^{14}} \\ - \frac{3b^4x^8}{64a^{12}} &= - \frac{3x^8}{64a^8} + \frac{3c^2x^8}{32a^{10}} - \frac{3c^4x^8}{64a^{12}} \\ - \frac{5b^2x^8}{32a^{10}} &= - \frac{5x^8}{32a^8} - \frac{5c^2x^8}{32a^{10}} \\ + \frac{55x^8}{128a^8} &= + \frac{55x^8}{128a^8} \end{aligned}$$

$$E = \frac{c^2x^8}{2a^{10}} - \frac{3c^4x^8}{8a^{12}} + \frac{3c^6x^8}{6a^{14}} - \frac{5c^8x^8}{128a^{16}}$$

Habemus itaque

$$\begin{aligned} A &= I \\ B &= \frac{c^2x^2}{2a^4} \\ C &= \frac{c^2x^4}{2a^6} - \frac{c^4x^4}{8a^8} \\ D &= \frac{c^2x^6}{2a^8} - \frac{c^4x^6}{4a^{10}} + \frac{c^6x^6}{16a^{12}} \\ E &= \frac{c^2x^8}{2a^{10}} - \frac{3c^4x^8}{8a^{12}} + \frac{3c^6x^8}{16a^{14}} - \frac{5c^8x^8}{128a^{16}} \end{aligned}$$

Quamobrem prolixo fatis calculo, quem tamen distincte hic explicari consultum fuit, ut sit exemplar in casibus similibus, tandem reperitur

$$\begin{aligned} \frac{V(a^2 - a^2x^2 + c^2x^2)}{aV(a^2 - x^2)} &= \\ I + \frac{c^2x^2}{2a^4} + \frac{c^2x^4}{2a^6} + \frac{c^2x^6}{2a^8} + \frac{c^2x^8}{2a^{10}} \&c. \\ &\quad - \frac{c^4x^4}{8a^8} - \frac{c^4x^6}{4a^{10}} - \frac{3c^4x^8}{8a^{12}} \\ &\quad + \frac{c^6x^6}{16a^{12}} + \frac{3c^6x^8}{16a^{14}} \\ &\quad - \frac{5c^8x^8}{128a^{16}} \end{aligned}$$

Est

Est igitur elementum arcus

$$\frac{dx \sqrt{a^4 - a^2 x^2 + c^2 x^2}}{a \sqrt{a^2 - x^2}} =$$

$$dx + \frac{c^2 x^2 dx}{2a^4} + \frac{c^2 x^4 dx}{2a^6} + \frac{c^2 x^6 dx}{2a^8} + \frac{c^2 x^8 dx}{2a^{10}}$$

$$- \frac{c^4 x^3 dx}{8a^8} - \frac{c^4 x^5 dx}{4a^{10}} - \frac{3c^4 x^7 dx}{8a^{12}}$$

$$+ \frac{c^6 x^6 dx}{16a^{12}} + \frac{3c^6 x^8 dx}{16a^{14}}$$

$$- \frac{5c^8 x^9 dx}{128a^{16}}$$

&c. in infinitum.

Tandem adeo arcus GM =

$$x + \frac{c^2 x^3}{6a^4} + \frac{c^2 x^5}{10a^6} + \frac{c^2 x^7}{14a^8} + \frac{c^2 x^9}{18a^{10}} \quad \&c.$$

$$- \frac{c^4 x^3}{40a^8} - \frac{c^4 x^5}{28a^{10}} - \frac{c^4 x^7}{24a^{12}}$$

$$+ \frac{c^6 x^7}{112a^{12}} + \frac{c^6 x^9}{48a^{14}}$$

$$- \frac{5c^8 x^9}{1152a^{16}}$$

Quodsi terminorum homogeneorum coefficientes reducatur ad eandem denominationem ; erit GM = $x + \frac{c^4 x^3}{6a^4}$

$$+ \frac{4a^2 c^2 - c^4}{40a^8} x^5 + \frac{8a^4 c^2 - 4a^2 c^4 + c^6}{112a^{12}} x^7$$

$$+ \frac{64a^5 c^2 - 48a^4 c^4 + 24a^2 c^6 - 5c^8}{1152a^{16}} x^9 \quad \&c.$$

COROLLARIUM I.

173. Quodsi ponamus esse GC : AC = 1 : m adeoque AC = mc ; erit GM = $x +$

$$\frac{1}{6m^4 c^2} x^3 + \frac{4m^2 - 1}{40m^8 c^4} x^5 + \frac{8m^4 - 4m^2 + 1}{112m^{12} c^6} x^7$$

$$+ \frac{64m^6 - 48m^4 + 24m^2 - 5}{1152m^{16} c^8} x^9 \quad \&c.$$

Quare si species ellipsis in casu dato determinetur , hoc est , m per numerum deter-

minatum explicetur ; prodibit series multo x simplicior. Sit enim m = 2 , erit GM =

$$x + \frac{1}{96c^2} x^3 + \frac{3}{2048c^4} x^5 + \frac{113}{458752c^6} x^7$$

$$+ \frac{3419}{75497412} x^9 \quad \&c.$$

COROLLARIUM II.

174. Quodsi c = a , ellipsis degenerat in circulum & series pro circulo evadit

$$x + \frac{x^3}{6a^2} + \frac{3x^5}{40a^4} + \frac{5x^7}{112a^6} + \frac{35x^9}{1152a^8} \quad \&c.$$

hoc est , si a = 1 , series = $x + \frac{1}{6} x^3 + \frac{3}{40} x^5 + \frac{5}{112} x^7 + \frac{35}{1152} x^9 \quad \&c.$ prorsus ut supra. (§. 153).

PROBLEMA LXIII.

175. Rectificare arcum hyperbolae Tab. II. Fig. 24.

Sit BC = AB = c , CQ = QM = x , dimidius axis conjugatus = a , CP = y , erit BP = y + c , AP = y - c

AP. PB = $y^2 - c^2$

Quare (§. 469. part. I.)

$$\frac{a^2 : c^2 = x^2 : y^2 - c^2}{a^2 y^2 - a^2 c^2 = c^2 x^2}$$

$$\frac{a^2 y^2 = a^2 c^2 + c^2 x^2}{2a^2 y dy = 2c^2 x dx}$$

$$\frac{a^4 y^2 dy^2 = c^4 x^2 dx^2}{h.c. a^4 c^2 dy^2 + a^2 c^2 x^2 dy^2 = c^4 x^2 dx^2}$$

$$\frac{a^4 dy^2 + a^2 x^2 dy^2 = c^2 x^2 dx^2}{dy^2 = \frac{c^2 x^2 dx^2}{a^4 + a^2 x^2}}$$

$$\frac{dx^2 + dy^2 = dx^2 + \frac{c^2 x^2 dx^2}{a^4 + a^2 x^2}}{= \frac{a^4 dx^2 + a^2 x^2 dx^2 + c^2 x^2 dx^2}{a^4 + a^2 x^2}}$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \frac{dx \sqrt{a^4 + a^2 x^2 + c^2 x^2}}{a \sqrt{a^2 + x^2}}$$

Elementum hoc nonnisi signis differt ab elemento ellipsis (§. 172). Quamobrem eodem prius modo, quo in problemate præcedente, reperitur elementum arcus $Mm =$

$$dx \mp \frac{c^2 x^2 dx}{2a^4} - \frac{c^2 x^4 dx}{2a^6} \mp \frac{c^2 x^6 dx}{2a^8} - \frac{c^2 x^8 dx}{2a^{10}} \&c.$$

$$- \frac{c^4 x^4 dx}{8a^8} \mp \frac{c^4 x^6 dx}{4a^{10}} - \frac{3c^4 x^8 dx}{8a^{12}}$$

$$\mp \frac{c^6 x^6 dx}{16a^{12}} - \frac{3c^6 x^8 dx}{16a^{14}}$$

$$- \frac{5c^8 x^8 dx}{128a^{16}}$$

Quare arcus $AM =$

$$x \mp \frac{c^2 x^3}{6a^4} - \frac{c^2 x^5}{10a^6} \mp \frac{c^2 x^7}{14a^8} - \frac{c^2 x^9}{18a^{10}} \&c.$$

$$- \frac{c^4 x^5}{40a^8} \mp \frac{c^4 x^7}{28a^{10}} - \frac{c^4 x^9}{24a^{12}}$$

$$\mp \frac{c^6 x^7}{112a^{12}} - \frac{c^6 x^9}{48a^{14}}$$

$$- \frac{5c^8 x^9}{1152a^{16}}$$

hoc est, reductione coefficientium in eodem termino ad eandem denominationem facta, $x + \frac{c, x^3}{6a^4} -$

$$\mp \frac{4a^2 c^2 - c^4}{40a^8} x^5 + \frac{8a^4 c^2 \mp 4a^2 c^4 \mp c^6}{112a^{12}} x^7$$

$$- \frac{64a^6 c^2 - 48a^4 c^4 - 24a^2 c^6 - 5c^8}{1152a^{16}} x^9 \&c.$$

Quodsi denuo hyperbolæ axes ponantur inter se ut 1 ad m , hoc est, si sit $a = mc$, reperietur arcus $AM = x$

$$\mp \frac{1}{6m^4 c^2} x^3 - \frac{4m^2 - 1}{40m^8 c^4} x^5 + \frac{8m^4 \mp 4m^2 \mp 1}{112m^{12} c^6} x^7$$

$$- \frac{64m^6 - 48m^4 - 24m^2 - 5}{1152m^{16} c^8} x^9 \&c$$

Et si species hyperbolæ determinetur, explicando m per numerum de-

terminatum 2, erit $AM = x + \frac{1}{96c^2} x^3$
 $- \frac{3}{1048c^4} x^5 + \frac{113}{458752c^6} x^7 - \frac{3419}{75497472c^8} x^9$
 $\&c.$

Series adeo pro arcu hyperbolico à serie pro arcu elliptico non differt nisi signis.

COROLLARIUM.

176. Si hyperbola fuerit æquilatera erit $c = a$ & series pro arcu AM multo simplicior evadit. Est nempe $= x \mp \frac{x^3}{6a^2} - \frac{3x^5}{40a^4}$

$$\mp \frac{13x^7}{112a^6} - \frac{105x^9}{1152a^8} \&c.$$

PROBLEMA LXVI.

177. *Rectificare Logarithmicam.* Tab. I. Sit curvæ subtangens $= a$, $PM = y$, Fig. 8. $Pp = dx$, erit (§. 54)

$$\frac{y dx}{dy} = a$$

$$y dx = a dy$$

$$dx = \frac{a dy}{y}$$

$$dx^2 = \frac{a^2 dy^2}{y^2}$$

$$dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 dy^2}{y^2} + dy^2$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dy \sqrt{\left(\frac{a^2}{y^2} + 1\right)}$$

Ut elementum hoc mM integrabile reddatur, ex $a^2 : y^2 + 1$ extrahenda est radix. Erit itaque in theoremate generali (§. 99. part. I.)

$$m = 1$$

$$m = 1, n = 2, 2P = \frac{a^2}{y^2}, Q = 1: \frac{a^2}{y^2} = \frac{y^2}{a^2}$$

$$P^{m:n} = \frac{a}{y} = A.$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{y} \cdot \frac{y^2}{a^2} = \frac{y}{2a} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{y}{2a} \cdot \frac{y^2}{a^2} = -\frac{y^3}{8a^3} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{3}{6} \cdot -\frac{y^3}{8a^3} \cdot \frac{y^2}{a^2} = \frac{y^5}{16a^5} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{y^5}{16a^5} \cdot \frac{y^2}{a^2} = -\frac{5y^7}{128a^7} \&c.$$

Est itaque $\sqrt{\left(\frac{a^2}{y^2} + 1\right)} = \frac{a}{y} + \frac{y}{2a} - \frac{y^3}{8a^3} + \frac{y^5}{16a^5} - \frac{5y^7}{128a^7} \&c.$ in infinitum.

Eadem series prodit, si ex $\sqrt{(a^2 + y^2)}$ extrahatur radix (§. cit.) &, quæ provenit, $a + \frac{y^2}{2a} - \frac{y^4}{8a^3} + \frac{y^6}{16a^5} - \frac{5y^8}{128a^7}$ porro dividatur per y . Habemus itaque elementum Mm arcus interminati $MI = \frac{a}{y} dy + \frac{y dy}{2a} - \frac{y^3 dy}{8a^3} + \frac{y^5 dy}{16a^5} - \frac{5y^7 dy}{128a^7} \&c.$

Quare arcus $MI = \int \frac{a dy}{y} + \frac{y^2}{4a} - \frac{y^4}{32a^3} + \frac{y^6}{96a^5} - \frac{5y^8}{1024a^7} \&c.$

Ponatur $SQ = z$, erit arcus interminatus $SI = \int \frac{a dz}{z} + \frac{z^2}{4a} - \frac{z^4}{32a^3} + \frac{z^6}{96a^5} - \frac{5z^8}{1024a^7} \&c.$

Est igitur arcus $MS = \int \frac{a dy}{y} - \int \frac{a dz}{z} + \frac{y^2 - z^2}{4a} - \frac{y^4 - z^4}{32a^3} + \frac{y^6 - z^6}{96a^5} - \frac{5y^8 - 5z^8}{1024a^7} \&c.$

$\int \frac{a dy}{y} - \int \frac{a dz}{z}$ est spatium hyperbo-

licum asymptoticum inter duas $a^2: y$ & $a^2: z$ comprehensum, & per a divisum (§. 118).

Est autem a latus potentiae hyperbolæ, y & z sunt abscissæ in asymptoto sumtæ (§. 488 part. I). Pendet adeo rectificatio curvæ logarithmicæ a quadratura hyperbolæ, quæ per series infinitas in superioribus data (§. 120).

Potest etiam alia adhuc ratione extrahi radix. Nimirum poni potest $P = 1$, $Q = \frac{a^2}{y^2} = a^2 y^{-2}$. Quare cum sit ut ante $m = 1$, $n = 2$; erit

$$P^{m:n} = 1 = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot a^2 y^{-2} = \frac{1}{2} a^2 y^{-2} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} a^2 y^{-2} \cdot a^2 y^{-2} = -\frac{1}{8} a^4 y^{-4} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{3}{6} \cdot -\frac{1}{8} a^4 y^{-4} \cdot a^2 y^{-2} = \frac{1}{16} a^6 y^{-6} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{16} a^6 y^{-6} \cdot a^2 y^{-2} = -\frac{5}{128} a^8 y^{-8} \&c.$$

Est igitur elementum curvæ $dy + \frac{1}{2} a^2 y^{-2} dy - \frac{1}{8} a^4 y^{-4} dy + \frac{1}{16} a^6 y^{-6} dy - \frac{5}{128} a^8 y^{-8} dy \&c.$ in infinitum.

Quare longitudo curvæ $= y - \frac{1}{2} a^2 y^{-1} + \frac{1}{24} a^4 y^{-3} - \frac{1}{80} a^6 y^{-5} + \frac{5}{896} a^8 y^{-7} \&c. = y - \frac{a^2}{2y} + \frac{a^4}{24y^3} - \frac{a^6}{80y^5} + \frac{5a^8}{896y^7} \&c.$

Sit jam alia semiordinata $SQ = z$, erit longitudo curvæ $= z - \frac{a^2}{2z} + \frac{a^4}{24z^3} - \frac{a^6}{80z^5} + \frac{5a^8}{896z^7} \&c.$

Ergo arcus inter semiordinatas y & z interceptus $MS = y - z = \frac{a^2}{2y} + \frac{a^2}{2z} + \frac{a^4}{24y^3} - \frac{a^4}{24z^3} - \frac{a^6}{80y^5} + \frac{a^6}{80z^5} + \frac{5a^8}{896y^7} - \frac{5a^8}{896z^7} \&c.$

COROLLARIUM.

178. Quoniam series istæ satisfaciunt quaesito, quatenus convergunt, & termini continuo minores fiunt (§. 53. part. 1), in Logarithmica autem y continuo fit minor, ita ut tandem infra subtangentem a decrescat; serie prima utendum est, si $a > y$; posteriori autem si $y > a$

PROBLEMA LXV.

179. Rectificare hyperbolam ex aequatione ad hyperbolam intra asymptotos.

Quoniam $xy = a^2$ (§. 488. part. I.), erit $y = a^2 : x = a^2 x^{-1}$

$$dy = -a^2 x^{-2} dx$$

$$dy^2 = a^4 x^{-4} dx^2$$

$$dy^2 + dx^2 = dx^2 + a^4 x^{-4} dx^2$$

$$\sqrt{dy^2 + dx^2} = dx \sqrt{1 + a^4 x^{-4}}$$

Elementum hoc arcus hyperbolici non multum differt ab elemento arcus logarithmicæ (§. 177).

Vi theorematis generalis (§. 99. part. I)

$$m = 1, n = 2, P = 1, Q = a^4 x^{-4}$$

$$P^{m:n} = 1 = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot a^4 x^{-4} = \frac{1}{2} a^4 x^{-4} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} a^4 x^{-4} \cdot a^4 x^{-4} = -\frac{1}{8} a^8 x^{-8} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{1}{6} \cdot -\frac{1}{2 \cdot 4} a^8 x^{-8} \cdot a^4 x^{-4} = \frac{1}{48} a^{12} x^{-12} = D$$

$$+ \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} a^{12} x^{-12} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{5}{8} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} a^{12} x^{-12} \cdot a^4 x^{-4} = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} a^{16} x^{-16} \&c.$$

Est igitur elementum curvæ $dx + \frac{1}{2} a^4 x^{-4} dx - \frac{1}{2 \cdot 4} a^8 x^{-8} dx + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6} a^{12} x^{-12} dx - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} a^{16} x^{-16} \&c.$ consequenter longitudo curvæ = $x - \frac{1}{2 \cdot 3} a^4 x^{-3} + \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 7} a^8 x^{-7} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 11} a^{12} x^{-11} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 15} a^{16} x^{-15} \&c. = x - \frac{a^4}{2 \cdot 3 x^3} + \frac{a^8}{2 \cdot 4 \cdot 7 x^7} - \frac{1 \cdot 3 \cdot a^{12}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 11 x^{11}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 a^{16}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 15 x^{15}} \&c.$ in infinitum.

Quodsi alia abscissa fit z ; erit longitudo curvæ $z - \frac{a^4}{2 \cdot 3 z^3} + \frac{a^8}{2 \cdot 4 \cdot 7 z^7} - \frac{1 \cdot 3 a^{12}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 11 z^{11}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 a^{16}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 15 z^{15}} \&c.$

Arcus igitur inter semiordinatas abscissis x & z respondentes interceptus = $x - z - \frac{a^4}{2 \cdot 3 x^3} + \frac{a^4}{2 \cdot 3 z^3} + \frac{a^8}{2 \cdot 4 \cdot 7 x^7} - \frac{a^8}{2 \cdot 4 \cdot 7 z^7} - \frac{1 \cdot 3 a^{12}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 11 x^{11}} + \frac{1 \cdot 3 a^{12}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 11 z^{11}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 a^{16}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 15 x^{15}} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 a^{16}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 15 z^{15}} \&c.$ in infinitum.

Eadem prorsus series prodit, si in elemento curvæ generali $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ substituatur valor ipsius dx^2 , ut elementum curvæ speciale evadat $dy \sqrt{1 + a^4 y^{-4}}$. Enimvero cum y continuo decrescat, nec unquam sit major latere potentiae a ; series hæc altera parum convergit.

Quod.

Quodsi a dicatur 1, erit series pro arcu intercepto $x = z - \frac{1}{2.3 x^3} + \frac{1}{2.3 z^3} + \frac{1}{2.4.7 x^7} - \frac{1}{2.4.7 z^7} - \frac{1.3}{2.4.6.11 x^{11}} + \frac{1.3}{2.4.6.11 z^{11}} + \frac{1.3.5}{2.4.6.8.15 x} - \frac{1.3.5}{2.4.6.8.15 z} &c. \text{ in infinitum} = x - z - \frac{1}{6x^3} + \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{56x^7} - \frac{1}{56z^7} - \frac{1}{176x^{11}} + \frac{1}{176z^{11}} + \frac{5}{1920x^{15}} - \frac{5}{1920z^{15}} &c. \text{ in infinitum.}$

PROBLEMA LXVI.

180. *Data area hyperbolae intra asymptotos, invenire abscissam eidem respondentem.*

Sit area hyperbolae $= t$, abscissa a fine lateris potentiae hyperbolae computata $= x$, erit (§. 120. part. I.)

$$t = x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{3}x^5 - \frac{1}{4}x^7 &c.$$

$$\text{Fiat } x = at + bt^2 + ct^3 + dt^4 &c.$$

$$\text{erit } x^2 = a^2t^2 + 2abt^3 + b^2t^4 + 2act^4$$

$$x^3 = a^3t^3 + 3a^2bt^4$$

$$x^4 = a^4t^4$$

adeoque

$$x = at + bt^2 + ct^3 + dt^4 &c.$$

$$-\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{2}a^2t^2 - abt^3 - \frac{1}{2}b^2t^4 - act^4$$

$$+\frac{1}{3}x^3 = +\frac{1}{3}a^3t^3 + a^2bt^4$$

$$-\frac{1}{4}x^4 = -\frac{1}{4}a^4t^4$$

$$-t = -t$$

Habemus itaque

$$a - 1 = 0 \quad b - \frac{1}{2}a^2 = 0$$

$$a = 1 \quad b = \frac{1}{2}$$

$$c - ab + \frac{1}{3}a^3 = 0$$

$$\text{h. e. } c - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 0$$

$$c = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$d - \frac{1}{2}b^2 - ac + a^2b - \frac{1}{4}a^4 = 0$$

$$\text{h. e. } d - \frac{1}{8} - \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = 0$$

$$d = \frac{14}{48} - \frac{1}{4} = \frac{7}{24} - \frac{6}{24} = \frac{1}{24}$$

Est igitur $x = t + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + \frac{1}{24}t^4 &c.$

$$= \frac{1}{1}t + \frac{1}{1.2}t^2 + \frac{1}{1.2.3}t^3 + \frac{1}{1.2.3.4}t^4 +$$

$$\frac{1}{1.2.3.4.5}t^5 &c. \text{ in infinitum. Quodsi}$$

terminus primus dicatur A, secundus B, tertius C, quartus D &c. erit $x = t + \frac{1}{2}At + \frac{1}{3}Bt + \frac{1}{4}Ct + \frac{1}{5}Dt &c. \text{ in infinitum.}$

SCHOLIUM.

181. *Eodem prorsus modo in aliis casibus inveniri potest basis, si figura area datur per seriem infinitam, ut pluribus exemplis non sit opus.*

PROBLEMA LXVII.

182. *Quadrare Cycloidem ex supposita arcus circuli rectificatione vi sinus versi.*

In Cycloide est arcus AP $=$ PM (§. Tab. I. 575. part. I). Jam si AQ $=$ x, arcus AP, Fig. 7. (§. 157) consequenter

$$PM = x^{1:2} + \frac{1}{6}x^{3:2} + \frac{3}{40}x^{5:2} + \frac{5}{112}x^{7:2} &c.$$

$$PQ = x^{1:2} - \frac{1}{2}x^{3:2} - \frac{1}{8}x^{5:2} - \frac{1}{16}x^{7:2} (\text{§. 124})$$

$$QM = 2x^{1:2} - \frac{1}{3}x^{3:2} - \frac{1}{20}x^{5:2} - \frac{1}{56}x^{7:2}$$

Quare elementum QMmq $= 2x^{1:2} dx - \frac{1}{3}x^{3:2} dx - \frac{1}{20}x^{5:2} dx - \frac{1}{56}x^{7:2} dx &c. \text{ prorsus ut supra (§. 131).}$

SCHO-

SCHOLIION.

183. *Methodo hæc quadrandi cycloidem usus est Newtonus (a): quam ideo superiori addidimus, ut appareat, quomodo subinde quadraturæ curvarum ex aliarum rectificationibus deducantur. Etenim pro circulo subficiuntur curvæ aliæ, quarum arcui AP æqualis est PM. Dari etiam possunt exempla, in quibus arcus datur non per abscissam, ut in exemplo præsentate, sed per semiordinatam veluti si AP sit parabola (§. 146).*

PROBLEMA LXVIII.

484. *Data chorda arcus cujuscunque invenire chordam arcus alterius, qui sit ad illam in ratione data.*

Sit diameter circuli = d
 chorda arcus dati = a
 ratio arcuum = $1 : n$
 chorda arcus quæsitæ = x
 erit (§. 169).

$$\text{arcus datus} = a + \frac{1}{2 \cdot 3 d^2} a^3 + \frac{1 \cdot 3 a^5}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot a^4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 d^6} a^7 \&c = a + \frac{1}{2 \cdot 3 d^2} a^3 +$$

$$\frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} a^5 + \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} a^7 \&c.$$

$$\text{arcus quæsitus} = x + \frac{1}{2 \cdot 3 d^2} x^3$$

$$\frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4} x^5 + \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} x^7 \&c.$$

Quoniam arcus datus ad quæsitum ut 1 ad n ; erit (§. 297. *Arithm.*)

$$na + \frac{n}{2 \cdot 3 d^2} a^3 + \frac{3 \cdot 3n}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4} a^5 +$$

$$\frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5n}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} a^7 \&c. = x + \frac{1}{2 \cdot 3 d^2} x^3 +$$

$$\frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4} x^5 + \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} x^7 \&c.$$

consequenter si prima series sit = A altera B, erit B — A = 0.

Fiat

$$x = ha + ia^3 + ka^5 + la^7 \&c.$$

$$x^3 = + h^3 a^3 + 3h^2 ia^5 + 3h^2 ka^7 + 3hi^2 a^7$$

$$x^5 = + h^5 a^5 + 5h^4 ia^7$$

$$x^7 = + h^7 a^7$$

adeoque

$$x = ha + ia^3 + ka^5 + la^7 \&c$$

$$+ \frac{1}{2 \cdot 3 d^2} x^3 = + \frac{1}{2 \cdot 3 d^2} h^3 a^3 + \frac{1}{2 d^2} h^2 ia^5 + \frac{1}{2 d^2} h^2 ka^7 \&c$$

$$+ \frac{1}{2 d^2} hi^2 a^7 \&c$$

$$+ \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4} x^5 =$$

$$+ \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4} h^3 a^5 + \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 d^4} h^4 ia^7 \&c$$

$$\frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} x^7 =$$

$$+ \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} h^7 a^7 \&c$$

&c &c

$$- A = - na - \frac{n}{2 \cdot 3 d^2} a^3 - \frac{3 \cdot 3n}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 d^4} a^5 - \frac{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5n}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 d^6} a^7 \&c$$

(*) In Analyfi per æquationes numero terminorum infinitas. p. 18.

Habemus

Habemus itaque

$$\frac{h-n=0}{h=n}$$

$$i + \frac{1}{2.3 d^2} h = \frac{n}{2.3 d^2} = 0$$

$$i = \frac{n-n^3}{2.3 d^2} = \frac{n.(1-n^2)}{2.3 d^2}$$

$$k + \frac{1}{2 d^2} h^2 i = \frac{3.3}{2.3.4.5 d^4} h^3 - \frac{3.3^n}{2.3.4.5 d^4} = 0$$

$$k = \frac{3.3^n}{2.3.4.5 d^4} - \frac{3.3}{2.3.4.5 d^4} h^3 - \frac{1}{2 d^2} h^2 i$$

Est vero

$$h^3 = n^3 \quad h^2 = n^2$$

$$\frac{3.3}{2.3.4.5 d^4} h^3 = \frac{9n^3}{2.3.4.5 d^4} \quad i = \frac{n-n^3}{2.3 d^2}$$

$$h^2 i = \frac{n^3 - n^5}{2.3 d^2}$$

$$\frac{1}{2 d^2} h^2 i = \frac{n^3 - n^5}{3.4 d^4}$$

$$= \frac{10n^3 - 10n^5}{2.3.4.5 d^4}$$

Quamobrem

$$k = \frac{9n - 9n^3 - 10n^3 + 10n^5}{2.3.4.5 d^4}$$

$$= \frac{9n - 10n^3 + n^5}{2.3.4.5 d^4}$$

$$= \frac{n.(1-n^2).(9-n^2)}{2.3.4.5 d^4}$$

Eodem modo reperitur $l = \frac{n.(1-n^2).(9-n^2).(25-n^2)}{2.3.4.5.6.7 d^6}$

Est igitur chorda arcus quaesiti =

$$na + \frac{n.(1-n^2)a^3}{2.3 d^2} + \frac{m.(1-n^2).(9-n^2)}{2.3.4.5 d^4} a^5$$

$$+ \frac{n.(1-n^2).(9-n^2).(25-n^2)}{2.3.4.5.6.7 d^6} a^7 \text{ \&c. in}$$

infinitum.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

SCHOLIUM.

185. Cum sinus sit arcus dimidii subtensa dimidia (§. 2. Trigon.); formula praesens finibus computandis inservit.

PROBLEMA. LXIX.

186. Quadrare sectorem Ellipsis. DCM.

Ducatur Cm ex centro C ipsi CM infinite propinqua & ex eodem centro C radio CM describatur arcus MN, erit erit angulus ad N rectus (§. 38) & sector infinite parvus CMN = MN. $\frac{1}{2}$ CM (435 Geom.). Est vero $Mm^2 - Nm^2 = MN^2$ (§. 417 Geom.).

Tab. IV. Fig. 50.

Sit jam AC = a, parameter = b,

PC = x, PM = y

erit AP = a - x

PB = a + x

AP. PB = a² - x²

consequenter (§. 420 part. I.)

b : AB = PM² : AP. PB

b : 2a = y² : a² - x²

$$y^2 = \frac{a^2 b - b x^2}{2a} = \frac{2a^3 b - 2abx^2}{4a^2}$$

Porro CP² = x²

$$PM^2 = \frac{2a^3 b - 2abx^2}{4a^2}$$

$$CM^2 = x^2 + \frac{2a^3 b - 2abx^2}{4a^2}$$

$$= \frac{4a^2 x^2 + 2a^3 b - 2abx^2}{4a^2}$$

$$CM = \frac{1}{2a} \sqrt{(4a^2 x^2 + 2a^3 b - 2abx^2)}$$

$$= \frac{1}{2a} (4a^2 x^2 + 2a^3 b - 2abx^2)^{1/2}$$

Ooo

Nm

$$Nm = \frac{2axdx - bxdx}{\sqrt{(4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b)}}$$

$$Nm^2 = \frac{(4a^2x^2 - 4abx^2 + b^2x^2)dx^2}{4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b}$$

Jam $Mm^2 = \frac{(a^4 - a^2x^2 + c^2x^2)dx^2}{a^4 - a^2x^2}$ (§.172)

Est vero $c^2 = \frac{1}{2}ab$ (§. 423 part. I).

Ergo $Mm^2 = \frac{(a^4 - a^2x^2 + \frac{1}{2}abx^2)dx^2}{a^4 - a^2x^2}$
 $= \frac{(2a^3b - 2abx^2 + b^2x^2)dx^2}{2a^3b - 2abx^2}$

Habemus itaque

$$NM^2 = \frac{(2a^3b - 2abx^2 + b^2x^2)dx^2}{2a^3b - 2abx^2} + \frac{dx^2(-4a^2x^2 + 4abx^2 - b^2x^2)}{4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b}$$

Quodsi jam partes has ipsius NM^2 reducatur ad eandem denominationem, prohibet $(2a^3b - 2abx^2 + b^2x^2)(4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b) = 8a^5bx^2 - 8a^3bx^4 + 8a^2b^2x^4 - 8a^4b^2x^2 - 2ab^3x^4 + 4a^6b^2 + 2a^3b^3x^2$ & $(-4a^2x^2 + 4abx^2 - b^2x^2)(2a^3b - 2abx^2) = -8a^5bx^2 + 8a^4b^2x^2 - 2a^3b^3x^2 + 8a^3bx^4 - 8a^2b^2x^4 + 2ab^3x^4$.

Quare $NM^2 = \frac{4a^6b^2dx^2}{(2a^3b - 2abx^2)(4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b)}$

adeoque $NM = \frac{2a^3b dx}{\sqrt{(2a^3b - 2abx^2)}\sqrt{(4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b)}}$

Jam cum sit $\frac{1}{2}CM = \frac{1}{4a}\sqrt{(4a^2x^2 - 2abx^2 + 2a^3b)}$; erit tandem elementum Sectoris $CMN = \frac{a^2b dx}{2\sqrt{(2a^3b - 2abx^2)}}$
 $= \frac{2a^2b dx}{4\sqrt{2ab}\sqrt{(a^2 - x^2)}} = \frac{adx\sqrt{2ab}}{4\sqrt{(a^2 - x^2)}}$.

Est vero $\sqrt{2ab} = 2c$. Ergo $CMN = \frac{2acd x}{4\sqrt{(a^2 - x^2)}} = \frac{acd x}{2\sqrt{(a^2 - x^2)}}$ consequenter sector $BCM = \frac{1}{2}c \int \frac{adx}{\sqrt{(a^2 - x^2)}}$

Enimvero $\int \frac{adx}{\sqrt{(a^2 - x^2)}}$ est elementum arcus circuli LE radio CA descripti, cujus sinus est PC (§. 153). Quare cum in superioribus hunc arcum quadrare docuimus, non alia re opus est, quam ut is ducatur in $\frac{1}{2}c$, five quartam partem axis minoris CD , ut prodeat sector ellipticus DCM .

COROLLARIUM.

187. Quodsi fiat $c = a$, hoc est $CD = CE$, Ellipsis degenerat in circulum, & formula pro sectore DCM degenerat in $\frac{1}{2}a \int \frac{adx}{\sqrt{(a^2 - x^2)}} = \frac{1}{2}CE \cdot LE$, adeoque sector ellipticus DCM in sectorem circuli ECL (§. 435 Geom.). Est itaque

$DCM: ECL = \frac{1}{2}c \int \frac{adx}{\sqrt{(a^2 - x^2)}} : \frac{1}{2}a \int \frac{adx}{\sqrt{(a^2 - x^2)}} = c : a$ (§. 124. part. I)
 $= CD : EL$

hoc est, sector ellipticus DCM est ad sectorem circuli circa axem majorem descripti, sinu arcum PC utrobique existente eodem, ut axis minor ad majorem.

SCHOLIUM.

188. Pendet adeo quadratura sectoris elliptici a quadratura sectoris circuli.

PROBLEMA LXX.

189. Quadrare sectorem hyperbolicum CAM radio CM ex centro C ducto.

Intelligatur radius Cm ipsi CM infinite propinquus, & radio CM describatur Fig. 51. Tab. IV.

batur arcus circuli MN, erit ad N angulus rectus (§. 38.), $MN^2 = Mm_2 - Nm^2$ (§. 417 *Geom.*) & $\frac{1}{2} CM.MN$ sector infinite parvus CMN (§. 435. *Geom.*) seu elementum sectoris hyperbolici quadrandi CAM.

Sit jam $PC = x$
 $AC = CB = a$ erit $AP = x - a$
 Parameter $= b$ $PB = x + a$
 $AP.PB = x^2 - a^2$

adeoque (§. 459 *part. I*)

$$AB : b = AP.PB : PM^2$$

$$2a : b = x^2 - a^2 : PM^2$$

Quare

$$PM^2 = \frac{bx^2 - ba^2}{2a}$$

$$CP^2 = x^2$$

$$CM^2 = x^2 + \frac{bx^2 - ba^2}{2a}$$

$$= \frac{2ax^2 + bx^2 - ba^2}{2a}$$

$$= \frac{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}{4a^2}$$

$$CM = \frac{1}{2a} \sqrt{(4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b)}$$

$$= \frac{1}{2a} (4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b)^{1/2}$$

$$Nm = \frac{2axdx + bxdx}{\sqrt{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}}$$

$$Nm^2 = \frac{dx^2 (4a^2x^2 + 4abx^2 + b^2x^2)}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

$$\text{Jam } y^2 = \frac{bx^2 - ba^2}{2a}$$

$$2ydy = \frac{2bx dx}{2a}$$

$$y^2 dy^2 = \frac{b^2x^2 dx^2}{4a^2}$$

$$dy^2 = \frac{b^2x^2 dx^2}{4a^2y^2}$$

$$= \frac{b^2x^2 dx^2}{2abx^2 - 2a^3b}$$

$$dx^2 + dy^2 = \frac{b^2x^2 dx^2}{2abx^2 - 2a^3b} + dx^2$$

$$\text{h. e. } Mm^2 = \frac{(b^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b) dx^2}{2abx^2 - 2a^3b}$$

$$Nm^2 = \frac{(4a^2x^2 + 4abx^2 + b^2x^2) dx^2}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

$$NM^2 = \frac{(b^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b) dx^2}{2abx^2 - 2a^3b}$$

$$+ \frac{dx^2 (-4a^2x^2 - 4abx^2 - b^2x^2)}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

Si fiat reductio ad eandem denominationem (§. 235. *Arithm.*), reperitur

$$\frac{b^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

$$- \frac{2a^3b^3x^2 - 4a^4b^2x^2 + 4a^6b^2}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

$$+ \frac{2ab^3x^4 + 4a^2b^2x^4 - 4a^4b^2x^2}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

$$+ \frac{4a^2b^2x^4 + 8a^3bx^4 - 8a^5bx^2}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

&

$$- \frac{4a^2x^2 - 4abx^2 - b^2x^2}{2abx^2 - 2a^3b}$$

$$+ \frac{8a^5bx^2 + 8a^4b^2x^2 + 2a^3b^3x^2}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

$$- \frac{8a^3bx^4 - 8a^2b^2x^4 - 2ab^3x^2}{4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b}$$

consequenter productis hisce in unam summam collectis,

$$NM^2 = \frac{4a^6b^2 dx^2}{(2abx^2 - 2a^3b)(4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b)}$$

$$NM = \frac{2a^3b dx}{\sqrt{(2abx^2 - 2a^3b)(4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b)}}$$

$$\text{Jam } \frac{1}{2} CM = \frac{1}{4a} \sqrt{(4a^2x^2 + 2abx^2 - 2a^3b)}$$

$$\frac{1}{2} \text{CM. NM.} = \frac{2a^2 b dx}{4\sqrt{(2abx^2 - 2a^3b)}} \\ = \frac{adx\sqrt{2ab}}{4\sqrt{(x^2 - a^2)}}$$

Est vero $\sqrt{2ab}$ axis conjugatus (§. 461. part. I. qui si dicatur $2c$; erit sectoris hyperbolici elementum

$$= \frac{acdx}{2\sqrt{(x^2 - a^2)}}$$

Jam in hyperbola æquilatera $a=c$ (§. 505. part. I.) Ergo elementum sectoris $= \frac{a^2 dx}{2\sqrt{(x^2 - a^2)}}$.

Resolvatur $1: \sqrt{(x^2 - a^2)} = (x^2 - a^2)^{-1/2}$ in seriem (§. 99. part. I.) erit

$$m=-1, n=2, P=x^2 Q=-\frac{a^2}{x^2} = -a^2 x^{-2}$$

$$Pm:n = x^{-1} = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} x^{-1} \cdot -a^2 x^{-2} = \frac{1}{2} a^2 x^{-3} = B$$

$$\frac{m^2 - n}{2n} BQ = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} a^2 x^{-3} \cdot -a^2 x^{-2} =$$

$$+ \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} a^4 x^{-5} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{5}{3} \cdot \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} a^4 x^{-5} \cdot -a^2 x^{-2} =$$

$$+ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} a^6 x^{-7} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = \frac{7}{8} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} a^6 x^{-7} \cdot -a^2 x^{-2} =$$

$$- \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} a^8 x^{-9}$$

Habemus itaque

$$\frac{dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)}} = x^{-1} dx + \frac{1}{2} a^2 x^{-3} dx +$$

$$\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} a^4 x^{-5} dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} a^6 x^{-7} dx +$$

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} a^8 x^{-9} dx \text{ \&c. in infinitum.}$$

$$\text{Quare } \frac{acdx}{2\sqrt{(x^2 - a^2)}} = \frac{1}{2} acx^{-1} dx + \\ a^3 cx^{-3} dx + \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 4} a^5 cx^{-5} dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 6} \\ a^7 cx^{-7} dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} a^9 cx^{-9} dx \\ \text{\&c.}$$

Habemus itaque sectorem CAM

$$= \frac{1}{2} a^2 c x^{-1} dx - \frac{1}{2 \cdot 4} a^3 c x^{-3} - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 4} a^5 c x^{-5} \\ - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6} a^7 c x^{-7} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8} a^9 c x^{-9} \\ \text{\&c.} = \frac{1}{2} acf x^{-1} dx - \frac{a^3 c}{2 \cdot 4 x^2} - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 4 \cdot 4 x^2} a^5 c \\ - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 a^7 c}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 x^6} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 a^9 c}{4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 x^8} \text{ \&c. in inf.}$$

Quoniam $\frac{1}{2} acf x^{-1} dx$ pendet a quadratura hyperbolæ intra asymptotos (§. 120); evidens est quadraturam sectoris hyperbolici in hoc casu supponere quadraturam hyperbolæ intra asymptotos.

Quodsi hyperbola ad axem secundum referenda, fiat dimidius axis secundus $CD=c$, $CA=CB=a$, $CQ=PM=x$, $CP=QM=y$, erit $PM^2 = x^2$, $AP \cdot PB = y^2 - a^2$ & (§. 469 part. I.)

$$AC^2 : CD^2 = AP \cdot PB : PM^2$$

$$a^2 : c^2 = y^2 - a^2 : x^2$$

$$\frac{c^2 y^2}{a^2} - c^2 = x^2$$

$$\frac{c^2 y^2}{a^2} = x^2 + c^2$$

Quoniam linea, quæ est tertia proportionalis ad axem secundum $2CD$ & primum AB dicitur parameter respectu axis secundi, quemadmodum parameter

parameter respectu axis primarii AB est tertia proportionalis ad AB & 2CD (§. 461 part. 1); si parameter respectu axis 2CD dicatur p , erit $c : a = 2a : p$, adeoque $2a^2 : c = p$, consequenter $2a^2 : c^2 = p : c$ & $c^2 : a^2 = 2c : p$. Hoc valore ipsius $c^2 : a^2$ in æquatione substituto, prodit

$$\frac{2cy^2}{p} = x^2 + c^2$$

$$y^2 = \frac{px^2 + pc^2}{2c}$$

Jam $PM^2 = x^2$

$$\text{Ergo } CM^2 = x^2 + \frac{px^2 + pc^2}{2c}$$

$$= \frac{2cx^2 + px^2 + pc^2}{2c}$$

$$= \frac{4cx^2 + 2pcx^2 + 2pc^3}{4c^2}$$

$$CM = \frac{1}{2c} \sqrt{(4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3)}$$

$$Nm = \frac{2cx dx + px dx}{\sqrt{(4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3)}}$$

Porro $y^2 = \frac{px^2 + pc^2}{2c}$

adeoque $2y dy = \frac{2px dx}{2c}$

$$dy^2 = \frac{p^2 x^2 dx^2}{4c^2 y^2}$$

$$= \frac{p^2 x^2 dx^2}{2pcx^2 + 2pc^3}$$

$$Mm^2 = \frac{p^2 x^2 dx^2}{2pcx^2 + 2pc^3} + dx^2$$

$$= \frac{p^2 x^2 dx^2 + 2pcx^2 dx^2 + 2pc^3 dx^2}{2pcx^2 + 2pc^3}$$

$$Nm^2 = \frac{(4c^2x^2 + 4pcx^2 + p^2x^2) dx^2}{4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3}$$

$$NM^2 = \frac{(px^2 + 2pcx^2 + 2pc^3) dx^2}{2pcx^2 + 2pc^3} + \frac{dx^2 (-4c^2x^2 - 4pcx^2 - p^2x^2)}{4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3} = \frac{4p^2c^6 dx^2}{(2pcx^2 + 2pc^3) \cdot (4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3)}$$

$$NM = \frac{2pc^3 dx}{\sqrt{(2pcx^2 + 2pc^3)} \cdot \sqrt{(4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3)}}$$

$$\frac{1}{2} CM = \frac{1}{4c} \sqrt{(4c^2x^2 + 2pcx^2 + 2pc^3)}$$

$$CMN = \frac{2pc^2 dx}{4\sqrt{2pc} \sqrt{(x^2 + c^2)}} = \frac{cdx \sqrt{2pc}}{4\sqrt{(c^2 + x^2)}}$$

$$= \frac{acd x}{2\sqrt{(c^2 + x^2)}} \text{ ob } \sqrt{2pc} = 2a.$$

$$= \frac{1}{2} ac dx (c^2 + x^2)^{-1/2}$$

Resolvatur $1 : \sqrt{(c^2 + x^2)}$ in seriem : erit in theoremate generali (§. 99 part. 1.)

$$m = -1, n = 2, P = c^2, Q = \frac{x^2}{c^2}$$

$$P^{m:n} = c^{-1} = \frac{1}{c} = A$$

$$\frac{m}{n} AQ = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{c} \cdot \frac{x^2}{c^2} = -\frac{x^2}{2c^3} = B$$

$$\frac{m-n}{2n} BQ = -\frac{3}{4} \cdot -\frac{x^2}{2c^3} \cdot \frac{x^2}{c^2} = +\frac{1.3x^4}{2.4c^5} = C$$

$$\frac{m-2n}{3n} CQ = -\frac{5}{6} \cdot \frac{1.3x^4}{2.4c^5} \cdot \frac{x^2}{c^2} = -\frac{1.3.5x^6}{2.4.6c^7} = D$$

$$\frac{m-3n}{4n} DQ = -\frac{7}{8} \cdot -\frac{1.3.5x^6}{2.4.6c^7} \cdot \frac{x^2}{c^2} = \frac{1.3.5.7x^8}{2.4.6.8c^9} \&c.$$

Est itaque $\frac{acdx}{2\sqrt{c^2+x^2}} = \frac{1}{2}adx - \frac{ax^2 dx}{4c^2}$
 $\mp \frac{1.3ax^4 dx}{4.4c^4} - \frac{1.3.5ax^6 dx}{4.4.6c^6} \mp \frac{1.3.5.7ax^8 dx}{4.4.6.8c^8}$
 &c. consequenter $CMA = \frac{1}{2}ax - \frac{ax^3}{3.4c^2}$
 $\mp \frac{1.3ax^5}{4.4.5c^4} - \frac{1.3.5ax^7}{4.4.6.7c^6} \mp \frac{1.3.5.7ax^9}{4.4.6.8.9c^8}$ &c.

Patet igitur, quadraturam sectoris hyperbolici CAM hoc in casu non pendere a Quadratura hyperbolæ intra asymptotos. Quoniam tamen x ultra a in infinitum excrescit; ubi procul a vertice discesseris, series posterior minus convergit priori; sed quando $x < a$, eadem magis convergit.

COROLLARIUM I.

190. Quoniam in hyperbola $y^2 = (bx^2 \mp hc^2) : 2c$; erit $2c : b = x^2 \mp c^2 : y^2$, hoc est, axis secundus seu conjugatus est ad ipsius parametrum ut Quadratum semiordinatæ PM & dimidii axis conjugati CD ad Quadratum distantiae semiordinatæ a centro CP.

COROLLARIUM II.

191. Cum in hyperbola æquilatera sit $c = a$, sector hyperbolicus est $\int a^2 dx :$

$2\sqrt{a^2+x^2} = \frac{1}{2}ax - \frac{x^3}{3.4a} \mp \frac{1.3x^5}{4.4.5a^3} - \frac{1.3.5x^7}{4.4.6.7a^5}$
 $\mp \frac{1.3.5.7x^9}{4.4.6.8.9a^7}$ &c.

PROBLEMA LXXI.

Tab. IV. Fig. 52. 192. Data tangente AE, arcus elliptici AM invenire sectorem AMC. Quoniam tangens AE axi conjugato DC est parallela (§. 448. 444. part. I), DC vero ad AB perpendicularis;

erit etiam EA perpendicularis ad AB (§. 230. *Geom.*), adeoque angulus ad A rectus (§. 78. *Geom.*). Sit jam $AC = a$, $CD = 1$, $AE = x$, $PM = y$. Ducatur Cc ipsi CE infinite propinqua, & ex centro C radio CE arcus EN atque radio CM arcus MO. Erit $\triangle EeN \sim \triangle AEC$, quemadmodum supra in casu simili (§. 124.) demonstratum est, $Ee = dx$ & ob $EC^2 = AE^2 + AC^2$ (§. 417 *Geom.*) $EC = \sqrt{(x^2 + a^2)}$. Jam cum sit (§. 267 *Geom.*)

$EC : AC = Ee : EN$

$\sqrt{(x^2 + a^2)} : a = dx : EN$

erit $EN = \frac{adx}{\sqrt{(x^2 + a^2)}}$

Porro ob parallelismum rectarum AE & PM (§. 256. *Geom.*), erit (§. 268 *Geom.*)

$EA : AC = PM : PC$

$x : a = y : PC$

adeoque $PC = \frac{ay}{x}$.

$PC^2 = \frac{a^2y^2}{x^2}$

Porro (§. 430 part. I.)

$CD^2 : AC^2 = PM^2 : AC^2 - PC^2$

$1 : a^2 = y^2 : a^2 - \frac{a^2y^2}{x^2}$

Quare (§. 297. *Arithm.*)

$a^2y^2 = \frac{a^2x^2 - a^2y^2}{x^2}$

$x^2y^2 = x^2 - y^2$

$x^2y^2 + y^2 = x^2$

$PM^2 = y^2 = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

PC²

$$PC^2 = \frac{a^2 y^2}{x^2} = \frac{a^2}{x^2 + 1}$$

$$CM^2 = \frac{x^2 + a^2}{x^2 + 1}$$

$$CM = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Denique ob sectores similes CEN & CMO (§. 137. 412. Geom.)

$$CE : EN = CM : OM$$

$$\sqrt{x^2 + a^2} : \frac{adx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{\sqrt{x^2 + 1}} :$$

$$\text{adeoque } OM = \frac{adx}{\sqrt{x^2 + a^2} \sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\text{Jam } \frac{1}{2} CM = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{2\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\text{Ergo } CMO = \frac{\frac{1}{2} adx}{1 + x^2}$$

Est igitur elementum sectoris elliptici ACE idem cum sectoris circuli (§. 124), si $CD = 1$.

Quare sector AMC = $\frac{1}{2} a (x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \frac{1}{9} x^9 \&c. \text{ in infinit.})$

PROBLEMA LXXII.

193. Dato sectoris KFB recta KF ex Tab. IV. foco Ellipsis ducta, invenire semiordinatam KQ.

$$\text{Sit } AC = CB = a, \text{ KQ} = y$$

$$FB = b \text{ sector KFB} = \frac{1}{2} v$$

$$CD = c \text{ erit Differentiale ejus } \frac{1}{2} dv$$

& ob QB. $QA = BC^2 - QC^2$ (§. 431 part. I.) ex natura ellipsis (§. 430 part. I.)

$$CD^2 : CB^2 = QK^2 : CB^2 - QC^2$$

$$\text{adeoque } CD^2 : QK^2 = CB^2 : CB^2 - QC^2$$

(§. 124 part. I.)

$$CD^2 : CD^2 - QK^2 = CB^2 : QC^2$$

$$c^2 : c^2 - y^2 = a^2 :$$

$$\text{consequenter } CQ^2 = a^2 (c^2 - y^2) : c^2$$

$$CQ = a\sqrt{(c^2 - y^2)} : c$$

$$CB = a$$

$$QB = a - a\sqrt{(c^2 - y^2)} : c$$

$$FB = b$$

$$FQ = b - a + a\sqrt{(c^2 - y^2)} : c$$

$$\text{Differentiale ipsius } FQ = \frac{aydy}{c\sqrt{(c^2 - y^2)}}$$

$$KQ = y$$

$$\text{Elementum segmenti KQB} = \frac{ay^2 dy}{c\sqrt{(c^2 - y^2)}}$$

Porro

$$FQ = b - a + a\sqrt{(c^2 - y^2)} : c$$

$$\frac{1}{2} QK = \frac{1}{2} y$$

$$\Delta FQK = \frac{1}{2} by - \frac{1}{2} ay + \frac{ay\sqrt{(c^2 - y^2)}}{2c}$$

$$\text{Differentiale } \Delta FQK = \frac{1}{2} bdy - \frac{1}{2} ady - \frac{ay^2 dy}{2c\sqrt{(c^2 - y^2)}} + ady\sqrt{(c^2 - y^2)} : 2c$$

hoc est, reductione ad eandem denominationem facta.

$$d\Delta FQK = \frac{(bc - ac)\sqrt{(c^2 - y^2)} dy + (ac^2 - 2ay^2) dy}{2c\sqrt{(c^2 - y^2)}}$$

$$dKQB = \frac{2ay^2 dy}{2c\sqrt{(c^2 - y^2)}}$$

$$dFKB = \frac{(bc - ac)\sqrt{(c^2 - y^2)} dy + ac^2 dy}{2c\sqrt{(c^2 - y^2)}} = \frac{acdy + (b - a)\sqrt{(c^2 - y^2)} dy}{2\sqrt{(c^2 - y^2)}}$$

Habemus itaque

$$\frac{acdy + (b - a)\sqrt{(c^2 - y^2)} dy}{2\sqrt{(c^2 - y^2)}} = \frac{1}{2} dv$$

$$[ac + (b - a)\sqrt{(c^2 - y^2)}] cdy = dv\sqrt{(c^2 - y^2)}$$

$$\frac{dy}{dv} [ac + (b - a)\sqrt{(c^2 - y^2)}] = \sqrt{(c^2 - y^2)}$$

dy

$$\frac{dy}{dv} [ac + (b-a)\sqrt{c^2 - y^2}] - \sqrt{c^2 - y^2} = 0$$

Jam ut valor ipsius y per v exprimat, quod est quod quaeritur, fiat

$$y = hv + iv^3 + lv^5 + mv^7 \quad \&c.$$

$$\text{erit } dy = hdv + 3iv^2dv + 5lv^4dv + 7mv^6dv$$

$$\frac{dy}{dv} = h + 3iv^2 + 5lv^4 + 7mv^6$$

$$y^2 = h^2v^2 + 2hiv^4 + i^2v^6 + 2hlv^6 \quad \&c.$$

$$y^4 = h^4v^4 + 4h^3iv^6 \quad \&c.$$

$$y^6 = h^6v^6 \quad \&c.$$

$$\frac{bdy}{dv} = bh + 3biv^2 + 5blv^4 + 7bmv^6 \quad \&c.$$

$$\frac{bdy}{dv} \sqrt{c^2 - y^2} = bch + 3bciv^2 + 5bclv^4 + 7bcmv^6$$

$\frac{bh^3}{2c}$	$\frac{2bhi^2}{2c}$	$\frac{bbi^2}{2c}$
		$\frac{2bh^2l}{2c}$
	$\frac{bb^5}{8c^3}$	$\frac{4bb^4i}{8c^3}$
	$\frac{3bb^2i}{2c}$	$\frac{bb^6}{16c^5}$
		$\frac{6bbi^2}{2c}$
		$\frac{5bb^2l}{2c}$
		$\frac{3bb^4i}{8c^3}$

Porro (§. 99 part. I)

$$\begin{aligned} \sqrt{c^2 - y^2} &= y^2c - \frac{y^2}{2c} - \frac{y^4}{8c^3} - \frac{y^6}{16c^5} \quad \&c \\ &= c - \frac{h^2v^2}{2c} - \frac{2hiv^4}{2c} - \frac{i^2v^6}{2c} \quad \&c \\ &\quad - \frac{2hlv^6}{2c} \quad \&c \\ &\quad - \frac{h^4v^4}{8c^3} - \frac{4h^3iv^6}{8c^3} \quad \&c \\ &\quad - \frac{h^6v^6}{16c^5} \quad \&c \end{aligned}$$

Quodsi pro b substituat a , prodibit valor ipsius $\frac{ady}{dv} \sqrt{c^2 - y^2}$.

Quamobrem si hi valores in æquatione $\frac{dy}{dv} [ac + (b-a)\sqrt{c^2 - y^2}] - \sqrt{c^2 - y^2} = 0$ substituat prodibit

$$\begin{aligned} \frac{acdy}{av} &= ach + 3aciv^2 + 5aclv^4 + 7acmv^6 \text{ \&c.} \\ \frac{bdy}{av} \sqrt{(c^2 - y^2)} &= bch + 3bciv^2 + 5bclv^4 + 7bcmv^6 \text{ \&c.} \\ &\quad - \frac{bh^3}{2c} v^2 - \frac{2bh^2i}{2c} v^4 - \frac{bhi^2}{2c} v^6 \\ &\quad - \frac{7bh^2l}{2c} v^6 \\ &\quad - \frac{bh^3}{8c^3} v^4 - \frac{7bh^2i}{8c^3} v^6 \\ &\quad - \frac{3bh^2i}{2c} v^4 - \frac{bh^3}{16c^5} v^6 \\ &\quad - \frac{6bhi^2}{2c} v^6 \\ - \frac{ady}{av} \sqrt{(c^2 - y^2)} &= -ach - 3aciv^2 - 5aclv^4 - 7acmv^6 \text{ \&c.} \\ &\quad + \frac{ah^3}{2} v^2 + \frac{2ah^2i}{2c} v^4 + \frac{ahi^2}{2c} v^6 \\ &\quad + \frac{7ah^2l}{2c} v^6 \\ &\quad + \frac{ah^3}{8c^3} v^4 + \frac{7ah^2i}{8c^3} v^6 \\ &\quad + \frac{3ah^2i}{2c} v^4 + \frac{ah^3}{16c^5} v^6 \\ &\quad + \frac{6ahi^2}{2c} v^6 \\ - \sqrt{(c^2 - y^2)} &= -c + \frac{h^2}{2c} v^2 + \frac{2hi}{2c} v^4 + \frac{i^2}{2c} v^6 \text{ \&c.} \\ &\quad + \frac{2hl}{2c} v^6 \\ &\quad + \frac{h^4}{8c^3} v^4 + \frac{4h^3i}{8c^3} v^6 \\ &\quad + \frac{h^6}{16c^5} v^6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Habemus itaque

$$\begin{aligned} \frac{ach + bcb - ach - c}{bcb - c} &= 0 \\ \frac{bcb - c}{bh - 1} &= 0 \\ \frac{bh - 1}{bh} &= 1 \\ h &= \frac{1}{b} \end{aligned}$$

$$\frac{3aci + 3bci - \frac{bh^3}{2c} - 3aci + \frac{ah^3}{2c} + \frac{h^2}{2c}}{3aci + 3bci - \frac{bh^3}{2c} - 3aci + \frac{ah^3}{2c} + \frac{h^2}{2c}} = 0$$

$$\frac{6ac^2i + 6bc^2i - bh^3 - 6ac^2i + ah^3 + h^2}{6bc^2i - bh^3 - ah^3 - h^2} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{6bc^2i - bh^3 - ah^3 - h^2}{6bc^2i - bh^3 - ah^3 - h^2} &= \frac{1}{b^2} - \frac{a}{b^3} - \frac{1}{b^2} \\ &= -\frac{a}{b^3} \end{aligned}$$

$$i = -\frac{a}{6b^3c^2}$$

$$5acl + 5bcl - \frac{2bh^2i}{2c} - \frac{bh^5}{8c^3} - \frac{3bb^2i}{2c} - 5acl$$

$$+ \frac{2ab^2i}{2c} + \frac{ab^3}{8c^3} + \frac{3ab^2i}{2c} + \frac{2hi}{2c} + \frac{b^4}{8c^3} = 0$$

$$40ac^4l + 40bc^4l - 8bc^2h^2i - bb^5$$

$$- 12bc^2h^2i - 40ac^4l + 8ac^2h^2i + ab^5$$

$$+ 12ac^2h^2i + 8c^2hi + b^4 = 0$$

h. e. $40bc^4l - 20bc^2h^2i - bb^5 + 20ac^2h^2i$
 $- ab^5 + 8c^2hi + b^4 = 0$

$$40bc^4l = 20bc^2h^2i + bb^5 - 20ac^2h^2i - ab^5$$

$$- 8c^2hi - b^4$$

$$h^2 = \frac{I}{b^2} \quad bh^5 = \frac{I}{b^4}$$

$$i = \frac{a}{6b^4c^2} \quad -ab^5 = -\frac{a}{b^5}$$

$$h^2i = \frac{a}{6b^6c^2} \quad hi = \frac{a}{6b^5c^2}$$

$$20bc^2h^2i = -\frac{10a}{3b^5} \quad -8c^2hi = +\frac{4a}{3b^5}$$

$$-20ac^2h^2i = +\frac{10a^2}{3b^6}$$

Ergo $40bc^4l =$

$$-\frac{10a}{3b^5} + \frac{I}{b^4} + \frac{10a^2}{3b^6} - \frac{3a}{3b^5} + \frac{4a}{3b^5} - \frac{I}{b^4}$$

$$= \frac{10a^2}{3b^6} - \frac{9a}{3b^5} = \frac{10a^2 - 9ab}{3b^6}$$

$$l = \frac{10a^2 - 9ab}{120b^7c^4}$$

Reperitur eodem modo $m =$

$$\frac{280a^3 + 504a^2b - 225ab^2}{5040b^{10}c^6}, \text{ adeoque}$$

$$\text{tandem } y = \frac{I}{b} v - \frac{a}{6b^4c^2} v^3 + \frac{10a^2 - 9ab}{120b^7c^4} v^5$$

$$- \frac{280a^3 + 504a^2b - 225ab^2}{5040b^{10}c^6} v^6 \&c.$$

PROBLEMA LXXIII.

194. *Quadrare sectorem hyperbolicum CAM, data tangente ad verticem AE.* Tab. IV. Fig. 53.

Calculus prorsus idem, qui supra pro ellipsi in casu simili (§. 192). Si enim $AC = CB = a$ $PM = y$

$$AE = x \quad CD = I$$

$$\text{erit } Ee = dx \quad EC = \sqrt{(x^2 + a^2)}$$

& ob $\triangle AEC$ & EeN similitudinem $EN = adx : \sqrt{(x^2 + a^2)}$, ob similitudinem vero $\triangle CPM$ & CAE ut in Ellipsi $PC = ay : x$, atque ob analogiam $CD^2 : AC^2 = PM^2 : AC^2$

— PC^2 ex natura hyperbolae (§. 469 part. 1.) $a^2y^2 = (a^2x^2 - a^2y^2) : x^2$. Hinc ut supra reperitur $CM = \sqrt{(a^2 + x^2)} : \sqrt{(I + x^2)}$ & ob $CE : EN = CM : OM$ porro $OM = adx : \sqrt{(a^2 + x^2)} \sqrt{(I + x^2)}$, tandemque elementum MOC sectoris $CMP = \frac{1}{2} adx : \sqrt{(I + x^2)}$ quod idem prorsus est, quod pro ellipsi & circulo reperimus.

COROLLARIUM.

195. Eadem ergo series sectoribus circuli, ellipsis atque hyperbolae ex data tangente inveniendis inservit.

C A P U T I V.

De usu Calculi integralis in cubandis solidis & dimetiendis
superficiebus eorundem.

DEFINITIO VIII.

196. Solidum cubare idem est ac spatium solido comprehensum dimetiri.

PROBLEMA LXXIV.

Tab. II. 197. Cubare solidum ex rotatione
Fig. 19. figuræ planæ ANQ circa rectam AQ
tanquam axem facta genitum.

RESOLUTIO.

Sit femiordinata *pm* alteri PM infinite propinqua: parallelogrammulum PMRp haud differet a trapeziolo PMmp (§. 99). Cylindrulus ergo, quem in rotatione figuræ ANQ circa axem AQ describit parallelogrammulum PMRp (§. 456 Geom.) est elementum solidi per illam rotationem producti: cujus adeo summa dat integrum solidum, quia ex innumeris cylindrulis eodem modo formati constare concipitur.

Sit jam AP = x, PM = y, erit Pp = dx. Sit porro ratio radii ad peripheriam = r:p, erit peripheria circuli radio PM descripti = py: r, consequenter area py²: 2r (§. 429 Geom.), quæ ducta in Pp sive dx dat soliditatem cylindruli seu elementi solidi = py² dx: 2r (§. 541 Geom.).

Quodsi jam ex æquatione ad curvam speciali substituatur valor ipsius y²; habebitur, si elementum integrari possit, soliditas segmenti, cujus altitudo AP, radius basis PM, hoc est revolutione ipsius AMP circa AP geniti.

PROBLEMA LXXV.

198. Cubare Conum. Tab. II.
Conus describitur, si triangulum Fig. 17.

ADC circa axem DC rotatur (§. 467. Geom.). Sit DC = a, AC = r, PM = y, DP = x; erit (§. 268 Geom.)

$$DP : PM = DC : CA$$

$$x : y = a : r$$

Hinc $rx : a = y$

& $r^2 x^2 : a^2 = y^2$

$$py^2 dx : 2r = pr^2 x^2 dx : 2a^2 r = prx^2 dx : 2a^2$$

(§. 189).

$$spy^2 dx : 2r = prx^3 : 6a^2.$$

Quodsi pro x substituatur a; habebitur soliditas totius Coni pra³: 6a² = $\frac{1}{6} apr$ = $\frac{1}{2} pr \cdot \frac{1}{3} a$. Basis nempe $\frac{1}{2} pr$ ducenda est in tertiam altitudinis partem $\frac{1}{3} a$, ut ex elementis Geometriæ constat (§. 548. Geom.).

PROBLEMA LXXVI.

199. Cubare spheram.

Sphæra cum describatur per rotationem semicirculi circa diametrum ejus (§. 470. Geom.); erit, si diameter sit 2r,

$$yy = 2rx - x^2 \quad (\S. 376. part. 1.)$$

Unde $py^2 dx : 2r = px dx - px^2 dx : 2r$

$$spy^2 dx : 2r = \frac{1}{2} px^2 - px^3 : 6r$$

Habemus adeo indefinitam cubationem segmenti spherici, cujus diameter 2r, altitudo x.

Quodsi ergo pro x substituatur diameter $2r$; prodibit soliditas sphaerae integræ $2pr^2 - Spr^3 : 6r = 2pr^2 - \frac{4}{3}pr^2 = \frac{2}{3}pr^2 = 2rp \cdot \frac{1}{3}r$. Nimirum rectangulum ex diametro $2r$ in peripheriam p multiplicandum est per tertiam radii aut sextam diametri partem $\frac{1}{3}r$. Denique si diameter $2r$ sit 1 ; erit soliditas sphaerae $\frac{1}{6}p$.

COROLLARIUM I.

200. Sphaera igitur æquatur pyramidi quadrangulari, cujus basis est rectangulum ex diametro sphaerae $2r$ in peripheriam eadem descriptam, altitudo semidiameter sphaerae (S. 548. Geom.).

COROLLARIUM II.

201. Cylindri sphaerae circumscripti soliditas est pr^2 (S. 541 Geom.). Est itaque ad sphaeram ut pr^2 ad $\frac{2}{3}pr^2$, hoc est, ut 1 ad $\frac{2}{3}$, seu ut 3 ad 2 (S. 124 part. I.).

PROBLEMA LXXVII.

202. Cubare Conoides parabolicum ex rotatione parabole cujuscunque generis circa axem suum genitum.

Sit parameter $= 1$, erit æquatio ad infinita parabolæ genera (S. 519.)

$$y^m = x.$$

$$y = x^{1:m}$$

$$y^2 = x^{2:m}$$

$$py^2 dx : 2r = px^{2:m} dx : 2r$$

$$\int py^2 dx : 2r = \int mpx^{2+m:m} : (4 + 2m)r = \int mpy^2 x : (4 + 2m)r$$

Sit altitudo totius Conoidis $= a$, diameter baseos $2r$: erit a pro x & r pro y substituto soliditas totius Conoidis

$$mpr^2 a : (4 + 2m) r = \frac{m}{4 + m} apr$$

$$= \frac{1}{2}pr \cdot \frac{m}{2 + m} a.$$

E. gr. Si parabola genitrix fuerit Apollo-

niana, erit $m = 2$, adeoque $m : (2 + m) = 2 : (2 + 2) = \frac{1}{2}$. Basis ergo ducenda est in dimidiam altitudinem: consequenter Conoides cylindri super eadem basi & ejusdem altitudinis subduplum (S. 541 Geom.).

PROBLEMA LXXVIII.

103. Cubare sphaeroides ellipticum ex rotatione ellipsis Apolloniana circa axem genitum.

Quoniam ad ellipsin Apollonianam (S. 420 part. I)

$$y^2 = bx - bx^2 : a$$

$$\text{erit } \int py^2 dx : 2r = \int pbx dx : 2r - \int pbx^2 dx : 2ar$$

$$\int py^2 dx : 2r = \int px^2 : 4r - \int pbx^3 : 6ar$$

Quodsi pro abscissa x substituatur axis a , prodibit soliditas integri sphaeroidis $pba^2 : 4r - pba^3 : 6ar = pba^2 : 4r - pba^2 : 6r = (6pba^2 - 4pba^2) : 24r = pba^2 : 12r$.

COROLLARIUM I.

204. Quodsi $2r$ ponatur axi conjugato æqualis; erit $4r^2 = ab$ (S. 432 part. 1.). Unde soliditas sphaeroidis habetur $4par_2 : 12r = \frac{1}{3} apr$; hoc est, sphaeroides ellipticum æquatur Cono, cujus altitudo axi majori a , diameter baseos axi minoris ellipsis genitricis quadruplo $4r$ æqualis (S. 548 Geom.).

COROLLARIUM II.

205. Quoniam cylindri circumscripti altitudo $= a$, diameter $= 2r$, adeoque soliditas $= \frac{1}{2} apr$ (S. 541 Geom.); erit sphaeroides ellipticum ad cylindrum circumscriptum ut $\frac{1}{2} apr$ ad $\frac{1}{2} apr$, hoc est, ut $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{2}$, seu ut 2 ad 3 (S. 124. part. 1.).

COROLLARIUM III.

206. Si diameter sphaerae $= a$, erit peripheria circuli maximi (posita ratione radii ad peripheriam $= r : p) = ap : 2r$, consequenter sphaera $= a^3 p : 12r$. Est adeo sphaeroides ellipticum ad sphaeram axe majore a descriptam ut $\frac{1}{3} apr$ ad $a^3 p : 12r$, hoc est, (dividendo per

$\frac{1}{3} ap$)

$\frac{1}{3}ap$ ut r ad $a^2 : 4r$, seu ut $4r^2$ ad a^2 , (nempe ut quadratum axis minoris ad quadratum majoris.

COROLLARIUM IV.

207. Si diameter sphaerae = $2r$, erit soliditas = $\frac{2}{3}pr^2$. (§. 199). Est itaque sphaeroides ellipticum ad sphaeram axe minori $2r$ descriptam ut $\frac{1}{3}par$ ad $\frac{2}{3}pr^2$, hoc est, ut a ad $2r$ (§. 124 part. 1.), seu ut axis major ad minorem.

PROBLEMA LXXIX.

208. Cubare Conoides hyperbolicum ex rotatione hyperbolae Apolloniane circa axem genitum.

Quoniam ad hyperbolam scalenam (§. 459. part. 1)

$$y^2 = bx + bx^2 : a$$

erit $\int py^2 dx : 2r = pbx^2 : 4r + pbx^3 : 6r$

Et quia ad hyperbolam aequaliteram (§. 507 part. 1.)

$$y^2 = ax + x^2$$

erit $\int py^2 dx : 2r = (apx dx + px^2 dx) : 2r$

$\int py^2 dx : 2r = apx^2 : 4r + px^3 : 6r$

COROLLARIUM.

209. Si altitudo Conoidis fuerit axi transverso aequalis, hoc est, si $x = a$; erit soliditas Conoidis in casu priore $pbx^2 : 4r + pba^3 : 6ar = (6pba^2 + 4pba^2) : 24r = 10pba^2 : 24r = 5pba^2 : 12r$.

PROBLEMA LXXX.

210. Cubare solidum ex rotatione Cifoidis circa axem AB genitum.

Sit $AB = 1$, $AP = x$, $PM = y$; erit (§. 548 part. 1.)

$$y^2 = x^3 : (1 - x)$$

$\int py^2 dx : 2r = px^3 dx : 2r(1 - x)$

hoc est, quia $2r = AB = 1$,

$\int py^2 dx : 2r = px^3 dx : (1 - x)$.

Est vero $x^3 : (1 - x) = x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8$ &c. in infinitum (§. 45. part. 1.). Ergo $\int py^2 dx : 2r = px^3 dx + px^4 dx + px^5 dx + px^6 dx + px^7 dx$

+ $px^8 dx$ &c. in infinitum.

Et hinc $\int py^2 dx : 2r = \frac{1}{4}px^4 + \frac{1}{5}px^5 + \frac{1}{6}px^6 + \frac{1}{7}px^7 + \frac{1}{8}px^8 + \frac{1}{9}px^9$ &c. definit solidum portione APM descriptum.

Quodsi pro x substituatur $AB = 1$; prodit solidum integrum $\frac{1}{4}p + \frac{1}{5}p + \frac{1}{6}p + \frac{1}{7}p + \frac{1}{8}p + \frac{1}{9}p$ &c. seu $p(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \dots)$ in infinitum.).

PROBLEMA LXXXI.

211. Cubare solidum ex rotatione Logisticae circa asymptotum AH genitum.

In Logistica, cujus subtangens = a , est (§. 54)

$$\frac{y dx = a dy}{dx = a dy : y}$$

$$\frac{\int py^2 dx : 2r = pay dy : 2r}{\int py^2 dx : 2r = pay^2 : 4r}$$

Quodsi pro y substituatur $AB = r$, erit integrum solidum $par^2 : 4r = \frac{1}{4} apr$.

COROLLARIUM.

212. Cylindrus, cujus altitudo = a , radius basis = r , est $\frac{1}{2} apr$ (§. 541. Geom.), adeoque ad solidum logisticum ut $\frac{1}{2} apr$ ad $\frac{1}{4} apr$, hoc est, ut 2. ad 1. (§. 124 part. 1.).

SCHOLIUM.

213. Facile hinc apparet, quod inventis, methode hactenus exposita expressionibus solidorum, ea inter se facile comparantur unumque in alterum transformetur.

PROBLEMA LXXXII.

214. Cubare solidum ex rotatione parabole circa semiordinatam QN genitum.

Ex resolutione problematis 74. (§. 197) manifestum est, elementum solidi esse circulum radio MR descriptum & in differentiale Rr ipsius RN ductum. Sit itaque ratio radii ad peripheriam = $r : p$, $AQ = r$, $AP = x$, $QN = b$, $PM = y$, erit $Rr = dy$, $MR = PQ = AQ - AP = r - x$.

Tab. II. Fig. 22.

Tab. II. Fig. 25.

peripheria radio MR descripta = p
 $\frac{px}{r}$ consequenter area circuli $\frac{1}{2}pr$

$\frac{px^2}{2r}$ (§. 429 *Geom.*) & hinc elementum solidi $\frac{1}{2}prdy - pxdy + px^2dy: 2r$.

Si jam parameter parabolæ 1; erit $y^2 = x$ (§. 388. *part. I*) & $y^4 = x^2$: quibus valoribus in expressione elementi generali substitutis, erit id $\frac{1}{2}prdy - py^2dy + py^4dy: 2r$. Hujus integrale $\frac{1}{2}pry - \frac{1}{2}py^3 + \frac{1}{2}py^5: 10r$ indefinite exprimit solidum ex rotatione portionis MNR circa NR genitum.

Quodsi pro y^2 ponatur x ; habebimus pro eodem solido $\frac{1}{2}pry - \frac{1}{2}pxy + px^2y: 10r = p(\frac{1}{2}ry - \frac{1}{2}xy + x^2y: 10r)$.

Denique si pro y substituatur b pro x vero r ; prodibit solidum integrum $p(\frac{1}{2}br - \frac{1}{3}br + \frac{1}{15}br) = (30 - 20 + 6)pbr: 60 = \frac{6}{30}pbr = \frac{1}{5}pr \cdot \frac{6}{15}b$, hoc est, basis seu circulus radio AQ descriptus ducitur in $\frac{6}{15}$ altitudinis QN.

COROLLARIUM.

215. Cylindrus super eadem basi & ejusdem altitudinis est $\frac{1}{2}pbr$ (§. 541. *Geom.*) adeoque ad solidum hoc parabolicum ut $\frac{1}{2}pbr$ ad $\frac{1}{2}pbr \cdot \frac{6}{15}$, hoc est, ut 1 ad $\frac{6}{15}$, seu ut 15 ad 6 (§. 124. *part. I*).

PROBLEMA LXXXIII.

Tab. II. Fig. 26. 216. *Cubare solidum ex rotatione spatii interminati hyperbolici juxta asymptotum CD tanquam axem genitum.*

Sit $AB = a, AC = b, CP = x, PM = y$; erit $Pp = dx$, & posita peripheria radio AB descripta = p , peripheria radio PC descripta $px: a$, quæ ducta in $PM = y$ dat superficiem cylindri parallelogrammo CPMR descripti = $pxy: a$ (§. 541. *Geom.*). Hæc vero si ulterius ducatur in $Pp = dx$, prodibit cylindrus cavus, parallelogrammulo PqQM descriptus seu elementum solidi = $pxydx: a$.

Est vero ex natura hyperbolæ intra asymptotos

$\frac{xy = ab}{y = ab: x}$ (§. 502 *part. I*).

Quare $\frac{pxydx: a = pabxdx: ax = pbdx: spxydx: a = pbx.$

Quodsi pro x substituatur b ; prodibit solidum integrum pbb .

COROLLARIUM.

217. Cylindrus ex rotatione parallelogrammi ACSB circa axem CS geniti est $\frac{1}{2}pba$ (141. *Geom.*), adeoque ad solidum hyperbolicum ut $\frac{1}{2}pba$ ad pbb , hoc est ut $\frac{1}{2}a$ ad b , seu ut 1 ad 2 b (§. 124 *part. I*).

SCHOLIUM.

218. *Possunt etiam figura plana rotari circa tangentes, vel alias lineas quascunque: Sed cum nihil in his difficultatis sit, plura non addimus.*

PROBLEMA LXXXIV.

219. *Metiri superficiem corporis rotatione figuræ ANQ circa axem AQ geniti.* Tab. II. Fig. 19.

RESOLUTIO.

Sit ratio radii ad peripheriam = $r: p$, $AP = x, PM = y$, erit $Pp = MR = dx, mR = dy$; $Mm = \sqrt{(dx^2 + dy^2)}$, peripheria radio PM descripta = $py: r$, quæ ducta in Mm dat elementum superficiæ solidi ex rotatione circa axem AQ geniti $py \sqrt{(dx^2 + dy^2)}: r$.

Quodsi jam ex natura figuræ ANQ valor ipsius dx^2 substituatur & elementum integrabile fiat; superficies desiderata per summationem habetur.

PRO-

Tab. II. PROBLEMA LXXXV.

Fig. 17. 220. *Invenire superficiem Coni.*

Cum Conus gignatur ex rotatione trianguli ACD circa axem DC; ex æquatione ad triangulum in expressione generali ante (§. 198.) inventa substituendus est valor ipsius dx^2 . Sit nempe $CD = a$, $AC = r$, $DP = x$, $PM = y$; erit (§. 268 *Geom.*)

$$x : y = a : r$$

$$\frac{x = ay : r}{dx = ady : r}$$

$$\frac{dx^2 = a^2 dy^2 : r^2}{py \sqrt{dx^2 + dy^2} : r}$$

$$\frac{= py \sqrt{a^2 dy^2 + r^2 dy^2} : r^2}{= py dy \sqrt{a^2 + r^2} : r^2}$$

$\int py \sqrt{dx^2 + dy^2} : r = \int py^2 \sqrt{a^2 + r^2} : 2r^2$
 Quodsi pro y ponatur r , prodibit superficies conii integri $= \frac{1}{2} p \sqrt{a^2 + r^2}$
 $= \frac{1}{2} p \cdot AD$: est nempe æqualis facto ex semiperipheria basis Coni in latus AD, prorsus ut in elementis Geometriæ demonstratum (§. 548. *Geom.*).

PROBLEMA LXXXVI.

Tab. I. 221. *Invenire superficiem sphaerae.*

Fig. 3. Sit diameter circuli genitoris = I , $AP = x$, erit elementum arcus Mm (§. 157.) $= dx : 2\sqrt{x - xx}$, quod ductum in peripheriam radio PM descriptam $= 2p\sqrt{x - x^2}$ producit elementum superficiæ sphaericæ (§. 219) pdx . Hujus integrale px indefinite metitur superficiem segmenti sphaerici, cujus altitudo x .

Quodsi pro x substituatur diameter I ; erit superficies sphaeræ integræ $= p$ seu, si $I = a$, ap .

COROLLARIUM.

222. Est ergo quodlibet segmentum superficiæ sphaericæ ad superficiem sphaeræ integræ ut px ad p , seu ut x ad I (§. 124. part. 1.), hoc est ut altitudo segmenti ad diametrum sphaeræ.

PROBLEMA LXXXVII.

223. *Invenire superficiem conoidis parabolici.*

Ad parabolam est $adx = 2ydy$ (§. 21).

$$\frac{dx^2 = 4y^2 dy^2 : a^2}{py \sqrt{dx^2 + dy^2} : r}$$

$$\frac{= py \sqrt{4y^2 dy^2 + a^2 dy^2} : ar}{= py dy \sqrt{4y^2 + a^2} : ar}$$

$$\text{Fiat } \sqrt{4y^2 + a^2} = v$$

$$\text{erit } 4y^2 + a^2 = v^2$$

$$\frac{8ydy = 2v dv}{ydy = \frac{1}{4} v dv}$$

$$\frac{pydy \sqrt{4y^2 + a^2} : ar = pv^2 dv : 4ar^2}{\int pydy \sqrt{4y^2 + a^2} : ar = \int pv^3 : 12 ar}$$

$$= (4py^2 + pa^2) \sqrt{4y^2 + a^2} : 12 ar.$$

Fiat $y = 0$, relinquetur $pa^2 \sqrt{a^2} : 12 ar = pa^2 : 12 r$. Unde superficies segmenti conoidis parabolici =

$$(4py^2 + pa^2) \sqrt{4y^2 + a^2} : 12 ar - pa^2 : 12 r$$

CAPUT V.

De usu Calculi integralis in Methodo tangentium inversa.

DEFINITIO IX.

224. **M**ethodus Tangentium inversa est, qua ex data tangente aut linea quacunquē alia, cujus determinatio a tangente pendet, invenitur æquatio ad curvam aut constructio curvæ.

COROLLARIUM.

225. Cum expressiones differentiales tangentis, subtangentis, subnormalis, normalis & arcus, itemque area curvæ superius traditæ fuerint (§. 20. 34. 35. 44. 98. 144); si valor datus expressioni differentiali æquetur & æquatio differentialis vel summetur, vel si id fieri nequeat, construatur, curva desiderata innotescit.

PROBLEMA LXXXVIII.

226. *Invenire lineam curvam, cujus subtangens = 2yy : a.*

Quoniam subtangens lineæ algebraicæ = ydx : dy (§. 20); erit

$$\frac{ydx : dy = 2yy : a}{aydx = 2y^2dy}{adx = 2ydy}{ax = y^2}$$

Est adeo curva quæsitæ parabola (§. 388. part. I.), cujus constructio ex superioribus manifesta (§. 392. part. I).

PROBLEMA LXXXIX.

227. *Curvam invenire, cujus subnormalis est constans, e. gr. = a.*

Quoniam subnormalis lineæ algebraicæ (§. 35) ydy : dx; erit

$$\frac{ydy = adx}{\frac{1}{2}y^2 = ax}{y^2 = 2ax}$$

Est adeo curva quæsitæ parabola, cujus parameter = 2a.

PROBLEMA XC.

228. *Invenire curvam, cujus subnormalis = r - x.*

Quoniam ydy : dx = r - x (§. 35.);

$$\frac{ydy = rdx - xdx}{\frac{1}{2}y^2 = rx - \frac{1}{2}xx}{y^2 = 2rx - xx}$$

Est adeo curva quæsitæ circulus, cujus radius r seu diameter 2r (§. 377. part. I.).

PROBLEMA XCI.

229. *Invenire curvam, cujus subtangens est tertia proportionalis ad r - x & y.*

Quoniam (§. 20)

$$r - x : y = y : \frac{ydx}{dy}$$

erit r - x : y = dy : dx (§. 124. part. I.)

$$\frac{rdx - xdx = ydy}{rx - \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}y^2}{2rx - xx = y^2}$$

Est adeo curva quæsitæ denuo circulus.

PROBLEMA XCII.

230. *Invenire curvam, cujus subtangens est tertia proportionalis ad r + x & y.*

Quoniam (§. 20)

$$r + x : y = y : \frac{ydx}{dy}$$

crit

erit $r + x: y = dy: dx$ (§. 124. part. I)

$$\frac{rdx + xdx = ydy}{}$$

$$\frac{rx + \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}y^2}{}$$

$$2rx + x^2 = y^2$$

Est adeo curva quaesita hyperbola æquilatera, cujus axes conjugati & parameter = $2r$ (507 part. I).

PROBLEMA XCIII.

231. Invenire curvam in qua subtangens multiplo abscessæ aequalis.

Quoniam (§. 20)

$$\frac{mx = ydx: dy}{}$$

$$\frac{erit \quad mxdy = ydx}{mxdx - ydy = 0}$$

Ut hæc æquatio integrari possit, multiplicetur per $y^{m-1}: x^2$ (§. 95).

$$\frac{erit (my^{m-1}xdy - y^m dx): x^2 = 0}{}$$

$$\frac{y^m: x = a^{m-1}}{}$$

$$y^m = a^{m-1}x$$

Satisfaciunt ergo proposito infinita parabolæ genera.

PROBLEMA XCIV.

232. Invenire lineam, in qua subtangens semiordinata æqualis.

Quoniam (§. 20)

$$\frac{ydx: dy = y}{}$$

$$\frac{ydx = ydy}{}$$

$$\frac{dx = dy}{}$$

$$x = y$$

Patet adeo, lineam quaesitam esse rectam ad cathetum trianguli rectanguli æquicruri tanquam axem relatam, seu hypotenusam trianguli rectanguli æquicruri (§. 89 Geom.). Quodsi vero x sumatur pro arcu circuli; erit linea quaesita cyclois (§. 572. part. I. & §. 52. part. I.).

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

PROBLEMA XCV.

233. Invenire curvam, cujus subnormalis = \sqrt{ax} .

Quoniam $ydy: dx = \sqrt{ax}$ (§. 34)

$$\frac{erit \quad ydy = a^{1/2}x^{1/2}dx}{}$$

$$\frac{\frac{1}{2}y^2 = \frac{2}{3}a^{1/2}x^{3/2}}{}$$

$$y^2 = \frac{4}{3}\sqrt{ax^3} = \frac{2}{3}\sqrt{4ax^3}$$

Patet adeo, quadrata semiordinatarum hujus curvæ exprimere spatia parabolæ, cujus parameter $4a$ (§. 103). Sunt igitur semiordinatæ ipsæ mediæ proportionales inter abscessas & $\frac{2}{3}$ semiordinatarum parabolæ circa communem axem descriptæ (§. cit.)

SCHOLIUM.

234. Curva hæc dici potest Quadratrix Tab. II. parabolæ: Solent enim Geometrae Quadratricem alicujus curvæ appellare curvam circa eundem axem descriptam, cujus semiordinatis datis datur quadratura partium respondentium in altera curva. E. gr. si fuerit ut in nostro casu $APMA = PN^2$, vel $APMA = AP \cdot PN$, vel $APMA = PN \cdot a$ &c. erit AND Quadratrix ipsius AMC. Fig. 27.

PROBLEMA XCVI.

235. Invenire curvam, cujus normalis constans est.

Sit constans linea = a , abscessa = x , semiordinata = y ; erit (§. 44)

$$\frac{y\sqrt{(dy^2 + dx^2)}: dx = a}{}$$

$$\frac{y\sqrt{(dy^2 + dx^2)} = adx}{}$$

$$\frac{y^2dy^2 + y^2dx^2 = a^2dx^2}{}$$

$$\frac{y^2dy^2 = a^2dx^2 - y^2dx^2}{}$$

$$\frac{ydy = dx\sqrt{(a^2 - y^2)}}{}$$

$$\frac{ydy}{\sqrt{(a^2 - y^2)}} = dx$$

$$\sqrt{(a^2 - y^2)} = a - x \quad (\text{§. 95})$$

Qq q

Est

Est itaque curva quæsitæ circulus.

PROBLEMA XCVII.

236. Invenire curvam, cujus area indefinite exprimitur per $a\sqrt{x}$.

Quoniam differentiale areae $= ydx$ (§. 98.);

$$\text{erit } \frac{1}{2}ax^{-1:2} dx = ydx$$

$$\frac{1}{2}ax^{-1:2} = y$$

$$\frac{1}{4}a^2x^{-1} = \frac{1}{4}a^2; x = y^2$$

$$\frac{1}{4}a^2 = xy^2$$

Est adeo curva hyperbola secundi generis intra asymptotos.

COROLLARIUM.

237. Cum \sqrt{ax} sit semiordinata parabolæ, cujus parameter $= a$; evidens est parabolam Apollonianam esse quadratricem hyperbolæ intra asymptotos, ad quam $\frac{1}{4}ax = xy^2$

PROBLEMA XCVIII.

238. Invenire curvam, cujus quadratura indefinita $= x^3 : a$

$$\text{Quoniam } x^3 : a = \int ydx$$

$$\text{erit } 3x^2 dx : a = ydx$$

$$x^2 = \frac{1}{3}ay$$

Tab. II. Est adeo curva quæsitæ parabola ex Fig. 28. terior, cujus parameter $\frac{1}{3}a$. Sit enim $AQ = PM = x$, $PQ = AM = y$, erit $\frac{1}{3}ay = x^2$ (§. 288. part. I)

PROBLEMA XCIX.

239. Invenire curvam, cujus area $= a\sqrt{(aa + xx)}$.

$$\text{Quoniam } axdx : \sqrt{(aa + xx)} = ydy$$

$$ax : \sqrt{(aa + xx)} = y$$

$$a^2x^2 : (aa + xx) = y^2$$

$$\text{hoc est, } y^2 : x^2 = a^2 : aa + xx$$

Quæ analogia naturam curvæ definit, cujus quadratrix est hyperbola æquilatera, axibus conjugatis & parametro

existentibus a (§. 507. part. I. & §. 234 part. 2).

PROBLEMA C.

240. Invenire curvam, cujus area $= x\sqrt{(aa + xx)}$.

$$\text{Quon. } \frac{x^2 dx}{\sqrt{(aa + xx)}} + dx\sqrt{(aa + xx)} = ydx$$

$$\text{erit } \frac{2x^2 + aa}{\sqrt{(aa + xx)}} = y$$

$$(2x^2 + aa)^2 = y^2 (aa + xx)$$

$$y^2 : aa + 2xx = aa + 2xx : aa + xx$$

Quæ analogia definit itidem naturam curvæ, cujus quadratrix est hyperbola æquilatera.

SCHOLIUM.

241. Ex problematis his apparet, quod data quadratrice semper inveniatur quadranda facili negotio. Et hac quidem methodo inveni possunt curvæ innumera quadrabiles, constructivæque curvarum quadrabilium, seu, quod perinde est, formularum summabilium canones.

PROBLEMA CI.

242. Invenire curvam cujus subtangens est linea constans a .

$$\text{Quoniam } ydx : dy = a \quad (\text{§. 20})$$

$$\text{erit } dx = ay^{-1} dy$$

$$\int dx = x = \int ay^{-1} dy$$

Quosi $ay^{-1} dy$ multiplicetur per a ; erit $a^2y^{-1} dy$ elementum hyperbolæ intra asymptotos (§. 118) & quidem æquilatera, in qua asymptoti junguntur ad angulos rectos (§. 510. part. I). Quod si ergo y sumatur pro abscissa, erit respondens semioordinata $x = a\sqrt{y^{-1}}$ æqualis spatio hyperbolico asymptotico per constantem a , quæ latus est potentie in hyperbola æquilatera (§. 477 part. I.); & diviso. Unde constructio

curvæ

curvæ quæsitæ a Quadratura hyperbolæ pendet.

COROLLARIUM VII.

243. Quoniam linea, ad quam $x = say^{-1}dy$, est logarithmica ad asymptotum relata (§. 54) atque x in asymptoto sumta logarithmus semiordinatæ ipsi respondentis (§. 55. part. 1); erit quoque $say^{-1}dy$ logarithmus ejusdem semiordinatæ y , consequenter $say^{-1}dy = asdy : y = ly : (ly$ denotat logarithmum ipsius y in logistica sumtum, cujus subtangens $= a)$. Unde liquet, quomodo differentiale logarithmi aut quantitatis, quam logarithmus ingreditur, sit inveniendum. Quoniam enim $ady : y = dly$ erit etiam $dn^ny = nln^{-1}yady : y$ ubi a notat subtangentem logisticæ.

COROLLARIUM II.

244. Et quia $af \frac{dy}{y}$ est spatium hyperbolicum per latus potentæ hyperbolæ divisum; spatia hyperbolica per idem latus divisa exprimunt logarithmos, quorum numeri sunt ut semiordinate ad asymptotum relatæ.

PROBLEMA CII.

245. Invenire curvam, in qua est ut a ad y ita $\sqrt{(aa - yy)}$ ad subtangentem.

Quoniam per hypoth. & §. 20

$$a : y = \sqrt{(aa - yy)} : \frac{ydx}{dy}$$

hoc est, $a : 1 = dy\sqrt{(aa - yy)} : dx$

erit $dy\sqrt{(aa - yy)} : a = dx$

$$sdy\sqrt{(aa - yy)} : a = x$$

Quoniam $sdy\sqrt{(aa - yy)}$ est portio circuli CDPM, cujus radius AC $= a$, abscissa PC $= y$ (§. 124) : constructio curvæ a quadratura circuli pendet, hoc est, circulus est quadratrix curvæ quæsitæ (§. 234). Retentis nempe abscissis PC, semiordinatæ x erunt æquales spatio PMDC per constantem a diviso.

Tab. I. Fig. 3.

PROBLEMA CIII.

246. Invenire curvam, in qua est, ut a ad y ita $\sqrt{(aa + yy)}$ ad subtangentem.

Quoniam per hypoth. & §. 20

$$a : y = \sqrt{(aa + yy)} : \frac{ydx}{dy}$$

hoc est, $a : 1 = dy\sqrt{(aa + yy)} : dx$

erit $dy\sqrt{(aa + yy)} : a = dx$

$$sdy\sqrt{(aa + yy)} : a = dx$$

Quoniam $sdy\sqrt{(aa + yy)} : a$ est arcus parabolæ AM, cujus parameter $2a$ (§. 146.); si semiordinata parabolæ PM sumatur pro abscissa curvæ quæsitæ, erit semiordinata ejusdem arcui parabolico AM æqualis.

Tab. II. Fig. 19.

SCHOLIUM.

247. Apparet adeo, interdum constructionem pendere a rectificatione curvarum. Præstat autem eam ad curvarum potius rectificationem, quam quadraturam reducere, quia in priori casu praxis est facilior, ubi arcum filo metiri datur. In posteriori autem spatiorum quadratura ope severum infinitarum definienda est in numeris prope veris & inde similiter in istiusmodi numeris semiordinate curvarum quæsitarum sunt computandæ.

PROBLEMA CIV.

248. Invenire curvam, in qua est subtangens ad y ut quantitas constans r ad $\sqrt{(r^2 - y^2)}$.

Quoniam per hypoth. & §. 20

$$\frac{ydx}{dy} : y = r : \sqrt{(r^2 - y^2)}$$

hoc est, $dx : dy = r : \sqrt{(r^2 - y^2)}$

erit $dx = rdy : \sqrt{(r^2 - y^2)}$

$$x = rdy : \sqrt{(r^2 - y^2)}$$

Quia $r dy : \sqrt{(r^2 - y^2)}$ est arcus circuli AM, cujus radius AC $= r$, PM $= y$ (§. 153); constructio curvæ pendet a rectificatione peripheriæ circuli. Nempe

Tab. I. Fig. 3.

si femiordinatæ in circulo PM sumantur pro abscissis curvæ quæsita; erunt ejusdem femiordinatæ arcubus AM æquales.

PROBLEMA CV.

249. *Invenire curvam, in qua subtangens est ad y ut r² ad r² + y².*

Quoniam per hypoth. & §. 20

$$\frac{y dx}{dy} : y = r^2 : r^2 + y^2$$

Tab. II.
Fig. 20.

hoc est, $dx : dy = r^2 : r^2 + y^2$

erit $dx = r^2 dy : (r^2 + y^2)$

Quoniam $\int r^2 dy : (r^2 + y^2)$ aut, si $r = 1$, $\int dy : (1 + y^2)$ est elementum arcus BM, cujus tangens BK = y (§. 158; evidens est, constructionem curvæ quæsita denuo pendere a rectificatione arcuum circuli indefinita. Sumtis nempe tangentibus arcuum BK pro abscissis curvæ quæsita; femiordinatæ ejusdem erunt arcubus BM æquales, radio circuli existente r.

PROBLEMA CVI.

250. *Invenire curvam, in qua tangens est constans.*

Sit constans illa = a, abscissa = x, femiordinata y; erit (§. 34)

$$y \sqrt{(dx^2 + dy^2)} : dy = a$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \frac{ady}{y}$$

$$dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 dy^2}{y^2}$$

$$dx = \frac{a^2 dy^2 - y^2 dy^2}{y^2}$$

$$x = \int \frac{dy}{y} \sqrt{(a^2 - y^2)}$$

Tab. I. Curva, in qua tangens constans est, Fig. 8. describitur puncto M, si alterum extremum rectæ TM in recta AH incedit, di-

citurque *Traëctoria*. Ad ejus adeo descriptionem non opus est, nisi bacillo, in cujus utroque extremo cuspis infixæ, ita ut cuspis in M prematur in planum e latere, vel pondere. Est itaque æquatio inventa ad Traëctoriam.

Eadem æquatio sic eruitur. Quoniam TM = a, PM = y; erit PT = $\sqrt{(a^2 - y^2)}$. Sed PT = $\int y dx : dy$ (§. 20). Ergo $y dx : dy = \sqrt{(a^2 - y^2)} : y$, aut, quia femiordinatæ continuo decrefcentis differentiale negativum, $dx = -dy \sqrt{(a^2 - y^2)} : y$.

COROLLARIUM I.

251. Si fuerit $x = 0$, erit etiam $dx = 0$, adeoque

$$\frac{-dy \sqrt{(a^2 - y^2)} : y = 0}{\sqrt{(a^2 - y^2)} = 0} \\ \frac{a^2 - y^2 = 0}{a = y}$$

Est igitur in A, ubi origo indeterminatæ x, AB = a: id quod etiam ex descriptione liquet.

COROLLARIUM II.

252. Quoniam $dx = dy \sqrt{(a^2 - y^2)} : y$ erit $y dx = dy \sqrt{(a^2 - y^2)}$ adeoque spatium indeterminatum HPMI = $\int dy \sqrt{(a^2 - y^2)}$. Quadratura igitur traëctoriæ pendet a Quadratura circuli (§. 124), cujus radius est a, abscissa a centro computatæ sunt y.

COROLLARIUM III.

253. Similiter quia $dx^2 = \frac{a^2 dy^2 - y^2 dy^2}{y^2}$ erit

$$dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 dy^2 - y^2 dy^2}{y^2} + dy^2 \\ = a^2 dy^2 : y^2$$

$$\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \frac{ady}{y}$$

$$\int \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = \int \frac{ady}{y}$$

Quare

Quare cum $f \frac{ady}{y}$ sit logarithmus ipsius y ; arcus tractoriæ sunt ut logarithmi, semiordinate ut numeri.

Et quia $fady$: y est abscissa Logarithmicæ, cujus subtangens = a ; arcus tractoriæ rectificantur per abscissas Logarithmicæ.

COROLLARIUM IV.

254. Si $BO = v$, erit $OA = PM = a - v$, adeoque $a - v = y$ & $-dv = dy$, consequenter $dx = -dy \sqrt{a^2 - y^2}$: $y = dv \sqrt{2av - v^2}$: $(a - v)$. Habemus adeo æquationem, quæ Tractoriam definit respectu axis BA.

CAPUT VI.

De usu Calculi integralis in Logarithmorum doctrina.

PROBLEMA CVII.

255. **D**ato numero, invenire logarithmum.

Sit Logarithmicæ ordinata $AB = 1$, eademque subtangenti, quæ constans est (§. 54.) æqualis, erit PM numerus unitate major, QN numerus unitate minor, AP logarithmus numeri unitate majoris, AQ logarithmus numeri unitate minoris.

Quodsi jam differentia inter AB & PM sit y ; erit $PM = 1 + y$, consequenter AP seu logarithmus unitate majoris numeri $f dy : (1 + y)$ (§. 243). Est vero $1 : (1 + y) = 1 - y + y^2 - y^3 + y^4$ &c. in infinitum (§. 45. part. 1). Ergo $dy : (1 + y) = dy - ydy + y^2 dy - y^3 dy + y^4 dy$ &c. in infinitum, consequenter $f dy : (1 + y)$, seu logarithmus numeri $1 + y$ unitate majoris, = $y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$ &c. in infinitum.

Quodsi differentia inter AB & QN sit y , erit $QN = 1 - y$, consequenter AQ seu logarithmus numeri unitate minoris = $f - dy : (1 - y)$. Est vero $1 : (1 - y) = 1 + y + y^2 + y^3 + y^4 + \dots$ &c. in infinitum (§. 45 part. 1). Ergo $- dy : (1 - y) = - dy - ydy - y^2 dy - y^3 dy - \dots$

$y^4 dy$ &c. in infinitum, consequenter $f - dy : (1 - y)$, seu logarithmus numeri unitate minoris, = $-y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{5}y^5$ &c. in infinitum.

COROLLARIUM I.

256. Si latus potentie hyperbolæ AB vel BC fuerit 1 , $BP = y$; erit $AP = 1 + y$ & spatium hyperbolicum asymptoticum = $y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$ &c. in infinitum (§. 120). *Fig. 29.* Et ubi $BQ = y$, erit $AQ = 1 - y$, adeoque (si $QN = v$) ob $1 = v - vy$ (§. 490 part. 1), elementum spatii hyperbolici asymptotici = $1 y dy : (1 - y)$, consequenter spatium = $-y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{5}y^5$ &c. in infinitum (§. 120). Possunt ergo etiam logarithmi per hyperbolam exhiberi: nimirum si latus potentie $AB = 1$, abscissa AP est numerus unitate major, spatium asymptoticum $BCMP$ logarithmus numeri unitate majoris; similiter abscissa AQ est numerus unitate minor & spatium hyperbolicum asymptoticum $QNCB$ logarithmus numeri unitate minoris.

COROLLARIUM II.

257. Quodsi $y = 1$, erit $1 + y = 2$; adeoque logarithmus hyperbolicus binarii = $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$ &c. in infinitum.

COROLLARIUM III.

258. Quoniam logarithmus ipsius $1 : (1 + x)$ & numeri integri $1 + x$ idem est (§. 351.

Tab. III. Fig 30.

Arithm.), fractio vero $1 : (1 + x)$ numerus unitate minor; si pro $1 - y$ ponatur $1 : (1 + x)$, formula posterior inveniendis logarithmis tam numerorum unitate majorum, quam minorum satisfacit. Nemp̄e cum sit ex hypothesi

$$1 - y = 1 : (1 + x)$$

erit $1 - 1 : (1 + x) = y$

hoc est, $\frac{1 + x - 1}{1 + x} = \frac{x}{1 + x} = y$

adeoque in formula $y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$ &c. pro y substitui debet $x : (1 + x)$ si numeri unitate majoris logarithmus desideretur.

SCHOLIION.

259. Formula posterior si in casu quoque priore, ubi numerus cujus logarithmus quaeritur, unitate major, adhibetur, inventio logarithmi faciliori opera absolvitur; quia series citius convergit, quam si priori formula utamur. Enimvero prebe notandum, logarithmos hyperbolicos coincidere cum Neperianis adeoque diversos esse a Briggianis, quibus communiter utimur. Cum autem hyperbolici sint ad Briggianos ut logarithmus denarii hyperbolicus ad logarithmum denarii Briggianum, sitque logarithmus binarii hyperbolicus 2.302585092994 &c. Briggianus 1.000000000000; hyperbolici ad Briggianos, quibus vulgo utimur, facile reducuntur.

PROBLEMA CVIII.

260. Dato logarithmo invenire numerum.

Sit logarithmus l , numerus $1 + y$ erit $l = y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$ &c. Quare cum $y = l + bl^2 + (2b^2 - c)l^3 + (5bc - 5b^3 + d)l^4 + (14b^4 + 6bd - 21b^2c + 3c^2 - e)l^5$ &c. (§. 366. part. 1) ob $a = 1$, & $b = -\frac{1}{2}$, $c = +\frac{1}{3}$, $d = -\frac{1}{4}$, $e = +\frac{1}{5}$ &c. erit

$$2b^2 - c = \frac{2}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3 - 2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$5bc - 5b^3 + d = -\frac{5}{6} + \frac{5}{8} + \frac{1}{4} =$$

$$\begin{aligned} & -\frac{40 + 30 + 12}{48} = \frac{2}{48} = +\frac{1}{24} \\ & 14b^4 + 6bd - 21b^2c + 3c^2 - e \\ & = \frac{14}{16} + \frac{6}{8} - \frac{21}{12} + \frac{3}{9} - \frac{1}{5} \\ & = \frac{7}{8} + \frac{6}{8} - \frac{14}{8} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \\ & = -\frac{1}{8} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{40 - 15 - 24}{120} = +\frac{1}{120} \end{aligned}$$

adeoque

$$y = l + \frac{1}{2}l^2 + \frac{1}{6}l^3 + \frac{1}{24}l^4 + \frac{1}{120}l^5 \text{ \&c.}$$

$$\text{in infinit.} = \frac{l}{1} + \frac{l^2}{1.2} + \frac{l^3}{1.2.3} + \frac{l^4}{1.2.3.4}$$

$$+ \frac{l^5}{1.2.3.4.5} \text{ \&c. in infinit.}$$

Quodsi terminus primus dicatur A, secundus B, tertius C, quartus D &c, erit $y = l + \frac{1}{2}Al + \frac{1}{3}Bl + \frac{1}{4}Cl + \frac{1}{5}Dl$ &c. in infinitum.

Quoniam vero l est logarithmus numeri $1 + y$; erit numerus $1 + y = 1 + l + \frac{1}{2}Al + \frac{1}{3}Bl + \frac{1}{4}Cl + \frac{1}{5}Dl$ &c. in infinitum.

Si l fuerit logarithmus numeri unitate minoris $1 - y$; erit $l = y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$ &c. & eodem ut ante modo reperietur $y = l - \frac{1}{1.2}l^2 + \frac{1}{1.2.3}l^3$

$$- \frac{1}{1.2.3.4}l^4 + \frac{1}{1.2.3.4.5}l^5 \text{ \&c. in infi-}$$

nitum, consequenter $1 - y = 1 - \frac{l}{1}$

$$+ \frac{l}{1.2} - \frac{l^2}{1.2.3} + \frac{l^3}{1.2.3.4} - \frac{l^4}{1.2.3.4.5}l^5$$

&c. in infinitum.

Quodsi terminus primus dicatur A, secundus B, tertius C &c. erit $y = l - \frac{1}{2}Al + \frac{1}{3}Bl - \frac{1}{4}Cl + \frac{1}{5}Dl$ &c. in infinitum, consequenter $1 - y = 1 - l + \frac{1}{2}Al - \frac{1}{3}Bl + \frac{1}{4}Cl - \frac{1}{5}Dl$ &c. in infinitum.

PRO-

PROBLEMA CIX.

261. Dato sinu, invenire logarithmum.

Sit radius=1, cosinus=x, erit sinus

$$= \sqrt{(1-xx)} \text{ (§. 377 part. 1)} = \sqrt{(1+x)(1-x)}.$$

$$\text{Sed } l(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6$$

$$\& l(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{6}x^6$$

$$\text{Ergo } l(1-xx) = -\frac{2}{2}x^2 - \frac{2}{4}x^4 - \frac{2}{6}x^6 \text{ (§. 337 Arith.)}$$

$$\& l\sqrt{(1-xx)} = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{6}x^6 \&c. \text{ (§. 338 Ar.)}$$

PROBLEMA CX.

262. Data tangente, invenire logarithmum.

Sit radius, seu sinus totus, hoc est, tangens 45° (§. 32 Trigon.) = 1; tangens arcus 45° majoris = $1+x$; tangens arcus 45° minoris = $1-x$; erit logarithmus tangentis in casu priore $x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5$ &c. in infinitum; in casu posteriore $-x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5$ &c. in infinitum (§. 255.)

SECTIO TERTIA.

DE CALCULO EXPONENTIALI.

CAPUT I.

De natura Calculi exponentialis.

DEFINITIO X.

263. Calculus exponentialis est methodus differentiandi quantitates exponentiales & differentialia exponentialium summandi.

DEFINITIO XI.

264. Quantitas exponentialis est dignitas, cujus exponens variabilis, e. gr. x^x, a^x .

PROBLEMA CXI.

265. Quantitatem exponentialem differentiare.

RESOLUTIO.

Non alia re opus est, quam ut quantitates exponentiales ad logarithmicas revocentur: quo facto, differentiatio succedit per § 243.

E. gr. Quæritur differentiale quantitatis exponentialis x^y . Fiat

$$x^y = z$$

$$\text{erit } ylx = lz \text{ (§. 139 Arithm.)}$$

$$\frac{lx dy + y dx}{x} : x = dz : z \text{ (§. 243)}$$

$$z l x dy + z y dx : x = dz$$

hoc est, $x^y l x dy + y x^{y-1} dx = dz$

Sit quantitas exponentialis differentianda secundi gradus v^x . Fiat, ut ante,

$$v^x = z$$

$$\text{erit } x^y l v = lz \text{ (§. 339 Arithm.)}$$

$$\frac{(x^y l x dy + y x^{y-1} dx) l v + x^y dv}{x^y} : v = dz : z \text{ (§. 243)}$$

$$z (x^y l x dy + y x^{y-1} dx) l v + z x^y dv : v = dz$$

hoc est,

$$v^x \{ x^y l x dy + y x^{y-1} dx \} l v + v^x v^{-1} x^y dv = dz$$

sen

$$v^x x^y l x l v dy + v^x y x^{y-1} l v dx + v^x v^{-1} x^y dv = dz$$

Eadem

Eadem ratione inveniri potest differentiale quantitatis exponentialis cujuscunque alterius.

PROBLEMA CXII.

266. *Differentiale logarithmicum integrare.*

Sit differentiale integrandum $x \ln x dx$.

Fiat

$$x = 1 + y$$

$$\text{erit } \ln x = \ln(1 + y)$$

$$\& dx = dy$$

$$x \ln x dx = \ln(1 + y) (1 + y) dy.$$

Est vero $\ln(1 + y) = y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5 \&c.$ in infinitum (§. 255). Ergo $\ln(1 + y) (1 + y) dy = (1 + y) dy (y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5 \&c.$ in infinitum) = (multiplicatione actu facta)

$$y dy - \frac{1}{2}y^2 dy + \frac{1}{3}y^3 dy - \frac{1}{4}y^4 dy + \frac{1}{5}y^5 dy \&c.$$

$$+ y^2 dy - \frac{1}{2}y^3 dy + \frac{1}{3}y^4 dy - \frac{1}{4}y^5 dy \&c.$$

$$\text{h.e. } y dy + \frac{1}{2}y^2 dy - \frac{1}{6}y^3 dy + \frac{1}{12}y^4 dy - \frac{1}{24}y^5 dy \&c.$$

Unde tandem habetur $\int x \ln x dx$

$$= \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 - \frac{1}{24}y^4 + \frac{1}{60}y^5 - \frac{1}{120}y^6 \&c.$$

$$= \frac{1}{1.2}y^2 + \frac{1}{1.2.3}y^3 - \frac{1}{1.2.3.4}y^4 + \frac{1}{1.3.4.5}y^5$$

$$- \frac{1}{1.4.5.6}y^6 \&c. \text{ in infinitum : in qua}$$

serie $y = x - 1$.

PROBLEMA CXIII.

267. *Differentiale exponentialem quantitatem involvens integrare.*

Sit differentiale integrandum $x^x dx$.

Fiat $x = 1 + y$, erit $x^x = (1 + y)^{1+y}$,

adeoque $x^x dx = (1 + y)^{1+y} dy$. Fiat

$$(1 + y)^{1+y} = 1 + v$$

$$\text{erit } (1 + y) \ln(1 + y) = \ln(1 + v)$$

$$\text{hoc est, } (1 + y) (y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{5}y^5$$

$$\&c. \text{ in infinitum) } = v - \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{3}v^3 - \frac{1}{4}v^4$$

$$+ \frac{1}{5}v^5 \&c. \text{ in infinitum (§. 255).}$$

seu per calculum praecedentem $y + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{12}y^4 - \frac{1}{24}y^5 \&c.$ in infinitum $= v - \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{3}v^3 - \frac{1}{4}v^4 + \frac{1}{5}v^5 \&c.$ in infinitum (§. 266).

Fiat porro

$$v = y + ky^2 + my^3 + ny^4 + py^5 \&c.$$

$$\text{erit } v^2 = y^2 + 2ky^3 + k^2y^4 + 2kmy^5$$

$$+ 2my^4 + 2ny^5$$

$$v^3 = y^3 + 3ky^4 + 3k^2y^5$$

$$+ 3my^5$$

$$v^4 = y^4 + 4ky^5$$

$$v^5 = y^5$$

(§. 95. part. I). Unde

$$v = y + ky^2 + my^3 + ny^4 + py^5 \&c.$$

$$- \frac{1}{2}v^2 = -\frac{1}{2}y^2 - ky^3 - \frac{1}{2}k^2y^4 - kmy^5$$

$$- my^4 - ny^5$$

$$+ \frac{1}{3}v^3 = \frac{1}{3}y^3 + ky^4 + k^2y^5$$

$$+ my^5$$

$$- \frac{1}{4}v^4 = -\frac{1}{4}y^4 - ky^5$$

$$+ \frac{1}{5}v^5 = \frac{1}{5}y^5$$

$$- y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 - \frac{1}{12}y^4 + \frac{1}{24}y^5 = 0$$

Habemus ergo

$$\frac{1 - 1 = 0}{1 = 1} \quad \frac{k - \frac{1}{2} = 0}{k = 1} \quad \frac{m - k + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0}{m = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}}$$

$$\frac{n - \frac{1}{2}k^2 - m + k - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = 0}{n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{12} = \frac{1}{12}}$$

$$p - km - n + k^2 + m - k + \frac{1}{5} + \frac{1}{24} = 0$$

$$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 1 - \frac{1}{2} + 1 - \frac{5}{24} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12} - \frac{3}{12} = -\frac{2}{12} = -\frac{1}{6}$$

$$\text{Consequenter}$$

$$(1 + y)^{1+y} = 1 + v = 1 + y + y^2 + \frac{1}{2}y^3$$

$$+ \frac{1}{3}y^4 + \frac{1}{12}y^5 \&c. \text{ in infinitum.}$$

Quare differentiale ad integrandum

$$\text{propositum } (1 + y)^{1+y} dy = dy + y dy$$

$$+ y^2 dy + \frac{1}{2}y^3 dy + \frac{1}{3}y^4 dy + \frac{1}{12}y^5 dy \&c.$$

$$\text{in infinitum, adeoque } \int (1 + y)^{1+y} dy$$

$$= y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{8}y^4 + \frac{1}{15}y^5 + \frac{1}{72}y^6 \&c.$$

PRO-

PROBLEMA CXIV.

268. *Quantitatem exponentialem, consequenter curvam exponentialem, cuius æquatio datur, construere.*

RESOLUTIO.

Tab. I II. Fig. 30. Quantitates exponentiales reducendæ sunt ad logarithmicas, quæ per abscissas Logarithmicæ exhiberi possunt.

E. gr. Sit construenda curva exponentialis, ad quam $x^x = y$, erit (§. 339 *Arithm.*) $xlx = ly$. Supponamus Logarithmicam MBN descriptam & in ea semiordinatam $AB = 1$. Sit $PM = x$; erit $AP = lx$. Est vero $1 : lx = x : ly$ (§. 299 *Arithm.*). Ergo ly reperiri potest (§. 271 *Geom.*): cui si æqualis in axe Logistica sumatur AH, erit $HI = y$ (§. 506.

part. 1). Quodlibet adeo curvæ exponentialis punctum G reperitur sequentem in modum:

Fiat $AC = x$ & ducatur MC ipsi AP parallela, quæ Logisticam in M secabit; erit $MC = AP = lx$. Fiat $CD = AB = 1$ & $DE = AC$, ducaturque LE ipsi MC parallela; erit $LE = ly$. Ducatur LH ipsi EA parallela; erit $HI = y$. Quodsi ergo AC sumatur pro axe curvæ exponentialis fiatque $CG = HI$; erit G punctum in curva quæsitæ.

Porro cum $x = 0$, erit $ly = 0$. Sed 0 est logarithmus unitatis. Ergo y est unitas, consequenter = AB. Quare si fiat $AF = AB$; erit F punctum curvæ exponentialis.

Similiter quando $AB = 1 = x$, erit $lx = 0$, adeoque ad AB applicatay est 1 seu ipsi AB æqualis. Quamobrem si fiat $BK = BA$; erit K punctum curvæ exponentialis.

CAPUT II.

De usu Calculi exponentialis in Curvarum exponentialium Symptomatis investigandis.

DEFINITIO XII.

269. **C**urva exponentialis est quæ definitur per æquationem exponentialem.

DEFINITIO XIII.

270. *Æquatio exponentialis est, quam ingreditur quantitas exponentialis.*

PROBLEMA CXV.

271. *Invenire subtangentem curvæ, in qua $a^x = y$.*

$$\begin{array}{l} \text{Quoniam} \quad a^x = y \\ \text{erit} \quad \frac{xla = ly}{ladx = dy : y} \quad (\S. 243) \\ \quad \quad \quad dx = dy : yla \end{array}$$

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

Ergo subtangens $ydx : dy$ (§. 20) = $ydy : ylad y = 1 : la$.

Constructio. Sit descripta Logistica quæcunque MBN & in ea $AB = 1$. Fiat $AC = a$ ducaturque CM ipsi AP & MP ipsi AC parallela: erit $PM = AC = a$ & $AP = la$ (§. 554. *part. 1*). Fiat porro $PQ = AB = 1$, itemque QT ipsi AB parallela; erit $TQ = 1 : la$ (§. 302. *Arithm.* & §. 268. *Geom.*).

COROLLARIUM.

272. Quoniam curvæ subtangens $1 : la$ constans: æquatio proposita ad Logarithmicam est.

SCHOLIUM.

273. Nempse si subtangens Logistica fuerit $1 : la$; ea definitur per $a^x = y$.

Rrr

PRO-

PROBLEMA CXVI.

Tab. I. 274. *Quadrare spatium Logisticum*
Fig. 8. *interminatam* HPMI.

Sit Logisticae subtangens PT = 1 : la:

$$PM = y, Pp = dx; \text{erit}$$

$$\frac{a^x = y}{\text{ (§. 271)}}$$

$$\frac{xla = ly}{\text{}}$$

$$\frac{ladx = dy}{\text{ (§. 243)}}$$

$$\frac{dx = dy}{\text{ (§. 243)}}$$

$$\frac{ydx = ydy}{\text{ (§. 243)}}$$

$$\frac{fydx = y : la = y(1 : la) = PM. PT}{\text{}}$$

COROLLARIUM I.

275. Spatium Logisticum interminatam HPMI est trianguli subtangente PT, tangente TM, & semiordinata PM contenti duplum (§. 385 Geom.).

COROLLARIUM II.

276. Quoniam Spatium HPMI = PM. PT & ISQH = SQ. PT (§. 274); erit QPMS (PM - SQ)PT, hoc est, spatium inter duas semiordinatas interceptum æquale rectangulo ex subtangente in differentiam semiordinatarum.

PROBLEMA CVXII.

277. *Cubare solidum Logisticum ex rotatione spatii interminati HPMI circa asymptotum PH geniti.*

Quoniam (§. 274)

$$\frac{dx = dy}{\text{ (§. 197)}}$$

$$\frac{py^2 dx : 2r = py^2 y d}{\text{ (§. 197)}}$$

$$\frac{2ryla = pydy}{\text{ (§. 197)}}$$

$$\frac{2ryla = pydy}{\text{ (§. 197)}}$$

COROLLARIUM I.

278. Quoniam $py^2 : 2r$ est circulus radio $PM = y$ descriptus (§. 197), $py^2 : 4rla$ est cylindrus, cujus basis eadem est cum basi solidi logistici, altitudo vero 1 : $2la$ seu $\frac{1}{2}PT$ (§. 441. Geom.).

COROLLARIUM II.

279. Est ergo solidum istud logisticum ad conum, cujus altitudo subtangens $PT = 1 : la$,

semidiameter basis $PM = y$, ut $py^2 : 4rla$ ad $py^2 : 6rla$, hoc est, ut $\frac{1}{4}$ ad $\frac{3}{2}$ seu ut 6 ad 4., aut ut 3 ad 2 (§. 124 part 1).

PROBLEMA CXVIII.

280. *Determinare subnormalem Logisticam.*

Quoniam $ladx = dy : y$ (§. 274),

$$\text{erit } \frac{dy = yladx}{\text{}}$$

$$\frac{ydy : dx = y_2 ladx : dx}{\text{ (§. 35)}}$$

$$= y^2 la = y^2 : \frac{1}{la}$$

Est adeo subnormalis tertia proportionalis ad tangentem $PT = 1 : la$ & semiordinatam $PM = y$.

COROLLARIUM.

281. Quodsi ergo parabola describatur, cujus parameter subtangenti logisticae æqualis; semiordinatae parabolae eadem sunt cum semiordinatis logisticae, illius autem abscissis hujus subnormales æquantur.

PROBLEMA CXIX.

282. *Determinare subtangentem curvae exponentialis, ad quam $x^x = y$.*

Quoniam $x^x = ly$

$$\text{erit } \frac{lxdx + xdx : x = dy : y}{\text{}}$$

$$\frac{ylxdx + ydx = dy}{\text{}}$$

Ergo subtangens $ydx : dy = ydx : (ylxdx + ydx) = 1 : (lx + 1)$.

Est itaque PT tertia proportionalis ad $AB + AP = 1 + lx$ & $AB = 1$ (§. 208).

PROBLEMA CXX.

283. *Determinare subnormalem curvae, ad quam $x^x = y$.*

Quia $ylxdx + ydx = dy$ (§. 221); erit subnormalis $ydy : dx = (y^2 lxdx + y^2 dx) : dx$ (§. 34) = $y^2 lx + y^2 = y^2 (lx + 1)$

Quærenda igitur est ad $AB = 1$ & $PM = y$ tertia proportionalis y^2 & hinc porro ad $AB = 1$, $AB + AP = 1 + lx$ atque lineam

Tab.
III.
Fig. 30.

lineam inventam y^2 quarta proportio-
nalis.

PROBLEMA CXXI.

Tab. 284. Determinare minimam applica-
III. tam SR in curva exponentiali, ad quam

Fig. 30. $x^x = y$.

Quoniam $y l x dx + y dx = dy$ (§. 282);
fiat

$$y l x dx + y dx = 0 \text{ (§. 61).}$$

$$\text{erit } l x + 1 = 0$$

$$1 = - l x$$

Fiat ergo $AT = AB = 1$; erit $TV = AR = x$ (§. 554 part. I.).

Quodsi pro $l x$ in æquatione curvæ $x l x = l y$ substituatur valor modo inventus -1 ; prodibit $x = -l y$. Fiat igitur $AQ = VT = -x$; erit $NQ = y$ (§. cit. part. I.).

PROBLEMA CXXII.

285. Quadrare curvam exponentialem, ad quam $x^x = y$.

Quoniam elementum areæ $y dx$ (§. 98.); erit area curvæ $= \int x^x dx =$ (si pro x ponatur $1 + v$) $v + \frac{1}{2} v^2 + \frac{1}{3} v^3 + \frac{1}{4} v^4 + \frac{1}{5} v^5 + \frac{1}{6} v^6$ &c. in infinitum (§. 267).

PROBLEMA CXXIII.

286. Invenire æquationem ad curvam, cujus subtangens $= 1 : (1 + l x)$.

Quoniam $1 : (1 + l x) = y dx : dy$ (§. 20)

$$\text{erit } dy = y (1 + l x) dx$$

$$dy : y = dx + l x dx$$

$$\int dy : y = l y, \int (dx + l x dx) = x l x$$

$$l y = x l x$$

$$y = x^x \text{ (§. 337 Arithm.)}$$

PROBLEMA CXXIV.

287. Invenire æquationem ad curvam, cujus subnormalis $y^2 (l x + 1)$.

Quoniam $y^2 (l x + 1) = y dy : dx$ (§. 35)

$$\text{erit } y^2 (l x + 1) dx = y dy$$

$$l x dx + dx = dy : y$$

$$x l x = l y \text{ (§. 243)}$$

$$x^x = y \text{ (§. 341. Arithm.)}$$

PROBLEMA CXXV.

288. Invenire æquationem ad curvam, cujus subnormalis $y^2 l a$.

Quoniam $y^2 l a = y dy : dx$ (§. 35)

$$\text{erit } y^2 l a dx = y dy$$

$$l a dx = dy : y$$

$$x l a = l y \text{ (§. 243)}$$

$$a^x = y \text{ (§. 341 Arithm.)}$$

Est ergo Curva quæsita Logarithmica vulgaris seu Logistica (§. 272).

PROBLEMA CXXVI.

289. Invenire æquationem ad curvam, cujus area $(2x^2 l x - x^2) : 4 l a$.

Quoniam (§. 98)

$$(4x l x dx + 2x dx - 2x dx) : 4 l a = y dx$$

$$\text{erit } 4x l x = 4 y l a$$

$$x l x = y l a$$

$$x^x = a^y \text{ (§. 341. Arithm.)}$$

Curva hæc vi probl. II 4. (§. 268)

ita construitur ope Logarithmicæ vulgaris MBN. Sit nempe $AB = 1$; quæ in infinitum producat. Fiat $AD = a$ & $AC = x$, ducanturque DL & CM ipsi AP , HL & PM ipsi AC parallelæ; erit $DL = AH = l a$ & $CM = AP = l x$ (§. 268). Fiat $AF = AH$ & ducatur FE ipsi CG parallela, per A vero & E recta AG ipsi CM continuatæ in G occurrens, erit $CG = x l x : l a = y$ (§. 268 Geom.), adeoque punctum G in curva quæsita, quæ definitur per $x^x = a^y$.

Tab. III. Fig. 32.

COROLLARIUM I.

290. Quia $lxdx + dx = ldy$ (§. 243.)

erit $dx = ldy : (lx + 1)$

$ydx : dy = yla : (lx + 1)$ (§. 20).

Est ergo subtangens curvæ hujus exponentialis quarta proportionalis ad $AB + AP$, CG & constantem AH .

COROLLARIUM II.

Quia $(lxdx + dx) : la = dy$ (§. 290); erit yd ; $lx = y(lx + 1)$; la adeoque subnormalis

curvæ hujus exponentialis est quarta proportionalis ad constantem AH , ad $AP + AB$ & ad CG .

COROLLARIUM III.

292. Est ergo subtangens ad subnormalem y ut $la^4 : (lx + 1)$ ad $y(lx + 1) : la$, hoc est, ut la^2 ad $(lx + 1)^2$ (§. 124. part. 1) Quare quadratum compositæ ex constante AB & variabili AP est ad quadratum constantis AH ut subnormalis curvæ exponentialis ad ejus subtangentem.

SECTIO QUARTA.

DE CALCULO DIFFERENTIO-DIFFERENTIALI.

CAPUT I.

De natura Calculi differentio - differentialis.

DEFINITIO XIV.

293. **C**alculus differentio - differentialis est methodus quantitates differentiales denuo differentiandi.

COROLLARIUM.

294. Quoniam signum differentialis est d (§. 8): differentiale ipsius dx erit ddx : differentiale ipsius ddx erit ddd & ita porro.

HYPOTHESIS

295. Scribantur ddx , ddd , ddd &c. compendiosius d^2x , d^3x , d^4x &c.

DEFINITIO XV.

296. Differentiale primi gradus est infinitesima quantitatis ordinariæ, ut dx . Differentiale secundi gradus est infinitesima quantitatis differentialis primi gradus, veluti ddx , $dx dx$ vel dx^2 , $dx dy$. Differentiale tertii gradus est

infinitesima quantitatis differentialis secundi gradus, ut ddd , dx^3 , $dx dy dz$ & ita porro.

PROBLEMA CXXVII.

297. Invenire regulas differentiandi differentia quæcumque data.

RESOLUTIO.

Eodem prorsus modo investigari possunt, quo supra invenire docuimus regulas differentiandi quantitates ordinarias (§. 17. 19): id quod uno alteroque exemplo ostendere libet.

E. gr 1. Sit investigandum differentiale ipsius xdx .

Fiat $\frac{xdx = v}{dx = v : x}$

erit $\frac{d^2x = (xdv - vdx) : x^2}{x^2 d^2x = xdv - vdx}$ (§. 19.)

$\frac{vdx + x^2 d^2x = xdv}{vdx + x^2 d^2x = xdv}$

hoc

hoc est, ob $v = xdx$

$$xdx^2 + x^2d^2x = xdv$$

$$dx^2 + xd^2x = dv$$

Differentiatur ergo xdx eodem modo, quo duæ quantitates ordinariæ se mutuo multiplicantes differentiari solent (§ 12.)

II. Sit differentiale ipsius $x : dx$ investigandum.

Fiat $x : dx = v$

$$x = vdx$$

$$dx = vd^2x + dx dv \text{ per cas. præc.}$$

$$dx - vd^2x = dx dv$$

hoc est, ob $v = x : dx$

$$dx - xd^2x : dx = (dx^2 - xd^2x) : dx = dx dv$$

$$(dx^2 - xd^2x) : dx^2 = dv$$

Differentiatur itaque $x : dx$ eodem modo, quo quantitates ordinariæ se mutuo dividentes differentiari solent (§ 19.)

III. Sit differentiale ipsius dx^2 investigandum.

Fiat $dx^2 = v$

erit $dx = v : dx$

$$d^2x = (dx dv - vd^2x) : dx^2 \text{ per cas. 2.}$$

$$dx^2 d^2x = dx dv - vd^2x$$

$$vd^2 + dx^2 d^2x = dx dv$$

hoc est, ob $v = dx^2$

$$dx^2 d^2x + dx^2 d^2x = 2dx^2 d^2x = dx dv$$

$$2dx d^2x = dv$$

Differentialium igitur potentia veluti dx^2 , eodem modo differentiantur, quo potentia

quantitatum ordinariarum differentiari solent (§. 13. seqq.)

COROLLARIUM I.

298. Cum differentialia composita aut se mutuo multiplicent. aut se mutuo dividant, aut potentia sive perfecta, sive imperfecta differentialium primi gradus existant; differentialia eodem modo, quo quantitates ordinariæ, differentiantur.

COROLLARIUM II.

299. Calculus adeo differentio differentialis non est diversus a calculo differentiali (§. 293.).

PROBLEMA CXXVIII.

300. Differentiare differentialia.

RESOLUTIO

Differentialia considerentur instar ordinariarum quantitatum & ex circumstantiis casuum specialium dijudicetur quænam sint variables, quænam constantes. Ipsa vero differentiatio absolvatur per problemata cap. I. sect. I. (vi §. 299.)

E gr. Sit differentiale denuo differentiandum $= 1 : dx$ & 1 quantitas constans, erit $d(1 : dx) = -d^2x : dx^2$ (§. 19). Similiter reperitur $d(y dy : dx) = (dy^2 + y d^2y) : dx$, si dx constans, vel $(dx dy^2 - y dy d^2x) : dx^2$, si dy constans.

C A P U T I I.

De usu Calculi differentio-differentialis in inveniendo puncto flexus Contrarii curvarum.

DEFINITIO XVI.

Tab. III. Fig. 33. N. 1. 301. **P**unctum flexus contrarii est punctum M, in quo curva flectitur in partes contrarias, ut scilicet axi, aut puncto cuidam fixo convexitatem obvertat, cum antea concavitatem obverteret. Vocatur *Punctum regressus*, si curva AMI in contrarias partes flexa regreditur versus verticem A.

PROBLEMA CXXIX.

302. Determinare punctum flexus contrarii in curvis, quarum ordinate sunt inter se parallele.

RESOLUTIO.

Tab. III. Fig. 33. N. 1, 2. Sint duæ curvæ AMS, quarum una axi concavitatem, altera convexitatem obvertat. Ducatur tangens TM, sintque PM, pm & QS infinite propinquæ, & $Pp = pQ$, hoc est, dx sit constans. Demittantur ex punctis curvarum M & m perpendiculares MR & mr. Quoniam pm ipsi QS parallela, per *hypoith.* erit $angulus m = S$ (§. 233. *Geom.*). Sed $MR = Pp$ & $mr = pq$ per *hypoith.* adeoque $MR = mr$ (§. 87. *Arithm.*). Ergo $mR = rS$ (§. 251 *Geom.*). Est vero $Sr > Vr$, quando curva axi concavitatem obvertit, & $Sr < Vr$, quando convexitas curvæ axem respicit. Quamobrem in casu priore differentia semiordinatarum dy continuo decrescit, in posteriore autem crescit, sumpta abscissæ differentia dx pro constans. In

puncto itaque flexus contrarii differentia semiordinatarum dy est minimum aliquod, quando curva primum ad axem concava, deinde convexa; maximum vero aliquod, quando curva ad axem primum convexa, deinde concava. Invenitur adeo illud punctum, si fiat $ddy = 0$ vel $ddy = \infty$, hoc est, si sumpta dx pro constans, valor ipsius dy denuo differentietur (§. 300.) & quæ prodit differentia vel nihilo, vel infinito æqualis ponatur.

COROLLARIUM.

303. Quodsi æquatio ad curvam ignotam detur; inveniri potest, utrum convexitatem, an concavitatem axi obvertat, si ex æquatione differentiali eruatur ratio mr & MR. E. gr In parabola (§. 388. part. 1.)

$$ax = y^2$$

$$\text{adeoque } adx = 2ydy$$

$$a : 2y = dy : dx$$

$$\text{hoc est. } a : 2\sqrt{ax} = dy : dx$$

Crescente adeo abscissa x , decrescit ratio $a : 2\sqrt{ax}$ (205. *Arithm.*) Quare cum dx sit constans, per *hypoth.* dy decrescere debet (§. 204. *Arithm.*) Parabola igitur constanter concavitatem axi obvertit, adeoque punctum flexus contrarii habet nullum.

PROBLEMA CXXX.

304. Determinare punctum flexus contrarii M in Cycloide FMN ejus natu-Tab. III. Fig. 34. re, ut sit $AQB : BN = AQ : QM$.

Sit

Sit semiperipheria circuli genitoris
 $AQB = p$, $BN = a$, $AB = 1$, $PQ = v$,
 $AQ = z$, $AP = x$, $PM = y$. Quoniam
per hypoth.

$$AQB : BN = AQ : QM$$

$$p : a = z : \frac{az}{p}$$

$$\text{erit } PM = PQ + QM = v + az : p$$

Est adeo æquatio ad curvam

$$y = v + az : p$$

$$\text{unde } dy = dv + adz : p.$$

Sed $dz = dx : 2\sqrt{(x - xx)}$ (§. 157.) &

ob $v = \sqrt{(x - xx)}$ (§. 377. part. 1.),

$$dv = (dx - 2x dx) : 2\sqrt{(x - xx)}.$$

$$\text{Ergo } 2 p dy = (p dx - 2 p x dx + adx) : \sqrt{(x - xx)}.$$

Quodsi adeo dx fumatur pro constan-
 te; erit (§. 300.)

$$2 p ddy = \frac{2 p \sqrt{(x - xx)} dx^2}{x - xx}$$

$$\frac{p dx^2 - 4 p x dx + adx^2 + 4 p x^2 dx - 2 a x dx}{(x - x^2) 2 \sqrt{(x - xx)}}$$

$$= \frac{(-4 p x + 4 p x^2 - p + 4 p x - a - 4 p x^2 + 2 a x) dx^2}{2 (x - xx) \sqrt{(x - xx)}}$$

$$= \frac{(2 a x - p - a) dx^2}{2 (x - xx) \sqrt{(x - xx)}} \text{ Quare (§. 302.)}$$

$$\frac{(2 a x - p - a) dx^2}{2 (x - xx) \sqrt{(x - xx)}} = 0$$

$$2 a x - p - a = 0$$

$$2 a x = a + p$$

$$x = \frac{1}{2} + p : 2 a$$

$$\text{Ergo } CP = AP - AC = x - \frac{1}{2} = p : 2 a$$

Est adeo $a : p = \frac{1}{2} : CP$

$$BN : AQB = BC : CP.$$

PROBLEMA CXXXI.

305. Determinare punctum flexus contra-
 rii in curva, ad quam $axx = (xx + aa)y$.

$$\text{Quoniam } axx = (xx + aa)y$$

$$\text{erit } \frac{axx : (xx + aa)}{2ax^2 dx + 2a^2 x dx - ax^3 2 dx} = dy$$

$$\frac{2ax^2 dx + 2a^2 x dx - ax^3 2 dx}{(xx + aa)^2} = dy$$

$$\text{hoc est, } \frac{2a^2 x dx}{x^4 + 2a^2 x^2 + a^4} = dy$$

Quodsi adeo dx fumatur pro constante,
 reperietur (§. 300.)

$$\frac{(2a^2 x^4 + 4a^2 x^2 + 2a^2) dx^2 - (8a^3 x^4 + 8a^2 x^2) dx^2}{(x^2 + a^2)^4}$$

$$= \frac{2a^2 - 6a^3 x^2 - 4a^2 x^2) dx}{(x^2 + a^2)^4} = ddy$$

Quare (§. 302.)

$$2a^7 - 6a^3 x^4 - 4a^2 x^2 = 0$$

$$a^4 - 3x^4 - 2a^2 x^2 = 0$$

$$aa + xx$$

$$aa - 3xx = 0$$

$$aa = 3xx$$

$$\frac{1}{3} aa = xx$$

$$\sqrt{\frac{1}{3} aa} = x$$

Quodsi valor ipsius x^2 in æquatione
 data $axx = (xx + aa)y$ substituatur:
 prodibit

$$\frac{1}{3} a^3 = \frac{4}{3} aay$$

$$\frac{1}{3} aa$$

$$\frac{1}{4} a = y$$

Quare si $\sqrt{\frac{1}{3} aa}$ & $\frac{1}{4} a$ jungantur ad an-
 gulos rectos, punctum flexus contrarii
 determinatur, utut curva nondum fue-
 rit descripta.

PROBLEMA CXXXII.

306. Determinare punctum flexus
 contrarii in curva, ad quam $4b^3 x =$
 $2b^2 y^2 - y^4$

Quoniam $4b^3 x = 2b^2 y^2 - y^4$

$$\text{erit } \frac{4b^3 dx = 4b^2 y dy - 4y^3 dy}{b^3 dx} = dy$$

$$\frac{b^3 dx}{by - y^3} = dy$$

Porro quoniam dx constans, repe-
 rietur (§. 300.),

ddy

$$\frac{ddy = \frac{-b^3 dx dy + 3b^1 y^2 dx dy}{(b^2 y - y^3)^2} = 0}{3b^1 y^2 - b^3 = 0}$$

$$3y^2 = b^2$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{3} b^2}$$

Substituatur hic valor in æquatione ad curvam $4b^3 x = 2b^2 y^2 - y^4$, erit

$$4b^3 x = \frac{2}{3} b^4 - \frac{1}{9} b^4 = \frac{5}{9} b^4$$

$$x = \frac{5}{36} b$$

Quodsi fit $x = 0$, erit

$$2b^2 y^2 - y^4 = 0$$

$$2b^2 = y^2$$

$$\sqrt{2b^2} = y$$

Quodsi ponamus $dy = \infty$, erit ob

$$b^3 dx : (b^2 y - y^3) = dy$$

$$b^2 y - y^3 = 0$$

$$b^2 - y^2 = 0$$

$$b^2 = y^2$$

$$b = y$$

in casu maximi (§. 63).

Quodsi denique hic valor substituatur in æquatione ad curvam $4b^3 x = 2b^2 y^2 - y^4$; erit

$$4b^3 x = 2b^4 - b^4 = b^4$$

adeoque $x = \frac{1}{4} b$

Curvæ igitur hujus ductus est profusus mirabilis.

PROBLEMA CXXXIII.

307. Determinare punctum flexus contrarii in curva, ad quam $ay^2 = x^3 - bx^2$.

Quia $ayy = x^3 - bx^2$

erit $\frac{2aydy = 3x^2 dx - 2bx dx}{2aydy = 3x^2 dx - 2bx dx}$

$$dy = \frac{3x^2 dx - 2bx dx}{2ay}$$

$$ddy = 0 = 0$$

$$\frac{12axy dx^2 - 4aby dx^2 - 6ax^2 dx dy + 4abx dx dy}{4a^2 y^2}$$

Hinc

$$(12axy - 4aby) dx^2 = (6ax^2 - 4abx) dx dy$$

$$\frac{(6x - 2b) y dx}{3x^2 - 2bx} = dy = \frac{(3x^2 - 2bx) dx}{2ay}$$

$$(12x - 4b) ayy = (3x^2 - 2bx)^2$$

$$(12x - 4b) (x^3 - bx^2) = (3x^2 - 2bx)^2$$

hoc est,

$$12x^4 - 16bx^3 + 4b^2 x^2 = 9x^4 - 12bx^3 + 4b^2 x^2$$

$$3x^4 - 4bx^3 = 0$$

$$3x - 4b = 0$$

$$3x = 4b$$

$$x = \frac{4}{3} b$$

Substituatur valor ipsius x in æquatione data $ayy = x^3 - bx^2$; reperietur $ayy = \frac{64}{27} b^3 - \frac{16}{9} b^3 = \frac{64}{27} b^3 - \frac{48}{27} b^3 = \frac{16}{27} b^3 = \frac{2}{9} b^3$

$$y = \frac{1}{3} \sqrt{(2b^3 : a)}$$

PROBLEMA CXXXIV.

308. Determinare punctum flexus contrarii in curva ad quam $y - a = (x - a)^{3/5}$

Quoniam $y - a = (x - a)^{3/5}$

erit $dy = \frac{3}{5} (x - a)^{-2/5} dx$

Quodsi ergo dx sumatur pro constante; reperietur

$$\frac{ddy = -\frac{6}{25} (x - a)^{-7/5} dx^2 = 0}{-\frac{6}{25} (x - a)^{-7/5} = 0}$$

$$-6 = 0$$

Quoniam nullus valor ipsius x prodit in hypothefi $ddy = 0$; ponatur

$$-6 dx$$

$$\frac{-6dx^2 : 25 (x-a)^{7:5} = \infty}{\text{erit } 25 \cdot \frac{(x-a)^{7:5} = 0}{x-a=0}}$$

$$x = a$$

PROBLEMA CXXXV.

309. Determinare punctum flexus contrarii in curvis, quarum semiordinata CM, Cm, ex puncto fixo C ducuntur.

Sit Cm ipsi CM infinite propinqua & CM=y. Tangat TM curvam in puncto M & occurrat ipsi CT ad CM perpendiculari in T. Erigatur etiam Ct perpendicularis ad Cm & ducatur tangens tm ad punctum m, quæ ipsi Ct in t occurret. Secabit autem tangens TM perpendicularem Ct in L, eritque Ct < CL, quando curva puncto C seu polo convexitatem obvertit; aut eadem Ct > CL, quando curva est versus polum C concava. Igitur in flexus contrarii puncto Lt=0. Describatur jam ex centro C radio CM arcus MR=dx & radio CT arcus TH; erit ob MCT=m Ct (§.145. Geom.) MCm=HCT (§. 91. Arithm.), consequenter arcus TH ∼ MR (§. 141. Geom.). Porro TCM est rectus per construct. MRm itidem rectus (§. 38.), adeoque TCM=MRm (§. 145. Geom.) Et quia TMC=MmC + MCm (§.239 Geom.), & MCm=0; erit MmR=TMC, consequenter (§. 267. Geom.)

$$mR : MR = MC : TC$$

$$dy : dx = y : \frac{ydx}{dy}$$

Et ob arcus MR & TH similes per demonstrata, erit (§. 413. Geom. & §. 171. Arithm.)

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

$$CM : CT = MR : TH$$

$$y : \frac{ydx}{dy} = dx : \frac{dx^2}{dy}$$

Denique cum verticales ad L sint æquales (§. 156 Geom.) ob infinite parvum LCT vero MLC = LTC (§. 239. Geom.) & H rectus (§.38.), MCT itidem rectus per construct. erit (§.267. Geom.)

$$CM : CT = TH : HL$$

$$y : \frac{ydx}{dy} = \frac{dx^2}{dy} : HL$$

Ergo HL=dx³:dy².

Est vero ob CT=ydx:dy, sumto arculo MR=dx pro constante, t H=(dxdy²—ydxddy):dy² (§. 300.) Ergo tL=tH+HL=(dxdy²—ydxddy + dx³):dy².

$$\text{Fiat jam } \frac{dxdy^2 - ydxddy + dx^3}{dy^2} = 0$$

$$\text{erit } dy^2 + dx^2 = yddy$$

PROBLEMA CXXXVI. Tab. I.

310. Determinare punctum flexus contrarii in Conchoide Nicomedis. Fig. 5.

Sit AB=qM=a, BC=b, Cq=z, CM=y, Mr=dx, erit mr=dy & (§. 535. part. 1.)

$$\frac{z+a=y}{dz=dy}$$

Porro Bq=√(zz—bb) (§.417. Geom.) & ducto arculo qt, erit ob rectos t & B atque s & q non nisi infinite parvo angulo qCs differentes (§. 239. Geom.) adeoque æquales (§. 4.) Δ Sgt ∼ ΔBCq (§.267. Geom.), consequenter:

$$Bq : BC = St : tq$$

$$\sqrt{(z^2 - b^2)} : b = dz : \frac{bdz}{\sqrt{(z^2 - b^2)}}$$

Et ob sectores Cqt & CMr similes est

$$Sst : Cq^2$$

Cq: qt = CM: Mr

$$2 : \frac{bdz}{\sqrt{z^2 - b^2}} = z + a : \frac{bzdz + ab^2z}{\sqrt{z(z^2 - b^2)}}$$

Unde $dx = (bzdz + ab^2z) : z\sqrt{(z^2 - b^2)}$

$$\frac{zdx\sqrt{(z^2 - b^2)} = bzdz + ab^2z}{zdx\sqrt{(z^2 - b^2)} = dz = dy}$$

Si itaque dx sumatur pro constante, cum sit differentiale ipsius $zdx\sqrt{(z^2 - b^2)}$ $= dzdx\sqrt{(z^2 - b^2)} + z^2dzdx : \sqrt{(z^2 - b^2)}$ $= (2z^2 - b^2)dzdx : \sqrt{(z^2 - b^2)}$ & differentiale denominatoris $bz + ab = bdz$, reperitur $ddy = \frac{zabz^2 - ab^3 + 2bz^3 - b^3dz}{(ab + bz)^2 \sqrt{(z^2 - b^2)}} - \frac{bz\sqrt{(z^2 - b^2)}dzdx}{(ab + bz)^2} - \frac{(zabz^2 - ab^3 + bz^3)dzdx}{(ab + bz)^2 \sqrt{(z^2 - b^2)}}$

$$= \text{substituto valore ipsius } dz, (2abz^3 - ab^3z + bz^4)dx : (ab + bz)^3.$$

Quoniam in puncto flexus contrarii $yddy = dx^2 + dy^2$ (§. 308.)

hinc tandem eruitur

$$\begin{aligned} b(z + a)(2az^3 - ab^2z + z^4)dx &: (ab + bz)^3 \\ &= dx^2 + (z^4 - b^2z^2)dx : (ab + bz)^2 \\ \frac{2az^3 - ab^2z + z^4}{2az^3 - ab^2z} &= \frac{(ab + bz)^2 + z^4 - b^2z^2}{2az^3 - ab^2z} \\ &= \frac{a^2b^2 + 2ab^2z}{2az^3 - 3ab^2z} = \frac{a^2b^2}{2az^3 - 3ab^2z} \\ \frac{z^4 - \frac{1}{2}b^2z^2 - \frac{1}{2}ab^2}{bb} &= 0 \end{aligned}$$

Tab. I. Fig. 14. Describatur itaque parametro b parabola & (§. 622. part. 1.) fiat $AL = \frac{1}{4}b$ & $LI = \frac{1}{4}a$. Ex centro I per verticem A describatur circulus: dico esse $PM = z$. Nam $AI^2 = LI^2 + AL^2 = \frac{1}{16}aa + \frac{2}{16}bb$ & $MR = z - \frac{1}{4}a$, $AP = z^2 : b$, $IR = z^2 : b - \frac{1}{4}b$. Quare ob $AI^2 = MI^2 - MR^2 + IR^2$, $\frac{1}{16}aa + \frac{2}{16}bb = \frac{z^4}{bb} - \frac{1}{4}z^2 + \frac{2}{16}b^2 + z^2 - \frac{1}{2}az + \frac{1}{16}aa$

$$\frac{z^4}{bb} - \frac{1}{4}z^2 - \frac{1}{2}az = 0$$

$$\frac{z^3 - \frac{1}{2}b^2z - \frac{1}{2}ab^2}{z} = 0$$

SCHOLIUM.

311. Nisi inconsulta nobis visa fuisset figurarum multiplicatio, parabolam circa axem Tab. I. CT descripsissemus, statuto vertice in C & Fig. 5, crure sursum tendente.

PROBLEMA CXXXVII.

312. Determinare punctum flexus Tab. contrarii in spirali parabolica AMC, III. que generatur, si axis parabole in peripheriam circuli incurvatur. Fig. 36

Quoniam semordinatæ PM ad axem perpendiculares; in centro C concurrere debent (§. 38). Quare si parameter parabolæ a , abscissa $AP = v$, $PM = y$; erit æquatio ad spiralem parabolicam

$$av = y^2$$

adeoque $adv = 2ydy$

$$dv = 2ydy : a$$

Sit porro radius circuli $= r$, $MR = dx$; erit $CM = r - y$ &

$$CP : Pp = CM : MR$$

$$r : dv = r - y : dx$$

$$rdx = r dv - y dv$$

$$dx = (r - y) dv : r$$

hoc est, substituto valore ipsius dv

$$(2rydy - 2y^2dy) : ar = dx$$

$$(4r^2y^2 - 8ry^3 + 4y^4) dy^2 : a^2r^2 = dx^2$$

& si dx sumatur pro constante,

$$\frac{2r dy^2 - 4y dy^2 + 2ryddy - 2y^2ddy}{ar} = 0$$

$$\frac{(r - 2y) dy^2 + (ry - y^2) ddy}{(r - y) y ddy} = 0$$

$$(r - y) y ddy = (2y - r) dy^2$$

$$y ddy = \frac{(2y - r) dy^2}{r - y}$$

Habemus adeo

ob $dx^2 + dy^2 = yddy$ (§.309)

$$\frac{(4r^2y^2 - 8ry^3) + 4y^4 + a^2r^2}{a^2r^2} dy^2 = \frac{(2y-r)dy^2}{r-y}$$

$$4r^2y^2 - 8r^2y^3 + 4ry^4 + a^2r^2 - 4r^2y^3 + 8ry^4 - 4y^5 - a^2r^2y = 2a^2r^2y - a^2r^2$$

$$4y^5 - 12ry^4 + 12r^2y^3 - 4r^3y^2 + 3a^2r^2y - 2a^2r^2 = 0$$

Hujus æquationis radix y est semiordinata PM in puncto flexus contrarii.

C A P U T I I I.

De usu Calculi differentio-differentialis in investigandis evolutis curvarum & radio osculi.

DEFINITIO XVII.

Tab. III. Fig. 37. 313. SI curvæ BCF filum circumplacetur & successive iterum ab ea abducatur, extremitas ejus A in rectam MC extensi curvam aliam describit, quam *Hugenius* inventor (k) *Curvam ex evolutione descriptam*; sicut alteram, quæ evolvitur, *Evolutam* vocat.

DEFINITIO XVIII.

314. Portio fili MC appellatur *Radius Evolutæ*, item *Radius curvedinis*, *Radius osculi*. Circulus enim, qui radio evolutæ MC ex centro C describitur, dicitur curvam ex evolutione descriptam in M *osculari*.

COROLLARIUM I.

315. Evoluta igitur BCF est locus centrorum omnium circulorum curvam ex evolutione descriptam AMI osculantium.

COROLLARIUM II.

316. Quando punctum B cadit in A, radius evolutæ MC æquatur arcui BC, alias aggregato ex AB & arcu BC.

COROLLARIUM III.

317. Quia elementum arcus Mm in curva ex evolutione descripta est arcus circu-

(k) In Horolog. Oscillatorio part. 3. Def. 3. f. 60.

li radio CM descriptus (§. 313); radius evolutæ MC est ad curvam AI perpendicularis (§. 38).

COROLLARIUM IV.

318. Quoniam radius evolutæ MC ipsam evolutam BCF continuo tangit, ceu ex genesi manifestum (§. 313); curvæ ex evolutione per innumera puncta describuntur, si tangentes in quotlibet punctis evolutæ producantur: donec arcubus sibi respondentibus æquales fiant.

SCHOLIUM.

319. *Meditatio de curvarum osculis debetur illustri Leibnitio, qui primus evolutarum Hugenianarum in metienda curvedine curvarum usum ostendit.*

PROBLEMA CXXXVIII.

320. *Determinare radium osculi vel Tab. III. Fig. 37. curvedinis in curvis, quarum semior-*
dinata PM & pm sunt ad axem per-
pendiculares.

RESOLUTIO.

Sit semiordinata pm alteri PM infinite propinqua; sit item radius osculi Cm alteri CM infinite propinquus. Ducatur CE ipsi AB parallela, donec

Sff 2 semior-

femiordinatæ MP continuatæ in E occurrat, & MG eidem axi AB parallela. Quoniam anguli E & R sunt recti & ob EMG & CMm (§. 317) rectos adeoque æquales (§. 145 Geom.) utrinque angulo CMG sublato, EMC = GMm; erit (§. 267 Geom.)

$$MR : Mm = ME : MC$$

$$dx : \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = t : \frac{t \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{dx}$$

Jam cum radius MC constans intelligatur, quandiu ex centro C arcus infinite parvus Mm describitur, interea vero ME augeatur quantitate differentiali Rm; erit radii osculi CM differentiale nullum (§. 7). Sed, si dx sumatur pro constante, differentiale ipsius MC est

$$\frac{dt \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{dx} + \frac{t dy ddy}{\sqrt{(dx^2 + dy^2)} dx} =$$

$$\frac{dt dx^2 + dt dy^2 + t dy ddy}{dx \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}$$

$$\text{Ergo } \frac{dt dx^2 + dt dy^2 + t dy ddy}{dx \sqrt{(dx^2 + dy^2)}} = 0$$

$$\frac{dt dx^2 + dt dy^2}{dx \sqrt{(dx^2 + dy^2)}} = - t dy ddy$$

Quoniam mR differentiale femiordinatæ etiam differentiale ipsius ME ob PE constantem; erit dt = dy.

$$\text{Quare } dx^2 + dy^2 = - t dy ddy$$

$$(dx^2 + dy^2) : - ddy = t$$

Quodsi itaque ex æquatione ad curvam datam substituatur valor ipsius dy², & - ddy; prodibit ME = t in quantitatibus ordinariis.

Si vero radius evolutæ MC ipse desideretur (quem interdum inveniri præstat) fiat (§. 267 Geom.) ob PH = ydy : dx (§. 35)

$$MP : PH = ME : EC$$

$$y : \frac{y dy}{dx} = \frac{dx^2 + dy^2}{- ddy} : \frac{dx^2 dy + dy^3}{- dx ddy}$$

$$\text{Unde } EC^2 = \frac{dx^4 dy^2 + 2 dx^2 dy^4 + dy^6}{dx^2 ddy^2}$$

$$ME^2 = \frac{dx^4 + 2 dx^2 dy^2 + dy^4}{ddy^2} \\ = \frac{dx^6 + 2 dx^4 dy^2 + dx^2 dy^4}{dx^2 ddy^2}$$

$$MC^2 = \frac{dx^6 + 3 dy^2 dx^4 + 3 dy^4 dx^2 + dy^6}{dx^2 ddy^2}$$

$$= \frac{(dx^4 + 2 dx^2 dy^2 + dy^4)(dx^2 + dy^2)}{dx^2 ddy^2}$$

$$MC = \frac{(dx^2 + dy^2) \sqrt{(dx^2 + dy^2)}}{- dx ddy}$$

PROBLEMA CXXXIX.

321. Data æquatione ad curvam algebraicam, invenire æquationem ad evolutam.

RESOLUTIO.

1. Investigentur quantitates BN & CN in valore abscissæ AP aut femiordinatæ PM. Nimirum ME invenitur (§. 320): unde subducta PM relinquit PE = NC. Sed per analogiam PM : PH = ME : EC (§. 267 Geom.) reperitur EC. Si vero ex AP + EC = AN subtrahatur AB radius evolutæ in vertice B per probl. præc. determinandus, relinquitur BN.
2. Fiat valor ipsius BN = v, CN = z & communis æquationum reductio ad evolutam in puris v & z atque constantibus.

PROBLEMA CXL.

322. Invenire radium circuli parabolam osculantis & æquationem ad ejus evolutam.

I. Quo-

I. Quoniam $ax = y^2$

erit $\frac{adx = 2ydy}{adx : 2y = dy}$

$a^2 dx^2 : 4y^2 = dy^2$

h. e. $adx^2 : 4x = dy^2$

Et, si dx fumatur pro constante, invenietur ob $adx : 2\sqrt{ax} = dy$

$-adx^2 : 4x\sqrt{ax} = ddy$

Tab. III. Unde $\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy} = \frac{(4x dx^2 + adx^2) 4x\sqrt{ax}}{4ax dx^2}$

Fig. 37. $\frac{(x+4x)\sqrt{ax}}{a} = \sqrt{ax} + \frac{4x\sqrt{ax}}{a} = y + \frac{4xy}{a}$

$= t = ME = PM + PE$. Est vero $PM = y$. Ergo $PE = 4xy : a$ hoc est, quia $x = y^2 : a$, $PE = 4y^3 : aa$.

Constructio. Quoniam $PM = y, TP = 2y^2 : a$, (§. 21); si in T excitetur ad TM perpendicularis TE ipsi MP continuata in E occurrens; erit $PE = 4y^3 : aay = 4y^3 : aa$ (§. 327 Geom). Quodsi ulterius in E & M excitentur perpendiculares EC & MC ad ME & MT; communis intersectio in C radius osculi seu evolutæ MC determinabit (§. 317).

II. Quoniam EC ipsi PH parallela; erit (§. 267 Geom.) ob $PH = \frac{1}{2}a$ (§. 36).

$PM : PH = ME : EC$

$y : \frac{1}{2}a = y + \frac{4xy}{a} : \frac{1}{2}a + 2x$

adeoque $EC^2 = \frac{1}{4}aa + 2ax + 4xx$

$ME^2 = ax + 8x^2 + 16x^3 : a$

$MC^2 = \frac{1}{4}aa + 3ax + 12x^2 + 16x^3 : a$

Jam cum MC coincidit in AB, hoc est, quando radius evolutæ est AB, $x = 0$. Quare $AB^2 = \frac{1}{4}aa$ & hinc $AB = \frac{1}{2}a$. Est adeo $BN = AP + PN = AB = 3x + \frac{1}{2}a = \frac{1}{2}a = 3x$. Sit jam $BN = v$, $CN = PE = z$: erit.

$v = 3x$ $z = 4x\sqrt{ax} : a$

$\frac{1}{3}v = x$ $z = \frac{4}{3}v\sqrt{\frac{1}{3}av} : a$

$3az = 4v\sqrt{\frac{1}{3}av}$

$9a^2 z^2 = \frac{16}{3}av^3$

----- a : 3

$27az^2 = 16v^3$

En æquationem ad evolutam Parabolæ Apolloniana: unde intelligitur evolutam parabolæ Apollonii esse parabolam secundi generis, cujus parameter $\frac{27}{16}$ parametri in parabola Apolloniana.

III. Si MC in terminis analyticis quærratur, erit, substitutis in formula generali $(dx^2 + dy^2)\sqrt{(dx^2 + dy^2)} : -dx ddy$ valoribus dy^2 & $-ddy$ paulo ante inventis, $MC = (dx^2 + \frac{adx^2}{4x})\sqrt{(dx^2 + \frac{adx^2}{4x})} 4x\sqrt{ax} : adx^3 = (4x + a)dx^3\sqrt{(4x + a)4x\sqrt{ax}} : 8ax dx^3\sqrt{x} = (4x + a)\sqrt{(4x + a)} : 2\sqrt{a}$

Quodsi fiat $x = 0$, erit vi n. 1. $ME = 0$ & $MC = a\sqrt{a} : 2\sqrt{a} = \frac{1}{2}a$, hoc est, circuli parabolam in vertice osculantis diameter æquatur parametro & centrum ejus ob $ME = 0$ est in axe parabolæ.

Porro quia $MC = \frac{(4x + a)\sqrt{(4x + a)}}{2\sqrt{a}} = \frac{(4ax + aa)\sqrt{(4ax + aa)}}{2a^2}$ & $\frac{1}{2}\sqrt{(4ax + aa)}$

$= MH$ seu normali: erit $MC = \frac{8MH^3}{2a^2}$

Est autem $8MH^3$ cubus duplæ normalis MH, sicuti $2a^2$ duplum quadrati parametri.

Constructio. Fiat $a : 2MH = 2MH : \frac{4MH^2}{a}$ & $2MH : \frac{4MH^2}{a} = \frac{4MH^2}{a} : \frac{8MH^3}{a^2}$ hoc est, quærratur ad parametrum & duplam normalem $2MH$ quarta continue proportionalis, erit ejus dimidium radius osculi MC.

Sff 3 Quoniam

Quoniam etiam $MC = 4MH^3 : a^2$, erit etiam $a : MH = MH^2 : \frac{MH^2}{a}$: & $MH : \frac{MH^2}{a} \equiv \frac{MH^2}{a} : \frac{MH^3}{a^2}$, hoc est, quærat ad parametrum & normalem MH quarta continue proportionalis, erit ejus quadrupla radius osculi seu evolutæ MC.

PROBLEMA CXLI.

323. Determinare radium osculi seu evolutæ MC in infinitis parabolis aut paraboloidibus.

Ad infinitas parabolæ (§. 519 part. I.)

$$y^m = a^{m-1}x$$

$$my^{m-1}dy = a^{m-1}dx$$

Quod si ergo dx sumatur pro constante, erit

$$\frac{(m^2 - m)y^{m-2}dy^2 + my^{m-1}ddy = 0}{(m^2 - m)y^{m-2}dy^2 = -my^{m-1}ddy} \\ (m-1)y^{m-1}dy^2 = -ddy$$

Quamobrem

$$(dx^2 + dy^2) : -ddy = (ydx^2 + ydy^2) : (m-1)dy^2$$

hoc est, ob $dx^2 = m^2y^{2m-2}dy^2 : a^{2m-2}$

$$ME = \frac{m^2y^{2m-1}dy^2 + a^{2m-2}ydy^2}{(m-1)a^{2m-2}dy^2} = \frac{m^2y^{2m-1} + a^{2m-2}y}{(m-1)a^{2m-2}} \cdot \frac{y}{m-1} \\ = \frac{1}{m-1}y + \frac{m^2x^2}{(m-1)y}$$

Sit jam $m=2$, erit $x=y^2 : a$ & hinc $x^2 = ax \cdot y^2 : a^2 = xy^2 : a$, adeoque $ME = 4xy^2 : ay + y = 4xy : a + y$, ut in problemate præcedente.

PROBLEMA CXLII.

324. Determinare radium osculi in circulo.

Quoniam ad circulum (§. 377 part. I)

$$y^2 = 2rx - xx$$

$$\text{erit } 2ydy = 2rdx - 2xdx$$

$$ydy = rdx - xdx$$

Quare si dx sumatur pro constante, erit

$$\frac{dy^2 + yddy = -dx^2}{(dx^2 + dy^2) : y = -ddy} \\ \text{Quare (§. 320)}$$

$$\frac{dx^2 + dy^2}{-ddy} = \frac{y(dx^2 + dy^2)}{dx^2 + dy^2} = y$$

Est itaque $ME = y$, hoc est, punctum E cadit in P, adeoque C in centrum circuli H (§. 38. 320). Radius igitur circuli idem est cum radio osculi, hoc est, circulus, qui circulum osculatur, huic congruit & circuli evoluta est centrum ejus.

PROBLEMA CXLIII.

325. Invenire radium osculi in ellipsi. Quoniam ad ellipsin (§. 420 part. I)

$$ay^2 = abx - bx^2$$

$$\text{erit } 2aydy = abdx - 2bxdx$$

$$dy = (abdx - 2bxdx) : 2\sqrt{(a^2bx - abx^2)}$$

ob $a^2y^2 = a^2bx - abx^2$.

Unde, si dx sumatur pro constante,

$$ddy = \frac{4b^2dx^2 \sqrt{(a^2bx - abx^2)}}{4a^2bx - 4abx^2} \\ = \frac{a^3b^2dx^2 - 4a^2b^2xdx^2 + 4ab^2x^2dx^2}{(4a^2bx - 4abx^2) \sqrt{(a^2bx - abx^2)}} \\ = \frac{(-4a^2bx^2 + 4ab^2x^2 - a^3b^2 + 4a^2b^2x - 4ab^2x^2)dx^2}{(4a^2bx - 4abx^2) \sqrt{(a^2bx - abx^2)}} \\ = \frac{a^3b^2dx^2}{(4a^2bx - 4abx^2) \sqrt{(a^2bx - abx^2)}}$$

Nimirum si $D = 2\sqrt{(a^2bx - abx^2)}$ & $N = abdx - 2bxdx$; reperietur $dD = (a^2bx dx - 2abxdx) : \sqrt{(a^2bx - abx^2)}$,

$$\text{adeoque } \frac{dD \cdot N}{D^2}$$

$$\frac{a^3b^2dx^2 - 4a^2b^2xdx^2 + 4ab^2x^2dx^2}{(4a^2bx - 4abx^2) \sqrt{(a^2bx - abx^2)}}$$

quæ est differentialis valoris ipsius dy pars negativa (§. 19).

Est

Est vero porro

$$dy^2 = \frac{(a^2b^2 - 4ab^2x + 4b^2x^2) dx^2}{(4a^2bx - 4abx^2)}$$

Quare $dy^2 + dx^2 = (a^2b^2 - 4ab^2x + 4b^2x^2 + 4a^2bx - 4abx^2) dx^2 : (4a^2bx - 4abx^2)$ & $(dy^2 + dx^2) \sqrt{dx^2 + dy^2} = (a^2b^2 - 4ab^2x + 4b^2x^2 + 4a^2bx - 4abx^2) \sqrt{(a^2b^2 - 4ab^2x + 4b^2x^2 + 4a^2bx - 4abx^2)} dx^2 : (4a^2bx - 4abx^2) 2\sqrt{(a^2bx - abx^2)}$, consequenter $MC = (dx^2 + dy^2) \sqrt{dx^2 + dy^2} : -dxddy = (a^2b^2 - 4ab^2x + 4b^2x^2 + 4a^2bx - 4abx^2) \sqrt{(a^2b^2 - 4ab^2x + 4b^2x^2 + 4a^2bx - 4abx^2)} : 2a^3b^2 = (\text{brevitatis gratia}) v\sqrt{v} : 2a^3b^2$.

Est vero (§. 44) normalis $MH = y \sqrt{dx^2 + dy^2} : dx$. Quare cum sit $y = \sqrt{(abx - bx^2)} : \sqrt{a}$ & $\sqrt{dx^2 + dy^2} = dx\sqrt{v} : 2\sqrt{(abx - bx^2)}\sqrt{a}$. Erit $MH = \sqrt{(abx - bx^2)} dx \sqrt{v} : 2a\sqrt{(abx - bx^2)} dx = \sqrt{v} : 2a$, consequenter $MH^3 = v\sqrt{v} : 8a$, adeoque $4MH^3 = v\sqrt{v} : 2a^3$.

Est itaque $MC = v\sqrt{v} : 2a^3b^2 = 4MH^3 : b^2$

Constructio. Fiat b . $MH = MH : MH^2 : b$
& $MH : \frac{MH^2}{b} = \frac{MH^2}{b} : \frac{MH^3}{b^2}$

hoc est, quærat ad parametrum b & normalem MH quarta continue proportionalis; erit hujus quadrupla radius osculi MC .

COROLLARIUM.

326. Si AP five $x = 0$: circuli in A ellipsin osculantis AB radius reperitur $a^2b^2 \sqrt{a^2b^2} : 2a^3b^2 = a^3b^2 : 2a^3b^2 = \frac{1}{2}b$.

PROBLEMA CXLIV.

327. *Invenire radium osculi seu evolute in hyperbola.*

Quoniam ad hyperbolam (§. 459 part. 1) $ay^2 = abx + bx^2$, radius osculi MC eodem prorsus, ut in probl. præced. modo invenitur $(4a^2bx^2 + 4abx^2 + a^2b^2 + 4ab^2x + 4b^2x^2) \sqrt{(4a^2bx + 4abx^2 + a^2b^2 + 4ab^2x$

$+ b^2x^2) : 2a^3b^2 = 4MH^3 : bb$ & , si $x = 0$, hoc est in vertice,

$$= a^2b^2 \sqrt{a^2b^2} : 2a^3b^2 \\ = \frac{1}{2}b.$$

PROBLEMA CXLV.

328. *Invenire radium circuli MC Tab. III. cycloidem AMB in M osculantis.* Fig. 39.

Sit diameter circuli genitoris $AD = I$, $Fig. 39.$

$AP = x$, $PM = y$, erit $QP = \sqrt{(x - xx)}$ (§. 377 part. I), arcus $AQ = \int (dx : 2\sqrt{[x - xx]})$ (§. 157), adeoque $PM = PQ + QM = \sqrt{(x - xx)} + \int dx : 2\sqrt{[x - xx]}$ (§. 565 part. 1). Quamobrem

$$y = \sqrt{(x - xx)} + \frac{\int dx}{2\sqrt{(x - xx)}}$$

$dy = \frac{dx - 2xdx + dx}{2\sqrt{(x - xx)}} = \frac{2dx - 2xdx}{2\sqrt{(x - xx)}}$
 $= dx(1 - x) : \sqrt{x}\sqrt{(1 - x)} = dx\sqrt{(1 - x)} : \sqrt{x}$
Quodli ergo dx sumatur pro constante, reperietur

$ddy = -dx^2\sqrt{x} : 2x\sqrt{(1 - x)} - dx^2\sqrt{(1 - x)}\sqrt{x} : 2x\sqrt{x} = (-dx^2 - dx^2 + xdx^2) : 2x\sqrt{(x - xx)} = -dx^2 : 2x\sqrt{(x - xx)}$.

Unde ob $dx^2 + dy^2 = dx^2 + dx^2(1 - x) : x = (xdx^2 + dx^2 - xdx^2) : x = dx^2 : x$, eruitur $MC = (dx^2 + dy^2) \sqrt{(dx^2 + dy^2)} : dxdy$ (§. 320)

$= 2xdx^3\sqrt{x - x^2} : xdx^3\sqrt{x} = 2\sqrt{(1 - x)}$
 $= 2DQ$ (§. 417. *Geom.*). Nam

$$PD^2 = I - 2x + xx$$

$$PQ^2 = x - xx$$

$$DQ^2 = I - x. \text{ Ergo } DQ = \sqrt{(I - x)}.$$

Constructio. Quoniam tangens TM ipsi AQ parallela (§. 132); $TMQ = AQP$ (§. 233 *Geom.*). Est vero AQD rectus (§. 317 *Geom.*): & TMC itidem rectus (§. 317): Ergo $QMC = PQD$ (§. 91 *Aritm.*), consequenter MC ipsi QD parallela. Constructio igitur talis est: ducatur MC ipsi QD parallela & fiat $EC = EM$; erit C punctum in evoluta cycloidis.

COROLLARIUM I.

329. Si $x = 0$; erit radius evolutæ $2\sqrt{1} = 2 = 2AD$, quia $AD = 1$. Quare si DG fiat $= AD$; in G terminabitur evoluta ex una parte. Si $x = AD = 1$; erit radius evolutæ $2\sqrt{1-1} = 2\sqrt{0} = 0$. Quare evoluta ex altera parte in B terminatur.

COROLLARIUM II.

330. Quodsi BL ipsi QD vel MC parallela ducatur, erit LBD = BDQ (§. 233 Geom.), adeoque arcus QD & BL (§. 322 Geom.) chordæque cognomines (§. 289 Geom.), consequenter BL = EC (§. 337 Geom.) & hinc LC ipsi BE æqualis & parallela (§. 257 Geom.). Est vero BE arcui QD (§. 575 part. 1) adeoque & alteri BL, per demonstr. æqualis. Quare LC æqualis arcui BL (§. 87 Arithm.). Est itaque evoluta cycloidis itidem cyclois æqualis & similis (§. 575 part. 1), hoc est, cyclois sui evolutione seipsam describit.

SCHOLIUM.

331. Cum radius osculi aut evolutæ vel æqualis sit arcui evolutæ, vel eundem quantitate data excedat (§. 316); omnes arcus evolutarum geometricè rectificantur, quarum radii per constructiones geometricas exhiberi possunt. Unde patet, cur arcus cycloidis BC sit chordæ BL duplus (§. 168): est enim radius evolutæ MC ejusdem duplus (§. 328) & evoluta cycloidis ipsa quoque cyclois est (§. 330). Liquet etiam innumeras inveniri posse curvas, quæ saltem geometricè rectificantur; Ceterum utilis est radii osculi inventio, quia arcus circuli osculatoris substitui potest pro arcu curvæ, quam osculatur, in praxi. Ita speculum sphericum cavum, observante Leibnitio in Actis Erudit. A. 1686. substituitur parabolico, quia parameter parabola est diameter circuli eam in vertice osculantis (§. 317) sicque perinde ac parabolicum distantiam foci habet quartæ diametri parti æqualem.

PROBLEMA CXLVI.

332. Determinare radium osculi seu evolutæ in Logarithmica:

Quoniam in Logarithmica (§. 54.)

$$\frac{y dx : dy = a}{y dx : a = dy}$$

$dx dy : a = ddy$, quia dx constans seu $ddy = y dx^2 : a^2$,

Est vero $dy^2 = y^2 dx^2 : a^2$, adeoque

$$dy^2 + dx^2 = y^2 dx^2 : a^2 + dx^2 = (y^2 + a^2) dx^2 : a^2$$

$$\frac{(dy^2 + dx^2)\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dx^3(y^2 + a^2)\sqrt{(y^2 + a^2)} : a^3}{(dx^2 + dy^2)\sqrt{(dx^2 + dy^2)} : dx ddy = \frac{dx^3(y^2 + a^2)\sqrt{(y^2 + a^2)}}{ay}}$$

Est igitur radius osculi seu evolutæ Tab. I. Fig. 8.

Enimvero cum a fit subtangens Logistica PT, y semiordinata PM, erit $\sqrt{(y^2 + a^2)}$ tangens TM (§. 417 Geom.). Porro cum fit

$$TP : PM = PM : PN$$

$$a : y = y : PN$$

erit subnormalis $PN = y^2 : a$, consequenter TN composita ex subnormali $y^2 : a$ & subtangente $a = (y^2 + a^2) : a$.

Habemus adeo

$$y : \frac{y^2 + a^2}{a} = \sqrt{(y^2 + a^2)} :$$

h. e. $PM : TN = TM :$

Theorema. In Logistica radius osculi seu evolutæ est quarta proportionalis ad semiordinatam, tangentem atque compositam ex subtangente ac subnormali.

Quantitas negativa est ob valorem ipsius y in præsentè casu negativum.

Porro quoniam ay est spatium logisticum interminatum HPMI (§. 134) & $(a^2 + y^2)\sqrt{(a^2 + y^2)} = TM^3$; erit HPMI: $TM^2 = TM : MC$. Habemus itaque hoc

Theorema. Spatium logisticum interminatum est ad quadratum tangentis ad radium osculi seu evolutæ.

SECTIO QUINTA.

DE ARITHMETICA INFINITORUM.

CAPUT I.

De natura Arithmetica infinitorum.

DEFINITIO XIX.

333. **A**rithmetica infinitorum est methodus summandi series numerorum infinitis terminis constantes, aut earum rationes investigandi.

PROBLEMA CXLVII.

334. *Invenire summam fractionum infinitarum, quarum numerator communis est unitas, denominatores vero progrediuntur in ratione numeratoris primæ ad suum denominatorem.*

Sit fractio prima $I : e$ Numerus terminorum cum sit infinitus & termini continuo decrescant, devenietur tandem ad infinitesimam (§. 2.), adeoque summa fractionis primæ & hujus, quæ tanquam ultima consideratur, ipsi fractioni primæ $I : e$ æqualis (§. 4). Divisa ergo per $e - I$ dat summam omnium terminorum $I : (ee - e)$ excepto primo (§. 119. part. 1). Quare summa integræ seriei $I : (ee - e) + I : e = (I + e - 1) : (ee - e) = e : (ee - e) = I : (e - I)$.

Sit e. gr. $e = 2$; erit $f(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} \&c. \text{ in infinit.}) = \frac{1}{2}$.

Sit $e = 3$; erit $f(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} \&c. \text{ in infinit.}) = \frac{1}{2}$.

Sit $e = 4$; erit $f(\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} \&c. \text{ in infinit.}) = \frac{1}{3}$.

Wolffii Oper. Mathem. Tom. I.

Sit $e = 5$; erit $f(\frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} \&c. \text{ in infinit.}) = \frac{1}{4}$.

Sit $e = 6$; erit $f(\frac{1}{6} + \frac{1}{36} + \frac{1}{216} \&c. \text{ in infinit.}) = \frac{1}{5}$.

PROBLEMA CXLVIII.

335. *Invenire summam fractionum, ubi numerator communis est unitate minor denominatore primæ & denominatores progrediuntur in ratione unitatis ad denominatorem primæ.*

Sit denominator fractionis primæ = m ; erit numerator = $m - I$. Summa primi & ultimi termini utpote primo æqualis = $(m - 1) : m$, quæ per $m - I$ divisa dat summam omnium terminorum excepto maximo seu primo $I : m$. Quare summa integræ seriei = $m : m = I$.

Sit e. gr. $m = 2$ erit $f(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \&c. \text{ in infinit.}) = I$, ut ante (§. 334.)

Sit $m = 3$, erit $f(\frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \&c. \text{ in infinit.}) = I$.

Sit $m = 4$, erit $f(\frac{3}{4} + \frac{3}{16} + \frac{3}{64} \&c. \text{ in infinit.}) = I$.

SCHOLIUM.

336. *Poterat idem per modum corollarij ex theoremate precedente deduci. Est enim $f(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} \&c.) = \frac{1}{2}$ (§. 334). Ergo duplum hujus seriei, hoc est, $f(\frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} \&c.) = \frac{2}{2} = I$. Et in genere $f(\frac{I}{m} + \frac{I}{m^2} + \frac{I}{m^3}$*

+ $\frac{I}{m^4} \&c. \text{ in infinit.}) = I : (m - I)$ Ergo

mul:iplum hujus seriei, cujus denominator $m - I$, sit necesse est $(m - I) : (m - I) = I$.

Ttt PRO-

PROBLEMA CXLIX.

337. Invenire summam infinitarum fractionum, ubi numerator communis deficit a denominatore primæ data quantitate, denominatores vero progrediuntur in ratione unitatis ad denominatorem primi.

Si terminus primus = $(m - n) : m$, qui utpote æqualis summæ primi & ultimi divisus per $(m - 1)$ dat summam omnium terminorum maximo excepto $(m - n) : (m^2 - m)$. Quare summa seriei integræ = $(m - n) : (m^2 - m) + (m - n) : m = (m - n + m^2 - mn - m + n) : (m^2 - m) = (m^2 - mn) : (m^2 - m) = (m - n) : (m - 1)$.

Sit e. gr. $n = 1$, erit $(m - n) : (m - 1) = (m - 1) : (m - 1) = 1$.

Sit $n = 2, m = 4$, erit $f(\frac{2}{4} + \frac{2}{16} + \frac{2}{64} \&c.) = (4 - 2) : (4 - 1) = \frac{2}{3}$.

Sit $n = 2, m = 5$; erit $f(\frac{2}{5} + \frac{2}{25} + \frac{2}{125} \&c.) = (5 - 2) : (5 - 1) = \frac{3}{4}$.

Sit $n = 2, m = 6$; erit $f(\frac{2}{6} + \frac{2}{36} + \frac{2}{216} \&c.) = (6 - 2) : (6 - 1) = \frac{4}{5}$.

Sit $n = 2, m = 7$; erit $f(\frac{2}{7} + \frac{2}{49} + \frac{2}{343} \&c.) = (7 - 2) : (7 - 1) = \frac{5}{6}$.

Similiter

Sit $n = 3, m = 6$; erit $f(\frac{3}{6} + \frac{3}{36} + \frac{3}{216} \&c.) = (6 - 3) : (6 - 1) = \frac{3}{5}$.

Sit $n = 3, m = 7$; erit $f(\frac{3}{7} + \frac{3}{49} + \frac{3}{343} \&c.) = (7 - 3) : (7 - 1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Sit $n = 3, m = 8$; erit $f(\frac{3}{8} + \frac{3}{64} + \frac{3}{512} \&c.) = (8 - 3) : (8 - 1) = \frac{5}{7}$.

Porro

Sit $n = 4, m = 8$; erit $f(\frac{4}{8} + \frac{4}{64} + \frac{4}{512} \&c.) = (8 - 4) : (8 - 1) = \frac{4}{7}$.

Sit $n = 4, m = 9$; erit $f(\frac{4}{9} + \frac{4}{81} + \frac{4}{729} \&c.) = (9 - 4) : (9 - 1) = \frac{5}{8}$.

Sit $n = 4, m = 10$, erit $f(\frac{4}{10} + \frac{4}{100} + \frac{4}{1000} \&c.) = (10 - 4) : (10 - 1) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

$\&c.) = (10 - 4) : (10 - 1) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
&c. &c.

PROBLEMA CL.

338. Invenire summam fractionum infinitarum, quarum communis est numerator, denominatores vero in ratione quacunque progrediuntur.

Sit numerator communis = m denominator fractionis primæ = a , denominator rationis = n ; erit series summamanda $\frac{m}{a} + \frac{m}{na} + \frac{m}{n^2a} + \frac{m}{n^3a} \&c.$ in infinitum. Unde eodem, quo in problematibus præcedentibus, modo reperitur summa $m : (na - a) + m : a = (m + mn - m) : (na - a) = mn : (na - a) = mn : a(n - 1)$.

Sit e. gr. $m = 5, a = 6, n = 2$; erit $f(\frac{5}{6} + \frac{5}{12} + \frac{5}{24} \&c.) = 10 : 6(2 - 1) = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$.

Sit $m = 3, a = 5, n = 4$; erit $f(\frac{3}{5} + \frac{3}{20} + \frac{3}{80} + \frac{3}{320} \&c.) = 12 : 5(4 - 1) = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$.

Sit $m = 1, a = 7, n = 2$; erit $f(\frac{1}{7} + \frac{1}{14} + \frac{1}{28} + \frac{1}{56} \&c.) = 2 : 7(2 - 1) = \frac{2}{7}$.

SCHOLIUM.

339. Hoc problema universalitate sua antecedentia omnia complectitur. Sit enim $n = a$ & $m = n - 1$, qui est casus problematis præcedentis: substitutis hisce valoribus in formula præsentate, prodit $(n^2 - n) : (n - 1)n = (n - 1) : (n - 1)$, quæ est formula problematis præcedentis. Similiter sit $n = a, m = n - 1$, erit summa = $(n^2 - n) : (n^2 - n) = 1$, ut supra (§. 335). Denique si $m = 1, n = a$; erit summa = $n : (n - 1)n = 1 : (n - 1)$, ut supra (§. 334).

PROBLEMA CLI.

340. Invenire rationem summæ progressionis arithmetice simplicis ab 1 in infinitum continuatæ $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

† 6 &c.) ad summam totidem maximo equalium.

Terminus primus = 1, numerus terminorum = m , differentia = 1. Ergo ultimus = n & hinc $f(1 + 2 + 3 + 4 + 5 \text{ \&c.}) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$ (§. 106 part. 1) & $fn = n^2$. Cum n sit infinitus numerus, atque (§. 66 Arith.) $1 : n = n : n^2$; erit n^2 ipso n infinities majus, adeoque n respectu n^2 pro nihilo habendum (§. 3), consequenter $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n = \frac{1}{2}n^2$. Est itaque $f(1 + 2 + 3 + 4 + 5 \text{ \&c. in infinit.}) : fn = \frac{1}{2}n^2 : n^2 = 1 : 2$ (§. 124 part. 1).

Theorema Summa seriei numerorum naturalium in infinitum continuata est ad summam totidem maximo equalium ut 1 ad 2.

PROBLEMA CLII.

341. Invenire rationem summae progressionis arithmeticae sive finita, sive infinita, cujus terminus primus est 0, ad summam totidem maximo equalium.

Terminus primus = 0, ultimus = v , numerus terminorum = n ; erit summa progressionis = $\frac{1}{2}nv$ (§. 106 part. 1), summa vero totidem maximo equalium nv . Est ergo illa ad hanc ut $\frac{1}{2}nv$ ad nv , hoc est, ut 1 ad 2 (§. 124 part. 1).

PROBLEMA CLIII.

342. Invenire rationem, quam habet summa omnium quadratorum ab 0 in infinitum continuatorum ad summam totidem maximo equalium.

Sit terminus maximus n ; erit summa quadratorum $\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$ (§. 205 part. 1.). Est vero $1 : n = n^2 : n^3$ (§. 66 Arithm.) ergo quia 1 infinitesima ipsius n ; per hypothes. erit etiam n^2 infinitesima ipsius n^3 , consequenter $\frac{1}{2}n^2$, adeoque multo magis $\frac{1}{6}n$, respectu ip-

sius $\frac{1}{3}n^3$ pro nihilo habendum (§. 3.). Est ergo summa infinitorum quadratorum $\frac{1}{3}n^3$. Quadratorum vero totidem maximo equalium summa est n^3 . Quare illa ad hanc ut $\frac{1}{3}n^3$ ad n^3 , hoc est, ut 1 ad 3 (§. 124 part. 1).

PROBLEMA CLIV.

343. Invenire rationem, quam habet summa omnium cuborum ab 0 in infinitum continuatorum ad summam totidem maximo equalium.

Sit terminus maximus n ; erit summa cuborum $\frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2$ (§. 205 part. 1). Sed eodem modo, quo in problemate praecedente, ostenditur, $\frac{1}{2}n^3$, adeoque multo magis $\frac{1}{4}n^2$, respectu ipsius $\frac{1}{4}n^4$ tandem evanescere. Erit ergo summa infinitorum cuborum $\frac{1}{4}n^4$. Sed summa totidem cuborum maximo equalium est n^4 . Quare illa ad hanc ut $\frac{1}{4}n^4$ ad n^4 , hoc est, ut 1 ad 4. (§. 124 part. 1).

PROBLEMA CLV.

344. Invenire rationem, quam habet summa omnium potentiarum cujuscunque gradus ab 0 in infinitum continuatarum ad summam totidem maxima equalium.

Quoniam omnes potentiae inferiores numeri infiniti respectu superioris evanescent (id quod eodem modo, quo in probl. 153 ostenditur), summa omnium potentiarum ab 0 in infinitum

continuatarum est $\frac{1}{m+1}(n+1)^{m+1}$ (§. 203 part. 1) = $\frac{1}{m+1}n^{m+1}$ in casu infini-

ti, ob $1 = 0$ respectu n . Sed potentia maxima est n^m adeoque summa totidem maximae equalium m^{m+1} .

Ergo summa illa ad hanc ut $\frac{1}{m+1}$,
 $\times n^{m+1}$ ad n^{m+1} , consequenter ut 1 ad
 $m+1$ (§. 124. part. 1).

E. gr. Sit $m=2$; erit summa quadra-
 torum infinitorum ad totidem maximo æ-
 qualium ut 1 ad 3.

Sit $m=3$; erit summa cuborum infinitor-
 um ad totidem maximo æqualium ut 1 ad 4.

Sit $m=7$; erit summa potentiarum septi-
 mi gradus ad totidem maximæ æqualium ut
 1 ad 8.

SCHOLIION I.

345. In infinitum continuari reuera non
 aliud significat, quam eo usque continuari,
 donec quantitates quedam respectu aliarum
 evanescant (1). Nam e. gr. (§. 342.) in
 summa quadratorum $\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$ ratio
 termini primi $\frac{1}{3}n^3$ ad reliquos $\frac{1}{2}n^2$ & $\frac{1}{6}n$
 continuo crescit. Unde non mirum, si ratio
 posteriorum tandem adeo exigua evadat, ut
 assignari amplius nequeat. Est enim primus,
 ad secundum $= \frac{1}{3}n^3 : \frac{1}{2}n^2 = 2n : 3$ (§. 124.
 part. 1). Quare crescente n ratio ipsius
 $2n$ ad 3 continuo crescit (§. 203. Arithm.)

Similiter terminus primus est ad tertium ut
 $\frac{1}{3}n^3$ ad $\frac{1}{6}n$ hoc est, ut $2n^2$ ad 1 (§. 124. part.
 1). Quare crescente n ratio ipsius $2n^2$ ad 1
 multo magis crescit, quam in casu priore (§.
 203. Arithm.). In eo igitur casu, in quo ter-
 minus secundus respectu primi fit inassignabilis,
 tertius multo magis inassignabilis esse debet.

SCHOLIION II.

346. Eodem modo plurima alia Arithme-
 ticæ infinitorum theoremata inveniri possunt,
 si utamur iis, que in Analyfi finitorum (§.
 173 & seqq.) de numeris figuratis demon-
 strata sunt.

SCHOLIION III.

347. Usus Arithmetica infinitorum in
 Geometria ostenderunt (m) Wallisius inventor,
 & qui eam magis excoluit, Ismael Bulialdus
 (n). Enimvero cum per calculum Leibnitii
 summatorum non modo ea, que per Arith-
 metica infinitorum eruuntur, longe facilius;
 sed & plurima huic insuperabilia inveniri
 possint; e re nostra non esse judico, ut de e-
 jus usu multa proferamus. Suffecerit igitur
 pauca eam in rem attulisse.

CAPUT III.

De usu Arithmetica infinitorum in Geometria.

PROBLEMA CLVI.

Tab. 348: **I**nvenire rationem trianguli
 III. ACB ad parallelogrammum
 Fig. AEFB super eadem vel equali basi AB
 40. & ejusdem altitudinis.

Concipiatur altitudo CD in partes
 infinite parvas & inter se æquales di-
 visa; triangulum ACD resolvetur in

parallelogrammula, quorum bases sunt
 ordinatæ trianguli Mm, Nn, Oo &c.
 altitudines infinitesimæ ipsius CD; pa-
 rallelogrammum vero EABF in toti-
 dem parallelogrammula & inter se
 & maximo in triangulo æqualia,
 quorum nempe bases basi triangu-
 li.

(1) Vid. Ontologia nostra §. 823. & seqq.

(m) In Arithmetica infinitorum, quæ extat
 in Vol. I. Oper. Mathem.

(n) In Opere Novo ad Arithmetica infinitor-
 um.

li. AB sigillatim æquales sunt. Parallelogrammula itaque seu elementa trianguli progrediuntur in ratione ordinarum Mm , Nn , Oo &c. (§. 380 *Geom.*). Ordinatae vero sunt ut abscissæ CP, CQ, CR (§. 396 *Geom.*) &, quoniam altitudo in partes æquales divisa, abscissæ crescunt in progressionem arithmetica 0. 1. 2. 3. 4. 5 &c. Ergo elementa trianguli constituunt progressionem arithmeticam a cyphra inchoatam & in infinitum continuatam. Est adeo triangulum ACB ad parallelogrammum EABF ut 1 ad 2. (§. 341).

PROBLEMA CLVII.

Tab.II. Fig.28. 349. *Invenire rationem spatii parabolici externi AKLPA ad rectangulum AKLN super eadem basi KL & ejusdem altitudinis AK.*

Si spatium parabolicum APLKA & rectangulum KN in parallelogrammula resolvantur, ut in probl. præc. (§. 348), altitudine communi AK in partes infinite parvas æquales divisa; elementa parabolici progrediuntur ut semiordinatæ HI, QP, KL &c. iisdem vero in rectangulo totidem respondent maximo, cujus basis KL, æqualia. Quodsi parameter parabola fuerit a , $AH=1$, $AQ=2$, $AK=3$ &c. erit $HI=1:a$, $QP=4:a$, $KL=9:a$ &c. (§. 391 *part. I.*), hoc est bases elementorum, adeoque elementa ipsa (§. 389 *Geom.*), progrediuntur in ratione duplicata abscissarum, hoc est, ut 0, 1, 4, 9 &c. Est ergo spatium parabolicum AKLPA ad rectangulum ANLK ut 1 ad 3

(§. 342), adeoque ANLPA ad idem rectangulum ANLK ut 2 ad 3.

PROBLEMA CLVIII.

350. *Invenire rationem spatii paraboloidici cujuscunque AKLPA ad rectangulum AKLN.* Tab.II. Fig.28.

Si abscissæ AH, AQ, AK fuerint ut 1, 2, 3 &c. in paraboloidibus quibuscunque erunt semiordinatæ HI, QP, LK ut 0, 1, 2^m, 3^m &c. (§. 519 *part. I.*). Quare cum etiam spatii paraboloidici AKLPA elementa progrediantur ut 1, 2^m, 3^m &c. (§. 349), iisdem vero in rectangulo respondeant totidem maximo æqualia, erit illud ad hoc ut 1 ad $1+m$ (§. 344), consequenter ANLPA ad idem rectangulum NK ut $1 - \frac{1}{1+m}$ ad 1, hoc est, ut $\frac{m}{1+m}$ ad 1, seu ut m ad $1+m$ (§. 124 *part. I.*).

PROBLEMA CLIX.

351. *Invenire rationem pyramidis & conii ad prisma & cylindrum super eadem basi & ejusdem altitudinis.* Tab. III. Fig.41.

Si pyramidis ADBC altitudo concipiatur in partes infinite parvas æquales divisa; in prismata resolvitur, quæ inter se sunt ut bases (§. 573 *Geom.*), hoc est, ut plana similia a, b, c, d (§. 474 *Geom.*), Quoniam vero altitudines illorum prismatum sunt ut 1, 2, 3 &c. planorum latera homologa erunt itidem ut 0, 1, 2, 3 &c. (§. 566 *Geom.*) adeoque ipsa plana ut 0, 1, 4, 9 &c. (§. 406 *Geom.*) Quare cum elementis pyramidis respondeant in prismate super eadem basi & ejus-

dem altitudinis totidem maximo æqualia; pyramis ad prisma est ut 1 ad 3 (§. 342).

Quodsi ACBD fuerit conus, plana a, b, c, d erunt circuli: qui cum progrediantur ut 0, 1, 4, 9 &c. (§. 387 *Geom.*), in cylindro vero ipsis respondeant totidem maximo d æquales; conus quoque ad cylindrum super eadem basi & ejusdem altitudinis est ut 1 ad 3 (§. 342)


PROBLEMA CLX.

Tab. 352. *Invenire rationem conoidis parabolici ex rotatione parabole AMSR circuli.*
 III. *Fig. 42.*

ca axem AR geniti ad cylindrum super eadem basi & ejusdem altitudinis.

Constat ex superioribus (§. 197), altitudine AR in particulas infinite parvas & æquales divisa conoides resolvi in cylindrulos, quorum bases sunt circuli radiis PM, QN, SR descripti, quique adeo sunt ut isti circuli (§. 573 *Geom.*). Quodsi $AP = 1, AQ = 2, AR = 3$; erit $PM = 1, QN = \sqrt{2}, SR = \sqrt{3}$ (§. 392 *part. 1*) adeoque circuli sunt ut 0, 1, 2, 3 &c. (§. 408. *Geom.*). Quare cum iisdem respondeant in cylindro totidem maximo æquales; omnia elementa conoidis ad omnia elementa cylindri sunt ut 1 ad 2 (§. 341).

FINIS Analyseos infinitorum, & Tomi Primi.



E R R A T A.

Ante quam legas corrigenda.

IN ELEMENTIS ARITHMETICÆ.

pag. 15. lin. penult. concedi lege concedi
p. 31. col. 2. §. 106. lin. 11. subtractione
lege subtractione

p. 71. col. 1. lin. ult. $\frac{64}{729}$ lege $\frac{64}{729}$

p. 72. col. 2. lin. 2. $1\frac{44}{100}$ lege $1\frac{44}{100}$

p. 73. in Titulo Cap. VI. lege Cap. V.

p. 75. in Titulo pag. Cap. VI. lege Cap. V.

ibid. col. 2. §. 308. lin. 3. & 4. tripium
lege triplum.

p. 78. col. 1. lin. 18. $333\frac{6}{81}$ lege $333\frac{6}{81}$

ibid. col. 2. lin. 15. $58\frac{2}{11}$ lege $58\frac{2}{11}$

p. 79. in titulo pag. Cap. V. lege Cap. VI.

p. 82. col. 2. §. 337. lin. 6. unum ita,
factor lege unum, ita factor

p. 83. col. 1. lin. 28. 243 lege 343.

p. 89. col. 1. lin. ult. 5' lege 5'''

p. 91. col. 2. lin. 13. 0, 34°: lege 0. 34

ibid. lin. 20. in multiplicatione lege
multiplicatione.

ibid. lin. 33. 378 lege 379.

IN ELEMENTIS GEOMETRIÆ.

p. 96. lin. 24. empyricas lege empiricas

p. 101. in margine. col. 1. Descendatur

Tab. I. Fig. 2. juxta Definit. XXII.

ibid. lin. 24. tri angulorum lege trian-
gulorum.

ibid. col. 2. §. 55. lin. 1. littera lege litera

p. 109. col. 2. §. 142. lin. 5. angulorum
lege angulorum.

p. 111. lin. 14. per C & C lege per C & D

p. 115. col. 2. §. 183. lin. 2. ABAC lege
AB: AC.

p. 117. col. 1. §. 192. lig. 1. puncta lege puncto

p. 118. col. 1. in margine, Tab. II. Fig. 24.
lege Tab. II. Fig. 42.

p. 119. col. 2. §. 204. lin. 3. BA lege BC

p. 122. lin. 7. KIH lege K & H

p. 126. col. 1. lin. 3. AC lege BC.

p. 127. col. 2. lin. antepenult. 156. lege 256

p. 128. col. 2. lin. antepen. EH lege FH.

p. 130. col. 2. §. 264. lin. 2. junctum lege
junctim

p. 131. col. 1. §. 268. lin. 6. BDE lege
 \triangle BDE

p. 132. col. 2. lin. 33. $\frac{1}{61}$ CA lege $\frac{1}{10}$ CA

p. 134. col. 2. lin. antepenult. cd AB lege
cd = AB

p. 135. col. 1. §. 283. lin. 4. perpendiculi. Q
lege perpendiculi Q.

ibid. col. 2. lin. antepen. AB lege HB.

p. 138. col. 2. lin. antepen. vro lege vero

p. 139. col. 2. §. 293. lin. 5. E lege D

p. 149. col. 2. lin. 23. PROBLEMA XLIX.
lege PROBLEMA XL.

p. 153. col. 2. lin. antepenult. f lege f

p. 154. col. 1. & 2. in margine. Tab.
VI. Fig. III. lege Tab. VI. Fig. III.

p. 162. col. 1. lin. 4. à fine pagina. 480
lege 380

p. 164. col. 1. lin. 9. GB lege GD

ibid. lin. 13. ACB lege \triangle ACB

p. 165. col. 2. lin. 6. à fine pagina. $\frac{7}{1}$ AD
lege $\frac{7}{1}$ AD

p. 167. lin. 9. \triangle bad \curvearrowright \triangle BAD, lege ,
 \triangle cad \curvearrowright \triangle CAD

ibid. lin. 3. à fine pagine DEA lege DCA

p. 170. col. 2. §. 417. lin. 20. ALFG lege
 ALKG

p. 171. col. 1. lin. 2. CD' lege CD'

ibid. §. 423. lin. 7. A lege E

p. 178. col. 1. in margine Tab. VIII. Fig.
 410. lege Tab. VIII. Fig. 140.

p. 181. col. 1. §. 479. lin. 3. CAB lege AB
 ibid. col. 2. §. 506. lin. 1. uno lege una

p. 190. col. lin. 22. t lege i

p. 191. col. 1. ante §. 531. lege PROBLEMA XV.

p. 199. col. 1. PROBLEMA XXV. lege PROBLEMA XXII.

p. 199. col. 2. in fine addantur sequentia aliis adhuc modis fieri potest, uti suo loco ostendetur.

p. 200. col. 1. lin. 2. 565. lege 563.

p. 201. col. 2. §. 573. lin. 1. aequales, lege æquales

IN ELEMENTIS TRIGONOMETRIÆ.

p. 218. col. 2. PROBLEMA XII. lege PROBLEMA XI.

p. 215. col. 1. §. 19. lin. 9. AD sinui dato majori, lege AF sinui dato minori

p. 228. col. 2. §. notatus 63. est 61, & § notatus 61. est 62.

p. 229. col. 2. §. 67. lin. 7. ubi lege ubi

p. 231. col. 2. §. 79. lin. 5. DE lege BE

IN ELEMENTIS ANALYSEOS FINITOR.

p. 236. col. 2. §. 10. lin. 6. modum : lege modum effertur :

p. 240. col. 1. lin. 3. $+6b$ lege $-6b$

ibid. lin. 5. $-8f$ lege $-2f$

p. 241. col. 1. lin. 15. guarimus lege quarimus.

p. 243. col. 2. lin. antepenult. quorum lege quotum

p. 244. col. 1. lin. 7. secunda est potentia, lege secunda est, potentia

ibid. col. 2. §. 49. lin. 21. c^3 — $+$ $\frac{c^4}{1+c}$ lege

$$c^3 + \frac{c^4}{1+c}$$

ibid. — cc^2 lege — c^2

p. 247. col. 1. lin. 3. $a^n \cdot m x^{m:n}$ lege $a^n \cdot m x^{m:m}$

ibid. col. 2. lin. 7. à fine paginae $2\sqrt[3]{23}$ lege $2\sqrt[4]{23}$

p. 229. col. 2. lin. 11. à fine paginae $\sqrt{-8} + \sqrt{-2}$ lege $\sqrt{-8} - \sqrt{-2}$

p. 253. col. 1. lin. 2. $(a+b^2)$ lege $(a+b)^2$

ibid. lin. 16. $2Oq$ lege $2Oq$

p. 254. lin. ultima Tab. $10ab^6$ lege $10ab^9$

p. 256. col. 2. l. 7. à fine pag. Pm lege P^m

p. 257. col. 1. §. 98. lin. 9. a^{22} lege a^{22}

p. 260. col. 1. lin. 11. $\frac{m}{1} a^{n-1} g$ lege $\frac{m}{1} a^{m-1} g$

p. 263. col. 1. lin. ult. $-m^3$ lege $-m^{n-3}$

p. 264. col. 2. lin. 12. & 13.

IV. $\left. \begin{array}{l} a : ma \\ b : mb \end{array} \right\}$ lege $\left\{ \begin{array}{l} IV. a : ma \\ b : mb \end{array} \right.$

p. 268. col. 2. lin. 11. 43. lege 4. 3.

p. 273. col. 1. lin. 21. $y^2 = b^2$ lege $y^2 - b^2$

ibid. col. 2. lin. 1. inter itra lege iter intra

p. 275. col. 1. §. 158. lin. 13. $\frac{1}{2}a$ lege $\frac{1}{2}a^2$

p. 276. col. 1. lin. 10. $(a+y_2)$ lege $(a+y^2)$

p. 277. col. 1. lin. 14. $x^2 \frac{x^2}{x^2 - 2x + 1}$ lege

$$x^2 - \frac{x^2}{x^2 - 2x + 1}$$

ibid. lin. 22. 23. — $\sqrt{\frac{5}{4}}$ lege $= \sqrt{\frac{5}{4}}$

p. 279. col. 1. lin. 8. à fine pag. $\frac{1}{2}d + \sqrt{(\text{lege } \frac{1}{2}d + \sqrt{(\text{$

ibid. lin. penult. — $2cd$. lege — $2cd$).

ibid. col. 2. lin. 5. & 6 à fine paginae

$$9\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 17 \text{ \& } y = 9\frac{1}{2} - 7\frac{1}{2} = 2$$

lege $9\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2} = 2$ & $y = 9\frac{1}{2} + 7\frac{1}{2} = 17$

p. 282. col. 1. lin. 5. à fine pag. $-1 - x$:

$$\text{lege } -1 = x$$

p. 284. col. 1. lin. 8. $l(c-v)$ lege $l(c-a)$

p. 285. col. 1. §. 188. lin. 2. I. o lege I: o

p. 288. col. 1. §. 201. lin. 10. $f(n+1)$:

$$\text{lege } f(n+1)^2$$

ibid. col. 2. lin. 7. f_n^m 2 lege f_n^{m-2}

$$\text{ibid. } = \frac{1}{m+1} \text{ lege } - \frac{1}{m+1}$$

p.290. col.1. lin. 19. n 212. lege 212.
 ib. col.2. l. 3. heptagonis lege heptagonis
 ibid. §.213. lin.12. $\frac{1}{2}ax^2$ lege $\frac{1}{2}ax^2$
 ibid. lin. 15. $-2x$ lege $-2x^2$
 p.297. col.2. PROBL. CXVI. lege XCVI.
 p. 299. col.2. PROBLEMA CI. lege CII.
 ibid. col. 2. lin. 11. à fine pagine — $\frac{15}{9}$
 lege — $\frac{15}{9}$
 ibid. $\frac{36-26}{9}$ lege $\frac{36-16}{9}$
 p.300. col. 1. lin.7. i^3 lege i^2
 ibid. col.2. lin. ult. yv^3z^3 lege $yv^3 : z^3$
 p.301. col. 1. §.247. lin.12. y^2x^2 lege y^3x^2
 ibid. lin. 16. $\frac{ax^3}{8}$ lege $\frac{a^3x^3}{8}$
 p.303. col. 2. lin.16. $f + \frac{cg}{a} = h$ lege
 $\frac{cg}{a} = h$
 p.306. col. 1. ante lin. 3. scribatur CL.
 ibid. lin. 5. $\sqrt{(a^2\sqrt{2+5})}$ lege
 $\sqrt{(a^2\sqrt{2+\sqrt{5}})}$
 p.308. col.1. lin.9. à fine pag. sec lege sed
 p.311. col. 1. lin. 7. à fine pagina
 $-2a\sqrt{(a^2-\frac{1}{4}x)}$ lege $-2a\sqrt{(a^2-\frac{1}{4}x^2)}$
 p.312. col. 1. §.283. lin. 4. DCf lege
 DC=f
 ibid. lin.9. $x =$ lege $x^2 =$
 ibid. col.2. lin.10. HN=x. lege HN=y.
 ibid. col. 2. §. 285. lin.8. $y^* - bbcc$ lege
 $y^* = bbcc$
 ibid. lin. 10. $\sqrt{(\frac{1}{4}d^* = bbcc)}$ lege
 $\sqrt{(\frac{1}{4}d^* - bbcc)}$
 p.313. c.2. l. 4. à fine pag. = er lege e:r
 p.314. col.2. in margine Tab. II. Fig.23.
 lege Tab. I. Fig. 23.
 p.315. col.1. lin.12. $x^3 \frac{\frac{1}{2}x}{\sqrt{3}}$ lege $x : \frac{\frac{1}{2}x}{\sqrt{3}}$
 p.316. col. 2. §.299. lin.11. + CD lege
 + CD²

ibid. lin.12. $+\frac{1}{2}x$ lege $+\frac{1}{2}x^2$
 p.317. col. 2. in margine juxta Corol.
 II. scribatur Tab. II. Fig.27.
 p.318. col.2. lin.17. $\sqrt{\frac{1}{3}b}$ lege $\sqrt{\frac{1}{3}b^2}$
 p.320. col. 2. lin. 24. Producatur lege
 Producatur
 p. 323. In Titulo GEOMETRIA
 lege TRIGONOMETRIA
 ibid. col.2. §.327. lin.11. Prba^{m-} — lege
 Prba^{m-1} —
 p.325. col.1. lin.4. à fine pag. dimcnfio-
 nes lege dimensiones
 ibid. col.2. §.330. lin.1. & 2. equationem
 lege equationum
 p. 328. col. 1. lin. 11. à fine pagine.
 $-mt - p = 0$ lege $-mt + p = 0$
 ibid. lin.7. à fine pagine $-mt + p = 0$
 lege $-mt - p = 0$
 ibid. lin. 6. à fine pag. $-mt = -p$ lege
 $-mt = p$
 p.329. col. 2. lin. 10. $= \frac{3}{y}$ lege $= -\frac{3}{y}$
 ibid. lin. 13. $+\frac{1}{y}$ lege $+\frac{1}{y^2}$
 p.341. col. 2. lin. 4. à fine pagine
 $+\frac{2b^2-ac}{a^3}$ lege $+\frac{2b^2-ac}{a^5}v^4$
 ibid. lin. antep. $+a^2d$ lege $-a^2d$
 ibid. lin. penult. $-a^3$ lege $-a^3e$
 p.342. col.1. §.371. lin. 2. curvæ lege
 curva
 p. 344. col. 1. §. 386. lin. 2. fectione
 lege fectione
 p.345. col. 2. in marg. Tab. III. Fig.41.
 scribatur juxta Cor. I.
 p.347. col.1. Deleatur in margine Tab.
 III. Fig. 40.
 ibid. col. 2. §.413. lin. 1. AQ. lege AR.
 p.348. col.1. in marg. lin.ult. Fig. 191.
 lege Fig. 119.

ibid. col. 2. lin. 6. à fine pagina $x = \frac{1}{4}a$
lege $x - \frac{1}{4}a$

p. 349. col. 1. lin. 4. ductum lege ductam

ibid. col. 2. §. 425. lin. 1. $abx = bx^2$ lege
 $abx - bx^2$

p. 350. col. 1. §. 427. lin. 9. $+\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}a^2$
lege $+\frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2$

ibid. in marg. juxta lin. 18. §. 427. scribe
Tab. IV. Fig. 46.

p. 353. col. 1. lin. 2. vd lege ad

ibid. col. 2. lin. 5. à fine pagina $2r^2cz^2$
lege $2r^2cz$

p. 355. col. 1. §. 454. lin. 11. TSA lege TSI
col. 2. lin. ult. $MG = MG$ lege $MG = MC$

p. 356. col. 2. lin. 11. TMP lege TMR

p. 357. col. 1. lin. 10. $+2ox$ lege $+2cx$

p. 358. col. 1. lin. 8. bv lege av

ibid. lin. 9. $(b+v)$ lege $(a+v)$

p. 359. col. 2. lin. 20. 378. lege 478

p. 360. col. 1. §. 483. lin. 1. quantitatem
lege quantitatem

p. 361. col. 1. lin. 2. AIE lege IAE

ibid. col. 2. lin. 12.

$$+\frac{at^2 - az^2}{b+a} = \circ \text{ lege } +\frac{at^2 - az^2}{b+a} = \circ$$

p. 362. col. 2. lin. 12. à fine pagina

$$\frac{\frac{1}{2}ap^2bq + p^2qv^2}{p^2 - p^2q} \text{ lege}$$

$$\frac{\frac{1}{2}ap^2bq + p^2qv^2 - p^4v^2}{q^2 - p^2q}$$

p. 365. col. 2. lin. 21. 508. lege 507.

ibid. lin. 25. 507. lege 508.

ibid. §. 509. lin. 2. & 3. $r^2 - x$ lege $x^2 - r^2$

p. 368. col. 1. lin. 8. à fine pagina $a^{m-1}x$
lege $a^{m-1}x$

ibid. lin. ult. $ax^{m-1} : a^{m-1}$ lege

$$ax^{m-1} : a^{m-1}$$

ibid. col. 2. lin. 7. à fine pag. 425. lege 525

p. 369. col. 2. lin. 9. EB_n lege EB^n

p. 370. col. 1. l. 2. $f_m(x-a)^m$ lege $f^m(a-x)^m$

ibid. lin. 5. z_n lege z^n

ibid. lin. 8. $t_n f^m(a-x)^m$ lege $t^n f^m(a-x)^m$

ibid. lin. ult. $\frac{t^m f^m v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$ lege

$$\frac{t^n f^m v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$$

ibid. col. 2. lin. 3. $\frac{v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$ lege

$$\frac{v^m (a+v)^n}{x^m (a+x)^n}$$

ibid. in margine Tab. XII. Fig. 114;
lege Tab. XIII. Fig. 124.

p. 372. col. 1. lin. 4. $a^m b^m = x^n y^n$ lege
 $a^n b^m = x^m y^n$

p. 374. col. 1. lin. 4. DN lege BN

p. 379. col. 1. lin. 7. à fine pagina

$$p = \frac{-c^2 - \frac{1}{4}aa}{b} \text{ lege } p = \frac{-c^2 - \frac{1}{4}aa}{b}$$

p. 380. col. 1. lin. 5. à fine pagina

$y^2 - \frac{rxy}{q} + \frac{r^2x^2}{q^2}$ lege $y^2 - \frac{2rxy}{q} + \frac{r^2x^2}{q^2}$

ib. col. 2. l. 13. à fine pag. $+tf^2$ lege $+tf^2$

ibid. lin. 12. à fine pag. $-cf^2$ lege $-cd^2$

p. 381. col. 1. lin. 4. $\frac{dxy^2}{f}$ lege $\frac{dxy}{f}$

ibid. col. 1. lin. 11. $cd^2 f^2 x^2$ $4cf^2 f^2$ lege
 $cd^2 f^2 x^2$: $4cf^2 f^2$

ibid. lin. 13. y^3 lege y^2

ibid. lin. 9. à fine pag. $-\frac{m^2}{+p}$ } lege } $-\frac{m^2}{+p^2}$

col. 2. l. 18. $-bx + +\frac{1}{4}b^2$ lege $-bx + \frac{1}{4}b^2$

p. 383, in titulo Cap. VI. GEOMETRIA
SUBLIMIOR. lege Cap. VII. DE
LOCIS GEOMETRICIS.

p. 385. col. 2. lin. antep. $\frac{2n}{4} = \circ$ lege

$$\frac{2r}{4} = \circ$$

p. 386.

p. 386. col. 1. lin. 8. $\frac{a^2c^2}{(b-c)^2}$ lege $\frac{a^2c^2}{(b-c)^2}$

p. 390. col. 1. lin. 4. à fine pag. y^3 lege y^2

ibid. col. 2. lin. 5. $\frac{2n}{9} = 0$ lege $\frac{2r}{9} = 0$

p. 391. col. 1. lin. 2. $+ac$ lege $+\frac{1}{4}aa$

ib. col. 2. lin. 22. $-\frac{acy}{4b}$ lege $-\frac{acy}{b}$

p. 392. col. 2. lin. 4. $= xNM =$, TM
lege $= x = NM$, TM

p. 393. col. 2. lin. 14. V. $y^3 -$ lege V. $y^2 -$

p. 396. col. 2. lin. 14. DP^2CN^2 lege
 $DP^2 = CN^2$

ibid. lin. 18. $+\frac{1}{4}ab$ lege $+ab$

ibid. lin. 19. $-2ax = bx$ lege $-2ax - bx$

p. 397. col. 1. lin. 4. $-y_2$ lege $-y^2$

p. 400. col. 2. lin. 9. à fine pagina $+\frac{1}{2}cc$
lege $+\frac{1}{4}cc$

p. 401. col. 1. lin. penult. y_2 lege y^2

p. 402. col. 2. lin. 4. $\frac{b^2y^2}{aa}$ lege $\frac{b^2y^2}{aa}$

p. 403. col. 1. lin. 4. $\frac{v^2bz}{a} = \frac{v^2c}{a}$ lege

$$\frac{v^2bz}{a} = \frac{v^2c}{a}$$

p. 404. col. 1. lin. 8. x_2 lege x^2

ibid. lin. 10. $y^2 + \frac{x^2}{a}$ lege $y^2 + \frac{vx^2}{a}$

ibid. col. 2. lin. 8. datas lege data.

ibid. lin. 14. $\sqrt{r_2}$ lege $\sqrt{r^2}$

p. 405. col. 2. lin. 12. $\frac{x_4}{a^2}$ lege $\frac{x^4}{a^2}$

p. 410. col. 1. lin. 16. 2AD lege AD

ibid. col. 2. lin. 13. $PC^2 = x$ lege $PC^2 = x^2$

p. 411. col. 1. lin. 1. $\sqrt{(\frac{1}{4}a_2)}$ lege $\sqrt{(\frac{1}{4}a^2)}$

ibid. col. 2. lin. 18. $-y^2ax$ lege $y^2 - ax$

p. 412. col. 1. lin. 5. x in . lege in A.

ibid. lin. penult. $+x_2$ lege x^2

ibid. col. 2. lin. 3. $+\frac{1}{2}x_2$ lege $+\frac{1}{2}x^2$

ibid. lin. 7. $\frac{2p}{2} = n$ lege $\frac{2p}{2} = a$

ibid. lin. 9. $\frac{tp}{2m}$ lege $\frac{tp^2}{2m}$

ibid. lin. 11. $+p^4$ lege $+p^2$

p. 415. col. 2. lin. 5. y lege y^3

IN ELEMENTIS ANALYSEOS INFINIT.

p. 420. c. 1. §. 14. l. 11. $x^2: x^m$ lege $x^0: x^m$

ibid. lin. penult. *mperfectarum* lege
imperfectarum

p. 421. col. 1. lin. 2. $-nx \frac{(n-m):m}{mx^{n:m}} dx$

$$\text{lege } \frac{-nx^{(n-m):m} dx}{mx^{n:m}}$$

ibid. lin. 3. $-nx \frac{(n-m):n}{mx^{2n:m}} dx$ lege

$$\frac{-nx^{(n-m):m} dx}{mx^{2n:m}}$$

p. 422. col. 1. lin. 10. & RM lege & Rm

p. 423. col. 1. lin. 8. 226. lege 26.

ibid. lin. 12 & 13. lege

$$dx = \frac{(m+n)ay^{m+n-1} dy}{mbx^{m-1}(a-x)^n - nbx^m(a-x)^{n-1}}$$

p. 424. col. 1. lin. 5. $+nbx^{n-1} dy$ lege
 $+nbx^{n-1} dx$

ibid. lin. 8. $\frac{ydx}{dy} = \frac{may^m}{nbx^{n-1}}$ lege

$$\frac{ydx}{dy} = \frac{-may^m}{nbx^{n-1}}$$

ibid. lin. 8. à fine pagina $r = s = 0$
lege $r = 0$ $s = 0$

ibid. lin. 7. à fine pagina $\frac{2y^2}{a-2}$ lege $\frac{2y^2}{a-2x}$

p. 424. col. 2. lin. 6. bx^n lege bx^{2n}

ibid. lin. 10. COROLLARIUM. lege

COROLLARIUM XIII.

ibid. ante §. 35. PROBLEMA. lege
PROBLEMA V.

p. 425. col. 1. §. 39. lin. 3. $PHydy =$
lege $PH = ydy: dx =$

ibid. lin. 5. $-(m-1)$ lege $-(m+1)$
Vuu 2 ibid.

ibid. col. 2. post lin. 1. adde sequentia, que in 2^a. Edit. omiffa, visa sunt repetenda ex primâ.

41. Eodem modo (§.28) pro infinitis hyperbolis reperitur $PH = (my^2(a \mp x) \mp nxy^2) : (m \mp n)(ax \mp xx)$. Et itaque $ax \mp xx : yy = \frac{m}{m \mp n} a \mp x : PH$.

COROLLARIUM VII.

p. 426. col. 1. lin. 4. prod bit lege prodibit

ibid. col. 2. §. 48. lin. 13. ca lege CA

p. 428. col. 2. lin. 12. : $ma^{m+1}x^{n-1}$ lege $na^{m+1}x^{n-1}$

p. 433. col. 1. lin. 11. 76. lege 66

ibid. col. 2. lin. 5. : $3(a-x)^{1:3}$ lege $3(a-x)^{1:3}$

p. 436. col. 1. lin. 11. à fine pag. $MR_2 = y$: lege $MR^1 = y^4$:

ibid. lin. 10. à fine pag. $+\frac{1}{4}p^2y^2 + \frac{1}{2}qy$ lege $+\frac{1}{4}p^2 + y^2 - \frac{1}{2}qy$

ibid. col. 2. lin. 12. PR lege Pr

p. 437. col. 1. lin. 2. feu lege feu

p. 438. col. 2. lin. 7. à fine pag. $(a-x)$ lege $(a-x)$

ibid. lin. 2. à fine pag. $(a^2 - 4ax^2)$ lege $(a^2x - 4ax^2)$

p. 439. col. 1. lin. 2. — $12x$ lege $-12x^3$

p. 441. col. 1. lin. 16. vel x a lege vel $x-a$

p. 443. col. 1. §. 108. lin. 2. $(b+d)$ lege $(b+x)$

ibid. lin. antepen. AQ QN lege AQ. QN

p. 444. PROBLEMA XV. lege PROBLEMA XXXIII.

p. 445. col. 1. lin. 7. à fine p. $\frac{m}{m-n} \sqrt{x^m y^m}$

lege $\frac{m}{m-n} \sqrt{x^m y^m}$

p. 446. col. 2. interlineas 15. & 16. interse-
ratur $P^{m;n} = A^{1:2} x^{1:2} = A$

ibid. lin. 16. — $a^{-1}x$ dele —

p. 447. col. 1. lin. 14. $(x^{\frac{1}{2}})$ lege $(\frac{1}{2}x)$

ibid. lin. antepen. $\frac{1.3.x^{7:2}}{2.9.6}$ lege $\frac{1.3.x^{7:2}}{2.4.6}$,

ibid. col. 2. lin. 9. — $\frac{1}{4.7}$ — lege — $\frac{1}{4.7} x^3$ —

ibid. lin. 23. — $x^{\frac{1}{8}} dx$ — $\frac{1}{16}$ lege — $\frac{1}{8} x^4 dx$ — $\frac{1}{16}$

ibid. lin. 4. à fine $\frac{15}{1152}$ lege $\frac{5}{1152}$

p. 448. col. 1. lin. 17. Ax lege Ax^2

ibid. lin. 18. Bx lege Bx^2

ibid. col. 2. lin. 5. $\frac{tx}{1+x^2}$ lege $\frac{2x}{1+x^2}$

ibid. lin. 7. $\frac{1+x^2}{1-x^2} I : =$ lege $\frac{1+x^2}{1-x^2} I =$

ibid. lin. 11. $x4dx$ lege $4x dx$

ibid. lin. 26. $\mp x^4$ lege $\mp x^4 dx$

ibid. lin. penult. — $\frac{1}{11}$ lege — $\frac{1}{11}$

p. 450. col. 2. lin. 8. à fine pag. $\frac{1}{20}x$ lege $\frac{1}{20}x$

p. 451. col. 1. §. 183. lin. — $\frac{4}{3}$ lege — $\frac{4}{4}$

p. 452. col. 2. lin. 22. $(a-2y)$ lege $(a-y)$

ibid. lin. 24. — y^4 : 4ar lege — y^4 : 4ar

p. 453. col. 1. lin. 5. $(a-x)^2$ lege $(a-x)^2$

ibid. col. 2. lin. 8. $\frac{1}{2}c^{-1}x^{3:2} = B$ lege $\frac{1}{2}c^{-1:2}x^{3:2} = B$

ibid. lin. 13. $x^{7:2}c^{-1}x$ lege $x^{7:2}$. — $c^{-1}x$

ibid. lin. 15. $c^{\frac{1}{2}}x^{1:2}$ lege $c^{1:2}x^{1:2}$

ibid. lin. 25. — $\frac{1}{16}c^{-1:2}x^{7:2}$ lege — $\frac{1}{16}c^{-3:2}x^{7:2}$

p. 459. col. 1. lin. 19. $\frac{1}{2}a^2bv$, lege $\frac{1}{2}a^2bv^5$

ibid. col. 2. lin. 14. ante &c. scribe v^5

p. 460. col. 1. lin. 4. dele $\mp \frac{v}{3}$

ibid. col. 2. lin. antepen. $\frac{4:3x_2}{2.80}$ lege $\frac{4.3x^2}{2.80}$

p. 464. col. 1. lin. 8. $\frac{b^6x}{16a^{10}}$ lege $\frac{b^6x^6}{16a^{10}}$

ibid. lin. ult. $\frac{x^4}{2a^2}$ lege $\frac{x^4}{4a^2}$

ibid. $\frac{x^{16}}{132^6}$ lege $\frac{x^8}{32a^6}$

ibid.

ibid. col. 2. lin. 5. à fine pag. $\frac{b^2x^{24}}{2a^4}$ lege

$$\frac{b^2x^2}{2a^4}$$

ibid. lin. 3. à fine $\frac{3b^4x^8}{6^4a^{12}}$ lege $\frac{3b^4x^3}{6^4a^{12}}$

p. 465. lin. 7. $\frac{5b^8x}{128a^{14}}$ lege $\frac{5b^8x^8}{128a^{14}}$

NB. pagg. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. male notatae sunt 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470.

p. 466. col. 2. lin. 4. $-\frac{5c^2x^8}{32a^{10}}$ lege $+\frac{5c^3x^8}{32a^{10}}$

ibid. lin. 6. $+\frac{3c^6x^8}{6a^{14}}$ lege $+\frac{3c^6x^8}{16a^{14}}$

p. 467. col. 1. lin. 15. $\frac{c^4x^3}{6a^4}$ lege $\frac{c^2x^3}{6a^4}$

lin. antep. $m^{16}c^{18}$ lege $m^{16}c^8$

ibid. col. 2. $\frac{3419}{75497412}x^9$ lege $\frac{3419}{75497472c^8}x^9$

p. 469. col. 1. lin. 1. n = 2P lege n = 2, P

ib. lin. antep. $\frac{5y^5 - 5z^8}{1024a^7}$ lege $\frac{5y^8 - 5z^8}{1024a^7}$

p. 471. col. 1. lin. 4. legatur sic.

$$+\frac{1.3}{2.4.6.11z^{11}} + \frac{1.3.5}{2.4.6.8.15x^{15}}$$

ib. §. 180. lin. 11. $+\frac{3a^2b^2t^4}{24}$ lege $+\frac{3a^2bt^4}{24}$

ibid. col. 2. lin. 6. $\frac{1}{24}$ lege $\frac{1}{24}$

p. 472 col. 1. §. 484. lin. 9. $\frac{1.3}{2.4.5a^{14}}a^5$

$$\text{lege } \frac{1.3}{2.4.5d^4}a^5$$

ibid. col. 2. lin. 12. la^3 lege la^7

ibid. lin. 6. à fine b^2a^3 lege b^3a^3

ibid. lin. 4. à fine b^2a^5 lege b^3a^5

p. 473. col. 1. lin. antep. m lege n

ibid. col. 2. lin. 2. subtensa lege subtensa

ib. lin. penult. $— 2ab^2$ lege $— 2abx^2$

p. 475. col. 2. lin. 2. bx^2dx^2 lege $b^2x^2dx^2$

ibid. lin. 6. à fine $2ab^3x^2$ lege $2ab^3x^4$

ib. lin. penult. in Denom. $2d^3b$ lege $2a^3b$

p. 476. col. 1. l. 5. à fine a^2x^{-9} lege a^8x^{-9}
ibid. col. 2. lin. 2. $1a^3c$ lege $\frac{1}{2}a^3c$

ibid. lin. 8. $\frac{1.3}{4.4.4x^2}a^3c$ lege $\frac{1.3}{4.4.4x^4}a^3c$

p. 478. c. I. §. 190. l. 2. $+c^2y^2$ lege $+c^2y^2$

ib. §. 191. lin. $\frac{1.3x^5}{4.4.5a^5}$ lege $\frac{1.3x^5}{4.4.5a^3}$

p. 479. col. 1. lin. penult. $c^2 - y$ lege $c^2 - y^2$

ibid. col. 2. lin. 14. $ady\sqrt{(c^2 - y^2)}$ lege $ady\sqrt{(c^2 - y^2)}$

ibid. lin. penult. cdy lege dy

p. 480. col. 2. lin. 2. y^2c lege c

ib. lin. 10. à fine pag. $\frac{2bbi^2}{2c}$ lege $\frac{2bb^2i}{2c}$

p. 481. lin. 6. $\frac{bb^3}{16c^5}v^6$ lege $\frac{bb^6}{16c^5}v^6$

ibid. lin. 9. $\frac{ab^3}{2}v^3$ lege $\frac{ab^3}{2c}v^2$

ibid. lin. 12. $\frac{ab^7}{16c^5}v^6$ lege $\frac{ab^6}{16c^5}v^6$

p. 482. col. 1. lin. 2. $\frac{ab^3}{8c^3}$ lege $\frac{ab^5}{8c^3}$

ibid. lin. 7. $— ab^5$ lege $+ ab^5$

p. 484. col. 1. lin. antep. $\frac{m}{4 + m_2}$ lege $\frac{m}{4 + 2m}$

ibid. col. 2. lin. 7. 103. lege 203.

ibid. lin. 14. $px^2: 4r$ lege $pbx^2: 4r$

ibid. lin. 18. $4pha^2$ lege $4pba^2$

ibid. §. 204. lin. 3. $4par_2$ lege $4par^2$

ib. §. 205. l. 4. ellipti cum lege ellipticum

p. 489. col. 1. §. 231. lin. 6. lege $mxdy — ydx = 0$

p. 490. col. 1. §. 239. lin. 3. ydy lege ydx

p. 492. col. 2. lin. 5. e latere lege elatere

ibid. lin. penult. d^2y^2 lege dy^2

p. 495. col. 2. lin. 2. tungens lege tangens

ibid. lin. 6. $\frac{1}{2}x_2$ lege $\frac{1}{2}x^2$

p. 496. col. 2. lin. 11. à fine pag. $= \frac{1}{2}$
 lege $= \frac{1}{2}$

ibid. lin. antep. $+\frac{1}{12}y^5dy$ lege $+\frac{1}{12}y^5dy$

p. 498. col. 1. §. 277. lin. 6. py^2dy lege py^2dy
 Vuu 3 *ibid.*

ibid. col. 2. §. 280. lin. 5. $y \cdot l \cdot a \cdot d \cdot x$ lege $y^2 \cdot l \cdot a \cdot d \cdot x$
p. 500. col. 2. lin. 6. y ut *la* lege, ut y/a
p. 501. c. 1. lin. 6. à *fine pag. vd'* lege $vd' \cdot x$
p. 502. col. 1. §. 302. lin. 14. $mr = pq$
 lege $mr = pQ$

p. 503. col. 1. lin. 18. lege
 $pdx^2 - 4pxdx^2 + adx^2 + 4px^2dx^2 + 2axdx^2$
ibid. col. 2. lin. 5. $2a^2$ lege $2a^7$

ibid. lin. antep. $\frac{b^3dx}{by - y^3}$ lege $\frac{b^3dx}{b^2y - y^3}$

p. 506. col. 1. lin. 2. $2 : z$ lege $z :$

ibid. $\frac{bzdz + abdz}{\sqrt{z}\sqrt{(z^2 - b^2)}}$ lege $\frac{bzdz + abdz}{z\sqrt{(z^2 - b^2)}}$

ibid. lin. 11. sic legatur peritur
 $ddy = \frac{(2abz^2 - ab^3 + 2bz^3 - b^3dz) dz dx}{(ab + bz)^2 \sqrt{(z^2 - b^2)}}$

ibid. lin. pen. $MI^2 - MR^2$ lege $MI^2 = MR^2$

p. 507. col. 2. lin. 2 — a^2r^2 lege — a^2r^3

p. 509. col. 2. lin. 7. intelligitur lege
 intelligitur

ibid. lin. ult. crit lege erit

p. 510. col. 1. §. 323. lin. 9. y^{m-2} lege y^{m-2}

ib. col. 2. §. 325. l. 9. præfigatur signum —

ibid. lin. 10. $(-4a^2bx^2)$ lege $(-4a^2b^2x$

ibid. lin. 14. $(a^2bx dx)$ lege $(a^2b dx$

p. 511. col. 1. lin. 6. $4abx$ lege $4a^2bx$

ibid. lin. 21. $v\sqrt{v} : 8a$ lege $v\sqrt{v} : 8a^3$

ibid. §. 326. lin. 3. $a^3b^2 :$ lege a^3b^3

ibid. lin. penult. $4a bx^2$ lege $4a^2bx$

p. 512. col. 2. lin. 18. 19. 20. PN lege PH

ibid. lin. 21. 25. TN lege TH

ib. lin. 24. $\sqrt{(y^2 + a^2)} :$ lege $\sqrt{(y^2 + a^2)} : MC$

ibid. lin. 25. TM : lege TM : MC

ibid. lin. penult. tangentis ad lege tan-
 gentis, ut tangens ad

Corrigenda in FIGURIS,

Geomet. Tab. VIII. Fig. 139. Infra A
 scribatur M.

Trigonom. Tab. I. Fig. 8. ubi AC cir-
 cumferentiam secat scribatur F.

Analys. Finit. Tab. II. Fig. 29. mutetur
 I in L.

Tab. III. Fig. 42. producatur NM
 & notetur ejus extremum litera G.
 Scribatur etiam S in extremo Tan-
 gentis TMS.

Tab. IV. Fig. 51. Ducatur recta mq
 parallela recta CF.

Tab. VI. Fig. 63. Ducatur per M
 tangens curvæ AMO axi AP oc-
 curens in T.

Analys. Infinit. Tab. II. Fig. quæ est ad
 dextram Fig. 17, non 16 sed 18 est.

Tab. III. Ducatur recta tangens cur-
 vam in M occurrens tangenti per
 A ductæ in T.

Monendus es præterea B. L. non
 semel in prioribus Editionibus inter-
 ruptum esse ordinem in numeratione
 five §. §. five Propositionum quem mu-
 tare nolimus, ne citationes tantum
 non omnes mutandæ forent.















AVIS AU RELIEUR.

*Les Figures de chaque Traité doi-
 vent être reliées ensemble à la fin du
 Traité auquel elles se rapportent.*

MONITUM AD BIBLIOPEGAM.

*Figure uniuscujusque Tractatus de-
 bent simul compingi ad calcem Trac-
 tatus ad quem pertinent.*

Fig: Anal: infin: Tab: I.




















Fig. 30.




Fig. 31.




Fig. 32.




Fig. 33.




Fig. 34.





Fig. 35.




Fig. 36.




Fig. 39.




Fig. 37.




Fig. 38.




Fig. 41.




Fig. 40.





Fig. 42.








Fig. 43.




Fig. 44.




Fig. 45.




Fig. 46.




Fig. 47.




Fig. 48.




Fig. 49.




Fig. 50.




Fig. 51.




Fig. 52.




Fig. 53.

