Pfizer, comprometidos con la vacunación a lo largo de la vida[1-6]

Nimenrix®
Vacuna antimeningocócica conjugada con toxoide tetánico frente a los serogrupos A, C, W e Y

NeisVac-C®
Vacuna meningocócica conjugada del serogrupo C

APEXXNAR®
Vacuna antineumocócica polisacárida conjugada (20-valente, adsorbida)

Prevenar 13®
Vacuna antineumocócica conjugada 13-valente

▼COMIRNATY®*
Vacuna de ARNm frente a COVID-19 (con nucleósidos modificados)

Trumenba®
Vacuna frente al Meningococo del Grupo B

Referencias: 1. **Nimenrix®**: Ficha técnica disponible en el stand (en el caso de que se muestre en formato digital pulse aquí). El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales (ver a continuación de la Ficha Técnica). **2. Neisvac-C®**: Ficha técnica disponible en el stand (en el caso de que se muestre en formato digital pulse aquí). El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. **3. Trumenba®**: Ficha técnica disponible en el stand (en el caso de que se muestre en formato digital pulse aquí). El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. **4. Prevenar 13®**: Ficha técnica disponible en el stand (en el caso de que se muestre en formato digital pulse aquí). El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. **5. ▼COMIRNATY®**: Ficha técnica disponible en el stand (en el caso de que se muestre en formato digital pulse aquí). El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. **6. Apexxnar®**: Ficha técnica disponible en el stand (en el caso de que se muestre en formato digital pulse aquí). El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. *En la UE se ha concedido una autorización de comercialización (MA, por sus siglas en inglés): **▼COMIRNATY®** vacuna de ARNm frente a COVID-19 (con nucleósidos modificados) (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine en varios países) para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2; en lactantes y niños de entre 6 meses a 4 años de edad (3 microgramos/dosis), en niños de entre 5 a 11 años de edad (10 microgramos/dosis) y en personas de 12 años y mayores (30 microgramos/dosis). **▼COMIRNATY® Original/Omicron BA.1** y COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 vacunas de ARNm frente a COVID-19 (con nucleósidos modificados) para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en personas de 12 años y mayores [(15/15 microgramos)/dosis] que hayan recibido previamente al menos una pauta primaria de vacunación frente a COVID-19. **▼COMIRNATY® Original/Omicron BA.4-5** vacuna de ARNm frente a COVID-19 (con nucleósidos modificados) para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en niños de entre 5 a 11 años [(5/5 microgramos)/dosis] que hayan recibido previamente al menos una pauta primaria de vacunación frente a COVID-19.

Titular de comercialización de COMIRNATY: BioNTech Manufacturing GmbH. Más información sobre COMIRNATY en www.comirnatyeducation.es.
▼)Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

PP-CVI-ESP-0069 Ene. 2023