

Fauna nativa que aún se puede ver



Achará

Stilpnia preciosa

Otros nombres: saíra castaña, saíra preciosa, tangará castaño, tångara preciosa.

Identificación: Pájaro de 15 cm de longitud. Presenta plumaje multicolor. El macho tiene corona y espalda castaño cobrizas y en las alas presenta coloración azul. Los hombros y rabadilla son color crema y la parte ventral es turquesa. La hembra tiene corona castaño-pálida y el resto del plumaje es verdoso, más claro en la zona ventral.

Distribución: Está presente en el sureste de Brasil, sureste de Paraguay, noreste de Argentina y en departamentos del sureste, este y noreste de Uruguay.

Hábitat: Montes, quebradas, bordes de montes ribereños, montes serranos y selvas.

Comportamiento: Por lo general se lo ve solo o en pareja, alimentándose de insectos y frutos a diferentes alturas. Es común

localizarlo gracias a su vocalización (serie de varios tsi... agudos).

Reproducción: Se reproduce entre octubre y enero. Utiliza material vegetal para la construcción del nido; el mismo tiene forma de taza poco profunda. Por lo general la puesta es de 3 huevos blancos con manchas marrones.

Situación poblacional: Categorizada como *Preocupación Menor* (LC-UICN) tanto a nivel nacional como global.

Curiosidades: Esta ave ha sido citada con mayor frecuencia para los departamentos de Rocha, Maldonado, Lavalleja, Treinta y

Tres, Cerro Largo, Rivera, Artigas y Salto. Cabe destacar que hay registros recientes en otros departamentos como pueden ser Montevideo, Durazno y Paysandú. En los meses más fríos del año se la puede ver en zonas urbanas en busca de alimento, suele visitar lugares donde hay comederos para aves.

¿Dónde lo puedo ver? Es un ave poco común; se la puede ver en quebradas, serranías y a veces en bordes de montes. También puede estar, con menos frecuencia, en parques y balnearios.

Verónica Arburúas



Pablo Leal



Wilma Techera



Andrés De Muro



Guazubirá

Mazama gouazoubira

Otros nombres: guazuncho, corzuela parda (Argentina), Veado-birá (Brasil)

Identificación: Cérvido relativamente pequeño, de entre 12 y 25 kg. Pelo grueso, de color pardo a pardo grisáceo. La parte inferior de su cola así como su vientre es más clara, incluso blanuzco. Las crías nacen con manchas blancas que persisten por 4-6 meses. Como en la mayoría de los ciervos el dimorfismo sexual está en la presencia de astas en los machos, las cuales son simples, sin ramificar de unos 8-12 cm aprox.

Distribución: Habita Uruguay, Paraguay, centro y sureste de Bolivia, sur de Brasil desde el borde de la Amazonia, centro/norte de Argentina.

Hábitat: Ocupa varios tipos de bosques, sobre todo abiertos y semi-abiertos, evitando las selvas densas. En Uruguay, sobre todo en el sur hay una preferencia por zonas serranas.

Comportamiento: Principalmente solitaria, se la ve en pareja en época de celo, así como a la hembra acompañando a su cría hasta su independencia. De hábitos tanto diurnos como nocturnos, según la tranquilidad o peligros de su territorio, el cual ronda entre 30 a 150 hectáreas. Se alimenta variadamente de especies herbáceas, arbustivas y de frutos.

Reproducción: Se reprodu-

ce a lo largo de todo el año, con un período de gestación del entorno de 8 meses, luego del cual nace una cría, la cual permanecerá junto a su madre hasta los 8 meses de vida aprox. La madurez sexual se da al año en las hembras y un poco más tarde en los machos.

Situación poblacional: Considerado nacional y globalmente como "Preocupación menor" (LC-UICN).

Curiosidades: Hasta el año 2000, se consideraba que su distribución abarcaba gran parte de la Amazonía, descubriéndose ese año que se trataba de otra especie (*Mazama nemorivaga*), considerada hasta ese momento una subespecie de *M.gouazoubira*.

¿Dónde lo puedo ver? Con paciencia, es posible verla al recorrer distintos ambientes boscosos o semi-boscosos, como montes serranos, de quebrada y ribereños, o en zonas aledañas, donde sale a alimentarse.

Mauricio Alvarez



Mauricio Alvarez



Juan Carlos Gambarotta