

CATALOGO DIDACTICO DE LAS
PLANTAS FANEROGAMAS MAS
CARACTERISTICAS DE LOS
ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE
ALBACETE. TERCERA PARTE.

A. Valdés Franzí

R. Molina Cantos

J. L. González Beserán

Arturo Valdés Franzí.- Doctor en Biología (Botánica).
Catedrático de Escuela Universitaria.

Rafael Molina Cantos.- Licenciado en Biología. Becario
de Investigación (Plan F.P.P.I.).

J. Luis González Beserán.- Licenciado en Biología. Beca-
rio de Investigación (Plan F.P.P.I.).

Introducción

En este trabajo se continúa la relación de plantas vasculares que comenzamos a publicar en dos notas anteriores,⁽¹⁾ siguiendo los mismos criterios que allí se explican.

Nuestro catálogo se refiere a varias familias de Gamopétalas (Simpétalas), expuestas por orden alfabético hasta las Compuestas. Razones de extensión hacen que pospongamos a un trabajo ulterior la publicación del resto de las familias de este grupo.

DICOTILEDONEAS GAMOPETALAS

APOCINACEAS

- (c) *Nerium oleander* L. "Adelfa".
Arbusto perennifolio; hasta 4 m.; Jn-S; parques y jardines. (F).
- (c) *Vinca difformis* Pourret "Pervinca", "Alcandórea".
Perenne, a menudo rastrera; hasta 2 m.; F-My; jardines, tapias. (E).
- (c) *Vinca major* L. "Hierba doncella".

Perenne, a menudo rastrera; hasta 1 m.; Mr-Jn; jardines. (E).

ASCLEPIDIACEAS

- (n) *Cynanchum acutum* L. "Matacán".
Arbusto trepador caducifolio; hasta 3 m.; Jn-A; en zarzales y espinares de las márgenes del río Júcar. (E).
- (n) *Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench "Alcoideca", "Hornaballo".
Perenne rizomatosa; 20-70 cm.; My-Jl; laderas pedregosas. (E).

BIGNONIACEAS

- (c) *Catalpa bignonioides* Walt. "Catalpa".
Arbol caducifolio; 4-12 m.; My-Jl; parques y paseos. (F).

BORRAGINACEAS

- (n) *Anchusa azurea* Miller "Lengua de buey".
Perenne; 0'2-1 m.; Ab-Jn; bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Anchusa undulata* L. "Buglosa azul", "Lenguaza azul".
Bianual o perenne; 10-50 cm.; Ab-Jl; bordes de caminos, vertederos. (E).
- (n) *Asperugo procumbens* L. "Azotalenguas", "Asperugo".
Anual rastrera o trepadora; 20-70 cm.; Ab-Jn; zonas húmedas nitrificadas y frescas. (E).
- (n) *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnston "Mijo de sol".
Anual; 5-40 cm.; Mr-My; bordes de caminos, cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Cynoglossum cheirifolium* L. "Lengua de perro", "Cinoglosa".
Bianual; 10-30 cm.; Mr-Jn; bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Echium asperrimum* Lam. "Bolenga", "Viborera italiana".
Bianual; 30-90 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, cunetas húmedas, vertederos. (E).
- (n) *Echium plantagineum* L. "Viborillo".
Anual o bianual; 20-60 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, cunetas húmedas. (E).
- (n) *Echium vulgare* L. "Viborera", "Lengua de vaca".
Bianual o perenne; 20-80 cm.; Ab-Jl; cardinales de bordes de caminos. (F).

- (n) *Heliotropium europaeum* L. "Heliotropio", "Verruguera".
Anual a menudo rastrera; 10-40 cm.; Jn-O; vertederos, bordes de caminos, viñedos. (MF).
- (n) *Lithodora fruticosa* (L.) Griseb. "Asperilla", "Tamarguera".
Mata; 15-60 cm.; Mr-Jn; matorrales. (MF).
- (n) *Myosotis ramosissima* Rochel in Schultes "Nomeolvides".
Anual; 10-40 cm.; Mr-My; herbazales nitrificados, frescos y umbríos. (E).
- (n) *Neatostoma apulum* (L.) I. M. Johnston "Viborezno", "Chupamiel dorado".
Anual; 5-25 cm.; Mr-Jn; pastizales efímeros entre tomillares, bordes de caminos. (F).
- (n) *Nonea vesicaria* (L.) Reich. "Lanuda de flor negra".
Anual o bianual; 10-40 cm.; Mr-Jn; bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Omphalodes linifolia* (L.) Moench "Alfeñique", "Ombli-guera".
Anual; 5-35 cm.; Ab-Jn; claros de matorrales. (E).

BUDLEYACEAS

- (c) *Buddleja davidii* Franchet "Budleya", "Lila de verano".
Arbusto caducifolio; 1-4 m.; Mr-Jn; parques. (E).

CAMPANULACEAS

- (n) *Campanula dichotoma* L.
Anual; 7-15 cm.; My-Jl; pastizales efímeros sobre laderas calcáreas. (E).
- (n) *Campanula erinus* L. "Asperilla".
Anual; 5-20 cm.; Mr-Jn; pastizales efímeros entre tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Trachelium caeruleum* L. "Flor de viuda", "Hermosilla".
Perenne; 20-80 cm.; My-A; fisuras de paredones calcáreos en el valle del Júcar. (E).

CAPRIFOLIACEAS

- (c) *Lonicera biflora* Desf. "Madreselva".
Arbusto trepador caducifolio; 1-3 m.; My-S; jardines, recubriendo tapias. (E).
- (n) *Lonicera etrusca* G. Santi "Madreselva", "Matahombres".
Arbusto trepador caducifolio; hasta 3 m.; My-Jl; en zarzales y espinares de bosques de ribera.

- (n) *Lonicera implexa* Aiton “Madreselva”, “Calzas”.
Arbusto trepador perennifolio; hasta 2 m.; My-JI; encinares y coscojares térmicos. (E).
- (n) *Lonicera periclymenum* L. “Madreselva”, “Zapatillas de la Virgen”.
Arbusto trepador caducifolio; hasta 4 m.; Jn-S; en zarzales y espinares de bosques de ribera. (E).
- (n) *Sambucus ebulus* L. “Sauquillo”, “Matapulgas”.
Perenne; 0'5-1'5 m.; Jn-A; bordes de caminos húmedos y nitrificados. (E).
- (c) *Sambucus nigra* L. “Sauco”.
Arbusto o pequeño árbol caducifolio; 2-6 m.; Jn-JI; en algunos jardines. (E).
- (c) *Symphoricarpos albus* (L.) S. F. Blake “Bolita de nieve”.
Arbusto caducifolio; 1-3 m.; Jn-S; parques y jardines. (E).
- (c) *Viburnum rithyodophyllum*.
Arbusto perennifolio; 1-4 m.; Mr-My; parques. (E).
- (n)(c) *Viburnum tinus* L. “Durillo”, “Tino”.
Arbusto o pequeño árbol perennifolio; 2-6 m.; F-My; umbrías de encinares en el valle del río Júcar, parques. (E).

COMPUESTAS

- (n) *Anacyclus clavatus* (Desf.) Pers. “Manzanilla loca”.
Anual; 10-50 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (MF).
- (n) *Andryala integrifolia* L. “Carmelita descalza”, “Cerraja lanuda”.
Anual o perenne; 15-70 cm.; Ab-JI; herbazales de bordes de caminos. (F).
- (n) *Andryala ragusina* L. “Ajonje”, “Borraquillas”.
Perenne; 15-50 cm.; Ab-Jn; bordes arenosos de caminos, suelos terrosos y nitrificados. (F).
- (n) *Anthemis arvensis* L. “Manzanilla bastarda”.
Anual o bianual; 10-50 cm.; My-A; bordes de caminos, campos incultos. (E).
- (n) *Anthemis cotula* L. “Manzanilla hedionda”.
Anual; 10-60 cm.; My-S; cunetas, vertederos. (E).
- (n) *Arctium minus* Bernh. “Lampaza”, “Lamparaza”.
Bianual; 0'4-1'3 m.; Jn-A; vertederos, sotobosque de olmedas nitrificadas. (E).
- (n) *Artemisia campestris* L. “Ajenjo”, “Arbrótano macho”.
Perenne, leñosa en la base; 0'2-1 m.; Jn-S; matorrales nitrifi-

- cados. (E).
- (n) *Artemisia herba-alba* Asso “Ontina”, “Boja blanca”.
Perenne, leñosa en la base; 15-60 cm.; Jn-O; matorrales nitrificados, bordes de caminos. (MF).
- (n) *Artemisia vulgaris* L. “Artemisa”, “Hierba de San Juan”.
Perenne; 0'4-1'2 m.; Jn-O; cunetas algo húmedas. (E).
- (s) *Aster squamatus* (Sprengel) Hieron.
Anual o bianual; 20-80 cm.; JI-O; huertas y regadíos. (F).
- (n) *Asteriscus aquaticus* (L.) Less.
Anual; 5-40 cm.; Ab-JI; pastizales entre tomillares y encinares aclarados. (E).
- (n) *Atractylis cancellata* L. “Cardo enrejado”.
Anual; 3-25 cm.; My-S; pastizales entre tomillares. (E).
- (n) *Atractylis humilis* L. “Cardo heredero”.
Perenne; 10-40 cm.; Jn-O; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Bellis perennis* L. “Margarita común”, “Chirivita”.
Perenne; 10-20 cm.; Ab-O; prados y céspedes de jardines.
(E).
- (n) *Bidens tripartita* L. “Cáñamo acuático”, “Estrella de mar”.
Anual; 10-60 cm.; JI-O; márgenes de acequias, regadíos. (E).
- (n) *Bombycilaena erecta* (L.) Smolj. “Lino de pastora”.
Anual; 3-20 cm.; Mr-My; pastizales efímeros entre tomillares, terraplenes terrosos. (F).
- (n) *Calendula arvensis* L. “Caléndula”, “Maravilla silvestre”.
Anual; 5-25 cm.; Mr-Jn; cunetas, vertederos, bordes terrosos de caminos. (F).
- (c)(s) *Caléndula officinalis* L. “Flor de muerto”, “Maravilla”.
Anual o perenne, leñosa en la base; 20-60 cm.; My-N; jardines, caseríos y sus alrededores. (F).
- (n) *Carduncellus araneosus* Boiss. & Reut. “Cardillo azul”.
Perenne; 10-30 cm.; My-JI; tomillares y matorrales. (F).
- (c) *Carduus bourgeanus* Boiss. & Reut. “Cardo común”.
Anual; 20-50 cm.; Ab-Jn; cardunales de bordes de caminos.
(E).
- (n) *Carduus granatensis* Willk.
Perenne; 40-90; My-JI; cunetas y márgenes de caminos. (E).
- (n) *Carduus tenuiflorus* Curtis “Cardo común”.
Anual; 30-70 cm.; Ab-Jn; cunetas y márgenes de caminos.
(F).
- (n) *Carlina corymbosa* (L.) “Cardo cuco”, “Cabeza de pollo”.
Perenne; 15-60 cm.; Jn-S; matorrales y bordes de caminos.

- tomillares algo nitrificados. (F).
- (n) *Hieracium pilosella* L. "Hierba de la salud", "Velosilla".
Perenne estolonífera; 5-30 cm.; My-S; laderas secas y prados.
(E).
- (n) *Hypochoeris glabra* L. "Oreja de gato".
Anual, a veces perenne; 5-30 cm.; Ab-Jn; pastizales efímeros
sobre rañizos. (E).
- (n) *Hypochoeris radicata* L. "Hierba de halcón", "Lechuga de
cerdos".
Perenne; 20-80 cm.; My-A; prados y cunetas húmedas. (E).
- (n) *Inula montana* L. "Arnica montera".
Perenne; 20-50 cm.; My-Jl; matorrales de laderas soleadas.
(F).
- (n) *Jasonia glutinosa* (L.) DC. "Te de roca".
Perenne; 10-40 cm.; Jn-O; fisuras de rocas, litosuelos calcá-
reos. (F).
- (n) *Jurinea humilis* (Desf.) DC. "Escobilla baja".
Perenne acaule; 2-7 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales. (F).
- (c) *Lactuca sativa* L. "Lechuga".
Anual o bianual; 10-70 cm.; Jl-S; huertas. (F).
- (n) *Lactuca serriola* L. "Lechuga espinosa".
Anual o bianual; 0'3-1'2 m.; Jn-A; cardinales de bordes de
caminos, vertederos, campos incultos. (MF).
- (n) *Lactuca tenerrima* Pourret. "Lechugilla silvestre", "Serrillo".
Perenne; 20-50 cm.; My-Jl; paredes o zonas rocosas algo nitri-
ficadas, bordes pedregosos de caminos. (E).
- (n) *Lactuca viminea* (L.) J. & C. Presl. "Lechuga de asno".
Bianual o perenne; 20-80 cm.; Jn-Jl; herbazales de bordes de
caminos, claros de encinares subnitrófilos. (E).
- (n) *Launaea nudicaulis* (L.) Hooker fil.
Bianual o perenne; 10-40 cm.; Ab-Jn; tomillares yesíferos y
bordes de caminos en zonas términas. (E).
- (n) *Launaea pumila* (Cav.) O. Kuntze "Escorzonerilla falsa".
Perenne; 10-30 cm.; Ab-Jn; tomillares y espartales sobre sue-
los yesíferos. (E).
- (n) *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Mérat "Lechuguillo".
Anual; 5-30 cm.; Ab-Jn; pastizales efímeros sobre rañizos,
tomillares. (E).
- (n) *Leuzea conifera* (L.) DC. "Cuchara de pastor", "Cardo del
sol".
Bianual o perenne; 5-40 cm.; My-Jl; matorrales y claros de
encinar. (F).

- (n) *Logfia minima* (Sm.) Dumort. "Tacillas de algodón".
Anual; 5-20 cm.; My-Jn; pastizales efímeros sobre rañizos en claros de encinar. (E).
- (n) *Mantiscalca salmantica* (L.) Briq. & Cavillier "Alcabota", "Escoba de cabezuelas".
Bianual o perenne; 30-90 cm.; My-A; cardunales de bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Onopordum acanthium* L. "Cardo borriquero", "Toba".
Bianual; hasta 3 m.; Jn-A; macrocardunales de bordes de caminos y campos incultos. (E).
- (n) *Onopordum acaulon* L. "Cabeza de cardo", "Toba sentada".
Bianual; acaule; Ab-Jn; campos incultos. (E).
- (n) *Onopordum illyricum* L. "Cardo borriquero", "Cardo del demonio".
Bianual; 0'5-1'3 m.; Jn-A; cardunales de borde de caminos y campos incultos. (F).
- (n) *Onopordum nervosum* Boiss. "Cardo gigante", "Toba gigante".
Bianual; hasta 2'5 m.; Jn-A; macrocardunales de bordes de caminos y campos incultos. (F).
- (n) *Pallenis spinosa* (L.) Cass. "Castañuela", "Estrellada".
Anual o bianual; 10-60 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, terraplenes terrosos. (F).
- (n) *Phagnalon rupestre* (L.) DC. "Yesca", "Pelusilla".
Mata; 10-30 cm.; Ab-Jl; tomillares y matorrales de suelos pedregosos. (E).
- (n) *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. "Manzanilla yesquera", "Romero".
Mata; 20-60 cm.; Ab-Jl; enclaves rocosos termófilos. (E).
- (n) *Picnomon acarna* (L.) Cass. "Cabeza de pollo", "Azotacristos".
Anual; 20-70 cm.; Jn-S; cardunales de bordes de caminos, barbechos. (F).
- (n) *Picris echioides* L. "Cardo perruno", "Hierba gusanera".
Anual o bianual; 30-80 cm.; Jl-S; cunetas húmedas, regadíos y huertas. (E).
- (n) *Prolongoa hispanica* López & Jarvis.
Anual; 8-20 cm.; Ab-Jn; pastizales terofíticos sobre suelos arenosos. (E).
- (n) *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner "Uñas del diablo", "Camarroja".
Anual; 10-40 cm.; Ab-Jn; herbazales de cunetas frescas y

- sotobosques umbrosos de olmedas. (E).
- (n) *Santolina canescens* Lag. "Meaperros", "Botonera".
Mata; 20-50 cm.; My-Jl; matorrales algo nitrificados y bordes de caminos. (E).
- (n) *Santolina chamaecyparissus* L. "Abrótano hembra", "Hierba piojera".
Mata; 20-50 cm.; My-Jl; matorrales nitrificados y bordes terrosos de caminos. (F).
- (n) *Scolymus hispanicus* L. "Cardillo", "Cardo bravío".
Bianual o perenne; 20-70 cm.; Jn-A; bordes de caminos, vertederos y campos incultos. (F).
- (n) *Scorzonera graminifolia* L. "Barbuda", "Tetas de vaca".
Bianual o perenne; 10-50 cm.; My-Jn; matorrales y espartales. (F).
- (n) *Scorzonera laciniata* L. "Barbajas", "Margallos".
Anual o bianual; 10-50 cm.; My-Jn; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Senecio gallicus* Chaix in Vill. "Arnica falsa", "Flor de Santiago".
Anual; 10-40 cm.; Mr-Jn; cunetas nitrificadas, vertederos. (F).
- (n) *Senecio jacobaea* L. "Hierba de Santiago", "Azuzón".
Bianual o perenne; 0'3-1'5 m.; Jn-A; prados, cunetas húmedas. (E).
- (n) *Senecio vulgaris* L. "Hierba cana", "Pan de pájaro".
Anual; 10-30 cm.; F-My; cunetas húmedas, sotobosques umbrosos de olmedas, céspedes de jardines. (F).
- (n) *Serratula pinnatifida* (Cav.) Poiret.
Perenne; 10-40 cm.; Jn-Jl; matorrales de zonas frías. (E).
- (n) *Silybum marianum* (L.) Gaertner "Cardo de María", "Cardo lechero".
Anual o bianual; 0'4-1'5 m.; My-Jn; cardunales de bordes de caminos. (F).
- (n) *Sonchus asper* (L.) Hill "Cerraja".
Anual o bianual; 20-80 cm.; My-N; bordes de caminos y cunetas algo húmedas. (E).
- (n) *Sonchus crassifolius* Pourret ex Willd. "Ensalada de mula", "Cerraja de salobral".
Perenne; 10-40 cm.; My-Jl; suelos salinos más o menos húmedos. (E).
- (n) *Sonchus maritimus* L. "Amargón de acequia".
Perenne rizomatosa; 15-60 cm.; Jn-N; praderas juncuales, már-

- genes de canales. (E).
- (n) *Sonchus oleraceus* L. "Cerrajón", "Cardo lechuzo".
Anual o bianual; 0'3-1'2 m.; Mr-N; bordes de caminos, vertederos, regadíos. (MF).
- (n) *Sonchus tenerrimus* L. "Cerraja de pared".
Anual o perenne; 20-70 cm.; Mr-Jl; bases de muros, cunetas. (F).
- (n) *Staelina dubia* L. "Borlitas de seda montés".
Mata; 15-40 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales. (E).
- (n) *Taraxacum officinale* Weber in Wigg. "Diente de león".
Anual o bianual; 5-30 cm.; F-My; cunetas frescas y céspedes de jardines. (F).
- (n) *Tragopogon dubius* Scop. "Barbaja".
Anual o bianual; 20-50 cm.; My-Jl; herbazales de bordes de caminos, zonas ruderales. (F).
- (n) *Tragopogon porrifolius* L. "Barba cabruna", "Salsifí".
Bianual; 0'2-1 m.; My-Jl; cunetas, vertederos, bordes de caminos. (E).
- (n) *Urospermum picroides* (L.) Scop. "Barbas de viejo".
Anual; 20-50 cm.; My-Jl; herbazales de bordes de caminos en enclaves térmicos del valle del Júcar.
- (s) *Xanthium spinosum* L. "Cachurrera menor", "Pegotes".
Anual; 15-90 cm.; Jl-O; cunetas muy nitrificadas, vertederos. (F).
- (n) *Xanthium strumarium* L. "Cachurro", "Arrancamoños".
Anual; 0'2-1'2 m.; Jl-O; regadíos de maíz, márgenes de acequias. (E).
- (n) *Xeranthemum inapertum* (L.) Miller "Inmortal menor".
Anual; 10-40 cm.; My-Jl; herbazales de bordes de caminos. (F).