

Galta Vermeya

Tamaño: Medianamente grande.

Forma: Cordiforme-oval e irregular, con un labio más saliente que otro en la parte apical. Dorso acostillado y contorno irregular. Asimétrico.

Zona pistilar: Redondeada, levemente aplastada hacia el dorso. **Punto pistilar:** Pequeño, grisáceo, desplazado hacia el dorso y situado en una depresión más o menos acusada.

Sutura: Incolora o un poco más intensa que el color del fruto. Siempre visible, situada verticalmente o un poco oblicua, en surco en la parte inferior y punto pistilar, en el resto del fruto casi superficial.

Cavidad peduncular: Estrecha y de forma elíptica, generalmente profunda, suavemente rebajada en los dos lados. **Pedúnculo:** Adherido y al arrancarlo aparece un círculo rojo bordeando el orificio.

Piel: Un poco anteada y rugosa. **Color:** Amarillo anaranjado, con chapa de punteado carmín. Punteado abundante, transparente. En la zona peduncular estriado irradiado del color del fondo.

Carne: Amarillo-anaranjada. Semi-pastosa, algo fibrosa. **Sabor:** Suavemente acidulado y aromático.

Hueso: Adherido por el dorso y arista ventral. Alargado, color canela intenso, muy arenoso pero más intenso en su ápice. Acostillado en su mitad. Aristas secundarias levemente crestadas desde su mitad.

Almendra: Semi-dulce y aisladamente se encuentra alguna amarga.

Maduración: Mediados de junio en Porreras (Baleares).

