

ANQUILOQUELIA (*Ankylocheilia*, no *chilia*).—Gr., de τὸ χεῖλος, el labio.=La fusion ó identificación congénita ó cicatricial de la comisura de los labios con el maxilar inferior.

ANQUILOSIS (*Ankylosis*).—Gr., de ἀγκυλῶ, encorvar, soldar, anudar, arquear, torcer.—Lat. *Angulus*.—Rigidez articular, completa ó incompleta, acompañada de angulosidad ó arqueadura, aunque no siempre, puesto que se dan *Anquílosis* en completa extension.

La **A.** puede ofrecer cuatro aspectos elementales, correspondientes á cuatro distintas variantes anatómicas: 1.^a **A. intra-capsularis**: inmovilidad y deformacion sin espasmo, por recrecimiento de las partes óseas ligamentosas ó cartilaginosas de la cavidad articular.—2.^a **A. capsularis**: inmovilidad sin deformacion ni espasmo, á consecuencia de rugosidades y vegetaciones de la sinovial.—3.^a **A. extra-capsularis**: inmovilidad con poca deformacion y espasmo, determinada por alteraciones con embridamiento de los elementos fibrosos periféricos.—4.^a **A. muscularis**: inmovilidad sin deformacion y con espasmo, sostenida por la contractura de los músculos correspondientes á la articulacion enferma.

Estas cuatro formas, á fuer de elementales, preséntanse frecuentemente combinadas.

— **ANULADO, DA**, adj. (*Annulatus*).—Lat., de *annulus*, anillo, sortija.=Dícese de la forma circular ó anillada de diversas erupciones ó eflorescencias cutáneas.

ANURIA.—Gr., de ἀν, priv., y τὸ οὖρον, ου, la orina.=La escasez ó la supresion absoluta de secrecion renal.

APEPSIA.—Gr., de ἀ, priv., y πέπω, ablandar.=Insuficiencia de la energía gástrica propiamente digestiva.

APIREXIA (*Apyrexia*).—Gr., de ἀ, priv., y πυρέσσω, tener calentura (de τὸ πῦρ, el fuego).=Llámase así el estado infebril que media entre dos accesos de una fiebre intermitente.

APLASIA.—Gr., de ἀ y ἡ πλάσις (de πλάσσω, formar, organizar, esculpir).=La deficiencia ó la desaparicion completa, ó incompleta, del desarrollo de ciertos órganos ó tejidos.

APNEA (*Apnoea*).—Gr., de ἀ, priv., y ἡ πνοή (de πνέω, respirar, resollar).=La sofocacion extrema, ya eu el concepto de respiracion interrumpida, ya en el de respiracion acelerada y difícil.

APNEUMATOSIS.—Gr., de ἀ, priv., y ἡ πνευμάτωσις (de πνεῦμα, ατος, y la desin. ωσις), resuello.=Falta de resuello por causa patológica.

APODEMIALGIA.—Gr., de ἀπό, fuera de, lejos de; ὁ δῆμος, ου, el pueblo, la patria, y τὸ ἄλγος, el dolor.—Es, en oposicion á la *Nostalgia*, un patológico anhelo de abandonar el país natal, creyendo hallar en tierra extraña el perdido sosiego.

APOPLEJÍA.—Gr., de πλῆξις, εως, accion de golpear, paralizar de un golpe (de απο-πλήσσω, aturdir).—Es la repentina abolicion del trabajo útil en un órgano importante de la economía.

La *A.* es una pura forma sintomática y no prejuzga de las diversas alteraciones anatómico-patológicas que pueden determinarla.

Divídese, segun la naturaleza de las funciones abolidas, en **A. cerebral**, **A. espinal**, **A. meníngea** y **A. pulmonal**, y segun el mecanismo vascular, en **A. sanguínea**, ó por derrame material de la sangre; **A. serosa**, ó por edema agudísimo ó trasudacion súbita del suero; **A. embólica** ó **isquémica**, por atascamiento mecánico intra-vascular y la anemia consecutiva de la parte.

APOSTEMA.—Gr., τὸ ἀπόστημα, de ἀπό ἔϊστημι = ἀφίστημι, separarse.—Es sinónimo de *Absceso*.

APRAXIA.—Gr., de ἀ, y ἡ πράξις (de πράσσω, hacer, operar).—Es la pérdida de la inteligencia para el uso de las cosas, ó sea, el desconocimiento real y final de todas ellas.

Conviene fijar bien la relacion formal entre la *Apraxia* y la *Afasia*. En ésta se pierde la memoria de los nombres ó signos lógicos de las cosas; en aquélla se pierde el conocimiento de las cosas mismas y, en consecuencia, de sus usos.

APSELAFESIA (*Apselaphesia*). —Gr., de ἀ, priv., y ἡ ψηλάφησις (de ψηλάφω, tocar, palpar).—Es la pérdida del sentido especial del tacto, sin alteracion obligada del sentido térmico.

En rigor, muchos casos de *Apselafesia*, que la práctica ofrece, debieran denominarse *Parapselafesia* (de παρά, que en comp. indica transgresion, perturbacion), es decir, perversion de la sensacion tactil, ora en la naturaleza de la misma, ora en la idea del sitio á que la percepcion refiere dicha sensacion.

AQUINESIA (*Akinesis*).—Gr., de ἀ, priv., y ἡ κίνησις, el movimiento (de κινέω, moverse, cambiar de lugar).—Suspension ó abolicion del movimiento muscular voluntario.

ARCUS SENILIS.—Lat., arco senil ó de la vejez.—Círculo gris amarillento que circunvala la córnea transparente en los ancianos, por efecto de la degeneracion grasienta en los corpúsculos limitantes de la misma córnea.

Aunque en rigor no es síntoma, sino marca de senectud, conviene hacerse cargo de él en aquellos casos en que debe ser estimada con precisión la edad real, ó decadencia efectiva, de un individuo.

ARTRALGIA, ARTROPATIA (*Arthralgia, Arthropathia*).—Gr., de τὸ ἄρθρον, la juntura (de ἀρθρῶω, encajar, ajustar), y resp. de ἄλγος, dolor, y πάθος, padecimiento.—Es la neuralgia ó simple dolor articular, con ó sin participacion de los nervios cutáneos y musculares de la region afecta, pero sin síntomas objetivos de inflamacion.

ARTRITIS (*Arthritis*).—Gr., de ἄρθρον y la desinencia convencional *itis* (ιτις), que designa fuerte irritacion.—Es la inflamacion articular demostrable por síntomas flogísticos objetivos.

Por el concepto sintomatológico debe dividirse:

- 1.º Por su data, en **A. aguda** y **A. crónica**.
- 2.º Por el número de articulaciones afectas, en **Monarthritis**, **Polyarthritis** y **Pantarthritis**, segun sean una, varias ó todas.

Existe finalmente la **A. deformans**, s. **nodosa**, muy comun entre los ancianos, y no rara en sujetos discrásicos.

ASCITIS (*Ascites*).—Gr., ἀσκίτης, adj. de ὁ ἀσκός, el odre ó pellejo de vino.—Llámase así la hidropesía ó derrame seroso del peritoneo, bien como manifestacion idiopática de un padecimiento abdominal, bien como expresion de un hecho general.

ASEMIA.—Gr., de ἀ, priv., τὸ σημεῖον, ατος, el signo (sinónimo de *Asymbolia*, de *Aphasia*).—Es la expresion genérica de la incapacidad del enfermo para valerse de los signos de comunicacion racional: palabra, entonacion, escritura, diseño, gesto.

Dividese en **A. expresiva** y **A. receptiva**, segun la incapacidad se refiera á la produccion espontánea de signos, ó á la inteligencia de los producidos por tercera persona.

ASFIXIA (*Asphyxia*).—Gr., de ἀ, priv., y ὁ σφυγμός, ου, la palpitation (de σφύζω, palpitar, ondear, golpear).—Literalmente significa «resolucion del pulso»; pero técnicamente vale por resolucion ó suspension de la funcion respiratoria, con ó sin persistencia del movimiento cardíaco.

ASIALIA.—Gr., de ἀ, priv., y σάλις, ἰδος (ή), -ον, ου; -ωμα, ατος (ὀ), la saliva.—Escasez preternatural ó supresion de la saliva.

ASIMBOLIA (*Asymbolia*).—Gr., de ἀ, priv., y τὸ συμβόλον, el signo (de συμβάλλω, poner en relacion, conjeturar). (V. *Asemia* y *Afasia*.)

ASISTOLIA (*Asystolia*).—Gr., de ἀ, priv., y ἡ συστολή, la contraccion, la reunion (de συν-στέλλω, unir).—La debilidad y consiguiente insufi-

ciencia del sistole cardíaco para expulsar de las cavidades ventriculares toda la sangre que en el diástole reciben. (Intr. por Beau para denominar el segundo período de las afecciones del corazón.)

ASMA (*Asthma*).—Gr., τὸ ἄσθμα, de ἄω, aspirar, resollar, soplar.= En rigor, el *Asma* es una especie del género *Dispnea* ó dificultad de respirar, y se presenta generalmente periódico, caracterizado por una respiración precipitada, anhelosa, entrecortada, ruidosa, con gran dificultad expiratoria, tos sofocante, y rostro, ahora pálido y contraído, ahora abotagado.

Puede el *Asma* ser *idiopático*, por neurosis de la porción pulmonar del n. vago, ó de éste y del n. frénico, y puede ofrecerse *sintomático* ó reflejo, como por ejemplo, el **A. dispéptico**, el **A. uterino**.

ASPERMATISMO (*Aspermatismus*).—Gr., de ἄ, priv., y τὸ σπέρμα, el sémen, la semilla (de σπείρω, sembrar).=Es una forma de esterilidad viril que, sin incapacitar para la materialidad del coito, implica falta de eyaculación.

Distinguese de la *Azoospermia*, en que ésta ofrece eyaculación de un humor desprovisto de zoospermos.

ASTENIA (*Asthenia*).—Gr., ἀσθένεια, de ἄ, priv., y τὸ σθένος, la fuerza.=Falta de energía constitucional, en cuanto imprime carácter á la enfermedad concreta de que se trata, por ejemplo, la postración de un sujeto débil en el curso de una afección aguda de naturaleza franca. (V. *Adinamia*.)

ASTENOPIA (*Asthenopia*).—Gr., de ἄ, priv., σθένος, y ἡ ὠψ, ὠπός, el ojo.=Es la debilidad ó impotencia de acomodación visual, con dificultad de mantener largo tiempo la convergencia binocular en la visión á corta distancia (1).

ASTIGMATISMO.—Gr., de ἄ, priv., y τὸ στίγμα, ατος, ὁ στίγμός, οὖ, el punto (de στίζω, punzar).=Aberración visual debida á la desigualdad de los elementos dióptricos en diversos meridianos del ojo.—Consiste en la falta de unidad de *punto focal*, por aberración de esfericidad.

ATAXIA.—Gr., de ἄ, priv., y ἡ τάξις, el orden, la coordinación (de τάσσω, ordenar, etc.).=Es la alteración de las coordinaciones fisiológicas, tanto estáticas como locomotrices.

(1) En gr., ὠψ, ὠπός, se usa sólo en acusativo del singular y en plural;—con omícron, ὄψ, ὀπός, admite todos los casos, pero significa ojo, vista, voz y palabra;—ὄψις, εως, significa vista, semblante, apariencia.—Los tres son femeninos (ή).—Además, existe, como es de todos sabido, la voz οφθαλμος, οὖ (ὄ), ojo, mirada, vista, frente, faz, ventana, etc., de donde *oftalmia* (*ophthalmia*) y el adjetivo anat. *oftálmico*, *ca*.

ATETOSIS (*Athetosis*).—Gr., de ἀ, priv., y θέτος (de τίθημι, afirmar, situar, etc.).=Falta de firmeza, mala postura.—Así denominó Hammond unos movimientos involuntarios muy dolorosos, producidos á intervalos y con cierta regularidad en los dedos de las manos y de los piés, como resultado de una perturbacion idiopática ó simpática de los centros nerviosos.

ATONÍA.—Gr., de ἀ, priv., y ό τόνος, ου, tension (de τείνω, tender, apretar, ajustar).=Es la relajacion de los tejidos con descaecimiento de su energía funcional.

Es la *Atonía* la forma genérica de manifestacion de la *Asthenia* y la *Adinamia*.

ATRESIA.—Gr., de ἀ, priv., y ή τρήσις, el agujero (de τράω, talar).=Llámase así la imperforacion ó la oclusion completa de algun orificio ó conducto fisiológico.

ATROFIA (*Atrophia*).—Gr., de ἀ, priv., y ή τροφή, alimento, nutrimento (de τρέφειν, alimentar).=Es la regresion cuantitativa de los tejidos en cuanto á número y grandor de sus elementos anatómicos, bien por causa patológica, bien por simple privacion de su natural sustento.

AURA.—Lat., del gr. ή αύρα, ας, brisa, soplo, aspiracion.=La sensacion como de un vapor que, partiendo del tronco y los miembros, se eleva hácia la cabeza un momento antes de la invasion de algunos paroxismos agudísimos, ó insultos; por ejemplo, **A. histérica**, **A. epiléptica**.

AZOOSPERMIA.—Gr., de ἀ, priv.; τó ζώον, el animal, y τó σπέρμα, el sémen.=La suma escasez ó absoluta falta de zoospermos en el producto de la eyaculacion.

AZOTURIA.—Galicismo de *ázoe* (fr. *azote*), voz gr., de ἀ, priv., y ζωή, ης (ή), vida, gas (*antivital*), y τó ούρον, la orina. Debe, pues, decirse: **AZOURIA**.=Exceso anormal de *ázoe* contenido en las orinas.

B

BAL-LISMO.—Dícese que en gr. ό βαλλισμός significa la danza (de βαλλίζω, bailar (1), i. q. *Corea*).

BATARISMO (*Battarismus*).—Gr., βατταρίζω, tartamudear, farfu-

(1) Esta etimología es inaceptable. Entre las muchas y muy variadas acepciones del enrevesado verbo βάλλω, no figura «danzar», ni cosa parecida. Para tal acepcion ahí está el verbo χορεύω, danzar en coro, όρχήομαι-οὔμαι, bailar, hacer pantomimas, y otros.—Lo que hay aquí es que βάλλω significa, entre otras cosas, «agitar», «remo-

llar.—Lat. *Tumultus sermonis*.—El habla atropellada, con transposicion de unas sílabas y parcial elision de otras.

Puede ser, ó connatural, ó expresivo de estados patológicos.

BLÆSITAS, *spl. LINGUÆ*.—Lat. de origen gr., de βλασιός, cojo-patizambo.—En sentido figurado vale por *cojera* (claudicacion) de la lengua, es decir, por tartamudez, accidental ó patológica. (V. *Anarthria literalis*.)

BLEFARITIS (*Blepharitis*).—Gr., de τὸ βλέφαρον, el párpado.—La irritacion ó inflamacion palpebral.

Las principales formas son: **B. secretoria**, **B. hypertrophica**, **B. ulcerosa**, **B. phlegmonosa**, **B. ciliaris** y **B. tarsalis**.

BLEFAROPTOSIS (*Blepharoptosis*).—Gr., de βλέφαρον, párpado, y πῶσις, caída.—Procidencia del párpado superior, con incapacidad, absoluta ó relativa, de su elevacion voluntaria.

Suele ser sintomática, pero puede tambien darse como defecto congénito.

BLEFAROSPASMO (*Blepharospasmus*).—Gr., de βλέφαρον y ὁ σπασμός, el calambre (de σπᾶω, tirar, contraer).—Es la contractura ó contraccion patológica continua del m. orbicular de los párpados.

Se divide en **B. primitivo** (idiopático) y **B. secundario**.

BLÉNORREA (*Blennorrhœa*).—Gr., de τὸ βλέννος, el moco; ἡ βλέννα, la flema ó mucosidad, y ἡ ῥοή, el flujo (de ῥέω, fluir, manar).—El flujo de moco ó moco-pus producido por la irritacion catarral de las membranas mucosas.

Con frecuencia se emplea, aunque impropia é innecesariamente, en el sentido de verdadera supuracion de dichas membranas. (V. *Piorrea*.)

BORBORIGMO (*Borborygmi*).—Gr., de ὁ βορβορυγμός, murmullo.—Gorgoteo causado por el brusco cambio de lugar de productos gaseosos á través de los líquidos intestinales.

BRADIFRASIA (*Bradyphrasia*).—Gr., de βραδύς, εἶς, ὄ, lento, pesado, perezoso, y ἡ φρασις, el habla.—Lentitud patológica en la emision de la palabra, á causa de postracion fisica ó abatimiento moral.

BRADILALIA (*Bradylalia*).—Gr., de βραδύς y λαλεῖω, hablar (en sen-

ver», y que por este concepto es más propio que el término corea (*χορεία*), para denominar una expresion morbosa que nada tiene de parecido á danza, baile ni pantomima, segun es de desgraciada y resulta sin maldita la gracia. En cambio son incessantes en el enfermo la «agitacion» y la «remocion».—(Cf. *Corea*, ó baile de San Vito.)

tido glótico ó material).=Pronunciacion trabajosa, por dificultad centromotriz de emitir ordenadamente las letras y las silabas.

BRADIMASESIA (*Bradymasesia*).—Gr., de βραδός y μάσησις, masticacion. (V. *Amasesia*.)

BRAQUIALGIA (*Brachialgia*).—Gr., de ὁ βραχίων, el brazo, y τὸ ἄλγος, el dolor.=Neuralgia del plexo braquial.

BROMIDROSIS.—Gr., de ὁ βρωμος, el hedor, y ὁ ἰδρὸς, ὁ ἰδρώς, el sudor.=Produccion patológica de sudor hediondo, ó simple hediondez del ordinario transpirar.

Puede el fenómeno ser *general* ó *local*.

BRONCOFONÍA (*Bronchophonia*).—Gr., de ὁ βρόγγχος, y ἡ φωνή, la voz.=Fenómeno patológico de transmision clara y distinta de la voz del enfermo al punto de la pared torácica objeto de auscultacion. Débese este resultado, propiamente telefónico, á un aumento preternatural de la densidad pulmonar, percibiéndose en consecuencia tanto más clara la voz cuanto mayor es el macizo.

BRONCORREA (*Bronchorrhœa*).—Gr., de τὰ βρόγγχια, y ἡ ῥοή, ῥις, el flujo, la corriente (de ῥέω, manar).=Irritacion secretoria, profusa y atónica de las vías bronquiales.

— **BRONQUIAL**, adj. supl., *Murmullo, soplo, ruido bronchial*.—Gr., de ὁ βρόγγχος, ου, fauces, garganta: pl., τὰ βρόγγχια, el conjunto ó sistema de conductos aéreos tráqueo-bronquiales.=La alteracion del murmullo fisiológico, y su mayor alcance por aumento patológico de densidad de los pulmones.

BRONQUIECTASIA (*Bronchiectasia*).—Gr., de τὰ βρόγγχια, las vías aéreas, y ἐκ-τενύω, di-latar.=La dilatacion preternatural de los bronquios.

Div.: por su forma, en **B. difusa** ó fusiforme, y **B. sinuosa** ó cavernosa; por su causa próx., en **B. activa** ó compensatoria de la obstruccion de un pulmon enfermo por la expedicion del sano, y **B. pasiva** ó prod. direct. por atonía, y aun destruccion, de las paredes bronq. enfermas.

BRONQUIOCRISIS (*Bronchiokrisis*).—Gr., de τὰ βρόγγχια, y ἡ κρίσις, εως, juicio, decision (de κρίνειν, decidir).=Paroxismo de tos, como *ferina*, que suele atacar, á veces con grande alarma del mismo médico, á los enfermos de afeccion consuntiva de pecho, como si fuese *decisiva* de su muerte.

BUBON.—Lat. *Bubo, onis*, del gr. ὁ βουβιόν, ὄνκος, la ingle.=En sentido estricto significa tumor ganglionar en las regiones pudendas.—

Ampliase, sin embargo, el vocablo á la denominacion de todo tumor ganglionar supurado, de cualquiera region anatómica, procedente de causa escrofulosa, sifilítica, pestilencial, ó determinado por simpatía.

Div., por el concepto sintomatológico, en **B. agudo** ó **doloroso**, y **B. crónico** ó **indolente**.

BUFTALMOS (*Buphthalmos*).—Gr., de βοῦς, buey, y ὁ σφραλμός, οὖ, el ojo, la mirada, la vista.—Agrandamiento del bulbo ocular en el *Es-tafiloma esclero-coroideo* (*Hydrophthalmus*), en el cual dicho bulbo sale fuera de la órbita, á guisa de ojo de buey, sin que los párpados alcancen á cerrarlo.

BULIMIA (*Bulimos*).—Gr., ἡ βουλιμία, de λιμίνω, estar hambriento, y ὁ βοῦς, el buey, i. q. *hambre bovina*.—Exaltacion patológica del apetito, con sensacion epigástrica de ardor y desfallecimiento, y tendencia á un continuo comer.

Preséntase á veces como habitual, en medio de una aparente salud, bajo la forma de glotonería.

C

CACOQUIMIA (*Kakochymia*).—Gr., de κακός, malo, pésimo, y χυμός, jugo, humor.—Depravacion, hereditaria ó adquirida, de humores en general.—Trae el vocablo origen de la Escuela humorista y de él deriva la palabra *Caquexia* (V. l. corresp.).

CACOSMIA SUBJETIVA (*Kakosmia subjectiva*).—Gr., de κακός, ἴ, ὄν, malo, depravado, y ἡ ὀσμή, el olfato, el olor (de ὄζω, oler).—Perversion irritativa de la sensibilidad del centro olfatorio ó de sus nervios, revelada al sujeto por la percepcion de repugnantes olores sin realidad de origen objetivo.—Verdadera alucinacion olfativa, muy frecuente en los accesos vesánicos, epilépticos, sifilíticos y, sobre todo, en los histéricos.

CALAMBRE.—Lat. clás., *Spasmus*; bajo lat., *Crampus*.—Es el espasmo tónico persistente y doloroso de uno ó varios músculos.

Los miembros más propensos á calambre son los gastronemios y sóleo, sin duda por el extraordinario exceso de tonicidad que poseen en relacion con sus naturales antagonistas.

CÁLCULO (*Calculus*).—Dim. lat. de *Calx*, del gr. χάλιξ, piedra caliza, cal-piedra (igual origen que «calcular» y «cálculo» (aritmética), por ser costumbre romana valerse de piedrecitas para sacar las cuentas).—En Medicina toda concrecion anormal de base calcárea.

Hállanse los cálculos, ya en las cavidades naturales, ya en el espesor de los tejidos, formando sedimentos, concreciones secretorias, resoluciones calizo-purulentas, degeneraciones histoquímicas, etc., etc.

Variedades clínicas principales: *C. renal*, *C. vesical*, *C. salival*, *C. C. pulmonales*, *C. C. hepáticos*.

CALOR URENS, C. MORDAX.—Dos variantes del calor real febril de la piel, apreciado al tacto.—El *C. urente*, más ó menos húmedo, maduro, impresiona la mano como *ardor*. El *C. mordicante*, siempre extremadamente seco, impresiona la mano del observador robándole humedad de la palma; de donde la impresion *mordiente*, *mordaz*, curtiente, que le caracteriza.—Bien observadas las dos variantes, resulta que el *C. urente* es sólo urente, mientras que el *C. mordicante* es mordicante por lo seco, y urente por lo ardoroso.

CALVICIE.—Lat. *Calvities*.—Caida preternatural del cabello. (V. *Falacrosis*.)

CALLO, CALLOSIDAD (*Callus, Callositas*).—Lat., por conv. en *ca* de la sílaba $\tau\omega$ del gr. $\tau\acute{o}\lambda\omicron\varsigma$ (δ), callosidad, dureza.—Llámase *callo* el tejido óseo de nueva formacion con que se cicatrizan las fracturas.—Divídese en **C. provisional** ó exterior, **C. medular** ó interior y **C. óseo** ó intermedio.

Llámase *Callosidad* la induracion con engrosamiento hypersecretorio de la epidermis y transformacion córnea de sus capas profundas.

CANICIE.—Lat. *Canities* (*Canus*), gris, de *candere*, incinerar, calcinar.—Emblanquecimiento del pelo por resolucion de su pigmento medular.

Puede ser normal, **C. senilis**; ó anormal, **C. præmatura**.—Esta es la que tiene valor sintomatológico.

CAQUEXIA (*Kachexia*).—Gr., de $\kappa\alpha\chi\acute{o}\varsigma$, malo, pésimo, y $\acute{\eta}$ $\epsilon\acute{\iota}\xi\iota\varsigma$, εως, modo de ser, temperamento.—Significa perversion constitucional del organismo, por efecto, bien de insuficiencia alimenticia, bien de influjo consuntivo patológico.

Ejemplos: *C. linfático-esplénica*; *C. sífilítica*; *C. mercurial*; *C. africana*; *C. palúdica*.

Importa distinguir entre la *Caquexia* y el *Marasmo senil*.

CARDIALGIA (*Kardialgia*).—Gr., de $\acute{\eta}$ $\kappa\alpha\rho\delta\acute{\iota}\alpha$, ας, corazon, espíritu, estómago (confusion vulgar que todavía hoy, á despecho del conocimiento anatómico, persiste en algunas lenguas cultas), y $\tau\acute{o}$ $\acute{\alpha}\lambda\gamma\omicron\varsigma$, el dolor.—Neuralgia del estómago=**Hyperæsthesia ventriculi**.—I. q. *Gastralgia*.

CARDIOPALMUS.—Gr., de καρδία, en la acepción de corazón, y ὁ πάλμος, el ímpetu (de πάλω, vibrar, sacudir.—Lat. *Palpitatio cordis*).=Nombre genérico de los espasmos clónicos del corazón.

CARIES.—Lat., *Caries, iei.*=El estado ulceroso de los tejidos óseo y dentario.

Dist. dos formas capitales: *C. seca, sicca*, la que obra por desmoronamiento sin proceso supuratorio, y *C. húmeda, humifica*, la que obra por ulceración supurante.

CARO.—Lat., *Carus, Carosis.*—Del gr., ὁ χάρος, οῦ, el sueño profundo, letárgico.=Último grado del *Coma*, caracterizado por la insensibilidad absoluta á los más fuertes excitantes. (V. *Coma*.)

CARO LUXURIANS.—Carne redundante, excesiva; *lujo* de producción carnosa; carne muerta, carnosidad, fungosidad (del lat., *fungus*, hongo, seta).=Forma hipertrófica de los mamelones ulcerosos cicatriciales, con predominio, bien de formaciones capilares sanguíneas, bien de elementos linfáticos, conteniendo células gigantes.

CASTAÑETEO.—Lat., *Streptus dentium.*—Gr., βρυγμός, οῦ (ὄ), latinizada *Brygmus dentium.*=Rechinamiento de dientes.

CATALEPSIA.—Gr., κατάληψις, de καταλαμβάνειν, sorprender, atacar, invadir.=Forma neurótica, expresada por inmovilidad activa, movilidad pasiva y pérdida de la conciencia, ó, cuando menos, de la facultad de hacer efectivas el paciente sus determinaciones.

CATARRO (*Catarrhus*).—Gr., de καταρρέω, colar, destilar (de κατά, prep. que en comp. indica acción de arriba abajo, y ρέω, fluir).=Así se llamaba antiguamente la exaltación del flujo mucoso de la nariz, por creerse que éste *colaba* de la llamada glándula pituitaria á las fosas nasales por la *criba* del etmoides y por los agujeritos (nutricios) del fondo de la silla turca.

Por extensión se llama *catarro* la irritación secretoria, mucosa ó puriémula, de todo dermis visceral.

CATATONIA.—Gr., no del v. κατατένω, sino el propio adj. κατάτονος, ος, ον, extendido, echado, tendido en el suelo.=Estado de soñolencia de muy larga duración, que deja en suspenso todas las facultades psíquicas y la mayor parte de las funciones físicas.

CAUSALGIA.—Gr., de ἡ καύσις, el ardor (de κάω, ὁ καίω, arder, quemar), y τὸ ἄλγος, el dolor.=Neuralgia caracterizada por sensación ardorosa ó cáustica.

Es sin. del *Dolor urens* de los autores latinos (de *urere, ussi, ustum*, quemar, abrasar; de donde *ustion* como sinón. de quemazon.—

Conviene advertir que el vocablo *Causalgia* sólo se aplica á las neuralgias urentes, mientras que la calificación de *Dolor urente* es aplicable al ardor irritativo ó inflamatorio de cualesquiera órganos.

CAVERNA.—Lat., *Caverna*, de *cavus*, hueco, cavidad, oquedad.—Llámase así toda cavidad anormal producida en el trayecto de los bronquios, bien por destruccion de una parte del parénquima pulmonal, bien por mera dilatacion de la cavidad de los mismos. (V. *Bronquiectasia*.)

Por la percusion y la auscultacion apréciase el estado cavernoso.

CEFALALGIA (*Cephalalgia*).—Gr., de ἡ κεφαλή, ἤς, la cabeza, y τὸ ἄλγος.—Es propiamente la neuralgia pericránea (generalmente hemicránea, de ἡμι-, mitad, ó sea de un solo lado de la cabeza).

Importa no confundirla con la *Otalgia*, ó dolor de oído, con la neuralgia intra-orbitaria, y hasta con ciertas formas de neuralgia muy profunda del tronco nervioso maxilar inferior.

CEFALEA (*Cephalaea*).—Gr., de ἡ κεφαλαία, ας.—Antiguo término adoptado por Galeno para designar el dolor de cabeza profundo, persistente é inveterado.

Hoy se aplica aún, pero con cierta amplitud, á los dolores de cabeza originados de hiperemia, congestion ó fiebre, etc., es decir, no neurálgicos.

CEFALOCELE (*Cephalocele*).—Gr., de ἡ κεφαλή y ἡ κήλη, la relajacion herniaria.—Hernia por salida de una porcion del encéfalo á través de las paredes del cráneo, ya preternaturalmente distendidas, si blandas; ya fracturadas, si duras.

Div. en dos formas: **C. congénito** ó natural, y **C. traumático** ó accidental.

CERÚMEN.—Lat., de *Cera*.—Producto de la mezcla del humor sebáceo ó ceruminoso, exhalado por los folículos del conducto auditivo externo, con el detritus epidérmico y piloso y el polvo de la atmósfera.

Casos hay en que, bien por irrit. secretoria local, bien por incuria, el cerúmen, relleno más ó menos completamente el fondo del conducto auditivo externo, produce disturbios equívocos y hasta alarmanes.

CIANOSIS (*Cyanosis*).—Gr., ἡ κύανωσις, de κύανος-εος, α, ον, azul oscuro.—El aspecto lívido, á veces hasta negro-azul, del cutis de las partes más visibles y vascularizadas del cuerpo, por efecto de hiperemia venosa.

— **CIÁTICO, CA**, adj. (spl. Dolor, afeccion.)—Lat., *sciaticus*, ca.—

Gr., ἡ ἰσχιαλγία, del sust. τὸ ἰσχίον, la cadera, la nalga, y τὸ ἄλγος.—*Mal de Coturni* y **Neuralgia schiatica**.—Neuralgia del tronco, de algunas ramas sensitivas, ó del total plexo ciático.

En antiguos tratados se designa con el nombre de *ciática* la neuralgia del tronco crural, ó de su plexo y ramas profundas; de donde el nombre de *Ischias antica* con que se la designa.

CICATRIZ.—Lat., *Cicatrix*.—El tejido gránulo-conjuntivo aglutinador de partes divididas, ó supletorio de pérdidas de sustancia.

Div. por su conform. en **C. C. naturales** ó **viciosas**, y por su textura en **C. C. verdaderas** ó **definitivas** y **C. C. falsas** ó **propensas** á abrirse por imperfeccion evolutiva.

CICLOPNEA (*Cyclopnea*).—Gr., de ὁ κύκλος, el círculo, el ciclo (período) y πνέω, desinencia de los calificativos de πνέω, respirar, es decir, respiracion sujeta á ciclos ó períodos.—Nombre que propongo para designar el fenómeno descrito por Cheine y Stokes, y que se presenta en diversos enfermos bajo la siguiente forma: Primer t., pausa respiratoria.—Segundo t., una inspiracion profunda, más ó menos rápida.—Tercer t., una série de inspiraciones progresivamente más superficiales.—Cuarto t., otra pausa respiratoria, y así periódica y sucesivamente.

El valor de este síntoma es, como se debe suponer, muy vario, segun se presente en una alteracion grave del encéfalo ó en un paroxismo histérico, etc.

CINGULUM, lat. (cinturon).—Una erupcion especial herpetídea que de ordinario ciñe ó casi ciñe todo el cuerpo, al nivel de la cintura, pudiendo, en casos, presentarse al nivel de las escápulas (i. q. *Zona, Zoster*).

CINOREXIA (*Cynorexia*).—Gr., de ὁ κύων, gen. κυνός, el can, y ἡ ὀρέξις, el deseo, el apetito—i. q. *hambre canina*. Difiere en rigor de **BULIMIA**, ó *hambre bovina*, por cuanto la canina es voraz en un momento dado, hasta determinar hartura, mientras que la bovina es menos violenta, pero incesante.

— **CIRCINATUS**, adj. lat., de *Circinare*, redondear.—Llámase así la erupcion cutánea que se aparece en manchas eflorescentes circulares.

CIRSOCELE.—Gr., de ὁ κίρσος, nudosidad venosa (variz), y ἡ χίλη, la relajacion herniaria.—Tumor formado en lo profundo del escroto por el estado varicoso de las venas espermáticas.—(I. q. *Varicocele*.)

Observacion.—El radical *kéle* (*céle*) acusa en éstos y algunos otros vocablos el falso supuesto de *hernia*, nacido de ignorancia anatómica

de los antiguos.—Mantiene en uso tales vocablos la rutina, más que el respeto á la antigüedad.

CISTINURIA (*Cystinuria*).—Gr., de ἡ κύστις, εως-ιδος, la vejiga (de donde «cistina»), y τὸ οὖρον, la orina.—Presencia de la *cistina* en los orines.

CISTOCELE (*Cystocele*).—Gr., de κύστις y κήλη.—La hernia de una parte de la vejiga urinaria, ya por la uretra en la mujer, ya por alguna abertura preternatural en uno ú otro sexo.

CISTOIDE (*Cystoide*).—Gr., de κύστος, en la acepcion de quiste ó bolsa, y εἶδος, semejanza, parecido.—El quiste multilocular que, ó parece, ó está formado por una agrupacion de diferentes quistes.

Observacion.—El segundo caso llamaríase con más propiedad **polycysto** y, por ende, el primero, **polycystoide**.

CISTOLITHIASIS (*Cystolithiasis*).—Gr., de κύστος, vejiga, y ὁ λίθος, la piedra.—Expresa breve y taxativamente la presencia de cálculos en la vejiga y no en otro de los diversos lugares anatómicos. Pudiera, sin embargo, decirse: **Cystolithiasis hæpática**, ref. á la vejiga de la hiel.

CISTOPLEGIA (*Cystoplegia*).—Gr., de κύστις, y πλήσσω, golpear, paralizar de golpe.—Es la parálisis de la vejiga urinaria.—**Paralysis vesicæ**.

CLAUDICACION ESPONTANEA.—Lat., *Claudicatio spontanea*, de *claudicare*, cojear.—Cojera resultante de la dislocacion *per se* de la cabeza del fémur, con respecto á la cavidad cotiloide.

Por lo general ocurre el fenómeno en la segunda infancia.

CLAVO.—Lat., *Clavus*; esp. ojo de gallo, de pollo, etc.—Induracion circunscrita de la epidermis, con atrofia y hasta perforacion del dermis, y una masa *angiectática* ó fungosa en el fondo.

Aparece, por lo comun, bajo la influencia de presiones habituales sobre un determinado punto de la piel (piés, manos, rodillas).

C. histérico (*C. hystericum*): Dolor pungitivo y hasta lancinante, muy vivo, y reducido á un punto muy circunscrito.—**C. cefalálgico**: Variedad de jaqueca.

CLOASMA (*Chloasma*).—Gr., de χλοάζω, amarillo-verdosear (de χλόη, sembradura tierna).—Manchas cutáneas extensas, de color pajizo, más ó menos oscuro.

Se presenta en diversos casos, ya idiopático, ya sintomático.—I. q. *Manchas del hígado* (no *Efélides*).

— **CLÓNICO, CA**, adj.—Gr., de ὁ κλονος, ου, el tumulto, la agita-

cion.—Espasmo convulsivo en que alternan las contracciones de mm. antagonistas.—Difiere del tónico, por ser carácter de éste la rigidez permanente de un orden de músculos, ó simultánea de dos órdenes opuestos.

Baumer propuso llamar genéricamente *clonismo* el carácter espasmódico de todas las afecciones convulsivas.

Es impropio decir «convulsion tónica». Mal puede *convelerse* quien está *rígido*.

CLOROSIS (*Chlorosis*).—Gr., de *χλωρός*, *ά, όν*, pálido-verdoso.—Forma sintomática casi exclusiva del sexo femenino, y se caracteriza por un matiz pálido citrino de toda la piel, acompañada de lividez de las mucosas de transición (labiales, nasales, palpebrales, vulvares, etc.), que semeja al color de los pétalos de hortensia marchitos.

COCCIGODINEA.—Gr., de *ό κόκκυξ, υγος*, el coccix, y *ή όδώνη, ης*, el dolor.—Dolor en la region coccígea. No es neuralgia del plexo coccígeo, pues, como Gimpson observa, revela de ordinario lesión traumática del coccix.—Se admite además una **C. rheumatica**.

— **CÓLICO**, adj. de colon (gr. *κόλον*)—*κωλική διάθεσις, diathesis cólica*.—De antiguo significa fuerte dolor, determinado por una afección del intestino grueso (Celso, Boerhaave, Pareo, etc.); más tarde significó genéricamente dolor intestinal, y hoy vale por afección dolorosa de cualquiera viscera del abdómen.

Princ. varied: *C. bilioso, C. saburral, C. flatulento, C. intestinal, C. inflamatorio, C. de Madrid, C. hipocondríaco, C. meconial, C. hepático, C. hemorroidal, C. drástico, C. esencial ó espasmódico, C. consensual ó histérico, C. de Devonshire, de Poiteau, C. mesentérico, C. menstrual, C. metálico, C. miserere, C. nefrítico, C. de pintores, C. reumático, C. á frigore, C. seco, C. simpático, C. sintomático, C. estercoráceo, C. uterino, C. verminoso, C. nervioso, C. dinámico, C. fisi-orgánico.*

— **COLICUATIVO, VA**, adj. (spl. *Sudor, Diarrea*).—Lat., *Colliquativus*, de *con* y *liquare*, derretirse, licuarse.—Aplicase al sudor y á la diarrea de carácter seroso que se presenta en los estados de extrema prostracion orgánica.

COLAPSO.—Lat., *Collapsus*, de *con* y *labor, laberis labi, lapsus sum* (v. depon.), caerse de alto, aplomado.—El aplanamiento agudo de la energía vital, á consecuencia de súbitas debilitaciones de la acción cardíaca.

— **COLOIDE**, adj. (spl. *Humor, Sustancia, etc.*).—Gr., de *ή κόλλα*, la cola, gelatina, y *εἶδος*, modo de ser=*gelatiniforme*.—Humor que por su insipitidad, transparencia y composición molecular se parece á la

gelatina, y que, en el orden patológico, constituye, ahora el contenido de algunos tumores, ahora la sustancia como jalea ó melaza en que degeneran los elementos histológicos de un órgano dado.

COMA.—Gr., de τὸ κῶμα, la modorra (de κωμίζω, dormir profundamente).—El primer grado del *sopor* de los antiguos patólogos, y cuya nota consiste en que el enfermo despierta á favor de una excitacion; pero vuelve á sumirse en su profundo sueño tan pronto aquélla cesa. (V. *Caro*.)

Entre sus variedades destácase el **C. vigil**, s. *agripnon*, perturbado por sobreexcitacion general, delirio y la consiguiente *apariencia* de desvelo; de donde el calificativo de *vigil*.

COMEZON.—Lat., *Comedo*, de *cum-* y *edere*, comer.—Picor del cual el individuo no se alivia, y aun á las veces se agrava, rascándose.—Por creer que la causa de esta especie de sensacion era parasitaria, aplicáronle los antiguos tan expresivo nombre=(«sentirse comido»).

CONCRE-MENTO, CION.—Lat., *Concre-mentum*, *-tio*, de *cum-* y *crecere*, crecer por acumulacion algo.—Todo depósito anormal de productos sé ó ex-cretorios. Así se dice **C. calcárea**, **ceruminosa**, **sebácea**, **fibrinosa**, etc.

A menudo úsase como sinón. de *cálculo*.—En todo caso, *concrecion* expresa la accion y efecto; *concremento* sólo el efecto, la masa concrementada.

CONGELACION.—Lat., *Congelatio*, de *cum-* y *gelare*, n. helar-se.—Mortificacion de los tejidos por la persistencia de un intenso frio sobre el estado hiperémico consecutivo al espasmo inicial de la misma frialdad.

Con mucho acierto distinguen Pitha y Billroth tres grados de *Congelacion*: 1.º, **eritematoso**; 2.º, **flictenoso**; 3.º, **escarótico**, análogos á los tres clásicos de la quemadura.

CONGESTION (sc. de sangre).—Lat., *Congestio*, de *cum-* y *gestio* (p. de *gero*, *is*, *ere*, *gessi*, *stum*) || llevar consigo algo á || .—Aflujo de sangre en los vasos de una determinada region.—(Cf. *Nosobiót. analít.*—*Hiperemia*.)

CONMOCION.—Lat., *Commotio*, de *cum-* y *movere*, *movi*, p. *motum*, sacudirse en sí mismo, choque de íntimos movimientos.—Aplicase preferentemente á la trascendencia de accion traumática ó de accion psíquica al encéfalo; pero clinicamente debe asimismo aplicarse á los efectos traumáticos análogos sobre los demás grupos viscerales y sobre la totalidad del cuerpo.

La voz inglesa *Shock* (pr. *Choc*), choque, sacudida, ofensa, espanto, etcétera, con estar hoy tan en moda, no ha traído novedad alguna nominal ni ideológica. Redúcese á un *sajonismo* técnico y nada más; pues lo mismo que *conmocion*, supone *choque*, así por causa física como por causa psíquica. (V. *Shock*.)

CONQUASSATIO.—Lat., sin. de *Commotio*.—Viene de *cum* y *quasso*, *as*, *are*, *avi*, *atum*, sacudir, golpear, estremecer, agitar, conmover, etc., de donde *quassatura*, *æ*, contusion.=Aunque sinónimo de «*conmocion*», era empleado antiguamente este vocablo como genérico de los traumatismos mixtos ó contuso-inciso-magullantes. (V. *Contusion* y sus análogos.)

CONSTIPACION.—Lat., *Constipatio*, *Obstipatio alvi*; de *cum* ú *ob* resp., y *stipare*, estibar, apretar, detener.=Es la retencion de las heces ventrales por falta de secrecion y movimientos intestinales adecuados, y la consiguiente inspitud de la masa estercorácea.

CONSUNCION.—Lat., *Consumptio* ó *Consumtio*, de *cum-* y *sumere*, *sumpsi* (ó *sumsi*), *sumptum* (ó *sumtum*)=tomar para sí; fig. devorarse á sí mismo.=Voz latina, sinónima de la gr. *Phthisis* (tisis), que significa la resolucion progresiva de la grasa y hasta de los órganos, por efecto de una afeccion crónica incompatible con la nutricion general del individuo.

CONTRACTURA.—Lat., de *cum-* y *trahere*=traer hácia sí, consigo, atraer.=Es la rigidez transitoria ó permanente, con ó sin espasmo, de algun músculo ó tendón, ó de alguna region muscular.

Comprende desde la fugaz **C. histórica** hasta la permanente **C. digitorum** ó **crispatura tendinum** de Dupuytren, la **C. fascio-palmaris** de König, etc.

CONTUSION.—Lat., *Contusio*, de *cum-* y *tundere*, *tutudi* (y *tunsi*), *tussum* (y *tunsum*), tundir, dar una *tunda*, moler, machacar á golpes.=El efecto local de un golpe ó presion, bien con simple aflujo de humores, bien con extravasacion sanguínea entre las mallas del tejido lesionado.

CONVULSIBILIDAD.—Lat., *Convulsibilitas*, de *Convulsio*.=La propension congénita ó accidental á sufrir convulsiones.

CONVULSIO.—Lat., de *cum* y *vellere*, *velli* (y *vulsi*), *vulsum*, arrancar, remover, desgarrarse (sin duda aludiendo á las injurias que á las ropas y á las mismas carnes, propias ó ajenas, inferen los atacados de *convulsion*).=Es el acceso de espasmo clónico, general ó parcial extenso,

Si afecta una pequeña region, se suele llamar simplemente *espasmo clónico, temblor, etc.*

COPREMESIS.—Gr., de ἡ κόπρος, el excremento; ἡ ἔμεσις, el vómito.—I. q. *Vómito estercoráceo.*—Evacuacion de las heces ventrales por la boca, á causa de obstruccion, estrangulacion ó espasmo del tubo intestinal.—(Cf. *Hernia estrangulada, Col. Miserere.*)

COPROSTASIS.—Gr., de κόπρος y ἡ στάσις, el estacionamiento.—(V. *Constipacion.*)

CORÉA (*Choréa*).—Gr., de ἡ χορεία, la danza.—I. q. *Baile de San Vito* (S. Wyt), por la fama que á fines del siglo XV gozaba cierta capilla dedicada á este santo, cerca de Ulm (Suabia), á la que acudian las gentes atacadas de coréa.—Consiste en movimientos incesantes, irregulares, involuntarios (y siempre destituidos de toda gracia, por lo inexpressivos y estóolidos) de una ó más partes del cuerpo sujetas á músculos de la vida de relacion.

Suele presentarse en la infancia ó en la mocedad, y con preferencia en el sexo femenino.

Llámanla asimismo *Coremanía* (*Choremania*) ó manía de danzar.—Término impropio. (V. *Bal-lismo.*)

CORECTOPIA.—Gr., de ἡ κόρη, propiamente «la niña» (spl. de los ojos), ἔξ, fuera, y ὁ τόπος, el sitio.—Excentricidad congénita, ó accidental y sintomática, de la pupila, respecto del centro geométrico del iris.

CORIZA (*Coryza*).—Gr., de ἡ κόρυζα, la estupidez, el atontamiento.—Fluxion catarral de la pituitaria, acompañada de verdadero atontamiento, debido sin duda á la propagacion de la hiperemia á las meninges y al cerebro, por motivos de continuidad anatómica.

La *coriza* no siempre indica *romadizo* ó resfriado. Entre otras, bien ajenas al frio, conviene citar la **C. iódica**.

CORONA VENERIS.—Lat., i. q. *Diadema de Venus.*—Erupcion ó exantema sifilitico secundario, que rodea la piel de la frente hasta la línea-límite del cuero cabelludo.

N. B.—No es raro ver erupciones frontales en personas bien exentas de sífilis; por tanto, no toda corona eruptiva es *Corona Veneris*.

CORROSION.—Lat. *Corrosio*, de *cum-*, y *rodere, rosi, rosam*, roer, roerse á sí mismo.—Destruccion parcial de tegumentos, huesos, tejido conjuntivo, parénquima, etc., por un trabajo de regresion ó de gangrena miliar supuratoria.

Por abuso se dice de la accion de los cáusticos. En rigor, los cáusticos *roen*, son roedores, *rosivos*; no *con-* ó *cor-rosivos*.

COSTRA.—Lat., *Custra*.=Esta voz conviene á la designacion de tres diversos productos orgánicos: 1.º La concrecion anormal de exudado de una úlcera, dividida á su vez en **C. verdadera** y **C. falsa**.—2.º El eczema agudo que se presenta en las mejillas del niño de teta, con costras amarillas grisáceas parecidas á las de la crema, **C. láctea**, s. **Melitagra flavescens**.—3.º La capa dura y gris que ofrece la fibrina en la superficie del cuajaron de las sangrías, y que en otro tiempo se creyó característica de las flegmasías del pecho, **C. flogistica**, **Crassamentum sanguinis**, **Corium pleuriticum**.

COXÁLGIA (*v. híbrida*), del lat., *coxa*, *æ*, la nalga, la cadera, y del gr. *κόξυλος*, el dolor.=Neuralgia de las ramas glúteas del plexo ciático.

Se usa, aunque impropriamente, como sinónimo de *coritis*, y más aún, y con menor razon, de *coxartroace*. (Puro gr. sería **Coccygálgia**, de *κόκκυξ*, *υγος*.)

CREPITACION.—Lat., *Crepitatio*, de *crepitare*, prop., repicar las castañuelas, ó imitarlas con los dedos pulgar y medio, de donde «*crepitare digitis*» para llamar á los esclavos, como nosotros hoy á los perros.= Con tal nombre se expresa: 1.º El ruido como de chisporroteo que se produce en los pulmones, al principio y al final de una infiltracion, durante la inspiracion (**C. indux**) y la espiracion (**C. redux**).—2.º El ruido, idéntico al precedente, que da en cualquier órgano la infiltracion de aire en su parénquima (**Emphysema**).—3.º El ruido de brusco roce que determinan, al removerse para el reconocimiento, los trozos de hueso fracturado (**Crepitus**), más perceptible al tacto que al oído.

CRIPTORQUIDIA (*Cryptorchidia*).—Gr., de *κρυπτός*, oculto, y *ὄρχις*, *εως*, el testículo.=Falta de presencia de uno ó de ambos testículos en la bolsa escrotal, por detencion en el abdómen ó en el vestíbulo interno del conducto inguinal.

Puede darse la **C. transitoria**, sobre todo en las primeras edades.

CRISIS.—Gr., *ἡ κρίσις*, *εως*, juicio, decision (de *κρίνειν*, juzgar).=Nombre dado por la escuela hipocrática á aquel cambio decisivo que en las enfermedades agudas, en los paroxismos agudos de las crónicas, y aun en el curso de éstas, determina por epifenómenos importantes el término definitivo, bueno ó malo, del proceso morboso.

CRISPADURA (*de tendones*).—Lat., *Crispatura tendinum*, de *crispus*, crespo, erizado.=Rigidez de tendones de las manos ó los pies, bien por *contractura* propia, bien por pérdida de sustancia, bien por destruccion

de sus vainas de deslizamiento, bien, en fin, por cicatrices ó embridamientos de sus respectivos músculos.

CROMATOSIS (*Chromatosis*).—Gr., τὸ χρωμα, el color.=Infiltracion de pigmento, formado por corpúsculos de hæmatoidina y melanina en las células y tejidos, especialmente de la piel.

CROMIDROSIS (*Chromidrosis*).—Gr., de χρωμα y ὁ ἰδρώς, el sudor.=Produccion de sudor coloreado.

En algunos casos débese la coloracion á la presencia de un hongo microscópico.

CROMATOPSIA, CRUPSIA (*Chromatopsia, Chrupsia*).—Gr., de χρωμα y ἡ ὄψις, εὖς, la vista, la apariencia.=Fenómeno subjetivo de excitacion, consistente en ráfagas, aros, aureolas y otras apariencias de luz, ya blanca, ya coloreada.

D

DALTONISMO.—Vocablo técnico, derivado del nombre del insigne físico inglés Dalton, para significar el defecto visual que, por padecerlo él, pudo estudiar y describir, y consiste en la incapacidad retiniana para recibir la impresion de los colores.

Empléase como sinónimo, unas veces de *Aneritropsia*, otras de *Acromatopsia*. (V. l. resp.)

DECÚBITO.—Lat., *Decubitus*, de *cubare*, yacer.—Gr., κατακλίσις (ή), accion de echarse, de tenderse.=Actitud y manera espontánea de estar acostado el enfermo.

Div.: **D. supinus**, ó dorsal; **D. pronus**, ó ventral; **D. lateralis**, ó de costado; **D. transversus**, s. **diagonalis** (sosegado, ó inquieto).—*D. forzado* llámase aquel que por indicacion terapéutica el enfermo mantiene mediante algun mecanismo. (Fracturas, Metrorragias, Escaras por decúbito, etc., etc.)

DEFATIGATIO.—Lat., de *ad fatim agere* (*fatim*, adv., excesivamente).=Agotamiento de las energías muscular y nerviosa, por excesivo dispendio de ellas en algun paroxismo anterior.—I. q. *Fatiga patológica, Exhaustion*. (V. *Colapso*.)

DEFERVESCENCIA.—Lat., de *de-fervescere*, y tambien *de-fervere*, des-hervir, cesar el hervor.=Remision de la fiebre, especialmente en las agudas.

DEFLUVIUM CAPILLORUM.—Lat., de *de-fluere*, desvanecer, correr,

caer, acabarse algo.=La rápida caída del cabello á consecuencia de afecciones agudas del cuero cabelludo (espec. erisipela) ó de otras graves generales, agudas ó crónicas. (V. *Alopecia*.)

DEFURFURACION.—Lat., *Defurfuratio*, de *de*, sep., y *furfur* (griego *πίτρορον*), salvado.=Descamacion de la epidermis en forma de menudísimas laminillas.

DEGENERACION.—Lat., *Degeneratio*, de *genus* (gr., *γένος*) y *de*, sep.=Desnaturalizacion de los elementos histológicos de los tejidos, de los órganos ó del total individuo.

DELIRIO.—Probablemente del gr. *ó λήρος*, el desatinado hablar, y del lat. *de-*, redupl.=Aberracion de las ideas, manifestada por la insensatez en las palabras y los gestos.

Var. form.: **D. agudo**, **D. crónico**.—Var. intens.: **D. furioso**, **D. tranquilo**, **Subdelirio**, **D. murmurante** (**D. musitans**), **D. tremens** ó tembloroso.

DEMENCIA.—Lat., *mens*, *mentis*, la inteligencia, y *de*, priv.=Disminucion, perversion ó pérdida de las facultades intelectuales, siendo los respectivos sinónimos los vocablos **Imbecilidad** (dism.), **Mentecatez** (perv.) y **Estupidez** (pérd.).

DEMONOMANÍA (*Dæmonomania*).—Gr., de *ó δαίμων*, *ονος*, inteligencia divina, Dios inferior, demonio, genio (del bien ó del mal), destino, providencia.=Variedad de alienacion, caracterizada por la preocupacion constante y el consiguiente terror de estar poseido del demonio.

DEPRESION.—Lat., *Depressio*, de *premere*, *pressi*, *pressum*, uno de los verbos de más acepciones, entre ellas, para nuestro caso, *abatir* y el redupl. *de*.=Abatimiento extremo por exhaustion de energías.

Si el abatimiento es por mera suspension de funciones, y no por exhaustion de potencia, se llama **Opresion**.

DESCAMACION.—Lat., *Desquamatio*, de *squama*, *æ*, escama, y *de*, privat.=Proceso anormal de renovacion de la epidermis.

Div.: **D. furfurácea** (*Defurfuratio*), en forma de películas de salvado; **D. lamelosa** (*membranacea*), en forma de telas extensas; **D. silicuosa** (del lat. *siliqua*, el hollejo ó vaina de las legumbres), formada de bolsas flictenosas vacías por derramamiento ó por reabsorcion del exudado.

DETRITUS.—Lat., de *deterere*, *trivi*, *tritum*, moler, majar, triturar, etc.=Las menudas partes orgánicas que resultan de la destruccion morbosa de los tejidos.

Var.: **D. gangrenosa**, **D. degenerativa**.

DEYECCION.—Lat., *Dejectio*, de *Dejicere*, *jeci*, *jectum* (comp. de *jacio*, *is*, *ere*, *jeci*, *jactum*), arrojar, echar lejos de sí, tirar, etc., etc. (v. dist. de *jaceo*, *es*, *ère*, *jacui* (*jacitum* inus.), yacer, tenderse, etc.).=Evacuaciones de vientre.

Llámanse más concretamente *D. alvinas* (del lat. *alvus*, *i*, vientre, intestinos, etc.).

DIABETES.—Gr., de *δια-βαίω*, trans-pirar, sudar, filtrar.=Significa, en rigor de sentido tradicional, la simple eliminacion renal de las bebidas, tales y como el enfermo las va tomando, sin modificacion alguna de carácter secretorio.—(Concepto galénico).=Hoy diremos buena-mente que *Diabetes* es la alteracion urinaria, revolada, bien por exceso de cantidad total, bien por exceso absoluto ó relativo de alguno de los componentes naturales, bien por la presencia de elementos extraños procedentes de una desasimilacion irregular.

Entre las variedades de **D.**, hoy conocidas, merecen especial consigna-cion la **D. mellitus**, ó *Glucosuria*, caracterizada por la presencia de glu-cosa, ó azúcar incristalizable, llamado vulgarmente *de uva*; presencia debida á una perturbacion ó inervatoria, ó abdominal, ó muscular; ori-ginando resp. la **D. m. neurogenes**, la **D. m. gastro, entero** ó **hepatogenes**, la **D. m. incites** (del gr. *ή, ἴς, ἰσός*, la fuerza muscular), porque los orí-nes presentan la *inosina* ó azúcar amorfo peculiar del tejido contractil.

DIABROSIS.—Gr., de *ή διάβρωσις*, de *δια-βιβρώσκω*, cor-roer (falso tér-mino).=Llámanse así tan pronto la accion erosiva espontánea, ó la pro-vocada por sustancias semicáusticas, como la de desgaste puramente mecánico, causado por una compresion constante y progresiva, por ejemplo, la que sobre un hueso ejerce el latir de un aneurisma vecino. Lo único que hay de comun en todos estos hechos es la desaparicion de la sustancia de un órgano, por reabsorcion ó por destruccion, bien traumática, bien diafórica.

No comprende, pues, las tres formas la idea de *corroer*.

DIAPHORESIS (*Diaphoresis*).—Gr., *ή διαφώρησις*, de *δια-φορέω*, trans-portal, se-parar, exhalar, trasudar.=Aplicase á la transpiracion cutá-nea sensible, ó sudor, en cuanto se realiza bajo una forma sintomática, crítica ó terapéutica.

DIAPEDÉSIS (sc. *Sanguinis*).—Gr., de *διά*, á través, y *πηδήσις, εως* (*ή*), el brinco (de *πηδάω*, saltar).=De antiguo esta palabra ha tenido una acepcion más amplia que la de «hemorragia capilar espontánea», á que hoy suele ceñirse. La hemorragia puede darse por diapedésis, mas la diapedésis es más que esto. Así, pues, tanto la concepcion antigua, como los estudios modernos, obligan á definirla en estos términos:

Exudacion espontánea de la sangre ó de cualquiera de sus elementos constitutivos, á través de los estomas vasculares, por motivos anormales.

Bajo esta acepcion ha sido empleado el vocablo en el texto de la presente obra.

DIARREA (*Diarrhoea*).—Gr., ἡ διαρροία, ας, y διαρροή, ης, corriente, aflujo, flujo de vientre (de δια y ῥέω, fluir, manar, etc.).=Frecuente de posicion de cámaras flúidas, promovidas por una irritacion peri-stáltica y secretoria del colon, que impide á la masa de residuos adquirir la inspisitud debida.

Formas princ.: **D. nervosa** (*irritativa*); **D. ablactorum** (*del destete*); **D. chylosa**, s. **Fluxus cæliacus** (*foliculosa*); **D. dentitientium**; **D. lienterica** (*Lienteria*=restos inalt. de mater. alim.); **D. nocturna**; **D. coliquativa**.

DICROTISMO.—Gr., de δις, dos veces (*bis lat.*), y κροτέω, golpear (de donde krótalos, castañuelas).=Llámase así el doble golpe diastólico-arterial.

Conviene advertir que el pulso normal ofrece, por necesidad mecánica, un principio de *dicrotismo*; de suerte que éste, en el orden sintomatológico, no arguye una novedad, sino la exageracion ó aberracion de un carácter fisiológico.

DIFTERA (*Diphthera*).—Gr., ἡ διφθέρα, la membrana, la piel, etc.=Bretonneau (1826) propuso llamar *diphtherite (itis)* la irritacion infectiva específica de las mucosas, llamada más tarde *Difteria*. =La nueva palabra que propongo es precisamente la radical, para expresar el exudado fibroso-infectivo, donde se contiene el *contagium vivum* de la *Difteria*.

Actualmente se suele dar el calificativo de *crupal* á la *diftéra pseudo-membranosa*, para distinguirla de la intersticial. Más llana resultaría la division de la *Diftéra* en intersticial y membranosa.

DIGITUS HIPPOCRATICUS.—Una alteracion de los dedos, caracterizada por el engrosamiento de sus pulpejos, con encorvamiento de las uñas.

Semejan baquetas de timbal los dedos afectos de dicha alteracion, la cual suele presentarse durante el curso de aquellas enfermedades, como v. gr., la tísisis pulmonar y la insuficiencia de las válvulas cardíacas, que á la larga determinan ecstasis humorales en los puntos extremos, por dificultad circulatoria regresiva.

DIPLEGIA.—Gr., de δις, doble, y ἡ πληγή, el golpe (de πλήσσω, golpear, herir, material ó moralmente).—I. q. *Paraplégia*.

DIPLOPIA.—Gr., de διπλοῦς, duplicado, y ἡ ὄψις, la vista. =La percepcion duplicada de los objetos.

Var.: **D. binocularis**, **D. monocularis**.

DIPSOMANÍA.—Gr., de ἡ δίψα, la sed, y ἡ μανία, la pasion ó la locura por algo. =Sed morbosa insaciable, llevada hasta el delirio.—Todo lo opuesto á la *Hidrofobia*.

DIPTONGIA (*Diphthongia*).—Gr., de δῖς, doble, y ὁ εῶγγος, el tono, el sonido.—Doble golpe de voz, producido cuando por la presencia de algun engrosamiento en una de las cuerdas vocales ó por otro obstáculo análogo, queda dividida en el acto de la fonacion la glotis única ó natural en dos pequeñas glotis accidentales.

DISCRASIA (*Dyskrassia*).—Gr., de δύς, prefijo expres. de dificultad, irregularidad ó pena, y ἡ κρᾶσις, la mezcla ó comp. de algo. =En sentido estricto vale por Constitucion elemental morbosa de la sangre y los humores. =En sent. amplio sign. toda afeccion crónica local ó general que es, ó se supone, determinada por un vicio constitucional del individuo.

DISCROMATOPSIA (*Dyschromatopsia*).—Gr., de δύς y τὸ χρῶμα, ατος, el color, y ὄψις, la accion de ver. =Dificultad de distinguir los colores, y consiguiente confusion y trueque en juzgar de ellos. (V. *Acromatopsia* y *Daltonismo*.)

Algunos dicen **Chromatodysopsia**.

DISESTESÍA (*Dysæsthesia*).—Gr., de δύς y ἡ αἰσθήσις, la sensacion. = Propúsole Charcot para significar aquel estado de la sensibilidad en que cualquier excitacion de la piel produce una sensacion dolorosa que trasciende á toda la region.

DISFAGIA (*Dysphagia*).—Gr. de δύς y φαγεῖν, comer. =Dificultad ó absoluta imposibilidad de tragar, sea debida á causa mecánica, séalo á perturbacion inervatoria.

¿Por qué no decir *Afagia* cuando se trata de *imposibilidad*? Son muchas las perturbaciones á cuya denominacion se aplica esta mal entendida economía, ó mejor dicho, cicatería de vocablos.

DISFASIA (*Dysphasia*).—Gr., de δύς y ἡ φάσις, el habla. =Dificultad en la expresion oral por falta, no de integridad cogitativa, sino de expedicion motora para relacionar los signos glóticos y su orden sintáxico con las ideas que deben expresar.

DISFORIA (*Dysphoria*).—Gr., de δύς y φορέω, llevar=llevarse, sentirse mal. =La general y vaga sensacion de malestar que, sin acusar

enfermedad determinada, arguye que en alguna parte del cuerpo se fragua una lesion.

Cuando se acentúa, suele revestir el carácter de melancolía, hipochondría, misantropía, thanatofobia ó temerosa preocupacion de la muerte (no *necrofobia*, que es miedo á los muertos), y finalmente, nosomanía ó aprension y preocupacion de padecer muy graves enfermedades.—Lo contrario de *Euforia*.

DISFRASIA (*Dysphrasia*).—Gr., de δύς y ἡ φράσις, la frase, el conjunto lógico de las palabras.—Irregularidad del habla por perturbacion de la inteligencia.

DISFRENIA (*Dysphrenia*).—Gr., de δύς y ἡ φρήν, el espíritu.—Término propuesto por Kahlbaum para designar las perturbaciones de la razon por efecto simpático, ya concomitante, ya correlativo (*vicarial* de los alemes.), ya postsecutivo de alguna otra enfermedad.

Schüle la denomina **D. neurálgica**.

DISLALIA (*Dyslalia*).—Gr., de δύς y ἡ λάλη, el habla.—Forma de tartamudez, debida, bien á vicio de inervacion, bien á dificultad ó defecto en los órganos periféricos fono-glóticos.

DISLOGIA (*Dyslogia*).—Gr., de δύς y ὁ λόγος, la razon, el juicio.—Perturbacion de las facultades cogitativas, expresada por fenómenos muy parecidos á los disfrásicos. (V. *Disfrasia*.)

En la práctica no es muy grave el riesgo de confusion: camino va de *dislógico* el pobre que ya es *disfrásico*.

DISMENORREA (*Dysmenorrhæa*).—Gr., de δύς, οἱ μῆνες, los meses, lo mensual, y ῥέω, fluir, manar.—El ménstruo difícil y penoso.

DISPEPSIA (*Dyspepsia*).—Gr., de δύς y πέπτω ὁ πέσσο ὁ πέπτω, cocer, digerir.—Nombre genérico aplicado á las dificultades y los disturbios del mecanismo digestivo, séase la que se fuere su patogénesis.

Formas princ.: **D. flatulenta**, **D. ácida**, **D. aguda**, **D. crónica**.

DISPNEA (*Dyspnea*).—Gr., ἡ δύσπνοια (de δύς y πνέω, respirar).—Dificultad de respirar, expresada por un extraordinario esfuerzo concurrente de los músculos respiratorios secundarios á la accion de los principales.

Div.: **D. inspiratoria**, **D. espiratoria**.—Diferenciadas por la penuria de los músc. secund. respectivos.

DISTERIA AGITANTE (*Dysteria agitans*) (en desuso).—I. q. *Tremor*.

DISTERMASIA (*Dysthersasia*).—Gr., de δύς y ἡ θερμασία, ας, accion y efecto de calentar.—Dificultad, impotencia orgánica de producir la cuantía de calor necesaria para mantener la temperatura especifica normal, á despecho de las pérdidas por difusion y transformacion me-

cánica.—Propuesto por el malogrado Gubler, quien, atildado en todo, escogió el vocablo *Thermasia*, ya formado en la lengua griega, para expresar exactamente la idea.

DISTIMIA (*Dysthymia*).—Gr., de δύς y ó θυμός, el ánimo, el valor, la voluntad, el alma, la cólera, el corazón, etc. (cuanto es señal y muestra de energía).=Estado general y permanente de abatimiento físico y moral, con indiferencia absoluta á todo motivo expansivo. Arguye exahustion dinámica del cerebro, y suele terminar por locura ó por tránsito directo á imbecilidad.

Distínguese de la melancolía por no ofrecer accesos, y del abatimiento consecutivo á graves dolencias, por ser éste de carácter transitorio.

DISTIQUIASIS (*Distichiasis*).—Gr., δις y ó στίχος, la série, fila, línea (spl. de *pestañas*).=Anómala producción de doble fila de pestañas, de las cuales la supernumeraria nace del contorno más interior de los párpados, irritando el globo ocular. (V. *Triquiasis*.)

DISTOCIA (*Dystokia*).—Gr., de δύς y ó τοκετός, οὔ, parto (τίκτω y τοκίω, parir).—Término genérico expresivo de las dificultades é irregularidades que pueden ocurrir en el alumbramiento.

DISTOPIA (*Dystopia*).—Gr., de δύς y ó τόπος, el lugar ó sitio.=Anómala situación permanente, congénita ó adquirida, de un órgano ó grupo de órganos.—I. q. *Heterotopia*.

DISURIA (*Dysuria*).—Gr. ἡ δυσουρία, de δύς, y οὐρέω, orinar.=La micción difícil y dolorosa.

DIURESIS.—Gr., de δις, prefijo redupl., y οὐρέω, orinar; i. q., excitar á orinar mucho, de donde el verbo διουρέομαι, «influir en la secreción urinaria». =Este era el sentido hipocrático del vocablo, es decir, un sentido esencialmente terapéutico.=Hoy el mismo se emplea para expresar la función renal en sí misma, ora en su expresión sintomática, ora en sus modificaciones por acción medicinal.

DIVARICATIO MAXILLÆ INF.—Lat., del pref. *de*, redupl., y *varicare, avi, atum*, extender y abrir las piernas (y también v. dep. *varicari, atusum*).=Luxación de la quijada.—Aunque es rara, no lo es en determinados individuos predispuestos á ello, bien por constitución anat. de la región, bien por causa neurótica.

Div.: **D. tetanoide** ó **epiléptica**; **D. traumática** (espontánea ó provocada).

DOLOR.—Lat. *Dolor*.—Gr., τὸ ἄλγος.=Es la expresión íntima y genérica de toda sensación y todo sentimiento que perturba aquel bienes-

tar y sosiego del ánimo, que caracteriza la salud física y moral, y lleva por nombre *Euforia*. (Cf. texto. *Energología*.)

(A los principiantes importa distinguir las dos raíces técnicas *algor*, *oris*, lat., «frialdad», y ἄλγος, εος-ους, gr., «dolor». = Hé aquí por lo pronto la mejor regla: vocablo que termina en *algia*, ó en *algico*, *ica*, se refiere á ἄλγος; frase en que figura *algido*, *ida*, *idez*, se refiere á *algor*.)

E

ECLAMPSIA (*Eclampsia*).—Gr., de εκ-λάμπειν, estallar.—Forma de convulsion, clónica ó tónica, parcial ó general, susceptible de reiterados accesos en un mismo dia, y sintomática ó prodrómica de otra enfermedad.

Variantes clínicas más frecuentes: **E. infantium**, **E. puerperalis**, **E. uræmica**.

ECOLALIA (*Echolalia*).—Gr., ἡ ἠχώ, el eco, la resonancia, y ἡ λάλη, la palabra.—Es una forma de *Afasia*, por la que el enfermo, aunque no acierta á producir espontáneamente las palabras, repite, sin embargo, las que oye pronunciar.

ECSTASIS.—Gr., de ἔκ-στάσις, liter. sign. fuera de lugar, dislocacion.—Aplicase en Medicina á la abstraccion patológica del espíritu, por la vivísima atencion puesta en una vision de la propia fantasía ó en un tema de la propia conciencia.

ECSTROFIA (*Ekstrophia*).—Gr., de ἐκ y στρέφειν, sinónimo de τρέπειν.=I. q. *Ectropia*.

ECTASIA (*Ektasia*).—Gr., ἔκτασις, dilatacion (de ἐκ-τανύω, extender).—Término introducido por Gräfe para indicar las enfermedades caracterizadas por dilatacion preternatural de las cavidades orgánicas. Así se dice: *Bronchiectasia*, *Angiectasia*, etc.

ECTIMA (*Ekthyma*).—Gr., ἔκθυμα, ατος (τό), boton ó roncha de calor (εκθυμάινω, irritarse), de ἐκ y θυμάινω [de θυμός, ὅ (ó)], echar fuera el ardimiento, la cólera, etc. (no de ἐκθύω, ni menos deθύω, sacrificar, perfumar, degollar).—Nombre de vaga significacion en lo antiguo, pero que desde Willan se aplica precisamente á una erupcion caracterizada por pústulas diseminadas y bastante grandes, redondas, regulares y achatadas, capaces de desecacion y descamacion en costras amarillas ó negruzcas. Mance, piés, nalgas y regiones articulares son los sitios de más frecuente aparicion.

Variedades: **Ect. agudo, crónico, caquético, infantil, gangrenoso, perforante, sifilítico, estibiado, etc.**

ECTOPIA (*Ektopia*).—Gr., de ἔκ, fuera, y ὁ τόπος, ου, el lugar. = Sinónimo de dislocacion, aplicado especialmente á las de los órganos viscerales.

ECTROPIA (*Ektropia*).—Gr., de ἐκτρέπειν, revolver, volver del revés algo. = Así se llama la revuelta hácia fuera, ya de los párpados, ya de la vejiga urinaria, ya del orificio uterino, etc. Puede la Ectropia ser congénita ó adquirida.

ECTROPIUM, PIO.—I. q. ECTROPIA.

ECZEMA (*Ekzema*).—Gr., τὸ ἔκζεμα, de ἐκ-ζέω, re-cocer, producir hervor (*fervere*). = Erupcion cutánea, generalmente crónica, formada de pápulas ó vesículas, con puntos rubicundos húmedos, ó cubiertos de tenuísima escamilla, con formacion consecutiva de costras amarillas, cobrizas ó negruzcas.

E. acutum, chronicum; E. rubrum, papulosum, squamosum, vesiculosum, impetiginosum, marginatum (Hebra) (*Erythrasma* de Bärensprung, etc.).—**E. faciei, capillitii** (de la cabellera), **mucosæ narium, etc.**—**E. infantium** (costra láctea).

EDEMA (*Edema*).—Gr., τὸ οἰδημα, ατος (de οἰδάω-έω-αίνω, hincharse). = Infiltracion serosa del tejido conjuntivo de una parte del cuerpo, produciendo una hinchazon incolora, indolente y que se deja oprimir, conservando largo rato la huella de la presion recibida.

EDEMACIA.—I. q. EDEMA.

EDEODINIA (*Edæodynea*).—Gr., de αἰδοῖσθαι, las partes pudendas (de αἰδέομαι, avergonzarse) y ὀδύνη, dolor. = Estado doloroso de los genitales.

EFELIS, pl. **IDES** (*Ephelis*).—Gr., de ἐφ por ἐπί (raz. eufón.), sobre, á causa de, y ὁ ἥλιος, ου, el sol, el calor del dia. = Manchas cutáneas, rojizas ó de color de hoja seca, atribuidas antiguamente á la accion solar.

Hoy queda el nombre, á pesar de haber caducado el concepto.

Ef. hepáticas, igneales, lenticulares, escorbúticas, etc.—I. q. *Lentigo*.

— **EFÉMERO**, A (*ephemerus, a*).—Gr., de ἐφ por ἐπί (raz. eufón.), y ἡμέρα, dia. = Dicese del fenómeno patológico que dura, *circum circa*, un solo dia. (Ej.: *Fiebre efémera*.)

EFIDROSIS (*Ephidrosis*).—Gr., ἡ ἐφ-ιδρωσις, sobre-sudor (ἐφ por ἐπί). = Vocablo usado por Hipócrates para expresar en general el sudor muy copioso y vivo.

EFLORESCENCIA (*Efflorescentia*).—Lat., de *ex* y *florescere*.=Calificación que se da á toda erupcion cutánea de poco relieve.

En rigor de lenguaje clínico, las voces *Eflorescencia* y *Exantema* no son sinónimas. La primera es la manifestacion elemental (mácula, pápula, pústula, etc.) de una erupcion dada; mientras que la segunda expresa el conjunto de los elementos eruptivos (*erupcion*).

EGOFONIA (*Ægophonia*).—Gr., de ἡ ἀγῆ, ἀγός, la cabra, y ἡ φωνή, la voz.=Nombre dado por Laennec á la resonancia trémula que de la voz del enfermo llega por el tubo estetoscópico al oido del observador, en los casos de derrame pleural. (Variedad de la *Broncofonía*.)

EMACIATIO.—Lat., de *Macies*, *ei*, enflaquecimiento extremo.=Estado de consuncion debido, bien á inercia nutritiva, bien á excesiva actividad en la reabsorcion, y se muestra principalmente en la desaparicion de la grasa normal y de la fibra muscular.

EMBOLUS=EMBOLIA.—Gr., de ἐμ-βάλλω, lanzarse, invadir.=*Émbolo* se llama todo cuerpo que, desprendido *de* ó introducido *por* un punto del organismo, y arrastrado por la corriente circulatoria, se atranca en un determinado túbulo arterial.=*Embolia* se denomina la lesion y el proceso resultantes.

Var. princ. de *Embolus*: **E. sanguíneo**, **E. grasiento**, **E. neumático** ó de aire y **E. pigmentario**.

EMETROPIA (*Emmetropia*).—Gr., ἐν, τὸ μέτρον, la medida, y ἡ ὄψ, el ojo.=Vocablo bastante mal pergeñado, que expresa la normalidad ó justa medida del diámetro antero-posterior del globo ocular para los efectos de la vision. Paréceme que sería más correcto decir *Eumetropia*.

EMPIEMA (*Empyema*).—Gr., ἔμπιος (ἐμ por ἐν), tumor interno (ἐν), que tiene πύον, ον, ὁ πύος, ον (ὁ), el pus.=Aplicase por antonomasia á los abscesos consecutivos á pleuresías ó pleuro-pneumonías supurativas.

EMPROSTÓTONUS (*Emprostótonos*).—Gr., de ἐμ-προσθεν, hácia adelante; de πρὸς, hácia, y ὁ τόνος, la tension.=Tétano, ó espasmo general de contraccion continúa, de los músculos anteriores del tronco.

ENANTEMA (*Enanthema*).—Interior ó mucosa erupcion; v. gr., la erupcion intestinal tifódica. (No muy correcto: más propio sería *Enanthema*). (V. *Exantema*.)

ENCEFALOCELE (*Enkephalokele*, ὁ con *e* por *k*).—Gr., de ὁ ἐγ-κέφαλος, el contenido de la cabeza (cráneo), y ἡ κήλη, hernia ó quebradura.=La salida de algo de la masa encefálica más allá del límite normal de las paredes craneales, bien por herida de éstas, bien por complicacion con-

génita de su falta de osificación y la influencia distensora de la hidropesía cefálica. (*Hidrocefalo, Hidromeningocele, Hydroencephaloccele, etc.*)

ENFISEMA (*Emphysema*).—Gr., de ἐν y φυσάω, soplar, insuflar.=La infiltración de aire ó de gases en el tejido intersticial de un órgano ó region.

Por antonomasia se sobreentiende «pulmonal». Este puede ser **E. interlobular** ó **E. alveolar**. (Ectasia de las vesículas.—V. *Ectasia*.) Distínguese el alveolar en **E. sustancial** y **E. supletorio** (vicarial, *vicarirendes* de los alemanes).—Admítase también el **E. senile** (atrófico).

El **E. subcutaneum** nace, bien de comunicaciones anormales del tej. cel. subc. con los pulmones ó con los intestinos, bien de formación local de gases por gangrena de la parte.

ENOFTALMO (*Enophthalmos*).—Gr., de ἐν, adentro, y ὁ ὀφθαλμός, el ojo.=Subintración ó retroceso de los globos oculares por espasmo de sus músculos.—(*Jaqueca espasmódica*.)

ENTERÁLGIA.—Gr., de τὸ ἔντερον, el intestino, y τὸ ἄλγος, el dolor.=Dolor intestinal. Aplicase preferentemente al dolor cólico, ó de los intestinos gruesos. (V. *Enterodínea*.)

ENTERITIS.—Gr. ἔντερον, y la terminación convencional *itis*.=Inflamación ó irritación intestinal.

ENTEROCELE=ἔντερο-κίλη.=Hernia ó salida del intestino á través de una abertura natural ó preternatural de las paredes abdominales.

ENTERODINEA, no **ENTERODINIA** (*Enterodynea*).—Gr. ἡ ὀδύνη, el dolor.=Palabra preferentemente aplicable á los estados dolorosos de los intestinos delgados. (V. *Enteralgia*.)

ENTEROPNEUMATOSIS.—Gr., de ἔντερον y τὸ πνεῦμα, ατος, soplo, vapor, aire, gas.=Considerable desarrollo y acumulación de gases en el tubo intestinal.

— **ENTÓTICO, CA**, adj.—Gr., de τὸ οὖς, gen. ὠτός, el oído, y ἔντο, dentro, interior.=Aplicase á los susurros, silbidos y demás fenómenos acústicos subjetivos, del orden patológico.

ENTROPIA.—Gr., de ἐν y ὁ τρόπος, ου, -ή, ἴς, vuelta, cambio, revolución (de τρέπω, girar, revolver).—Lo contrario de *Ectropia*.=Volverse, ó revolverse, ó dislocarse un órgano hácia adentro.

ENTROPIUM se llama la revuelta de los bordes palpebrales y la consiguiente de sus pestañas hácia dentro.

Puede ser espasmódica, tarsal, bulbar (por atrofia del globo ó bulbo del ojo), y por retracción cicatricial.

EPIFORA (*Epiphora*).—Gr., de ἐπί-φόρειν, sobre-aportar, rebosar.—Lagrimo continuo por rebosamiento debido á obstruccion de los puntos ó de los conductos lagrimales.

— **EPILEPTICO, EPILEPTIFORME**, adj.—Del gr. ἐπι-λαμβάνω, sobre-coger, sorprender, caer encima, no en el sentido material de caerse el enfermo al suelo, sino en el de re-percutir, caer algo de improviso encima de alguien.—Suerte de accesos convulsivos que sobrevienen súbitamente, y con pérdida del conocimiento, y á intervalos de dias, semanas ó meses, en sujetos libres, al parecer, de enfermedad.—Los dos adjetivos establecen una distincion semeiótica ó diagnóstica, segun se trata de la verdadera ó falsa *Epilepsia*.

EPIPLOCELE.—Gr., de ἐπί-πλοον, epi-ploon, y κήλη, hernia.—Hernia del epiplon.

EPISPADIA.—Gr., de ἐπί, arriba, y σπάω, dirigir (spl. la abertura ó boca uretral).—Aberracion de desarrollo géinito-urin. mascul., presentando en el dorso del pene el orificio terminal de la uretra.

EPISTASIS.—Gr., de ἐπί, sobre, y ἡ στάσις, εως (de ἤστημι, estar, quedar).—Sustancia que se mantiene como película en la superficie de la orina.

EPISTAXIS.—Gr., del verbo ἐπιστάζω, gotear.—En sentido estricto, es la hemorragia nasal espontánea.

ÉPULIS.—Gr., de ἐπί y ἡ οὖλις, la encía.—Tumor gingival sarcomatoso.

EQUIMOSIS (*Echymosis*).—Gr., de ἔξ, fuera, y ὁ χυμός, zumo, salsa, humor.—Toda mancha ó tumor de color rojo ó lívido, efecto de extravasacion sanguínea.

ERETISMO (*Erethismus*).—Gr., de ἐρεθίζω, irritar.—Significa suma exaltacion irritativa, general ó local.

En el texto tiene el vocablo un sentido más científicamente ceñido. (V. *Energología*.)

ERISPELA (*Erysipela*).—Gr. ἐρυσίπελας, de ἐρυθρός, rojo, y τὸ πέλας, la piel.—Inflamacion aguda ó crónica de todo el espesor del dermis, con grande hiperemia de sus redes superficiales y tendencia á la difusion.

Var. sintomat.: E. aguda, crónica, difusa, estrangulada, flictenosa, eritematosa, flegmonosa, fija, ambulante y volante.

— **ERISPELATOZO, SA**, adj.—Aplicase al aspecto que ofrecen las

partes reiteradamente atacadas de erisipela, ó afectas de tumefaccion análoga.

ERITEMA (*Erythema*).—Gr. ἐρύθημα (de ἐρυθρός).—Rubicundez irritativa de la red vascular superficial del dermis.

Es concomitante de muchas erupciones, ya agudas (con ó sin fiebre), ya crónicas.

EROSION.—Lat. *Erodere* (de *ex* y *rodere*), roer de.—Destruccion ó levantamiento de la cutícula de la piel ó las mucosas.

Var. import.: **E. papilar** (que ataca sólo los vértices de las papilas) y **E. hemorrágica** (estómago, intestinos).

ERUCTACION.—Lat. *Eructus, atio*.—Expulsion más ó menos violenta de gases del estómago por la vía esofágica.

Var. princ.: **E. inodora**, **E. ácida**, **E. sulfídrica**.

ERUPCION (*Eruptio*).—Del lat. *Erumpere*, salir, romper por medio, abrirse paso.—Accion y efecto de presentarse en la piel un exantema.

ESCARA (*Eschara*).—Gr. ἡ ἐσχάρα, costra.—La placa mortificada que resulta de gangrena, bien espontánea, bien provocada por ustion ó causticacion de los tejidos.

ESCLEROSIS (*Sklerosis*).—Gr., de σκληρός, duro.—Denominacion genérica del endurecimiento del tejido conjunt. en los diversos órganos.

Escleroma, -*ema*, -*dermia*, -i, q. *E. cutánea*.—*E.* de los recién nacidos, *E.* de los adultos (*true keloid*, de Addison).

En comp.: *Osteosclerosis*, *Facosclerosis*, etc., etc.

ESCORIACION (*Excoriatio*).—De *Corium*, gr. τὸ χορίον, trama del dermis.—Herida superficialísima, ó que sólo interesa el epidermis y la capa-límite del dermis.

ESFACELO (*Sphacelo*).—Gr., de σφάζειν, matar, mortificar.—Gangrena húmeda, acompañada de putridez. (Aplicase de ordinario á las muy extensas y profundas.)

ESOFAGISMO (*Œsophagismus*).—Gr., de ὁ οἰσοφάγος.—I. q. *Disfagia*.

ESPASMO (*Spasmus*).—Gr. ὁ σπασμός, οἷ, de σπάω, tirar de.—Contraccion anormal de las fibras musculares, estriadas ó lisas.

Var. clás.: **E. clónico**, discontinuo; **E. tónico**, continuo.

Var. secund.: **Sp. facialis clonicus** (Tic convulsivo), **Sp. laryngis**, **Sp. nutans** (Espasmo de Salaam ó de Nick), **Sp. inspiratorius**, **Sp. nictitans** (palpebral), etc., etc.

ESPASMOFILIA (*Spasmophilia*).—Gr., de σπασμός y ἡ φιλία, la ten-

dencia, la afición, etc.=Propension á accesos espasmódicos, especialmente *clónicos*.

ESPASMO-SALAAM (*Sp.-Salaam*).—Arabe, *salâm*, saludo.=Doble espasmo clónico esterno-cleido-mastoideo que remeda una como salutación ó movimiento de hacer señas.—I. q. *Spasmus nutans*. (V. *Es-pasmo*.)

ESPERMATOCELE (*Spermatocèle*).—Gr., de τὸ σπέρμα, el sémen, la semilla (de σπείρω, esparcir, derramar, sembrar), y κίλη, hernia, tumor.=Quiste testicular que, por comunicacion con los tubos espermáticos, contiene materia seminal.

ESPERMATORREA (*Spermatorrœa*).—Gr., de σπέρμα y ῥέω.=Flujo anormal del sémen, sin provocacion ni excitacion sexual, y por sólo el traqueteo en carruaje, ó el trote ó galope á caballo, ó cualquiera contraccion abdominal defecatoria, mingitoria, etc. (V. *Polucion, Prostatorea*.)

ESPINA BÍFIDA (*Spina bifida*).—Lat., de *spina*, region apofisaria espinosa del raquis, y *bifidus*, de *bis* y *findere*, di-partir, hender.=Hidropesía intrarraquídea exteriorizada, merced al atraso ó detencion de desarrollo espinal de las vértebras correspondientes (ordin. las lumb. y sacras), y que tiene por cubiertas inmediatas la d. madre y la aracnoide.—I. q. *Rachischisis, Hydro-rachis dehiscens, Hiatus spinalis congenitus*.—Puede ser *externa* ó *interna* (del canal central de la médula).

ESPINTERISMO (*Spinterismus*).—Gr., de ὁ πινθηρ, ἦρος, la chispa, la centella.—I. q. *Fotopsia*.

— **ESPORÁDICO, CA**, adj. (*sporadicus, ca*).—Gr., σποραδικός, ἡ, ὄν, esparcido; de σπείρω, en la acepcion de esparramar (no de sembrar), de donde *sperma*).=Llámanse así las enfermedades que atacan á varios individuos por una causa comun climatérica transitoria. (V. texto, *Sintaxeología*.—Div. por el número de atacados.)

— **ESPUREO, A**.—Lat., *Spurius, a*, falso, bastardo.—I. q. *Nothus, a*.

ESPUTO.—Lat., *Sputum*, de *sputare*; más castizo *spuere* (*spuvi, sputum*), gargajear.=Producto de la espectoracion.

Formas patol. princip.: **Sp. crudum**, mucoso homog. traslúc. y con pocas células; **Sp. coctum**, opaco, amarillento, abund. en cél.; **Sp. puriforme**; **Sputa numulosa, fundum petentia**, que se posan y adhieren al fondo de la escupidera; **Sp. sero-muculentum**; **Sp. putridum, s. fœtidum**; **Sp. pneumaticum**.

ESTADIO.—Lat., *Stadium*.—Gr., τὸ στάδιον, οὐ, distancia de unos 200

metros, carrera para los juegos gimnásticos —En Medicina, cada uno de los periodos naturales del total proceso morboso agudo.

Div. clás.: **St. prodromorum** (precursor); **St. invasionis** (declaratorio); **St. incrementi**; **St. akme**, s. **fastigium** (cima, cumbre); **St. kriseos** (decisivo); **St. decrementi**; **St. reconvalescentiæ**.

Advertencia.—Varias son las enferms. agudas cuyo proceso difiere de esta norma.

ESTASIS (*Stasis*).—Gr., ἡ στάσις, de στάω, estar (quieto).—Detencion anormal de humores, pero sin que suponga perversion de su naturaleza. Dif. por ello del estancamiento.

Wirchow llama «stasis» la hiperemia mal llamada *pasiva*, y «fluxion» la mal llamada *activa*. (V. el texto, *Hiperemia*.)

ESTEARREA (*Stearrhæa*).—Gr., de στέαρ, atos, y στής, ητός, grasa, enjundia, sebo, y ῥέω.—Presencia ó abundancia de materia sebácea ó grasosa en las cámaras.

ESTEATORREA (*Steatorrhæa*).—I. q. *Estearrea*. (Vocablo más correcto que el anterior, por apoyarse en el genit.)

— **ESTÉNICO, CA**, adj. (*sthenicus, ca*).—Gr., de τὸ σθένος, εος-ους, la fuerza.—Aplicase á las enfermedades y, muy especialmente, á las fiebres donde predominan fenómenos intensos de excitacion cardíaca y nerviosa.

ESTENOCARDIA (*Stenocardia*).—Gr., de στενός, estrecho, oprimido, angosto, y ἡ καρδία, as, el corazon.—Forma morbosa, caracterizada por accesos de dolor angustioso ó espasmódico en la region esternal inferior ó precordial, con trascendencia al brazo izquierdo (rara vez al derecho), ó á lo largo del plexo lumbo-ciático.

Llábase tambien *Sternalgia, Angina pectoris*.—Neuralgia del plexo cardíaco.

ESTENOCORIA (*Stenocoria*, ó bien *Stenochoria*).—En ambos casos, del gr. στενός, y, segun la otra raíz sea κόρη, pupila, ó χώρα, espacio, lugar, así expresará: *coria*, la retraccion anormal permanente de la pupila, y *choria*, la retraccion ó la constriccion en general.

ESTENOSIS (*Stenosis*).—Gr. στένωσις.—I. q. *Estenocoria*, con χ (*ch*), con preferente aplicacion á orificios y conductos.

— **ESTERCORAL, -ÁCEO**, adj.—Lat., *stercoralis, aceus*.—Gr., κοπρώδης.—Que concierne á excrementos.

ESTERILIDAD.—Lat., *Sterilitas, atis*.—Gr., ἀγονία (con ο, no ω), de

ἀ, priv.; ἡ γονεῖα, ας, cría, generacion, prole.=Incapacidad de una mujer para concebir. (V. *Impotencia*.)

ESTERTOR.—Lat., *Stertor, oris*, de *Stertere*, roncar. - Gr., ῥέχος, εος (τὸ), de ῥέχω, -χω, -χομαι, de donde el v. esp. roncar.=El ruido anormal que se produce en la tráquea y bronquios por el ir y venir de mucosidades en ellas detenidas y toleradas por falta de excitabilidad.—Se distingue entre todos el *Stertor azonicus*. (V. *Ronquido, Estridor*.)

ESTIGMA (*Stigma*).—Gr., de τὸ στίγμα, ατος, el punto (de στίζω, pinchar).—Lat., *Umbo, onis*.=Pequeñas manchas cutáneas, redondeadas y rojas, que ofrecen en el centro un tubérculo del tamaño de un grano de mijo.

ESTOMATITIS (*Stomatitis*).—Gr., de τὸ στόμα, la boca, y la desin. ττις.=Irritacion ó inflamacion de la boca.

Var. princ.: **St. catarrhalis**; **St. membranosa** (cruposa y diftérica); **Stomatitis mercurialis**; **St. scorbutica**; **St. ulcerosa**; **St. vesicularis**, s. **aphthosa**; **St. ulcerosa idiopática**, s. **Stomakace**.

ESTORNUTACION.—Lat., *Stornutatio, onis*.=Acceso preternatural de estornudos, debido á un estado espasmódico, directo ó reflejo, de las vías respiratorias.

St. convulsiva, s. **Ptarmus** (del gr. ὁ πταρμός, de πταίρω, estornudar).

ESTRABISMO (*Strabismus*).—Gr., de στρέπω, girar, torcer.=La convergencia anormal de los ejes oculares por predominio de un determinado músculo de un ojo sobre su correlativo del ojo del otro lado en el ejercicio de la vision binocular, de suerte que nunca concurren ambas líneas visuales en el objeto ó punto de mira.

Var. princ.: **St. externus convergens**, **St. ext. parallelus**, **St. ext. divergens**.—**St. alternans**, en que el vicio recae, ahora en uno, ahora en otro de los dos ojos.

ESTRANGURIA (*Stranguria*).—Gr., de στράγγιξ, gota exprimida (στράγγω, exprimir, estrangular, y οὔρον, orina).=Emision urinaria difícil y por extremo penosa, con grandes esfuerzos y gota á gota.

ESTRÍAS CUTÁNEAS.—Lat., *Striae cutis*.=Agridamientos de la trama del dermis, paralelos ó en otra relacion, segun la marcha local del tejido, debidos á una distension muy rápida ó extrema, como por ejemplo, la preñez, la ascitis aguda, el recrecimiento exagerado de los pechos en el puerperio, etc.

ESTRICTURA (*Stricture*).—Lat., de *Stringere*, gr., στρυγγόω, estrangular, agarrotar, apretar.=Ultimo grado de angostamiento de algun

conducto orgánico, séase por la causa que se fuere (espasmo, inflamación, compresión, etc.).

ESTRIDOR.—Lat., *Stridor*, de *stridere*, silbar.—El silbido respiratorio producido por estrechez persistente de la laringe.

También se adjectiva (*stridulus, a, um*) *estrídulo, la*.

ESTUPOR.—Lat., *Stupor, oris*, de *stupere*, caer en aturdimiento, sordeza (correl. del gr. τῶπτω, golpear, aturdir á golpes, etc.).—Inercia y apatía por extrema remisión de los centros sensitivo-reflejos.

Obsérvase en diversas afecciones somáticas y muchas psíquicas.

EUEXIA, EUFORIA (*Euphoria*).—Gr., de εὖ y ἔχω ó φέρω, resp.—*Bienestar ó bien-llevarse*.—Palabras expresivas de la íntima y armónica sensación que produce en el sujeto el estado de salud.

EUTANASIA (*Euthanasia*).—Gr., de εὖ y ὁ θάνατος, la muerte.—Buena, suave, apacible muerte.

EVENTRACION (*Eventratio*).—De *ex* y *venter*, abdomen, como quien dice: «desventración ó vaciamiento del abdomen».—Hernia ó salida enorme de una gran parte de las vísceras abdominales.

EXACERBACION (*Exacerbatio*).—Lat. *Acerbus*, agudo, intenso, y *ex*, reduplic.—Aumento rápido de la intensidad de una afección ó de alguno de sus síntomas.

EXANTEMA (*Exanthema*).—Gr. τὸ ἐξάνθημα, de ἐξ por ἐκ, y τὸ ἄνθος, la flor, sinónimo de *eflorescencia*.—Expresa la súbita coloración, por placas de hiperemia capilar cutánea, que ocurre en las diversas dermatosis, tanto agudas como crónicas.

Estadios de los *Exanthemata acuta*: **St. incubationis**, s. *latentiae*; **St. prodromorum**; **St. eruptionis**; **St. floritionis**, s. *desquamationis*, s. *exsiccationis*.

EXCRESCENCIA.—Lat. *ex-crescere*.—Todo tumor ó vegetación inicial, superficial y pediculada.

EXENTERACION.—Gr., de ἐξ por ἐκ, y ἐντερον. (V. *Eventración*.)

EXESION.—Lat. *ex-edere*, part. *-esum*, comer, corroer, lit. «comer de».—Destrucción, ordinariamente lenta, de la superficie de un órgano enfermo, por efecto de un movimiento regresivo del mismo.

EXFOLIACION (*Exfoliatio*).—Del lat. *Folium*, hoja.—El desprendimiento laminar, ó como por hojas, de una porción de superficie orgánica, ulcerada ó traumatizada.

EXOFTALMO (*Exophthalmos*).—Del gr. ἐξ y ὁ ὀφθαλμός, el ojo.—El

hecho de presentarse saliente el globo ocular por causa preternatural (inflamacion, presion de un tumor intraorbitario, etc., etc.).

EXPIRATIO PROLONGATA, lat.—Se llama la producida por angostamiento ó infiltracion de los bronquios capilares, con mayor dispendio de tiempo que en la respiracion normal.

EXTRAVASATIO, lat. (spl. de la sangre).—Aplicase á la accion y efecto de las hemorragias intersticiales.

EXULCERACION.—Del lat. *ex* y *ulcus*, deriv. del gr. ἔλκος, llaga. =La destruccion, más ó menos profunda, de una porcion de tegumento por accion supurativa.

F

FACIES.—Este vocablo latino, que significa rostro, semblante, cara, ha tomado carta de naturaleza en el lenguaje médico de todos los países, y con ella, acompañada del calificativo correspondiente, se determinan las variedades semeióticas del semblante. Así se dice: **F. hippocratica**, s. agónica; **F. leontina**; **F. syphilitica**; **F. cholérica**, etc., etc.

— **FAGEDENICO, CA**, adj. (*phagedaenico, ca*).—Gr., de ἡ φαγέδαινα, ης, hambre devoradora (φαγῆν, comer). =Calificativo de algunas úlceras gangrenosas, cuya propagacion de capa en capa corre al par, y aun á veces con más celeridad, que la superficial.

FALACROSIS (*Phalakrosis*).—Gr. ἡ φαλάκρωσις. (V. *Calvicie*.)


FASTIDIUM.—Lat., de *Fastus, us (m)*, desden. =Inapetencia general; ausencia de todo estímulo espontáneo y desden por los provocados.—(Acep. fisiol. y psíqu.)

FASTIGIUM.—Lat., *cúspide*, cumbre.—I. q. *Acmé*. (V. *Acmé* y *Estadio*.)

FATUIDAD.—Lat., *Fatuitas*, de *fatuus, a, um*, necio, insustancial, estúpido. (V. *Idiotismo*.)

FEBRICULA, dim. lat. de *Febris*, es decir, fiebre con escaso aumento, así de la actividad arterial como de la temperatura.

FIEBRE.—Lat., *Febris*.—Gr. πῦρ, πῦρός, fuego (de donde los vocablos adjetivos *pyrético, antipyrético*, etc.). *Calentura*, en castellano puro. = Fenómeno general y complejo de regresion orgánica, rápida ó lenta, segun la lesion (local ó general) que la provoca y sostiene, y cuya nota característica se resuelve en estos tres hechos: agitacion cardio-arterial;



ascenso de temperatura real y aumento de residuos de oxidacion orgánica.

Se admiten tantas variedades de fiebre cuantas son las enfermedades de cuyo síndrome forma parte, sin más que asociar al sustantivo fiebre el calificativo nosológico respectivo. (*F. variolosa*, *F. puerperal*, *F. hectica*, etc., etc.) No bajan de trescientas las variantes empleadas en el corriente lenguaje clínico.

FIMOSIS (*Phimosis*).—Gr., de ὄφιός, bozal, freno (de φημί, atar, añudar, etc.).—Por antonomasia se dice de la estrechez con indilatabilidad abs. ó relat. del orificio prepucial. Sus naturales consecuencias son: dificultad en la emision de la orina y propension á infecciones de la mucosa correspondiente, por falta de la necesaria limpieza. Puede ser *natural* ó *accidental*, y adquirir, en todo caso, importancia clínica.—Aplicase en comp. á otros angostamientos, v. gr., *Blefarofimosis*.

FISCONIA (*Physkonía*).—Gr., de φύσκων, barrigudo (de φυσάω, inflar).—I. q. *Obesidad*, *Polisarcia*.

FISOMETRA (*Physometra*).—Gr., de ἡ φύσσα, el viento, y ἡ μήτρα, el útero.—Coleccion gaseosa en la cavidad uterina, bien por introduccion accidental de aire, bien por desprendimiento de gases de un contenido anormal en corrupcion.—Cf. *Hidrometra*, *Piometra*.

FÍSTULA.—Lat., *Fistula*, *a*, flauta de caña, tubo, canal; sin duda dimin. de *fissio*, *onis* (de *findere*, *issum*), raya ó hendedura, de donde *fissura*, *a*; *fissum*, *i*, *-us*, *us*, etc.—Comunicacion anatómica preternatural y angosta.

Clas.: **F. completa**, si va de una cavidad normal á otra ó á la piel. **F. incompleta**, si por uno de sus dos extremos no llega á producir contra abertura. **Seno fistuloso**, si tiene su punto de partida en el espesor del organismo (hueso, cartilago, etc.).

Varied. import.: **F. rectalis**, **F. vesico-vaginalis**, **F. vesico-perinealis**, **F. lacrymalis**, **F. colli congenita**, etc.

FISURA (*Fissura*).—Lat., de *findere*, part. *fissum*, hender, agrietar(se) una cosa.—Agrietamiento de los tejidos por causa patológica, y tambien la hendedura remanente en ellos por retardo formativo. Ejemplos de lo primero, *F.* de los labios, de la márgen del ano, de los pezones, etc.; de lo segundo, *F. abdominalis*, *F. sterni*, etc.

FLATULENCIA.—Lat., *Flatulentia*, de *flatus*, viento. (V. *Meteorismo*.)

FLEMON (*Phlegmon*).—Gr., ἡ φλεγμονή, de φλέγω, arder, quemar.—Hiperorgasmo ó inflamacion del tejido conjuntivo, con tendencia á la

difusion ó á la estrangulacion supuratoria segun la laxitud ó tupidez de la parte afecta.

FLEMORREA (*Phlegmorrhæa*).—Gr., de τὸ φλέγμα, el moco como prod. de irritacion inflam., de φλέγω y ἡ ῥοή, el flujo.—I. q. *Blenorrea*.

FLOCILEGIO.—Lat., de *floccus*, *i*, fleco, friolera, hilacha, mota. (Véase *Karphologia*.)

FLOGOSIS (*Phlogosis*).—Gr., ἡ φλόγωσις, de φλέγω.—I. q. *Inflamacion*.

FLUCTUACION.—Lat., *Fluctuatio* (de *fluctus*, *us*, la ola), oleaje.—El ondear del contenido líquido de las cavidades hidrópicas, provocado y demostrado por la percusion y succusion exploratorias.

FLUXION.—Lat., *Fluxio*, de *fluxum*, part. de *fluere*.—I. q. *Hiperemia*.

FOSFATURIA (*Phosphaturia*).—Gr., de οὔρον, orina.—Exceso de sales fosfáticas (cálcico-amoni-magnésicas) en las orinas.

FOTOFobia (*Photophobia*).—Gr., de τὸ φῶς, φωτός, luz, dia (dist. de ὁ φῶς, φωτός, hombre, y de ἡ φῶς, φωδός, quemadura), y ὁ φόβος, el miedo, terror, horror, etc.—Temor aprensivo de la claridad, ú horror á ella por intolerancia orgánica de la vista.

FOTOPSIA (*Photopsia*).—Gr., de τὸ φῶς y ἡ ὄψις, la vista.—Produccion intensa de fenómenos subjetivos de luz y centelleos, por un estado patológico del sistema visual.—I. q. *Fosfenas*, *Espinterismo*.

FREMITUS.—Lat., de *Fremere*, *ui*, *itum* (gr. βρέμω), temblar, estremecerse, rugir, etc., etc.—1.º Temblor general, que precede ó acompaña á los escalofríos y horripilaciones del eretismo febril.—2.º **F. cattarius** (de gato), el retembler ó vibracion sensible á la mano puesta sobre el precordio, en casos dados de afeccion del corazon (Laennec).—3.º **F. hydaticus**, la sensacion *sui generis* que producen al tacto y al oido las hidátides cuando se las percute.

FULIGO, INIS.—Lat., hollin.—Capa engrudosa, amarillo-negrucza que cubre la m. mucosa bucal (labios, encías y lengua) y los dientes, por inopisitud y escasez de secreciones locales.

FUNGUS, I.—Lat., hongo, carnosidad, seta que se forma en el pábilo de una vela, etc., etc.—Toda carnosidad ó recrecimiento de tejido, bien embrioplástico, bien telangiectático. Si es pediculado, se llama *pólipo*; si intra-articular, *tumor blanco* (tumor albus).

Cuéntase entre las especiales un **F. umbilicalis neonatorum**.

FUROR, lat.—Var. clín. princ.: **F. uterinus** (I. q. *Ninfomanía*), **F. maniacus**, *Delirium furibundum*.