

CUARTA PARTE

CLÍNICA TERAPÉUTICA

	<u>Págs.</u>
Enfermedades del aparato digestivo y sus anejos.— <i>Angina catarral.</i> —Tratamiento causal párrafo 3.º	161
Enumeración de las principales sustancias recomendadas en el tratamiento de las anginas párrafo 4.º	161
Tratamiento local: pulverizaciones y pincelaciones: inconvenientes de los gargarismos párrafo 4.º	161
Tratamiento sintomático: indicaciones de la cocaína	161
Plan farmacológico establecido.—Enumeración de los medicamentos empleados é indicaciones de los mismos.—Medicación diaforética	161
Clorato potásico asociado al alcoholaturo de acónito y tintura de belladona fórmula 1. ^a	162
Resultados obtenidos:	
<i>Estomatitis y gingivitis.</i> —Tratamiento empleado . . . párrafo 2.º	198
<i>Inapetencia.</i> —Enumeración de los medicamentos empleados para combatirla 342, 343 y 344	
<i>Catarro gástrico agudo.</i> —Régimen alimenticio . . . párrafo 6.º	259
Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los eméticos. párrafos 5.º y 7.º	280 y 336
Eméticos empleados:	
Ipecacuana fórmula 1. ^a	337
Tártaro emético fórmula 1. ^a	295
Indicaciones de los purgantes párrafo 5.º	259
Purgantes empleados:	
Purgantes salinos: citrato de magnesia fórmula 1. ^a	337

	<u>Págs.</u>
Sulfato sódico y potásico, sulfovinato sódico, carbonato de magnesias, etc. . . . fórmulas 1. ^a , 2. ^a , 3. ^a y 4. ^a —94, y 4. ^a y 5. ^a	347
Indicaciones de los antisépticos del tubo digestivo.—Antisépticos empleados: resorcina, benzonaftol. fórmula 2. ^a , pág. 180, y fórmula 4. ^a	181
<i>Catarro gástrico crónico</i> .—Tratamiento empleado . . . fórmula 6. ^a	343
<i>Gastroectasia</i> .—Indicaciones terapéuticas: 1. ^a . Reducir la sobrecarga alimenticia.—Manera de cumplir esta indicación.—Régimen alimenticio	31
Segunda indicación: Impedir las fermentaciones anormales.—Recursos terapéuticos de que podemos disponer para cumplir dicha indicación.—Agentes medicamentosos: antisépticos del tubo digestivo.—Enumeración de los más empleados.—Contraindicaciones de dichas sustancias	32
Antisépticos empleados. fórmula 3. ^a	34
Medios físicos.—Lavado gástrico.—Hora en que debe practicarse	40 y 32
Contraindicaciones del lavado gástrico párrafo 5. ^o	36
Tercera indicación: Combatir la atonía gástrica.—Agentes medicamentosos que podemos emplear para cumplir esta indicación: enumeración de los principales.—Inconvenientes de los excitantes de la tonicidad muscular gástrica . . . párrafo 3. ^o	32
Indicaciones del masaje y de la electricidad.—Prudencia que exigen sus maniobras cuando el enfermo es arterioesclerótico párrafo 3. ^o	32
Terapéutica sintomática.—Estreñimiento; purgantes indicados para tratarle; horas en que deben ser administrados. párrafo 4. ^o	32
Tratamiento del dolor párrafo 5. ^o	32
<i>Gastritis crónica ulcerativa</i> .—Indicaciones terapéuticas 1. ^a : Impedir las causas que sostiene la úlcera.—Manera de cumplir dicha indicación; combatir la hiperclorhidria: enumeración de las sustancias más empleadas. párrafo 3. ^o	169
Segunda indicación: favorecer la cicatrización de las ulceraciones.—Régimen dietético: reposo absoluto: dieta láctea, su importancia; cantidad que debe administrarse durante las 24 horas párrafo 1. ^o	170
Agentes farmacológicos: subnitrito de bismuto; manera de obrar de dicho medicamento. párrafo 2. ^o	160
Tratamiento sintomático: <i>dolor</i> ; medicamentos indicados para combatirle; alcalinos y narcóticos.—Enumeración de los más empleados	170
<i>Estreñimiento</i> : agentes medicamentosos indicados para combatir simultáneamente el estreñimiento y el dolor . . . párrafo 3. ^o	170

Plan farmacológico establecido: enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados:	
Purgantes salinos y enemas para vencer el estreñimiento. Fórmula 2. ^a , pág. 171; fórm. 4. ^a , pág. 173; fórm. 1. ^a y 2. ^a , pag. 174.	
Gotas rojas de Lecointe, para combatir la gastralgia. fórmula 1. ^a	170
Codeína asociada al bicarbonato sódico y á la cocaína, para cumplir la misma indicación	fórmula 1. ^a 172
Inyecciones subcutáneas de clorhidrato de morfina, para cumplir la misma indicación	fórmula 2. ^a 172
Favorables resultados obtenidos á beneficio de las inyecciones de morfina; cesación del dolor	173
Narcóticos periféricos asociados á los alcalinos, para tratar los síntomas estreñimiento y dolor	173 y 172
Ineficacia de los narcóticos periféricos; empleo de los preparados de opio, para combatir la gastralgia	fórmula 3. ^a 173
Úlcera redonda del estómago.—Dietética: régimen bromatológico	párrafo 3. ^o 91
Tratamiento farmacológico. — Indicaciones de los alcalinos. párrafo 3. ^o	91
Indicaciones de los narcóticos	párrafo 3. ^o 91
Idem de los purgantes	párrafo 4. ^o 91
Idem del lavado gástrico; prudencia que exigen sus maniobras	párrafos 3. ^o y 4. ^o 91
Plan farmacológico establecido; enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados:	
Purgantes salinos.—Sulfovinato sódico	fórmula 1. ^a 93
Sulfato sódico y sulfato potásico, para vencer el estreñimiento.	fórmula 1. ^a , pag. 92, y fórmula 2. ^a , pág. 94
Podofilino asociado á la cáscara sagrada y belladona, para continuar la acción purgante	fórmula 2. ^a 92
Alcalinos y fermentos gástricos, para favorecer la digestión. fórmula 3. ^a	92
Carbón naftolado asociado á la belladona y cilantro, para combatir el meteorismo y estreñimiento	fórmula 4. ^a 92
Acido clorhídrico, para tratar la hipoclorhidria demostrada por el análisis del jugo gástrico	fórmula 2. ^a 93
Resultados obtenidos.	
<i>Dispepsias gástricas.</i> — <i>Dispepsia atónica.</i> — Fórmulas prescritas para tratarla.	342, 343 y 344
<i>Dispepsia flatulenta.</i> —Indicaciones terapéuticas: 1. ^a , impedir la formación de gases.— Manera de cumplir esta indicación. párrafo 2. ^o	222
Régimen alimenticio: proscripción de los feculentos y de las bebidas carbónicas	párrafo 2. ^o 222

	<u>Págs.</u>
Tratamiento farmacológico. Indicaciones de los narcóticos estupefacientes.	222
2. ^a indicación: absorber los gases formados.—Enumeración de las principales sustancias absorbentes de gases; horas en que deben ser administradas párrafo 3. ^o	222
3. ^a indicación: expulsar los gases que no pueden ser absorbidos. Recursos terapéuticos que pueden emplearse para cumplir esta indicación. — 1. ^o Agentes farmacológicos-Carminativos; enumeración de los más empleados párrafo 2. ^o	222
Agentes de orden físico.—Indicaciones del masaje. párrafo 2. ^o	222
Tratamiento empleado fórmula 1. ^a	222
<i>Hiperclorhidria</i> : Indicaciones generales: 1. ^a impedir ó disminuir la producción de ácidos.—Manera de cumplir esta indicación. —Plan dietético: régimen alimenticio durante la primera etapa del tratamiento párrafo 2. ^o	29
Idem durante la segunda párrafo 3. ^o	29
Idem durante la tercera.—Substancias que deben predominar en la alimentación del hiperclorhídrico. párrafo 3. ^o	29
Digestibilidad de las carnes párrafo 3. ^o	29
Idem de los hidrocarbonados en general	29 y 30
Régimen higiénico de los hiperclorhídricos.—Proscripción del tabaco párrafo 3. ^o	30
Higiene de la piel	30
Tratamiento farmacológico. Indicaciones de la atropina, dubosina, azul de metileno, ergotina, veratrina, cocaína, picrotoxina, solanina, cannabis indica, narcóticos estupefacientes, moderadores reflejos, etc. párrafo 2. ^o	30
Escasos resultados que pueden esperarse de su empleo en los casos avanzados de hiperclorhidria párrafo 3. ^o	30
Medicamentos neutralizantes del ácido clorhídrico.—Medicación alcalina. Bicarbonato sódico: Acción fisiológica de dicho fármaco á pequeñas y á grandes dosis párrafo 3. ^o	30
Dosificación del bicarbonato sódico.—Dosis media.—Procedimientos para calcularla.—Procedimientos químicos: inconvenientes de los métodos fundados exclusivamente en el análisis del jugo gástrico	30 y 31
Regla clínica para calcular la dosis de bicarbonato sódico suficiente para neutralizar la acidez gástrica.	31
Otros alcalinos empleados: ventajas de los preparados de magnesia párrafo 1. ^o	31
Preparados de cal	31
Polvos inertes: indicaciones del subnitrate de bismuto	31
Indicaciones del bromuro de estroncio y del de calcio	31
Manera de administrar los alcalinos párrafos 2. ^o y 3. ^o	31

	<u>Págs.</u>
Terapéutica sintomática—Tratamiento del estreñimiento	32
Idem del dolor: indicaciones de los alcalinos	32
Idem de los narcóticos periféricos y estupefacientes, de la cocaína y del agua clorofórmica, de la cannabis indica y de la solanina, del éter y del mentol, de la antipirina y de los bromuros. párrafo 3.º	32
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los fármacos empleados 36 y siguientes	
<i>Tratamiento general de los vómitos.</i> —Indicaciones de los preparados con ácido carbónico.—Manera de obrar y enumeración de los más empleados párrafo 1.º	285
Bebidas heladas párrafo 1.º	285
Contraindicaciones de los bromuros	285
Tratamiento empleado. — Administración de la mixtura antiemética de Riverio fórmula 4.ª	285
Enfermedades de los intestinos. — <i>Catarro intestinal agudo.</i> —Fórmulas prescritas	351
<i>Enterocolitis:</i> Régimen alimenticio	320
Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los preparados de opio y de las sustancias alcalinotérreas	320
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados:	
Opio asociado al subnitrate de bismuto, para cohibir la diarrea y calmar el dolor fórmula 1.ª	321
Fosfato básico de cal asociado á fermentos gastrointestinales, para favorecer las digestiones y combatir la diarrea. fórmula 2.ª	321
Láudano Sydenham asociado al bálsamo del Perú y subnitrate de bismuto fórmula 3.ª	321
Subborato sódico fórmula 2.ª y 3.ª	322
Creta preparada asociada al subnitrate de bismuto, paracotoína y opio. fórmula 4.ª	322
Sulfato ferroso, pancreatina y extracto tebaico, para combatir el dolor y la diarrea, favorecer la digestión intestinal y la restauración hemática fórmula 1.ª	223
Tanígeno asociado al opio, para combatir la diarrea y la enteralgia fórmula 2.ª	223
Opio asociado á la ipecacuana y catecú. fórmula 3.ª	223
Resorcina, como antiséptico del tubo digestivo . . . fórmula 1.ª	324
Quasia simaruba, pepsina amilácea y benzonaftol, para excitar el apetito, favorecer la digestión gástrica y continuar la desinfección del tubo digestivo. fórmula 3.ª	324
Polvos de Dower, para favorecer la diaforesis y combatir la diarrea. fórmula 1.ª	325

Resultados obtenidos.

<i>Tratamiento general de la diarrea: medicamentos empleados, fórmulas 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a</i>	352
<i>Tratamiento del estreñimiento habitual.—Plan farmacológico establecido</i>	317 y 318
Enfermedades del hígado.—Ictericia idiopática.—Tratamiento dietético.—Régimen alimenticio	403
Tratamiento farmacológico: indicaciones de los colagogos, párrafo 1. ^o	403
Enumeración de los colagogos más empleados . . . párrafo 1. ^o	403
Indicaciones de los diuréticos párrafo 2. ^o	403
Plan farmacológico establecido.—Medicamentos empleados e indicaciones de los mismos.—Purgantes: Tartrato bórico potásico fórmula 2. ^a	403
Colagogos: coleato sódico fórmula 2. ^a	404
Sales de Carlsbad, para favorecer el restablecimiento de la permeabilidad biliar. fórmula 2. ^a	404
Diuréticos; acetato potásico para favorecer la eliminación de los productos tóxicos por la vía renal.	403
<i>Cirrosis mixta.—Tratamiento dietético.—Régimen alimenticio.</i>	234
Ventajas de la dieta láctea párrafo 2. ^o	234
Necesidad de proscribir las bebidas alcohólicas. . . párrafo 1. ^o	234
Tratamiento farmacológico de la cirrosis atrófica y de la hipertrófica párrafo 3. ^o	234
Indicaciones de los yoduros y del cloruro amónico	234
Escasos resultados que pueden esperarse de la terapéutica en la forma atrófica	234
Acción especial de los preparados mercuriales en el tratamiento de la cirrosis hipertrófica. párrafo 1. ^o	234
La opoterapia en la terapéutica de las cirrosis hepáticas, párrafo 3. ^o	234
Terapéutica sintomática.—Tratamiento médico de la ascitis, párrafo 5. ^o	234
Indicaciones de los diuréticos, purgantes y sudoríficos, párrafo 5. ^o	234
Agentes físicos.—Masaje y electricidad párrafo 5. ^o	234
Tratamiento quirúrgico de la ascitis.—Momento oportuno para practicar la paracentesis.—Razones en pro de la punción prematura párrafo 4. ^o	234
Idem en pro de la punción tardía párrafo 4. ^o	234
Plan terapéutico establecido.—Medicamentos empleados.—Indicaciones de los mismos	235 y siguientes.
Acetato potásico para favorecer la diuresis fórmula 1. ^a	235
Yoduros para combatir la esclerosis hepática 2. ^a	235

	<u>Págs.</u>
Bic. sódico para combatir la hiperclorhidria . . . fórmula 3. ^a	235
Extracto nuez vómica, de belladona y cáscara sagrada, para vencer el estreñimiento . . . fórmula 1. ^a	236
Tintura de cuasia como eupéptico y fosfato sódico como tónico . . . fórmula 2. ^a	236
Purgantes para combatir el estreñimiento . . . » 2. ^a	236
Mercuriales para tratar la cirrosis hipertrófica . . . 237 y 238	
Yoduro de litina y acetato sódico para aumentar la secreción renal y combatir el proceso esclerósico del hígado. fórmula 1. ^a	240
Coleato sódico . . . » 3. ^a	240
Crémor tártaro como purgante . . . » 4. ^a	240
Acetato amónico, sudorífico para combatir una bronquitis aguda de primer período. . . fórmula 1. ^a	241
Codeína y agua de laurel cerezo para disminuir la intensidad de la tos . . . fórmula 2. ^a	241
Licor amoniaco anisado para estimular los centros nerviosos cerebrales . . . fórmula 1. ^a	243
Strophantus hispídus y acetato potásico para favorecer la diuresis y sostener las energías cardíacas . . . fórmula 3. ^a	243
 Enfermedades del peritoneo.—Peritonitis tuberculosa.—Indicaciones generales . . . párrafo 3.^o	
Plan terapéutico establecido.—Medicamentos empleados é indicaciones de los mismos.—Acetato potásico para aumentar la diuresis . . . fórmula 1. ^a	86
Fosfato sódico para tonizar el organismo . . . » 2. ^a	86
Yoduros para favorecer la reabsorción del exudado peritoneal. fórmula 3. ^a	86
Persistencia de la ascitis á pesar de la medicación anteriormente establecida.—Indicaciones de la paracentesis	87
Resultados obtenidos	87 y 88
 Enfermedades del corazón.—Endocarditis aguda reumática.—Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los alcalinos . . .	
Idem de los yoduros . . . párrafo 2. ^o	203
Idem de los revulsivos . . . párrafo 2. ^o	203
Indicaciones de los tónicos cardíacos.—Enumeración de los más empleados	203
Tratamiento sintomático.—Plan farmacológico establecido . . .	204
Angina de pecho.—Tratamiento empleado. fórmula 1. ^a , pág. 148; y fórmula 2. ^a , pág. 149.	
Palpitaciones de carácter subjetivo.—Indicaciones terapéuticas.—Enumeración de las substancias más empleadas.—Plan farmacológico establecido. . . párrafo 3. ^o , fórmula 2. ^a	202

	Págs.
<i>Palpitaciones acompañadas de trastornos objetivos del aparato circulatorio.</i> —Contraindicaciones de la digital y demás tónicos cardíacos párrafo 1. ^o	283
Indicaciones de los bromuros.—Sal brónica preferible. párrafo 1. ^o	283
Indicaciones de los preparados ciánicos.—Prudencia que exige su empleo párrafo 3. ^o	284
Preparados ciánicos menos peligrosos	284
Dosificación de dichas sustancias.	284
Plan farmacológico establecido.—Empleo del bromuro potásico asociado al agua de laurel cerezo. fórmula 1. ^a	283
Idem del bromuro potásico asociado al ácido cianhídrico medicinal fórmula 3. ^a	284
<i>Endocarditis crónica.</i> —Estrechez del orificio aórtico con insuficiencia de las válvulas sigmoideas.—Indicaciones terapéuticas . .	145
Curabilidad de las afecciones valvulares.—Medicaciones empleadas.—Resultados obtenidos párrafo 2. ^o	145
Indicaciones de los yoduros basadas: 1. ^o , en su acción sobre el elemento causal: 2. ^o , en su acción vasodilatadora. párrafo 3. ^o	146
Otros vasodilatadores.—Trinitrina.	146
Régimen higiénico del cardíaco durante el período de compensación.	146
Necesidad de un ejercicio moderado para favorecer la circulación sanguínea	146
Indicaciones del masaje párrafo 1. ^o	146
Tratamiento dietético durante el período de no compensación.—Necesidad del reposo absoluto	146
Régimen bromatológico: sustancias alimenticias que deben ser recomendadas.—Idem que deben ser proscritas. párrafo 2. ^o	146
Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los tónicos del corazón	146
Idem de los estimulantes párrafo 2. ^o	146
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados.—Yoduro potásico y trinitrina para tratar las lesiones valvulares y dilatar los vasos periféricos fórmulas 1. ^a y 2. ^a	146
Purgantes salinos para vencer el estreñimiento. » 1. ^o y 2. ^o	147
Carbonato amónico asociado á la tintura de polígala para mantener las energías cardíacas y combatir la congestión pulmonar favoreciendo la contractilidad de los musculitos bronquiales fórmula 3. ^a	147
Morfina asociada al salicilato de bismuto y cerio, para combatir el dolor y la opresión precordial fórmula 1. ^a	148
Clorhidrato de morfina en inyecciones subcutáneas para cumplir las mismas indicaciones fórmula 2. ^a	149

	Págs
Digital asociada á la cafeína para aumentar la energía contráctil del miocardio y trinitrina como vasodilatador	149
Aguardiente alemán al objeto de producir una acción derivativa y descongestionar el pulmón y demás órganos que sean asiento de congestiones pasivas fórmula 3. ^a	149
Citrato de magnesia para cumplir las mismas indicaciones. fórmula 1. ^a	150
Clorhidrato de morfina para disminuir la intensidad de las crisis dolorosas, asociada á la trinitrina y yoduros para cumplir las mismas indicaciones que en los casos anteriores. fórmula 1. ^a	151
Digitalina para sostener la energía contráctil del miocardio. párrafo 2. ^o	151
Ergotina y ratania para cohibir las hemorragias. . . fórmula 2. ^a	115
Resultados obtenidos.—Disminución del dolor y opresión precordial después de las inyecciones de morfina.—Disminución de la disnea después del empleo de los cardiotónicos, vasodilatadores, purgantes hidragogos y salinos párrafo 1. ^o	150
<i>Estrechez del orificio mitral con insuficiencia de la válvula.</i> —Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados.—Digital para favorecer la energía contráctil del miocardio, yoduros para combatir las lesiones valvulares . . . fórmula 1. ^a	314
Subnitrato de bismuto para combatir la diarrea . . . » 1. ^a	315
Strophantus hispidus como sucedáneo de la digital. . . » 2. ^a	315
Resultados obtenidos.—Aumento del vigor del pulso.—Disminución de la disnea, después del empleo de los cardiotónicos y yoduros	315
Tratamiento general de la <i>hiposistolia</i> .—Indicaciones de los tónicos cardíacos cuando la hiposistolia es determinada por excesiva distensión del miocardio	146
Idem de los estimulantes cuando la hiposistolia es determinada por la degeneración grasosa del miocardio	146
Enumeración de los tónicos cardíacos más empleados.	146
Idem de los estimulantes párrafo 1. ^o	146
Indicaciones de la sangría en las afecciones valvulares mitrales acompañadas de congestión pulmonar párrafo 4. ^o	147
Contraindicaciones de la sangría en las afecciones valvulares aórticas acompañadas de palidez y pulsos bajos. párrafo 4. ^o	147
Indicaciones de la digitalina párrafo 2. ^o	151
Enfermedades de las arterias. — <i>Arterioesclerosis.</i> —Indicaciones de los vasodilatadores.—Enumeración de los más empleados.	33
Contraindicaciones de los yoduros párrafo 2. ^o	33
Enfermedades del aparato respiratorio. — <i>Catarro laringotraqueal agudo.</i> —Tratamiento empleado:	

	Págs.
Clorato potásico asociado á la codeína y agua de laurel cerezo. fórmula 1. ^a	95
<i>Laringitis tuberculosa</i> .—Tratamiento empleado	12
Enfermedades de los bronquios. — <i>Bronquitis aguda simple: primer período.</i> —Indicaciones de los diaforéticos	
Idem de los narcóticos.—Inconvenientes del opio . . párrafo 1. ^o	260
Indicaciones de los revulsivos	260
Sudoríficos empleados fórmula 1. ^a	260
<i>Tratamiento de la bronquitis en período de estado.</i> —Indicaciones generales	
Alcalinos y expectorantes.—Enumeración de los más usados . .	64
Indicaciones de los eméticos párrafo 2. ^o	264
Tratamiento empleado fórmula 1. ^a	264
<i>Terapéutica de la bronquitis aguda en período de declinación.</i> —Indicaciones generales párrafo 1. ^o	
Balsámicos: Enumeración de los más usados	265
Indicaciones de los sulfurosos	265
Idem de la ergotina y de la ipecacuana	265
Tratamiento empleado fórmula 3. ^a	265
<i>Bronquitis crónica.</i> —Tratamiento empleado	361, 362 y 363
Enfermedades de los pulmones. — <i>Congestión pulmonar pasiva.</i> —Tratamiento empleado fórmula 3. ^a	
<i>Pneumonía fibrinosa.</i> —Indicaciones y modos de administración del tártaro emético	239
Resultados obtenidos á beneficio del empleo de dicho medicamento.	
<i>Tratamiento de un delirio pneumónico.</i> —Indicaciones de la sangría párrafo 2. ^o	
Indicaciones y contraindicaciones del cloral párrafo 3. ^o	327
Idem de los bromuros y demás sedantes cardíacos . . párrafo 3. ^o	327
Indicaciones y contraindicaciones del opio	328
Contraindicaciones del tártaro emético párrafo 4. ^o	328
Indicaciones del sulfonal párrafo 2. ^o	328
Indicaciones del trional.—Ventajas de esta substancia sobre el sulfonal	328
Contraindicaciones del alcohol á dosis altas párrafo 2. ^o	328
Tratamiento empleado fórmulas 1. ^a y 2. ^a	328
<i>Fluxión de pecho.</i> —Tratamiento empleado fórmula 1. ^a	310
<i>Broncopneumonía.</i> —Tratamiento causal.—Suero antiestreptocócico	133
Terapéutica sintomática.—Indicaciones que deben cumplirse: 1. ^a , modificar el estado pulmonar.—Agentes farmacológicos	

	<u>Págs.</u>
indicados.—Amoniacaes: acción de dichos medicamentos.—	
Expectorantes: enumeración de los más usados	134
Indicaciones de la ipecacuana	134
Idem de los antisépticos pulmonares	134
Idem de los yoduros	134
Idem de los balsámicos	134
2. ^a indicación: sostener las energías cardíacas.—Cardiotónicos.—	
Alcohol	134
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados	134
Digital, yoduro sódico y amoniacaes para sostener las energías cardíacas y tratar el proceso pulmonar. . . . fórmula 1. ^a	134
Carbonato de guayacol para cumplir la última indicación. fórmula 2. ^a	134
Purgantes salinos para vencer el estreñimiento. fórmulas 1. ^a y 2. ^a	135
Purgantes oleosos para cumplir la misma indicación. fórmula 1. ^a	136
Podofilino y áloes para continuar la acción purgante. fórmula 3. ^a	136
Resultados obtenidos.—Terminación de la enfermedad por curación.—Regularización del funcionalismo intestinal.	
<i>Enfisema pulmonar</i> — Medicamentos empleados para tratarle. fórmula 3. ^a	381
<i>Tuberculosis pulmonar</i> .—Recursos terapéuticos que pueden emplearse:	
1. ^o Medios de tonificación del organismo: sobrealimentación.—	
Substancias alimenticias que deben constituir la preferente- mente párrafo 6. ^o	32
Indicaciones especiales de las grasas párrafo 6. ^o	32
Contraindicaciones de la sobrealimentación	33
2. ^o Medios de esterilización de la colonia bacilar.—Indicaciones de la creosota, creosotal, guayacol, yodoformo, ácido fé- nico, ácido tímico y demás antisépticos pulmonares. párrafo 4. ^o	33
Vías por las cuales pueden ser administrados los antisépticos pulmonares. párrafo 4. ^o	33
Administración de dichas substancias por la vía gástrica.—In- convenientes	33
Idem por la vía hipodérmica.	33
Idem por la vía cutánea	33
Idem por la vía rectal párrafo 4. ^o	33
Aeroterapia.—Prudencia que exigen las curas de aire	33
<i>Tratamiento farmacológico de la tuberculosis pulmonar en sus tres periodos: Primer periodo</i> .—Tratamiento empleado. fórmulas 3. ^a y 4. ^a	191
<i>Tratamiento de la tuberculosis pulmonar de segundo y tercer perio-</i>	

	<u>Págs.</u>
<i>do.</i> —Plan farmacológico establecido.—Enumeración de los medicamentos empleados é indicaciones de los mismos.—Acido tímico asociado á la terpina fórmula 2. ^a	12
Carbonato de guayacol para combatir el elemento causal. fórmula 1. ^a	76
Yodoformo para cumplir las mismas indicaciones . fórmula 1. ^a	78
Creosota para ídem fórmula 3. ^a	77
Creosotal para ídem fórmula 8. ^a	365
Acido fénico para ídem fórmula 1. ^a	78
Carbonato de guayacol para ídem fórmula 5. ^a	365
Benzoato de guayacol para ídem fórmula 11	366
Necesidad de que estén regularizadas las vías digestivas para administrar los antisépticos pulmonares por la vía gástrica.	78 y 79
Tratamiento farmacológico de algunos síntomas de la tuberculosis pulmonar.— <i>Diarrea</i> fórmula 1. ^a	11 y 12
<i>Adinamia.</i> —Medicamentos empleados. fórmula 3. ^a , pág. 14; fórmula 1. ^a , pág. 15; fórmula 1. ^a , pág. 16.	
<i>Tos.</i> —Ídem fórmula 4. ^a	79
<i>Fiebre.</i> —Indicaciones de la quinina. fórmula 1. ^a y 3. ^a	77
Ídem de la antipirina fórmula 2. ^a	77
Manera de administrar dichas sustancias.	77
<i>Tratamiento de los sudores de los tísicos.</i> —Indicaciones de la atropina fórmula 3. ^a	75
Contraindicaciones de la atropina párrafo 5. ^o	325
Indicaciones del agárico y agaricina. fórmula 3. ^a , pág. 325, y fórmula 5. ^a , pág. 382.	
Empleo de la cocaína en el tratamiento de la <i>disfagia</i> sintomática de la laringitis tuberculosa fórmula 3. ^a	12
<i>Tratamiento general de la hemoptisis.</i> —Medicamentos empleados: ergotina, ratania fórmula 1. ^a	369
Hamamelis virgínica. fórmula 4. ^a	370
Enfermedades de las pleuras. — <i>Pleuresia exudativa.</i> —Tratamiento médico.—Régimen alimenticio párrafo 4. ^o	188
Tratamiento quirúrgico.—Indicaciones de la toracentesis. párrafo 4. ^o	188
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos prescritos.—Digital asociada á la cafeína para favorecer la energía contráctil cardíaca . fórmula 1. ^a	189
Cafeína como tónico cardíaco y acetato potásico para favorecer la diuresis fórmulas 2. ^a y 3. ^a	180
Morfina y éter en inyecciones hipodérmicas para combatir la disnea sobrevenida consecutivamente á la toracentesis. párrafo 4. ^o	189

	<u>Págs.</u>
Pilocarpina en inyecciones hipodérmicas para favorecer la diaforesis y la reabsorción del exudado pleural. . . fórmula 1. ^a	190
Jaborandi asociado al espíritu de Minderero para continuar la acción diaforética fórmula 2. ^a	190
Infusión de violetas y acetato amónico para cumplir la misma indicación fórmula 3. ^a	190
Yoduro sódico y diuréticos para favorecer la reabsorción del exudado pleural fórmula 4. ^a	190
Tintura de álces compuesta asociada á la de angustura y de ruibarbo para combatir el estreñimiento y la inapetencia. fórmula 2. ^a	191
Resultados obtenidos:	
Enfermedades de los riñones.—Nefritis parenquimatosa aguda.—	
Tratamiento farmacológico empleado	376 y 377
Nefritis parenquimatosa crónica.—Dietética.—Reposo absoluto. párrafo 1.^o	
	65
Dieta láctea: su importancia. párrafo 1. ^o	65
Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de los preparados de estroncio, fosfato sódico, preparados de litio, cloruro de sodio, fuschina, compuestos tánicos, etc. párrafo 2. ^o	
	65
Indicaciones de los tónicos cardíacos. párrafo 4. ^o	65
Vías de eliminación de los productos tóxicos.—Vía renal: indicaciones y contraindicaciones de los diuréticos. . párrafo 4. ^o	
	65
Vía intestinal: purgantes párrafo 2. ^o	67
Vía cutánea: diaforéticos	66
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados:	
Acetato potásico para favorecer la diuresis . . . fórmula 1. ^a	65
Jaborandi asociado al clorhidrato amónico, á la polígala y á la esparteína, para favorecer la eliminación de productos tóxicos por la vía cutánea y tratar el proceso pulmonar. fórmula 1. ^a	66
Teobromina para favorecer la diuresis. fórmula 3. ^a , pág. 67; y fórmula 2. ^a , pág. 68.	
Purgantes para favorecer la eliminación de productos tóxicos por la vía intestinal 67 y 69	
Aguardiente alemán. fórmula 4. ^a	67
Aceite ricino » 5. ^a	67
Poción angélica » 2. ^a	69
Cafeína asociada al espíritu de Minderero y tintura de árnica para estimular los centros nerviosos y sostener la energía contráctil cardíaca.	69
Resultados obtenidos:	

	Págs.
<i>Uremia de forma disneica.</i> —Tratamiento empleado. fórmula 1. ^a	66
<i>Uremia de forma cerebral, tipo comatoso.</i> —Tratamiento empleado	68 y 69
Enfermedades de la médula. — <i>Meningomielitis.</i> —Tratamiento empleado. fórmula 2. ^a , pág. 369; fórmula 9, pág. 379; y fórmula 10. ^a , pág. 380.	
<i>Ataxia locomotriz progresiva.</i> —Tratamiento causal.—Enumeración de los medicamentos más empleados para combatir dicha enfermedad.	217
Agentes terapéuticos de orden físico: hidroterapia, electroterapia, suspensión del raquis	217
<i>Tratamiento de los síntomas.</i> — <i>Dolor.</i>	
Indicaciones de la morfina, antipirina, fenacetina, acetanilina	217
Idem del salicilato sódico, hiosciamina, sulfonal y trional	218
Tópicos: revulsivos	218
Pulverizaciones de éter y cloruro de metilo	218
Ventajas é inconvenientes de la morfina	217
Indicaciones del masaje y de la hidroterapia.	218
Tratamiento de la anestesia:	
Enumeración de los medios terapéuticos más empleados	218
Tratamiento de la incoordinación de los movimientos.	218
En qué consiste la reeducación progresiva de los movimientos. párrafo 2. ^o	218
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados fórmula 1. ^a	218
Tintura de yodo.—Evonimina y ruibarbo para combatir el estreñimiento. fórmula 2. ^a	218
Guasina para combatir la inapetencia: preparados mercuriales para tratar la ataxia substituyendo á los yódicos que no han sido tolerados.	218
Belladona y lactato de bismuto para combatir la gastralgia. fórmula 2. ^a	219
Purgantes para excitar el peristaltismo intestinal y favorecer la eliminación del mercurio fórmula 3. ^a	219
Yoduro sódico para cumplir las mismas indicaciones de los preparados yódicos anteriormente prescritos . . . fórmula 4. ^a	220
Bromuro sódico para combatir los dolores fulgurantes. fórmulas 1. ^a y 2. ^a	220
Preparados de plata para cumplir las mismas indicaciones que los yódicos y mercuriales. fórmula 1. ^a	221
Clorhidrato de morfina para combatir los dolores fulgurantes. fórmula 3. ^a	221

	<u>Págs.</u>
Bicarbonato sódico y tintura de badiana para tratar una dispepsia flatulenta	fórmula 1. ^a 222
Infusión de sen y manito para vencer el estreñimiento. » 2. ^a	223
Perlas de aceite fosforado para tratar la ataxia. » 3. ^a	223
Preparados de oro para cumplir las mismas indicaciones. fórmula 3. ^a	224
Resultados del tratamiento empleado.	
<i>Histerismo</i> .—Tratamiento psicológico	párrafo 1. ^o 277
Inconvenientes de los exclusivismos exagerados	párrafo 2. ^o 277
Consideraciones sobre la psicoterapia aplicada al tratamiento del histerismo.	277 y 278
Dificultades para establecer un tratamiento causal de la histeria.	278
Tratamiento de Weir-Mitchell	278
Terapéutica clásica del histerismo.—Aislamiento.—Sanatorios. párrafo 1. ^o	278
Sugestión hipnótica	párrafo 2. ^o 278
Sugestión en estado de vigilia	párrafo 3. ^o 278
Metaloterapia: principales metales empleados	279
Aplicación de imanes y maderas	párrafo 1. ^o 279
Hidroterapia	párrafo 2. ^o 279
Masoterapia	párrafo 3. ^o 279
Electroterapia.	párrafo 4. ^o 279
Tratamiento farmacológico.—Enumeración de las principales sustancias empleadas en el tratamiento de la histeria. párrafo 5. ^o	279
<i>Tratamiento sintomático</i> .—Ataques: diversos medios empleados.—	
Compresión ovárica.	279
Idem de las zonas espasmógenas	279
Inyecciones de morfina.	279
Idem de agua	279
Electricidad.	párrafo 7. ^o 279
<i>Tratamiento de las parálisis de origen histérico</i>	279
<i>Idem de las contracturas</i>	párrafo 1. ^o 280
<i>Idem de la anorexia</i>	párrafo 2. ^o 280
<i>Idem del insomnio</i>	párrafo 7. ^o 279
Plan farmacológico establecido	28 y siguientes.
Resultados obtenidos:	
<i>Epilepsia</i> .—Indicaciones terapéuticas: 1. ^a , evitar los estímulos.—	
Manera de cumplir esta indicación	párrafo 4. ^o 260
Necesidad de regularizar el funcionalismo digestivo para evitar la acción de estímulos de orden físico y químico	260 y 261
<i>Dietética</i> .—Régimen alimenticio.—Cantidad y calidad de las sustancias alimenticias.	
	párrafo 3. ^o 261
Consecuencias de la alimentación superabundante y la deficiente.	261

	Págs.
Necesidad de regularizar las funciones de la glándula hepática y del emunctorio renal, para evitar la acción de estímulos de orden químico. párrafo 4.º y 5.º	261
Necesidad de evitar los estímulos de orden psíquico. párrafo 6.º	261
Necesidad de tratar las enfermedades del aparato respiratorio.— Consecuencias de la oxigenación imperfecta de la sangre. párrafo 1.º	262
2.ª indicación: agentes farmacológicos indicados para disminuir la excitabilidad de las células de la sustancia gris de la corteza cerebral párrafo 3.º	262
3.ª indicación: modificar el estado de organización nerviosa.— Tónicos del sistema nervioso.—Enumeración de los principales párrafo 2.º	262
El sueño en el tratamiento de la epilepsia	263
Clima preferible párrafo 3.º	263
Medicaciones empíricas.—Enumeración de los principales agentes medicamentosos recomendados en el tratamiento de la epilepsia. párrafo 4.º	263
Agentes de orden físico	263
Indicaciones especiales de la cannabis indica y de la estricnina. párrafo 3.º	263
Tratamiento quirúrgico de la epilepsia.	260
Plan farmacológico establecido.	265
<i>Tratamiento de la neuralgia en general.</i> —Indicaciones de los narcóticos y analgésicos.—Enumeración de los más empleados.— Tratamiento local	285
<i>Neuralgia del trigémino.</i> —Tratamiento empleado	306 y siguientes.
<i>Neuralgia intercostal.</i> —Tratamiento empleado	331
<i>Neuralgia del plexo braquial.</i> —Tratamiento empleado. párrafo 4.º	282
<i>Espasmo de la glotis.</i> —Indicaciones de los bromuros	163
Idem de los narcóticos	163
Idem de la traqueotomía párrafo 3.º	163
Tratamiento empleado. fórmula 1.ª	163
 Enfermedades de la sangre. — <i>Cloroanemia.</i> —Tratamiento empleado.—Lactato ferroso asociado á la nuez vómica y áloes para combatir simultáneamente el estreñimiento y la clorosis. fórmula 1.ª	335
Sulfato ferroso para cohibir las hemorragias y tratar la enfermedad. fórmula 2.ª	335
Carbonato ferroso fórmula 1.ª	371
Pirofosfato de hierro. » 2.ª	371
Oxalato ferroso » 3.ª	371

	<u>Págs.</u>
Hierro reducido por el hidrógeno	fórmula 4. ^a 372
Tartrato férrico potásico	371 y 372
Arseniato de hierro	fórmula 1. ^a 199
Albuminato de hierro	» 2. ^a 311
<i>Púrpura hemorrágica.</i> —Indicaciones de los isquémicos y astrin- gentes.—Enumeración de los más recomendados	206
Tratamiento empleado	fórmula 4. ^a 206
Enfermedades de la nutrición. — <i>Polisarcia.</i> —Indicaciones tera- péuticas: 1. ^a , disminuir la producción de la grasa.—Manera de cumplir esta indicación	párrafo 4. ^o 339
Plan bromatológico; disminución de los hidrocarbonados; ídem de la cantidad de agua	párrafo 5. ^o 339
Proscripción del café	párrafo 5. ^o 339
Régimen alimenticio á base de carnes	párrafo 6. ^o 339
Necesidad de abandonar los exclusivismos exagerados	339
2. ^a indicación: favorecer la oxidación de la grasa formada en ex- ceso.—Ejercicios musculares	párrafo 7. ^o 339
Agentes farmacológicos.—Indicaciones de la tiroidina. párrafo 7. ^o	339
Ídem de los yoduros.	párrafo 7. ^o 339
3. ^a indicación: aumentar las energías cardíacas.—Indicaciones de los cardiotónicos.	fórmula 1. ^a 349 y 340
Tratamiento empleado.—Yoduro sódico.	fórmula 1. ^a 339
Tiroidina.	» 2. ^a 339
Estimulantes y tónicos cardíacos para aumentar las energías car- díacas.	340 y 341
<i>Diabetes sacarina.</i> —Indicaciones terapéuticas: 1. ^a , disminuir la producción del azúcar.—Manera de cumplir esta indicación: régimen alimenticio; substancias que deben ser permitidas y substancias que deben ser excluidas de la alimentación del diabético	196
2. ^a indicación: favorecer la oxidación del azúcar.—Indicaciones del masaje	párrafo 3. ^o 197
Indicaciones de la gimnasia	197
Inconvenientes de los ejercicios musculares exagerados cuando la diabetes se acompaña de enflaquecimiento	197
Higiene de la piel.	197
Tratamiento farmacológico.—Indicaciones de la opoterapia. pá- rrafo 2. ^o	196
Ídem de los alcalinos	párrafo 5. ^o 197
Indicaciones y contraindicaciones de los bromuros.	198
Tratamiento sintomático.—Indicaciones del opio y sus alcaloides.	198
Ídem de la valeriana y de la antipirina	párrafo 5. ^o 197

	<u>Págs.</u>
Idem de los preparados de hierro	198
Idem del aceite de hígado de bacalao	198
Idem del arsénico.	198
Peligros de las intervenciones quirúrgicas.—Régimen alimenticio y plan farmacológico establecido	198 y 199
Enfermedades infecciosas.—Infección grippal. —Enumeración de los principales medicamentos recomendados en el tratamien- to de dicha enfermedad	139
Tratamiento empleado.—Medicación purgante para tratar el ca- tarro gástrico fórmula 1. ^a	139
Expectorantes para tratar el catarro bronquial » 2. ^a	139
Eupépticos y fermentos gástricos para favorecer las digestio- nes. fórmula 1. ^a	140
<i>Erisipela.</i> —Indicaciones terapéuticas.—Método expectante. . .	179
Tratamiento general. párrafo 1. ^o	180
Tratamiento local.—Enumeración de los principales tópicos que han sido recomendados	180
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados.—Calomelanos al vapor y resor- cina para verificar la antiseptia del tubo digestivo. fór- mula 1. ^a y 2. ^a	180
Ácido fénico y timol, tópicos antisépticos . . . fórmula 1. ^a y 2. ^a	181
Espíritu de Minderero asociado á la tintura de paulinia, para es- timular los centros nerviosos cerebrales . . . fórmula 3. ^a	181
Benzonaftol para continuar la acción antiséptica del tubo diges- tivo fórmula 4. ^a	181
Yoduro potásico para tratar el lupus. » 1. ^a	182
Resorcina, como tópico antiséptico	183
Bitartrato potásico para vencer el estreñimiento . . párrafo 1. ^o	183
Yoduro de estroncio como sucedáneo del potásico para evitar la irritación del riñón fórmula 3. ^a	183
<i>Paludismo.</i> —Régimen dietético. párrafo 3. ^o	158
Enumeración de los principales medicamentos recomendados en el tratamiento del paludismo párrafo 5. ^o	158
Quinina.—Preceptos que deben tenerse en cuenta al adminis- trarla párrafo 3. ^o	158
Indicaciones especiales del arsénico » 5. ^o	158
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados.—Clorhidrosulfato de quinina para cumplir las indicaciones generales de las sales quíni- cas. fórmula 1. ^a y 2. ^a	159
Bisulfato de quinina para ídem fórmula 4. ^a	159

	<u>Págs.</u>
Clorhidrato de quinina asociado al opio para evitar la acción irritante de aquel medicamento sobre el tubo digestivo. fórmula 3. ^a	59
Licor de Fowler fórmula 4. ^a	59
Resultados obtenidos:	
<i>Reumatismo articular agudo.</i> —Tratamiento dietético	203
Tratamiento farmacológico.—Salicilato sódico y ácido salicílico. —Acción de dichas substancias en el reumatismo articular agudo y en la endocarditis reumática fórmula 1. ^a	203
Indicaciones del nitrato potásico, veratrina, colchicina, aconitina	203
Idem de la salipirina, salofeno y salol	203
Idem de la antipirina, fenacetina, exalgina, antifebrina	203
Indicaciones especiales de los yoduros	203
Idem de las sales quínicas párrafo 2. ^o	203
Tratamiento local de las artropatías.	203
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados.—Salicilato sódico y tintura de cólchico para tratar el reumatismo. fórmula 1. ^a y 2. ^a , pág. 204; fórmula 1. ^a , pág. 205.	
Benzonaftol asociado al carbonato de magnesia para oponerse al estreñimiento y verificar la antiseptis del tubo digestivo. fórmula 3. ^a	204
Calomelanos al vapor, para cumplir las mismas indicaciones. fórmula 1. ^a	206
Quinina para aprovechar su acción antirreumática, antitérmica y tónica. fórmula 2. ^a	206
Agua de Rabel para combatir las complicaciones por parte del aparato circulatorio. fórmula 4. ^a	206
Esparteína, como tónico cardíaco » 4. ^a	206
Amoniacales y polígala para tratar complicaciones por parte del aparato respiratorio	207 y 208
Salicilato y anisato de quinina, para cumplir las mismas indicaciones que las sales quínicas anteriormente prescritas.—Ergotina y tintura de nuez de kola, para combatir los éxtasis de los vasos capilares y la tendencia congestiva pulmonar. fórmula 3. ^a	209
Medicación yodurada para resolver el proceso reumático. fórmula 3. ^a y 4. ^a	210
Resultados obtenidos:	
<i>Tétanos.</i> —Tratamiento causal.—Suero antitetánico	109
Enumeración de los principales agentes medicamentosos empleados en el tratamiento de dicha enfermedad	109
Indicaciones especiales del cloral.	109

	Págs.
Idem de los preparados de opio	409
Idem de la eserina párrafo 1. ^o	409
Balneación tibia.—Duración, intervalos de separación y temperatura de los baños párrafo 3. ^o	409
Plan farmacológico establecido.—Enumeración é indicaciones de los medicamentos empleados.—Hidrato de cloral asociado al clorhidrato de morfina, para vencer el espasmo muscular.	109 y 110
Extracto de opio para cumplir las mismas indicaciones.	111, 112 y 113
Sulfato de eserina para cumplir las mismas indicaciones. fórmula 3. ^a	113
Sulfato sódico y potásico para oponerse al estreñimiento. fórmula 4. ^a	114
Podofilino y cáscara sagrada para cumplir las mismas indicaciones. fórmula 2. ^a	112
<i>Blenorragia aguda</i> .—Indicaciones y contraindicaciones de los balsámicos	320
Tratamiento local.	320
Tratamiento de las <i>úlceras por decúbito</i>	311
Tratamiento de la <i>sarna</i>	164

