



OFTAL COLIRIO

ANTIBIÓTICO OCULAR
SOLUCIÓN OFTÁLMICA
REG. SAN: 2C1-18375-
AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 1ml contiene:

Ofloxacino 3 mg
Vehículo c.s.p. 1 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	INDICACIONES	DOSIS PRÁCTICA
 CANINOS	Infecciones bacterianas de la conjuntiva, la córnea y el segmento anterior.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado 4 veces por día, cada 6 horas, durante una semana o hasta que desaparezca la infección.
 FELINOS		
 EQUINOS	Úlceras superficiales sin complicaciones.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado 4 veces por día, cada 6 horas.
	Úlceras corneales donde la barrera epitelial esté ausente.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 1 a 2 horas.
	Queratitis bacteriana.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 1 a 2 horas.

INDICACIONES DE USO

OFTAL COLIRIO a base de ofloxacina, es un antibiótico de amplio espectro de la familia de las fluoroquinolonas, indicado para infecciones de la córnea, queratitis, conjuntivitis y otras afecciones que involucren presencia de bacterias resistentes a otros fármacos.

VÍA DE APLICACIÓN: Ocular

FARMACOCINÉTICA

Las fluoroquinolonas presentan excelentes propiedades de penetración en el epitelio y endotelio ocular debido a su bajo peso molecular y propiedades lipofílicas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Las fluoroquinolonas son agentes bactericidas que ejercen su efecto al inhibir la ADN-girasa y la topoisomera tipo IV bacterianas, lo que resulta en la interrupción de la replicación bacteriana.

Las fluoroquinolonas oftálmicas son principalmente útiles para las infecciones corneales por bacterias gramnegativas. No se recomiendan para uso profiláctico previo o posterior a una cirugía.



OFTAL COLIRIO

ANTIBIÓTICO OCULAR
SOLUCIÓN OFTÁLMICA
REG. SAN: 2C1-18375-
AGROCALIDAD



FÓRMULA

Cada 1ml contiene:

Ofloxacin	3 mg
Vehículo c.s.p.	1 ml

ESPECIES



DOSIS

DOSIFICACIÓN		
ESPECIE	INDICACIONES	DOSIS PRÁCTICA
 CANINOS	Infecciones bacterianas de la conjuntiva, la córnea y el segmento anterior.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado 4 veces por día, cada 6 horas, durante una semana o hasta que desaparezca la infección.
 FELINOS		
 EQUINOS	Úlceras superficiales sin complicaciones.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado 4 veces por día, cada 6 horas.
	Úlceras corneales donde la barrera epitelial esté ausente.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 1 a 2 horas.
	Queratitis bacteriana.	Aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 1 a 2 horas.

PRECAUCIONES - ADVERTENCIAS - CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso en otra especie que no sea la autorizada.

No administrar a pacientes con hipersensibilidad conocida a las quinolonas.

Exclusivo para uso oftálmico tópico.

Si el paciente recibe dos tipos distintos de fármacos por vía oftálmica y su administración coincide en el mismo período de tiempo, se debe esperar aproximadamente 5 minutos entre las aplicaciones de cada fármaco para que estos sean bien absorbidos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han reportado.

REACCIONES ADVERSAS

Ciertos posibles efectos adversos de las quinolonas incluyen: hiperemia conjuntival, mal gusto en cavidad oral, fotofobia, edema de párpado, queratitis y náusea.

Se ha registrado el desarrollo de reacciones alérgicas con el uso de quinolonas en preparaciones oftálmicas.

RETIRO

En caninos y felinos no aplica el tiempo de retiro.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Gotero x 5ml