 P A R A -
P H R A S I S I N N O .

NVM LIBRVM RHAZAE MEDICI ARA-
bis Clariss. ad Regem Almanforem, de
affectuum singularũ corporis par-
tium curatione, Andrea
Vvesalio Bruxellen-
si autore.

Le Vignon M.


Rerum ac uerborum in hoc opere memo-
rabilium diligentissimus
I N D E X.



71,827

B A S I L E A E ▶

1537.



1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

ORNATISSIMO
CLARISSIMOQUE VIRO D. NI-
colao Florenti, inuictis, CAROLI
Cesaris Medico peritissimo, Do-
mino suo & Patrono, An-
dreas Vvesalius Bru-
xellensis, S.



RECTE nimirum ueteres non pa-
rum interesse iudicauerunt, uir do-
ctissime, qua quis ratione in arti-
bus ac scientijs uersaretur, hoc est,
exactam ne in illis seruaret metho-
dum, & à primis ad secunda, ac sic deinceps ad pro-
ximè semper consequentia debito transfiret ordine:
an uero prout unumquodq; se casu obtulisset, ita
uel primum, uel secundum ab eo haberetur. Quod
cum tu minime ignorares, meq; aliquot ab hinc an-
nis, Medicinæ studio operam daturum intelligeres,
operæ precium fore duxisti, præclarissimam quan-
dam longeq; utilissimam studendi in arte Hyppo-
cratica mihi præscribere rationem: cui quidem sum-
ma, quæ potui, diligentia semper insistens mirum di-
ctu, quanto meo commodo, nullisq; adeò ambagi-
bus, ad

bus, ad eam tandem peruenerim Medicinæ partem, quæ curatiua dicta, cæteris (cum ob hanc & illæ discantur) tum præstantior est, tum ad usum longe etiam accommodatior. Atq; hic adeo multum mirari cœpi, communem nostri temporis plurimorum Medicorum in abigendis morbis rationem, tantum à Græcorum, doctissimorumq; hominum modo euariatam, ac Barbarorum Arabumq; perpetuo (propè dixerim) uestigijs tam pertinaciter inhærentem. Vnde nec abs re fore duxi, ne quid illorum omnino nos fugiat, unâ cum Græcis (quos tuo exquisitissimo iudicio semper præferre consueuisti) Arabes quoq; hac in parte paulo diligentius conferre. Hanc etiam rationem excellentissimi PARISIENSIS MEDICI suis tyronibus plurimum commendauerunt, sic fore sperantes, ut propediem uetus illa, & ab Hippocrate autore profecta iatruum, magna cum mortalium utilitate prorsus reuocata, passim uigeat, sumpto paulatim artem hanc exercitantium opera incremento. Cum igitur sic tuo & meorum clarissimorum præceptorum consilio obsequutus, Rhazēn ex alijs primum in manus sumpsissem, ac maiori cum studio ad Græcorum scripta, tanquã ad lapidem Lydiũ, examinassē (eum nanq; inter reliquos suæ gentis in curandi artificio primas tenere,

tenere, à præceptore meo D. IACOBO SYLVIO, eruditissimo sanè Medicæ artis professore subinde audieram) ita profecto placuit, ut dignum censerem, qui sordibus ereptus, & elegantiori latini sermonis cultu circumdatus, à delicatoris quoq; auris lectore reciperetur: maxime quod omnes ferè locales morbos in tam exiguo opusculo persecutus sit, quodq; non nisi in paucissimis à Græcorum decretis declinarit. Vt hinc etiam quidam adstruere sunt conati, hunc Rhaçæ librū è Græca in Arabicam conuersum linguam, ac sic deinceps Rhaçæ nomen illi præfixū. Sed manifestè reclamare uidentur tum incognita Græcis medicamina, tum ipse dictionis stylus et character, adeò horridus et incultus, quæ admodum est Arabum uniuersus, ut nihil omnino cum Græcorum illi concinnitate & elegantia conueniat: nec perinde facile aut in Græcū, aut in Latinum sermonem transfundi se sinat. Atq; hæc cogitanti mihi sæpius, in diuersa distractus est animus: nunc quidem ad hoc urgens, ut quod æquum iudicasset, id ipsum aggrederer: nunc uero rei difficultate perpensa, ab hoc ipso rursus deterrens. Nam præter ea quæ dicta etiam nunc sunt, non ne uel molestissimum est, tot medicaminum, aliarumq; uocum interpretationem ad susceptum negotiū omnino ne

cessariam addiscere? Siquidem pauca admodum in
 eius libri translatione remedia inuenias, quæ non
 uel uiciatè scripta, uel obscuris quibusdam, aut etiam
 Arabicis dictionibus appellata sint. Sed uicit tan-
 dem publica utilitas, priuato commodo (si modo la-
 borum fuga commodum dici mereatur) longe sem-
 per anteferenda. Neq; uero parum subsidiij pollice-
 ri uidebantur, qui difficillimæ simplicium medica-
 mentorũ scientiæ instaurationi incubuerunt. Quod
 fermè duodecim iam annos foelicissima quæq; medi-
 corum ingenia nec infeliciter tentarunt: ut perra-
 rus admodum alicuius nominis Medicus extiterit,
 qui nõ aliquid posteris, quod ad hanc scientiam per-
 tineret, relinquere sit conatus. Huc enim omnes tam
 nobis exoptandis sudoribus contendebant, ut uide-
 licet pharmacopolarum officinas Barbaris uocibus,
 ne dicam falsis pharmacis infertas, pristinae integri-
 tati restituerent. His igitur motus causis, atq; horum
 adeò exemplo, Rhaetæ uersionẽ castigare aggres-
 sus sum, ut & immenso labore cæteros medicinae
 candidatos liberarem, & ipse posthac autor ad ho-
 minũ manus emendatio perueniret, repurgatis non
 solum medicamentorũ Barbaris, Latinisq; auribus
 incognitis uocibus, sed tota etiam orationis serie in
 melius commutata, ut quæ prius squalida & inculta
 essent,

essent, nec propter obscuritatem percipi possent, nunc quatenus fieri possit, & res ipsa ferat, splendeant, minusq; adeo Lectori negotium exhibeant. Verum nec hic quidem (quod forte ab interprete desideraretur) uerbum semper uerbo reddere conatus sum: imò potius paraphrasten egi, liberè quæ ad rem necessaria iudicavi subinde adijciens: & quædam fusiore, quæ nimirum obscuriora uisa sunt, oratione explicans. Vnde etiam uereor, nostras lucubratiunculas à quorundam uilitigatorum morsibus tutas minime futuras, ut qui nihil à sua horrida barbarie emutatum enouatumq; uelint, nec quicquam quod ipsi nō didicerint, pensi habeant. Repertis enim frugibus, gladem defendunt: nec cum Gryllo in hominem redire uolunt ne aliquando fastuosa illorum inscitia, uulgo turpiter innotescat. Quocirca uir præstantissime, primum hunc iuuenilem conatum, tua nominis celebritate commendatum, editionis aleam subire uolui: utpote melius ita à calumnijs tutum fore sperans. Siquidem tuam singularem in Græcorum & Arabum scriptorum Medicinæ cognitionem, & raram ac inauditam philosophicarum rerum scientiam, reliquasq; præclaras animi tui dotes, tales alienæ uirtutis ofores reueriti, pristinae Hypocraticæ artis studiosorum conatibus male oblo-

EPISTOLA

qui ac detrahere desinent. Tibi autem eum debeo,
 quod summus ad medicinam, & ad alias meliores di-
 sciplinas, mihi autor extiteris: nec adhuc cesses, sub
 inde me doctissimis tuis literis ad ea studia incitare,
 tuoq; patrocinio (quo ubiq; plurimum uales) apud
 alios prouehere. Rogo itaq; ut hoc meorum studio-
 rum præludium, hilari atq; exporrecta fronte, con-
 tra istos male feriatos defendendum suscipias, ac per
 ocium quid in eo præstiterim uideas, donec maiora,
 & tuæ excellenti doctrinæ digniora parauero. Va-
 le, Medicorū omnium decus: & nostro Imperatori

Augustiss. CAROLO, quo hoc præsertim
 tempore carere orbis Christianus
 non potest, diu feliciterq; ui-
 uito. Bruxellis, Cal.

Febru. Anno

1537.

RERVM AC VERBORVM

RVM HOC OPERE

memorabilium

INDEX.

A



	Brota- nū. 189	Ani scissuris ac fistulis medentia 190
	Aceti in dētium	Anginæ curatio. 97.99
	dolori- bus pe-	Apoplexiæ signa 13 à sanguinis copia. eo. à pituitoso humore. 14
ftis.	84	Aqua oculi 64
Acetosa herba	126	Aquæ intercutē origo 182. eiusdem curatio 142.
Acetum neruis inimi- cum	213	Armenij lapidis pul- uis 165
Albugo oculo inna- ta.	52	Arquati curatio 142
Alchitra	152	Articulorū tophi. 214. 215
Amplexicaulis herba. 137		Ascārides qui, & contra eos medicamē. 189. 190
Anacardina cōfectio. 19		Ἀσκήτης hydrops, eiusq; curatio 142. 145
Anacardinū mel. 20. 99		Afininum lac 84
ἀνασάρκα hydropis spe- cies, eiusq; curatio. 145		Affa arbor 29. 125
ἄγκυλόγλωσσος	96	Ἄθμα 102
Ani fistulæ 195. 196		Auditorio meatui si- a s quid
Ani prōcidentia 198		

I N D E X.

quid inciderit, quomodo euellendū. 76	ctus	107
A uditus grauitas ex for-	Βλιφαρόφυτον	55
dibus. 73. à crudis hu-	Blitum	177
moribus. 74. ex ficci-	Bombyx cruda	115
tate. 75. ab expurgato	Burungium	189
humore per crism.	Brassica capitata	28
eodem.	C	
A uripigmentum 57	C æcitas nocturna	
A uris ulcus 72	65.	
A urium cera 73. 74	C ali	173
A uriū dolor ex inflam-	C allonymus piscis	65
matione. 69. à crassis	C ameli urinæ usus	82
uiscosisq; humori-	C ancer in naribus à po-	
bis. 70. ex flatuoso	lypo diuersus	81
spiritu 71	C ancer uulvæ	202
A urium sonitus ac tinni-	C andentis sili usus in	
tus 72	dentium doloribus. 86	
A urium uermes 76	C aninus appetitus ab	
B	acido succo. 135. ab im-	
B Alaninum oleum. 131	modica transpiratione,	
Βάλακον 97	aut calido succo.	
B een incognitæ uete-	136.	
ribus radices. 38	C annabis, siue canabit.	
Βελιγδόν globuli 100	28.	
B ilem atram gignentis	C apitis dolor ex fan-	
cibi qui 34	guine. 1. ob bilis co-	
B ilem atram purgantia	piam. 2. ex pituita. 3. 7	
catapotia 37	ex uentriculi uitio. 7.	
B irsen thoracis affe-	ex insolatu 7.	
	ad Capitis feruidum cru-	
	ciatum	

I N D E X.

ciatum emplastrū . 5.	Cholera morbus	115
ad frigidum	6	Κιολάμπιλθ 87
Catapotia ad uentrē de	Coccia catapotia	3.5
ijciendum	159	κόκκιθ eodem, & 4.
Catapotia de hermoda	Cœliacus ex iocinoris	
ctylis	2 13	obstructione, &c. 163
Catapotia ex bdellio.	ex uentriculi & gracī	
193.164	lium intestinorum ui	
Catapotia ex rheobar-	tio	163
baro seni	143	κόλλιθ, eiusq; curatio.
Catapotia purgandæ bi	149.	
lis atræ	37	Colicus ex flatu. 152. à bi
Catapotiorum coccio-	liosō humore	155
rum compositio	4	Colicus ex sanguine
Catapotiorum ex aloë	156	
compositio	4	Columellæ curatio. 90
Catapotiorum fetido-	Collyrium album. 44.	
rum compositio	18	46.
Catarrhus siue destilla-	Collyrium de cerussa	
tio ex frigido aëre. 39	185.	
cū calida intēperie. 40	Collyriū Eleyfier. 49. 51	
Cathera	174	Collyrium ex æris flo-
Cazi electuarium	164	re. 57
Cera aurium	34. 37	Collyrium ex fellibus.
Cerussa albū Rasis. 222	61. 64. 65.	
de Cerussa collyriū.	185	Collyrium ex plumbo.
Charta babylonica	168	49. 50.
Cheieri, uiolæ luteæ. 223	Collyrium ex thure. 50	
Χίμοσις	61	Collyrium polychre-
Cherua .	19	ston 51.
		Collyrium

I N D E X.

Collyrium rubrum. 54.			
uiride	55.57		
Comitialis morbus. 25			
ex obstructione. eod.			
per cōsortium. 26. ex			
uentriculi uitio. 27. ex			
cerebri pituita. 28. ex			
sanguinis copia. eod-			
dem.			
Comitialis morbi cum			
ephialte consortiū. 30			
Condylomata	192		
Congelati qui	17		
Conuulsio oris	23		
Conuulsio, quæ <i>ακρωμύς</i>			
Græcis. 24	(119.		
Coraceus bolus	118.	<i>Διαβήτης</i>	186
Cordis palpitatio. 113. ex			
calore. eodem. à frigi			
da causa	114		
<i>κίρρυα</i>	42		
Costinum oleum	19		
Cotoneorum malorū			
pharmacum.	124		
Crocus orientalis.	45		
Cyrenæicus liquor. 29.			
sive Cyrenæicus suc-			
cus	86		
Cubebæ quid. 114. 115. 119			
Cuscuta herba.	137		
		D	
		Damnocochia	176
		Dentes eradicantia &	
		confringentia medi-	
		camenta	87.
		Dentium dolor, ex in-	
		flammatione. 84. ex	
		frigidi humoris afflu	
		xu	85
		Dentiū refriktioni me-	
		dentia	88
		Dentiū stupori meden-	
		tia	88
		Destillatio siue Catar-	
		rhus ex frigido aëre	
			39.
		<i>Διαβήτης</i>	186
		Diacalaminthæ electu-	
		arium	163
		Diacydonium	124.
		Diamoschi cōfectio. 107	
		Diarrhæa ex bilis co-	
		pia	164
		Diomedææ aues.	27
		Dysenteria, eiusq; cu-	
		ratio	169
		E	
		Ebur combustum pro	
		spodio	112
		Electuarium Cazi	164
		Electua-	

I N D E X.

Electuarium de styra- ce	167	descriptio	38
Electuariū diacalamin- thes	163	Expuitionis cruentæ ac purulentæ cura- tio	109
Electuarium ex baccis lauri	153	Extremarum partiū do- lores	222
Electuarium ex cumi- no	122	F	
Electuarium ex gallia moschata	149	F erri stercoris compo- sitis, 123. siue ex ferri stercore cōfectio. 192	
Electuariū Exhilarans dictum, eiusq; descri- ptio. 38. & usus. 39		Filicula	33. 38. 211
Electuarium ex thu- re	162	Filtrum	148
Electuaria sub antidoti nomine	153	Fistulæ ani	195. 196
Eleiser collyrium. 49. 51		Fistulæ angulorum ocu- li maiores	67
Elephantiæ curatio. 220		G	
Emplastrū de spica. 139		G alliæ moschatæ cōfe- ctio	5
Ἐπιληψία	25	Galliæ moschatæ	150
Ἐπιόληθ	30	Gibbi incipientis cura- tio	218
Ephialtæ cum comi- tiali morbo confor- tium	30	Gingiuarum dolor. 84	
Epithema ad uentris profluuium	169	Gingiuarum sanguine humentium cura- tio	89
Epithymi decoctum. 33		Grauedo, eiusq; cura- tio	42
Ἐχάρα	79	Gurgulionis laxatio, si- ue procidentia. 90	
Exhilarantis electuarij		Gutturi inhærentiū de- pulsio	

I N D E X.

pulsio	91.92	gida	138
H		Iocinoris inflammatio-	
Halcyonium	35	nis abscessus ue cura	
<i>Ἁλκυονίς</i>	105	tio	140
Hæmorrhoides	190	Iozulapon	41
Hellebori usus ad ster-		Iuiubæ	40
nutationes	23	Iuleb uiolatum	33.41
Herbæ refrigerantes.	48	K	
<i>ἕρπιδες</i> hydropis speci-		Kanabel	189
es, eiusq; curatio.	145.	Kebekengi	87
Hyrudinum gutturi in-		L	
hærentiū curatio.	91	Lac acidum, lac scif-	
Humeralis uena que.	44	sum	166.187
Hydromel ad colicos		Lactis muliebris usus.	35
dolores ex flatib.	157	Lacca.	139. (44.60.
<i>ἕρπιδες</i> , aqua intercutē.	142	Lachrymis oculorū cu-	
I		randis quæ faciant.	
<i>ἰκτερός</i>	140	58.59.	
<i>ἰλιός</i> , a frigido humore,		Laconicum prima bal-	
eiusq; curatio.	149	nei domus. 7.22.71.	86
Incubo ex obstructione		Lactaria herba	87
30. ex sanguine. 31. a		Lapidis in uesica sectio	
pituitę copia. eodem.		178.	
Insolatus	7	Lapidi in uesicę cerui-	
Intestini plenioris & te-		ce hærenti quomodo	
nioris morbi	149	medendum	174
Iocinoris dolor ex in-		Laserpitium	86
temperie, aut humo-		Lateralis dolor	104
re calido. 136. ab intē-		<i>λευκίτις</i>	166
perie, aut materia fri		Lepidion	18
		Lethargo	

I N D E X.

Lethargo cōferentia. 16	Lumborum rubor siue
<i>διουκοφλιγματία</i> 145	exulceratio 228
Lienis dolor ex inflam-	M
matione. 147. à frigi-	M <i>αλαβαθρομ</i> 115
do humore. 148. ex	<i>M</i> āna, melaërium
flatu. eodem.	41. 44. 98
Liēteria à calido humo-	Massacumia 53
re 160	Medicamē acre. 194. 196
Lienteria à cœliaco affe-	Mel aërium, manna. 41.
ctū quid differat 161	44. 98.
Lienteria à crudo & fri-	Melancholia ex propio-
gido succo 161	cerebri affectu 35
Lienteria ex naturaliū	Melancholia naturalis
facultatū imbecilli	& sanguinea 36
tate. 162	Melancholiæ iaitium. 31
Lingūę obleso sensui ac	perfectio 32
deficienti motui quo	Melancholiæ per con-
modo succurrēdum.	sortium curatio 32
94.	Melancholiæ tribus spe-
Lingūę pustularum cu-	cieb. coīa quæ. 36
ratio 97	Menstrua quomodo si-
Lingūę tumor 96. 97	stenda. 199. quomo-
Lingūę ulcera 88	do cienda. 200. (80.
Linimenti ad ophthal-	Mestezeberegī unguētū
miam descriptio. 45	Mingentibus pus quæ
Linodera herba 137	conducant 180. 183
Lippitudo, <i>ὀφθαλμία</i> 43	Miua 124
Lucij piscis fel 65	Mixæ 40
Lūbricis in ano aut uen-	Molæ uteri curatio. 206
tre natis quę adhibē-	<i>μολίβδα χυλόε</i> 202
da 183	Muraba 100

I N D E X.

N		Oculorū uibices, & cru-
N ardini olei confe-		entæ suffusiones. 58
ctio. 131		Oculorum unguis. 56
N arium crustæ ac ulce-		Oculis incidentia quo-
ra 79		modo educenda 51
N ariū polypus, siue sar-		Ocymi maioris suc-
coma. 80. cancer. 81.		cus 78
N emen 134		Oesipus 201
N eruorum resolutio. 17		ὀϊδίματα 145
N igellæ usus 82		in Oesophagum prola-
κονταλάφ 65		psorum remedia. 93
O		Oleum scorpionū. 177.
O culi abscessus si-		Olfaciendi facultas ob-
gna 47		læsa. 82. eiusdem resti-
O culi angulorū fistulæ		tutio 83.
maiores 76		ὀφθαλμία 43
O culi humiditati cōdu-		Oris distortio, siue con-
cens puluis. 60		uulsio, ob pituitæ in-
O culi inflammationis		farcionem. 23. ex sic-
nondum suppuran-		citare 24
tis curatio. 48. item		Oris ulcera 88
iam suppurantis, &		P
ulceris curatio. eodē.		P alleatæ curatiōes. 197
O culi suffusio. 62. siue a-		P alpebrarum pili o-
qua 64		culos iritantes. 61. (54
O culi album 47		P alpebrarum scabries
O culorum anguli ca-		P alpebrarum tumor. 61
runculis pruritu ue-		παράλυσις. 17. à pituita. eo-
xatis laborantes. 55		dem. ab extrema cau-
O culorum ulcera. 47		sa. 20. ex humoris ob-
		confusio-

I N D E X.

cōfusione influxu. 21.	Phrenitidis incipientis
Pastilli de balauftijs. 166	indicia. 109
Pastilli de caparibus.	φλοιός 111
148.	Pillulæ bechicæ 100
Pastilli ex acidæ spinæ	Pillulæ de raued 145
baccis. 137	Pillulæ ex styrace 102
Pastilli ex chamælea.	Piper calidum 18
143. 144.	Pituitam ducens phar-
Pastilli ex camphora.	macum 168
141.	πλευρίτις 104
Pastilli ex cancamo. 139	Pleuritidis nothæ cura-
Pastilli ex rheobarbo	tio 107
Seni 138	Podagræ, ac reliquorū
Pastilli ex rosis 120. 121	articul. morborū re-
Pastilli ex spica 132	media 210
Pastilli ex spodio, astringentes 165	Polychrestō collyrium.
Pastilli ex succino 183	51.
Pastilli ex thure 134	πολυκόσμιον 33. 38
Pastilli tenesmo dicati.	Polypus à cancro nariū
167.	diuersus 81
Pæoniæ radicis puluis	Polypi curatio 80
ad sternutationes 28	περὺσιον 56
περικνύμοσιον 108	Pulmonum inflamma-
Philonis Tarfei anody-	tio 108
non 155	Pulicaris herba 201
Philonium ileosis salu-	Puluis ad ducendū uen-
tare 155	trem 159
Phrenitis quando perfe-	Puluis Armenij lapidis
cta putanda 11	165
	Puluis citrinus. 46. al-
	b bus. eo-

I N D E X.

bus. eodem.		Ribes. 6. 160. ueteribus incognitum	96
Punicorum malorum puluis	163	Ricini fructus oleū.	158
Pupilla	66	S.	
Pupillæ dilatio, à ficitate .66. ab humoris copia. eod. à plaga. 67.		S Abot. piscis.	65
R		S Saccarum	38
Radicū decoctarū iuris preparatio	140.	Sacer morbus	25
ῥαγάδις, scissuræ	193	Sal Indicus	38
Ramech cōpositio.	90	Sandalum lignum ueteribus incognitum	5
Ramicum genera.	208	Sandalinū cerorum.	141
Ranarū uiridium usus	88.	Sanguinis à naribus profluuium	77
Ranulæ curatio	97	Sanguinis creatu aut uomitu eiectionis curatio	109
Ranunculus	87	Sanguinē aut pus mingentibus, quæ utilia	183.
Rasis album, cerussa.	222	Sapa	192
Regius morbus. 140. à meatuum obturatione	141	Sarcomatis narium curatio	80
Renum & uesicæ calculus	175	Saxifragia	176
Renum inflammatio	179. 181	Scabries palpebrarum	ῥαγάδις. 182. 54.
Renum Scirrhi curatio	181.	Scirrhi renū curatio.	181
Resina cedrina	152	Scirrhi uentriculi curatio	130
Rhob Arabibus quid	187	Scissuræ, ῥαγάδις	193
		Scorpionū cineres, eorumque	

rumiq; præparatio.	Splenis dolori remedia
176	147
Scorpionum oleum.	Spuma maris 53
177	Σταφνλιχαρτου 91
Σκυτόμικ 8	Sternutamenta 23.40
Σκύβαλον 152	Sternutationis reme-
Sebel 54.57	dium 135
Sebeste 40	Stomachicorum medi-
Secretorum liber falsò	camentorũ quæ cras-
Galeno inscriptus. 53	situdo esse debeat
Seitaragi 18	124
Sementina 189	Struthia 124
Seminum decoctũ. 158	Struthium ad sternuta-
Sericæ 40	tiones mouendas. 23
Singultientibus qua-	Stupor à frigido succo
re tumor incutiatur.	21
135.	de Styrace electuarium
Singultus à flatu & cru-	167
do succo. 133. ex sicci-	Succini usus 52
tate 134	de Succino pastilli 183
Sisimbrij semen 134	Suffusio oculorũ. 62.64
Sopor, ex cerebri pitui-	Sumen, eiusq; promi-
ta 16	nentia. 142
Σπασμός 24	Supini decubitus noxa
Spinachia herba 100.	40
177	Surditas unde 75
Spirandi difficultas. 102	Συνάγκη. 97. ex sanguinis
Spiritus compressione	copia. eod. à pituitoso
singultui ac sternuta-	succo 98
tioni succurri. 135	Syphon 174
	b 2 Syru-

I N D E X.

Syrupus acetosus	114	Tussis à caliditate & fic-
Syrupus acidus	99.	citate, 100. à pituitæ
Syrupus cotoneorū ma-		copia
lorum acetosus	125.	101.
T		ad Tussim, decoctū
Tabis curatio	111	40
Taguid avis	27	Tussis ex catarrho
Tamarind. inter medica-		41.
mina ueteribus inco-		sicca & humida, eod.
gnita	2	146
Telephion	173	<i>ΤΥΜΠΑΝΙΤΗΣ</i>
Tenesmus 167. à putri pi-		eiusdēq; curatio, eod.
tuita	169	V
Terra sigillata uera offi-		V Aricum curatio. 219
cinas nostras carere		V Vena humeralis. 44.
110. 111.		Ventriculi frigiditati cō-
Thapsia Indica	18	ducens electuarium
Theriaca ad dentiū do-		115.
lorem	86	Ventriculi imbecillitas,
Thoracis recremētis ei-		ob frigidam distem-
ciēdis medicamē. 104		periem
<i>ΤΙΒΟΥΜΑΛΘ ΜΥΡΤΙΤΗΣ</i>	87	120
Tophi articularū.	214.	Ventriculi œdema. 132
215.		Ventriculi oris dolor ac
Tremor ex frigido suc-		inflammatio. 127. ab-
co. 21. ex uino. eodē.		scessus
Tremoris præsidia eadē,		131
quæ stuporis	22	Ventriculi scirrhi cura-
Tunicula. 54. (es. 4.		tio
Turbit, tithymali speci-		130
		Ventris profluuij reme-
		dia
		160
		Vermiū in ano aut uen-
		tre nascentium origo
		188.
		Vertigo à sanguinis co-
		pia. 8. ob stomachi ui-
		tiumq; ex

I N D E X.

tium. 9. ex propria ce	pua medicamina.
rebri pituita 10	174.
Vesicæ calculi seu lapi-	Vrinam inuiti reddend-
dis signa 175	tes, quibus curandi.
Vesicæ inflammatio.	187.
179. 181	Vrinarij meatus, <i>δύρητις</i>
Violæ luteæ, cheieri 223	179
Violatum iuleb 33. 41	Vsne 173
Visus debilitas 59	Vteri exulceratio, absces-
Vitis morbi curatio.	sus & cancer 203
219.	Vteri mola 206
Vnguentū de sene. 194.	Vuæ laxatæ attollendæ
Vnguentū mordax. 80	ratio 91
Vnguenti viridis descri-	Vulsella 92
ptio 80	Vulvæ inflammatio 202
Vnguis oculorum 56	Vulvæ pro cidentia. 198.
Volubilis maior 87	199.
<i>δύρητις</i> 179	Vulvæ scissuræ. 201. siue
Vrinæ ardor 182	cancer 202. 203
Vrinæ difficultas à par-	Vulvæ strāgulatio. 204
tium debilitate. 170.	X
ab externa causa. 171.	Xylocaractæ 173
à corpore urinæ mea-	164.
tum obturante 172	Z
Vrinæ suppressæ preci-	Zulapon 177.

F I N I S.

RODOCVS VELSIVS

Hagiensis.

Nostros docta iuuant, placuerunt Barbara quondam,

Hoc Arabum dictat puluerulenta cohors.

Inter quos topici Rhazes medicaminis autor,

Emicat, excellens utilitate sua.

Sed malè quod uersus, patria cum gente legatur,

Displicet, at post hac gratior extiterit.


Quod tibi VVesali merito tribuisse queamus,

Laus te certa manet, tu modo perge, sequor.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY
 540 EAST 58TH STREET
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-3000
 FAX: 773-936-3000

[Faded text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible but appears to be organized into a list or table format.]





SO PARAPHRASIS IN
NONVM LIBRVM RHAZAE ME-
dici Arabis clariss. ad regem Almanso-
rem, de affectuum singularum corporis
partium curatione, Andrea Vue-
silio Bruxellensi autore.

¶ De capitis dolore.

Caput I.



Vando capitis ardori eius. *Ex san-*
dē tensio & grauitas, oculo- *guine.*
rumq; ac faciei rubor adfu-
erint, & reliquū corpus ta-
ctū calidū, pulsusq; magnus
præcipue in tēporibus sentiatur, hume-
ralis uena partis dolentis, aut eius quā
potissimum dolor exercet, supra cubitū
secanda est. Deinde aqua rosacea unā
cū aceto ac oleo rosaceo sumēda, quæ

A simul

ut plurimū simul tamdiu, donec debitam crassitiem
ad reliqua recipiant, agitata, ac niue aut fonte re-
quartā ace frigerata, capiti ab alto sunt infundēda.
in partem ac Aeger autem à carniū esu, uino reli-
ipimus. quisq; sanguinē augentibus arcebitur,
 ac lentes cum posca & croco decoctas,
 aut lenticulam solam aqua incoctam, &
 olera frigida, elixa uel cruda, & infrigi-
 dantes fructus edet. Aluum porro ex
uerois in myrobalanis citrinis, prunis, * tama-
er medica- rindis, & saccharo albissimo ducere expe-
ritia ueteri dit. Verum si hæc nō suffecerint, altheæ
us incogni semen aceto infusum, donec iustam ui-
ta numerat. scositatem obtineat, in mortario, pistillo
 contundito, ac in emplastri formam lin-
 teo inductum capiti applicato. Quin
 etiam ex herbæ pulicaris semine aceto
 macerato, utiliter ad eundem modum
 cataplasma capiti induces. Si iam com-
ob bilis co- prehensis notis pulsus ueloces adsint, ta-
iam. ctuq; ingens percipiatur calor, nullo ta-
 men rubore facies aut oculi suffundan-
 tur, neque ulla notabili tensione labo-
 rent, statim inter initia uentrem medica-
 minibus

minibus bilem flavam purgantibus sol-
 vere, deinde cōmemoratis localibus præ-
 sidijs uti, consilium est. Verum præter
 hæc naribus oleum uiolarum, aut cucur-
 bitæ domesticæ, aut nymphææ, aut florū
 falicum infundetur, & horum oleorum
 singula per se niue refrigerata, ab alto ca-
 pitū instillabuntur, & æger paulo ante cō-
 memorata uictus ratione cibabitur. Odo-
 rabit uero camphoram, aquā rosaceam,
 falices, uiolas, & quæ his refrigerandi fa-
 cultate respondent. Quod si post horū
 usum morbus plurimū inualuerit, incre-
 ueritq; sumito opij & camphoræ singu-
 lorum pondus duorum granorum hor-
 dei, ac oleo iosmini dissoluta auribus &
 naribus modice tepentia immittito.

Porro si graui capitis dolore nihil eo-
 rum, quæ de ruboris suffusione dixi in fa-
 cie aut oculis conspiciatur, morbusq; in-
 uerustatem protractus fuerit, inter inītia-
 leuioribus purgantibus auxilijs tentatis,
 uenter catapotijs coccijs, à granī (quod
 Græci κόκκον appellant) magnitudine sic

uocatis, ducendus est. Quorum compositionem ipse in hunc modum instituit. Pulueris picrae drachmae decem, cucurbitae syluestris drachmae tres cum scrupulo, scammonij drachmae duae cum semisse; *turbid, stichados, singulorum drachmae quinque: rediguntur haec in catapotia, quae decem distinctis uicibus in robustissimis corporibus porriguntur, caeteris autem pro uirium ratione. § Quoniam autem praesens compositio, propositi Noni libri commentatoribus suspecta est, existimantibus interpretem loco duorum scrupulorum cum semisse scammonij, uertisse drachmas duas & semissem, huic loco Galeni compositio catapotiorum ex aloe, interscribendam putauit. Habet autem ea, Libro primo secundum locos, in hunc modum: Cucurbitae syluestris pars una, aloe & scammonij, singulorum duae. His ego (scribit Galenus) absinthij succi partem unam admisceo, antea uero mastichen quoque Chiam & bdellium indidi. Sic etiam Quintus utebatur, Galenus & Alexander co-

*nostrum est
tithymali
ecies.*

*Quid si de
m nune
o catapo
a Rhazes
hibenda
oluisse?*

*ia tamen
esues &
icolai.*

der cotoneorū succo hæc excipiunt, Paulus aqua, Oribasius brassicæ succo. Ac quia huiuscemodi catapotia instar graniciceris finguntur, à multis coccia quoq; appellata sunt. Dantur Galeno & Paulo numero undecim, Alexandro quindecim, § Post deiectam autem aluum, capiti oleum iofminum & balaninum infundenda, eadem auribus quoq; & naribus immittenda sunt. Ad hæc ægro odoris gratia, confectio *galliæ moschatae appellata, naribus obijcienda, & moschi pauxillum nariū foraminibus inspirandū est. Cæterum si malum multum in crude scat, molestetq;, sumito euphorbij & castorei utriusque sesquiobolum, & in olei iofmini momento solutum, naribus & auribus instillato. In uehemēti capitis dolore, qui cū æstu est, emplastrū infrā scriptum, fronti & temporibus utiliter applicabis. Emplastrum ad ingentem capitis feruidum cruciatum: Accipito lactucarū semen, glaucij præparati succum, *lignū quod sandalum appellamus, & rubrum

*Pastilli sunt, ex oriente, ad nos aduecti, arabicæ algaliæ.

*Veteribus incognitū.

& album, nucem Indicam, rosas, singula
 æquis portionibus, opij momentum: his
 aceto & rosarum aqua conspersis ac ma-
 ceratis, informato emplastrum, & fronti
 superinducito, deinceps illi conduplica-
 tam fasciam, aceto & rosacea aqua imbu-
 tam, superponito, eaq; tepesacta rursus
 aliam, huiuscemodi refrigeranti liquori in-
 tinctam illigato. Linimentum discuti-
 ens & digerens, ad dolorem qui cum fri-
 gore est, efficax. Castorei, euphorbij, pi-
 peris, sinapis, styracis, rutæ, marubij, sin-
 gulorum pares modi; hæc exiccata, & in
 pulverem subacta, & per cribrum secreta
 commisceto, atq; illis uino ueteri consper-
 sis informato pastillos ad solem exiccand-
 os: ac quando usus postulauerit, uno il-
 lorum uino ueteri, aut oleo costino cha-
 mæmelino uel detrïto, frontē & tempora
 idētidē illinito. Vel unū in minori liquo-
 ris portione dissolue, ac instar emplastri
 fronti subindē inducito. Hoc enim lini-
 mentū, seu emplastrū, omni uetusto capi-
 tis dolori est q̄ accommodatissimū, nō mo-
 do fronti

do fronti ac temporibus admotum, sed in aurem quoque inditum, praesertim si in aliquo iam comprehensorum oleorum dissolutus pastillus fuerit. Aegrotanti uero uinum uetus, circa mali declinationem, non tamen affatim, praebeto. Caeterum quando ingens capitis dolor, septimanam totam perdurans, hominem affligit, in laconicum primam balnei domum, aut balnea aquarum medicamentosarum, exiccandi uis praedictarum, aeger deducendus est, ac capiti infundenda aqua, in qua chamamelum, & sampsuchus, & stichas Arabica seu Gallica, & serpillum, si mul omnia, aut singula per se ebullierint.

Porro si caput indies ante cibum indoluerit, ac post ingestos cibos conualuerit, laboranti ante tempus quo corripit consuevit, succurrendum est, exhibendo panis offulas, succo mali punici, aut immature uuae, aut alijs uirtute in refrigerando & astringendo his paribus, immerfas.

Si dolor capitis ob diutinam in sole

moram, concitatus fuerit, huic facile

A 4 aceto

*Hæc ad dolorem ex p
tuita faciunt*

Ob uentriculi uitium.

Ex insolatione

aceto & rosaceo bene refrigeratis, subuenire poteris. At si dolor his non remittitur, alijs intensius refrigerantibus, ut polygonij ac plantaginis succis aceto dilutis, propellendus est. Quod si praeterea ingens capitis dolor perseverat, ac intenditur, neque ullis praesidijs cedit, sitque metus, egrum visu priuatum iri, ob fluxum humorum in oculos: arteriae, quae per tempora repunt, opportune ut sanguinis quantum satis est fundant, inciduntur, ac manuali arte quicquid illarum denudatum est, laqueis interceptum aufertur. Verum postremum illud praeter praesentis libri institutum, hoc in loco tractatur.

¶ De uertigine, quam Graeci σκότωμα uocant.
Caput II.

¶ Sanguinis
topia.

CVM alicui ea quae foris sunt, in gyrum circumagi uidentur, & oculi te nebris obruuntur, & concidere aeger uult: quumque eodem tempore, quo scilicet malo aegrotus tenetur, facies & oculi rubore suffusi sunt, ac uenae post aures reptantes
sanguis

sanguine turgidæ cernuntur, * eas tum in
 cidere, cucurbitulasq; collo et tibijs agglu
 tinare expedit. Cæterum si hæ uenæ in
 conspicuæ lateant, faciesq; rubore suffun
 datur, ex axillari sanguis minuendus, &
 cucurbitulæ tibijs affigendæ sunt. In
 utrisq; autem his uertiginis speciebus iã
 commemoratis, ad repellendum humo
 rum affluxum, capiti rosaceum cum ace
 to est infundendum. Ventrem uero my
 robalanorum citrinarum decocto, supe
 rius ad capitis dolorem descripto, deince
 re utile est. Cibos quidem calidos, & san
 guinis copiam augentes, ægrotus auer
 sabitur, ac aridis & refrigerantibus enu
 trietur. Porro quum neque faciei ocu
 lorumq; rubor, neq; febris, uertiginosis
 adsunt, perpendendū est, an ne oris uen
 triculi euersio, an nausea hominem infe
 stet. Quæ si ægrotanti affuerint, primum
 uomitum leniter iritato, deinde quantita
 tem coccijs catapotijs præcedenti Capite
 inscriptam præbeto, & à frigidioribus ac
 pituitam coaceruantibus cibis ægrotan

* Galenus
 & Paulus
 arterias in
 tersecant.

Variat hic
 Arculariæ ex
 emplar ab
 alijs.

Ob stoma
 chi uitium.

Ex propria
cerebri pitu-
ita.

tem arceto. Verum si neq; oris uentriculi subuersio, neq; cibi fastidium adsint, nullaq; calor notae appareant, aluum subinde catapotijs coccijs soluito. Cibos ad haec frigidos omnino aegrum auersari iubeto: & gargarizationem, quae eliciendae pituitae sit, praeparato. Naribus item portionem aliquam inscribendorum ad attonitum morbum, ut struthij puluerem, inspirato, quo caput & calefacias, & sternutationes irites. Nec inutiliter quoque ad eundem usum, caput excalescentibus unctionibus inunges.

¶ De phrenitide. Cap. III.

+Paulus &
Alex. acuta
habent.

QVando febris * continens homotomus aegrum inuadit, una cum uehementi capitis & oculorum grauitate: praeterea si multus rubor faciei & oculorum, & dolor distendens capitis, & horror quidam lucis, pulsusq; solito uelocior ac frequentior adfuerint, phrenitidis incipientis certissima indicia adesse iudicabuntur. Si autem ad haec lingua aspera & nigra, uel sub-

uel subflaua fiat, perturbeturq; adeo intellectus, ut æger mente alienetur & deliret, multisq; uigilijs excrucietur, phrenitis perfecta putabitur. Aegro itaq; priusq; enarrata illa symptomata omnia concurrant, uenæ sectione, ac uentris solutione, ex*fructuum uidelicet mirobalanorum, tamarindorum & prunorum succo, succurrendum est. Alimentum autem eius sit aqua cum hordeo elixa, eaq; semel aut bis in die propinata, pro consuetudine quam dum sanus esset habuit. Capiti quidem acetum cum rosaceo ab alto, ad compescendum humorum impetum, infundatur. Cæterum si ægrotantem crebræ uigiliæ urgent, sumito uiolarum exiccatarum, corticum papaueris albi, hordei corticibus liberi, seminis lactucarum, radicum mandragoræ, singulorum tantum quantum manu una apprehendere potes. hæc simul in ænea olla, quam aqua impleueris, tantisper dum aqua rubescat decoquito. Deinde aquam iam tepidam

capiti

*Vt plurimū
ex sanguine
in tenui me-
ninge.*

**Medicamē
ad uentris so-
lutionem, in
doloze capi-
tis ex san-
guine, intelli-
git.*

capiti instillato: & sit caput ad peluim, in quam aqua recipiatur, inclinatum. Item deinceps huiuscemodi decoctū, in æneo uase ad ignem modice recalefactū, capiti superfundito. Hoc sanè singulis diebus crebro factum, magnum subsidium refrigerando, ac affluentem humorem reprimendo, ægro adfert. Caput præterea oleo uiolaceo muliebri lacte contemperato, irrigandum: quo etiam lana mollis imbuta, capiti applicanda est.

Ratio mittendi sanguinis.

Porro si ægri uires inter morbi initia ualidæ constantesq; esse conspiciantur, sanguis protinus ex humerali uena supra cubitum mitti debet, & is copiosior. At si manum desipiens non porrigat, metusq; sit secundū uacuationem, sanguinis profluuij, dum manū æger subinde ob mentis turbationem iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est aufere mus. Si uero uires languidæ dissolutæq; sint, aliam curandi rationem, qua morbū depellamus, aggrediemur. Sic q; remitte malo, à uenæ sectione tēperabimus.

De apo.

¶ De apoplexia. Cap. III.

SI aliquis ueluti sopore oppressus decubabit, & sine somno naturali stertit, cumque pungitur non sentit, certum est eum apoplexia teneri. Est sane huius morbi magnitudo aestimanda, secundum quod fortiter aut debiliter stertit & respirat aeger. Quum itaque illi ob summam spirandi difficultatem, spuma ab ore prorumpit, nullis remedijs ipsi subueniri potest. Verum si leniter stertit, & liberius aeger respirat, morbus lenior mitiorque existit. Praesens quidem affectus aut mox oppressum suffocationis modo iugulat perimitque, aut noxio humore e cerebro in neruos delapso, in illorum resolutionem desinit. Quocirca his symptomatibus aegrotantem affligentibus, considerandum est, an aegri facies multum aut cruenta, aut liuida, aut subuiridis fieri incipiat: uti euenire solet, sanguine in membro aliquo uinculis, aut quauis constrictione retento. Si quidem tunc sanguinem ilico ex duabus uenis iugularibus, aut duabus humeralibus incisis, minuere opportunum est. Porro

Rara fit, secundum. 10.

Aphor. 6.

parte, cretica expulsio.

A sanguinis copia.

*A pituitoso
humore.*

*Acris infu-
sio, ac san-
guinem ali-
quando edu-
cens.*

Porro si ad hunc modum res se non habeat, sed dum æger aërem inspirat, auditur in thoracis & asperæ arteriæ capacitate aëris sonitus & murmur, siq̃ his pituitā indicantia signa adsunt, hic clyster utiliter ei infundetur. Accipit aut̃, cucurbitæ syluestris, cyclaminis, cētaurij minoris, alterius cyclaminis speciei, hellebori albi, singulorū tm̃ quantū manu una cōprehendere potes: omnia simul tribus libris aquæ, ad duarum consumptionem decoquantur, deinde per colum trasfunduntur: atq̃ ex huius decocti semilibra, clyster in anum inditur. Qui si cito ab ano elabitur, rursus repetitur, ac donec humorum copia unā cum clystere deiciatur, infunditur. Naribus adhæc struthium & ueratrum album detritum, leni spiritu crebrius inspiretur. Est præterea ore per uim aperto conandum, ut anacardinam confectionem cum mulla, per os ad uentriculum subinde ægrum deglutire procuremus: atq̃ eius negotij singulis diebus sollicitudo habenda est. Præ-

sentis

sentis autem medicamenti pondus erit, sesquidrachma potui oblata. Eius uero descriptio, Capite de neruorū resolutione habetur. Frixiorium quoque ferreum candens, capiti identidem tam prope admodum, ut capilli etiam ægroti aduri uideantur. Cæterum si his rationibus affectus non discutitur, in medicando maiorem operam nauabimus. Et enim caput rademus, & sinapi & castoreo in aceto acerrimo detritis oblinemus. In priori quidem propositi affectus specie, post de tractum sanguinem fortiter brachia intercipere iuuat, iniiciendo scilicet uincula brachiorum parti, qua cum scoptulis illis articulatio est. similiter quoque tibi- arum partes graciliores uinciri ex usu est. Quinetiam ad reprimendum sanguinis affluxum, qui huius affectus autor esse consueuit, caput rosaceo oleo, & aceto ex uino præparato, perfundere præstat. Si itaque apoplexia detentus, corpore plethorio conspiciatur, morbusq; non adeò uehemens existat,

primum

*Aliqui igni-
tagalea ad
id utuntur.*

primum ad sanguinis reuulsionem pedis uenam, deinde deriuandi gratia, eam quæ in narium extremo apparet, incidemus.

¶ De sopore. Cap. V.

Ex cerebri
pituita.

SI quis cum profunda animi in somnū delatione iacet, & tamen si urgeatur sentit & mouetur, uerum oculos semper occlusos habet, at quos si altius illi inclametur, aperit, atq; ilico sopore oppressus occludit, is sopore laborat. Quem affectū clysteribus acribus, suprā Capite de apoplexia descriptis, curare profuerit. Ori quoq; laborantis mulla infundenda, quæ ut per fauces dimittat, sollicitare oportet, siquidem ea ægro alimenti loco præbentur. Caput ad hæc tribus primis diebus, aceto cum rosaceo irrigabitur. Verum post tertium diem sternutationes, struthij & ueratri albi puluere inspirato iritabimus. Caput quoq; non inutiliter radeamus, & sinapi cum aceto & castoreo perfricabimus.

Hæc lethærgo omnia cōferunt, & ad hæc Graeci uenam secant.

De con-

De congelatis, quibus semper oculi inconni-
uantes manent. Cap. VI.

Congelatum ac rigidum merito ali-
quem iudicabimus, quum quasi in
somnia solutus decumbit, nec ab ahsi-
dētibus incitatus mouetur, nec etiā pun-
ctus sentit: & licet oculi patent, cilia ta-
men eius immota ac rigida permanent.
Subueniendum quidem huic malo me-
dicamentis sopore dicatis. At præter il-
la, oleum iofminum capiti infundatur,
in cuius singulis libris, uncia euphorbii
adiecta sit. Præterea caput ipsum ex ca-
storeo & euphorbio in oleo iofmini læ-
uigatis, illinatur.

Ob refrigeratiū corpo-
ris habitū.

Cōferūt qui
dē æque ca-
lida, sed nō
æque sicca.

De neruorum resolutione, quæ πρῶλυσις
dicitur. Cap. VII.

Quam aliquis ad motum omnino
impotens est, ita ut unum aut plu-
res artus commouere minime queat: sicq;
unā ipsorum sensus abolitus fuerit, illū
resolutione unius plurimūe artuum ten-
tari pronunciamus. Huius quidem ma-
li curationem, catapotiorum foetidorum

A pituita, a
nimalis fa-
cultatis du-
ctus occu-
pante.

à me compositorum oblatione, auspica-
 bimur. Ea accipiūt, pulueris hierę picrę
 drachmas decem, syluestris cucurbitę
 carnis interioris drachmas quinque, eu-
 phorbij drachmas duas cum semisse, ca-
 storei, piperis, succi Cyrenaici, sagape-
 ni, opopanacis, * thapsiæ Indicę, sina-
 pis, singulorum drachmam unam : cen-
 taurij minoris, succi cucumeris agrestis,
 utriusq; drachmas quinque, gummi ruta
 succo diluuntur, quibus alia excepta in
 catapotia digeruntur, † quę decem dosi-
 bus exhibenda sunt. Quorum una por-
 tione deuorata, * triduum à medicami-
 num usu æger conquiescet, ac eo tempo-
 re cicerum decocto, & oleo, et sinapi enu-
 trietur. Postea alteram dosim assumat.
 huic ubi tertia successerit, aliquātulo tē-
 poris interuallo ad uires recolligendas,
 à medicamentorum usu æger rursus ab-
 stineat. Cibi conueniunt speciebus cali-
 dis, & incidentibus feminibus cōditi ac
 preparati : cuius notę est piper, & huic
 caliditate paria, & caro minutim cōcisa,
 & in

* *Seitaragi*
Mar. inter-
pret. lepi-
dion.

† *Fortasse*
legēdū, quo-
rum decem
una dosi ex-
hibēdatūt.

* *Aliq tres*
hebdoma-
das sribi
uolunt.

& in fríxorio fríxa: uel alioqui aliñ ad cõ-
 coctionem expediti, & non recrementi-
 tij. Potus autem mulsã sit. Iam membra
 quoq; resoluta, oleo costino utiliter inun-
 guntur, quod recipit, costi unciã unam,
 píperis, pyrethri, euphorbii, singulorum
 tertiam unius unciã partem, castorei se-
 munciam, omnia in semilibra † olei uio-
 læ luteã, quæ antiquis parietibus incre-
 scit, aut olei narcissi læuigãtur: atque ita
 membris deficiẽtibus inuncta, multum
 iuuant. Porrò diebus singulis, quibus à
 catapotiorum supra descriptorum usu
 æger liber est, exhibendæ sunt drachmæ
 duæ subsequẽtis confectionis: quam ab
 anacardi cuiusdã arboris Indicæ fructu,
 anacardinã appellant. Zingiberis, pyre-
 thri, nigellæ, píperis nigri, píperis longi,
 feminis petroseliní Macedonici, singulo-
 rum drachmæ uiginti: myrrhæ, rutæ sic-
 cæ, liquoris Cyrenaici, aristolochiã, bac-
 carum lauri, castorei, thapsiæ Indicæ, si-
 nãpis, gentianæ, singulorum, drachmæ
 quinq; anacardorum succi, qui ob simi-

† Al. cher-
 ua. i. ricini
 fruticis.

lem mellis consistentiam, mel anacardinum dicitur, drachmas quinque, irrorentur omnia oleo nucum, & melle decocto ac despumato excipiatur. Medicamentum hoc nervorum resolutioni, apoplexiæ, oris contorsioni, tremori, alphis tum albis, tum nigris, scorpionum ictibus, convulsioni, quæ humiditati fertur accepta; & in summa, omnibus frigidis affectibus, quammaxime accommodum censeatur. Siquidem hoc medicamentum devoratum sudores elicit, febrimque sua mirifica calefaciendi potentia ægro conciliat. Verum si forte propinatum, ægrotantem sanitati non restituerit, ab omni medicamine ipsum decem dies abstinere, ex usu erit: interim tamen victus ratione (quæ cum studio adhiberi debet) exacte instituta. Deinde rursus viribus collectis, ad mali curationem præscripta ratione properabimus.

§ Cæterum si resolutio ex plaga, aut casu ab alto, aut incidente quopiam corpore, subito facta sit, omni curationis spe adempta, affectus (utpote nervo, aut musculo,

*Ab externa
causa.*

sculo, aut tendone per trāsuerſum diſrupto) incurabilis permanebit. Si uero nō subito malum ex his cauſis excitatū ſit, ſed proceſſu temporis paulatim & pedetentim augeatur, tum loco læſo emplaſtrum hoc adhibeatur; quod recipit, fari nam fœnogræci, glandem unguentariā, nucleos ceraſorum ſylueſtriū, & domeſticorum, ſemē ricini fruticis, bdellium, ammoniacū, adipem anatis, ceram, oleū liliſ. hæc ſimul contuſa & cōmiſta, in formam emplaſtri, quod læſę parti inducitur, rediguntur.

*Ex humo-
ris ob con-
fuſionē in-
fluxu.*

*Hoc in prin-
cipio inuti-
le, ſed ceſ-
ſante fluxu
præſtatiſſi-
mum eſt.*

De ſtupore ac tremore. Cap. VIII.

SI quis aliquod ſuorum membrorum ſita affectum ſentit, ut ſæpe pedes noſtri afficiuntur, dum obſtupescunt, membrū hoc ſtupore implicatū affirmamus. Quoniā aut diſpoſitio hæc ſi lōgius prorogatur, in reſolutionē ob cauſarū uicinitatē trāſit, eius curā haud differemus. Quocirca quoq; huius mali remedia nō nullam cum neruorum reſolutione dicatis præſidijs affinitatem fortiuntur. Nam

*Stupor, à
frigido ſuc-
co.*

si recens affectus fuerit, ac præter frigidã intemperiem duntaxat modicum humorem pituitosum admixtũ habuerit, sola ad huiuscemodi affectum idonea uictus ratione, oleiq; costini inunctione, illi subueniri poterit. Verum si inueterauerit, maiorq; morbus ob pituitosi succi copiã extiterit, præter hæc æger catapotijs foetidis purgabitur, eiusq; intemperies anacardini confectionis usu, & ratione uictus calidiore & sicciore, ad temperiem reducetur. Cæterum tremori eisdem præsijs, quibus stupori succurris, subueniendum est. At si ex liberaliori uini usu obortus tremor sit, æger sibi à uino temperabit. Similiter si ex aquæ è niue solute potu, in hunc affectum æger incidit, ab ea quoq; abstinebit, ac in laconicum primam balnei domum ualde calefactã, quousq; sudor copiosus erumpat, properabit, aut balneis aquarum naturalium opportune utetur, atq; crebro in sole utiliter apricabitur.

De oris distortionem.

Cap. IX.

Oris

Tremor ab eadẽ causa, sed minori.

ORis conuulsione aliquē affligi cen-
semus, si quando illi os ad alterum
latus contorquetur, & oculum ad quem
illud conuellitur, occludere nequit: pre-
terea si expirare iussus, flatus ab altera tā-
tum parte prorūpat, effleturq;. Curatio-
nem uero eius,alui defectione per cata-
potiorum foetidorum propinationē ag-
grediemur, & cibum aegrotanti, & potū
incidētem, ac calefaciētem, ut Capite de
neruorum resolutione persecuti sumus,
instituemus. Item indies mane priusquā
cibū aeger capiat, ex sinapi & syrupo ace-
toso gargarizationē porrigemus. Et in
tenebrosam domū deducto egro, iubebi-
mus, ut nucem myristicam parte ea qua
affectus est, ore retineat. Naribus etiam
ad iritandas sternutationes, strūthiū de-
tritum inspirabimus. Præterea oleo co-
stino aegri ceruicis uertebras, & faciem,
& frontem perungemus. Adhæc singu-
lis diebus anacardini cōfectionis sesqui-
drachmam, non inutiliter eger assumet.
Quod si his remedijs affectus non cedit,

Ob pituitæ
infarcionē.

Vtuntur ho-
die ad mo-
uēdas ster-
nutationes
helleboro
confuso.
i. diti
cōditiuū
legere est.

uentris solutionem, ac plane eandē cum iam comprehensa curationem repetemus. De ea porrò oris cōuulsione, quæ nō subito, sed paulatim oritur, haud quam mihi sermo est: siquidem huiusce modi, non nisi in pernicioſa phrenitide, alijsq; morbis acutis, morte iam imminēte, inuadit egrotantem, atq; tunc ea cōuulsio ex siccitate originem ducit.

De cōuulsione, quàm σπασμὸν.

Græci uocant. Cap. X.

CVM cuiuspiam particula aliqua contracta ad suam cōuellitur originē, siue quum plures ex instrumentarijs partibus ita afficiuntur, cōuulsas eas esse iudicamus. Cōuulsio autē omnis, aut statim, aut pedetentim apprehendit. Cōuulsioni quidē subito exoriētī, eadem curandi ratio, quam resolutioni ex usu esse precepimus, adaptāda est. Priuatim tamen in hac, partim pluribus manuum frictionibus, partim frequētiori olei costini inunctione utimur. Quæ uero non repente inuadit, sed lente aridam æstuantemq; febrim,

Exreple-
tione.

Exuacui-
tate.

febrim, aut largas deiectiones, aut copiosum uomitum, aut ingēs sanguinis profluuium, aliam uē magnam inanitionem aut ariditatē, subsequitur, mala est, atq; ad curandū contumax conuulsio. Nihilominus qualiscunq; sit morbus, eius tamen curā aggrediemur, ac ægro hordei decoctum, & iuscula pinguia, emollientiaq; & frumētaceas sorbitiunculas administrabimus. Ac deinceps in aquæ tepentis folium, ægotantem deducemus, & egelido oleo uiolaceo, & oleo ex semine cucurbitę domesticæ, neruorum maxime exortus cōuulsioē implicitos, inungemus. Præterea ut folio diutius immoretur, oleoq; uiolaceo illinatur, hortabimur, & uinum modicū perquam aquosum potui porrigemus, cibisq; humidioribus ægotantem enutriemus.

De morbo comitali, ἐπιληψία dicto. Cap. XI.

MOrbo sacro comitali uē quempiā detentum testamur, quum in terram subito concidit, ac quasi concussus conuellitur, sed ita ut principis animæ fa-

Ob obstructionē, impedietē spiritus animalis transitū.

cultatis noxa concomitetur. Quod si cū his indicijs oris spuma, peculiaris admodum huius mali nota, apparet, aut urina & stercus præter uoluntatem excernuntur, aut genitura profluūt, dispositio deterior uehementiorq; existimatur. Porro si eger priusquā malo corripatur, præsentit quasi auram seu spiritum ex particula quapiā sursum ferri, ac caput petere, unde postea syncopi corripitur & concidit: necessum erit, simulatq; aurā hanc subnasci sentiat, antequā in terrā collapsus cōuellatur, ut eam partem à qua aura effertur, superius fortiter uinculis intercipiat ac constringat, siquidem eo pacto instantem accessionem propellet, aut saltem mitiorem ac minus uehementē efficiet. Intermedio quidē tēpore, quo accessionib. æger uacat, purgatiōe ex catapotijs * cōcēis sollicitādus est: & pars cōtagionē impartiens, sinapi, pipere, euphorbio in melle anacardino simul læuigatis inungenda, tantisper dum uesiculæ oboriantur, & tenui sanie plenæ crepent, ac

liquor

Per consor-
tiū alicuius
particulæ.

* His alia
pro humo-
rū uarieta-
te, ab auto-
ribus miscē
Mir.

liquor in illis collectus profluat. Nec citricæ obducantur, donec quicquid in illis coaceruatū sit, promaneat, nam hæc huius affectus certissima curatio est. Postremo etiã cucurbitulæ cum modica cutis incisione, parti consortij lege affectū inferenti, affigantur. Si autem æger priusquã morbus eum inuadat, nauseã, uel uentriculij erosionē, palpitationemq; patiatur, & dein accessio subsequatur, sepe uomitum porrectis his, quæ uomitibus ciendis sunt idonea, iritabimur: quo facto, ut medicamen amarū in potu frequenter sumat, hortabimur. Ventriculo quoq; emplastrum ex spica, rosis rubris, mastiche & thuris cortice, uino odorato subactis, imponēdum. Vniuersa autem uictus ratio, ægro talis præscribi debet, quæ sit quàmminime excrementitia, qualis est tum caro in fixorio fixa, & * profundioribus uasis incocta: tum auis palatū dentatū habens, Arabibus * taguid appellata, tum aliarum auium in collibus degentium, & hœdorū caro. Porro si

Ex uetricæ
liuitio.

ingruat
Possimus
aliquādo oleum mastichis, aut cottoncorū adde.

* Manar. u. tratis habet.

* Pl. li. 10. c. 44. Dic medeas huius generis aues uocare uidetur.

ægro

Ex cerebri
pituita.

ægro sensuum obfuscatio, motricisq; facultatis imbecillitas ac torpor superuenerint, nullaq; cōmemorata in alijs huius affectus speciebus indicia adfuerint, laborāti catapotia coccia subinde sunt offerenda. Et cibos quoq; incidētes ac extenuātes, è quorū numero antè dicti sunt, præbere competit. Gargarizatio ad hæc, ut & sternutationes antea compræhēsis irritatæ, (eliciendæ pituitæ gratiâ,) haud parum conferunt. Proinde naribus pæonia radice puluis, atomorū instar contusus, utiliter inspirabitur. Cæterū si eger comitali morbo affectus, faciem & oculos rubētes, uenasq; tumidas habeat, sanguinis ex uena malleolū interiorē perreptante extractio, strenue ei ob remissionem auxiliatur. Quinetiā ex furis, appositis cucurbitulis, sanguis non inutiliter uacuabitur, & caput opportune oleo rosaceo cū aceto irrigabit. A uino uero, cepis, allio, sinapi, porris, apio, fabis, cannabi, & breuiter ab his quæ caput uaporem emittendo grauant ac implent, eger arcebitur.

Ex sanguinis copia.

Alias capitabit, hoc est, brassica capitata.

arcebitur. Electuarium ad omnem morbum comitialē efficac, Pyrethri, sefelis, stichados, singulorū drachmæ decem, agarici drachmæ quinque, cardamomi recentis & acuti acriorisq̃, * liquoris Cyrenaici præstantissimi, aristolochiæ rotundæ, singulorū sesquidrachma, exprimito ex scilla succum, ac eum æquali mellis portione cōmixtum decoquito: illoq̃ simplicibus medicamentis exceptis, formato electuariū. Huius, nucis auellanae instar, cum liquore quopiam medicamentorū uim ad caput dirigente, indies æger mane, & tribus horis post frugalē cœnam, assumet, & à crassioribus cibis interim abstinebit. Electuarium hoc, seu antidotus, omnib. morbi comitalis differētijs probe auxiliatur: si modo unam à Galeno descriptā excipias, quæ scilicet ex sanguine ducit originē, cuius & nos quoq̃ iam supra meminimus. Huic sanē affectui sanguinis primū ex uena interiori maleolū perreptante, deinde ex axillari aut humerali mīssionem, præsentaneum

*Hodie officina assano foetida uocant.

neum remediũ adferre sæpe uidimus. Vi-
ctus autem ratio hoc malo implicito, in-
stituenda est ex his, quæ sanguinem mi-
nuunt atq; refrigerant. Quocirca carne,
uino, reliquisq; dulcibus abstinendum,
& acidorum fructuũ succus ad debitam
crassitudinem decoctus, loco potus por-
rigendus est. Item capiti quoq; ea que re-
frigerandi uim possident, quæq; sangui-
nis impetum reprimunt, non inutiliter
superaccommodabuntur.

De incubone, qui ἐπιάλτης Græce
dicitur. Cap. XII.

Ab organo-
rum faculta-
tis animalis
modica ob-
structione.

CVM quis in somno ponderosum
quiddam sibi incumbere imagina-
tur, & uox eius supprimitur, aut incerta
indiscretaq; editur, incubone correptus
dicitur. Cui malo mox per initia succur-
rendũ est. Nam si diutius se prorogaue-
rit, crebroq; eos per noctem oppresserit,
grauius aliquod nunciatur malũ, ut apo-
plexia, infania, & morbus comitialis.
Quæ enim comitiales interdũ, eadem
ephiatici dormientes noctu patiuntur.
Proinde

Proinde si sanguineo colore, uenisq; tur- Ex sanguine.
 gidis æger fuerit, ex malleoli uena san-
 guinem detrahemus, ac suræ cucurbitu-
 las cum cutis incisiōe ad sanguinis reuul-
 sionem agglutinabimus. Præterea labo-
 rantem à uini potu, & dulcium ciborum
 esu (in primis ab his quæ copiosum san-
 guinem gignūt) dehortari commodum
 erit. Si notæ cōtrariæ pituitam indican- A pituita
copia.
 tes adfuerint, aluū catapotijs coccijs du-
 cere, & ægro uictus rationem extenuan-
 tem, ac incidētē instituere, utile erit. Exer-
 citia quoq; & inferiorū partium frictio-
 nes, haud paruum momentum ad huius
 morbi depulsionem adferunt.

De melancholia. Cap. XIII.

SI alienæ cogitationes ac æstimatio-
 nes absq; euidenti causa, aliquē occu-
 pauerint, & inter cætera animi pathema-
 ta, metus, mœstitia, odiumq; hominum
 præualuerint, illi melācholiæ inītiū adesse
 asserimus. Cæterū quādo malum usq;
 adeò inualuerit, ut quæ animo concipit,
 proloquatur, & sermōnē & operationes:
 incon-

inconstātes interturbatosq; ædat, melan-
 cholica quæ apparent signa, eam perfe-
 ctam esse fatentur. Quæ itaq; huiuscemo-
 di uanæ imaginationes, & metus, animi
 q; angustia detinent, priusquā incre-
 re augeturq; cœperint, illi omnino sub-
 ueniendū est: quoniā si hæc symptoma-
 ta excreuerint, difficilem, ac plane contu-
 macem curationem admittent. Quapro-
 pter si melācholix comites sint uētris do-
 lor & inflatio, ineptus ac uitiatus corpo-
 ris color, praua concoctio, uomitus ru-
 ctusq; acidi, flatuosorum spirituum copia,
 & sputorum multitudo, curationē à ue-
 næ axillaris, aut eius quæ inter minimū
 digitum & anularem sinistrae manus re-
 pit incisione auspicabimur. Et si sanguis
 effluens, ater crassusq; cernitur, multum
 sanguinis: sin autem tenuis & boni colo-
 ris conspicitur, minimū extrahendū erit.
 Nisi forte crassiorem mox fluxurū suspi-
 cemur. Laborātem uero, his quæ aluum
 leniunt & humectant, ex quorū genere
 iuscula ex carne hœdorum, & iuniorum
 ueruecum

*Cura eius
 que per cō
 sortiū fit.*

*Græci po-
 tius uenas
 in cubito se-
 cant.*

ueruecum confecta sunt, nutriri compe-
 tit. In balneū quoq; dulcis aquæ (in quo
 tamen non diu desidebit) deducēdus æ-
 ger erit. Post hæc, subsequenti decocto
 epithymi à me conscripto, prospere ute-
 ris. Habet autem se in hunc modū, My-
 robalanorum Indicarū drachmæ decē,
 filiculæ (quam πολυπόδιον Græci uocāt)
 drachmæ quinq; senæ drachmę † nouē,
 turbit drachmę quatuor, stichados drach-
 mæ decem, uuarum passarum ab acinis
 mundatarū tantundē, epithymi Creten-
 sis drachmæ decem, omnia excepto epi-
 thymo in tribus libris aquæ, ad sesquili-
 bræ consumptionē, decoquito, his actis,
 adijcito epithymū, ac statim ab igne de-
 coctum amoueto, & tantisper dum refri-
 geretur in eo epithymum madere finito,
 & illis simul refrigeratis, manibusq; con-
 tritis, ius percolato. Deinde sumito aga-
 rici scrupulos duos, aloës drachmā unā,
 sacchari sedrachmā, hellebori nigri ses-
 quibolum, excipito hæc melle, aut * iu-
 leb uiolato, informatoq; catapotia, ac tri-

† Alibi
 octo.

* Constat
 uiolis, aqua,
 et saccharo.

C bus

bus horis ante decocti propinationem, pro uirium robore porrigito, & deinde præscriptum decoctum ægrotanti exhibeto. Postea * triduum totū eger ad uires recolligendas conquiescet. Interpositis quidem diebus, quibus à medicaminum usu abstinebit, paulo antè dictis aluū lenientibus cibus enutriendus est: & potui uinum tenue & lucidū, beneq; odorum præbendū. Dehinc rursus æger commemorata ratione euacuāndus est. Quinetiā tertio quoq; & quarto interpositis interuallis, per inferiora huiuscemodī purgationē moliemur. Interim tamen ægrotus à bilem atram gignentibus cohibeatur, cuius generis caprarū magnarū caro est, & ferina, & uaccina, & suilla, & fale condita caro, & caseus uetus, & fabæ, & in primis lenticula, oleracq; uniuersa humectandi uim nullā possidētia. fugiat quoque uina crassa & nigra, exercitia & uigilias, caueatq; ne uel fame, uel siti excrucietur. Sed his cōtraria, uinum tenue, per lucidum beneq; odorum, & frequentes ad diutinos

* Aliqui hebdomadas tres scribi uolunt.

diutinos somnos, illi iniūgere cōpetit.
 Prospiciendum etiā lieni his remedijs,
 quæ in sequētibus Capite de intumescē-
 tis splenis præsidijs, prosequemur. Simi-
 liter os quoq; uentriculi corroborādum
 est, medicamētis his, quorū mentionem
 faciam; ubi ad uentriculi affectus deuen-
 tum fuerit. Cum autē nulli ex cōme-
 moratis antea circa uentriculum affecti-
 bus, aut certe pauci melācholiæ eueniūt;
 sed si post phrenitidē, aut capitis ictum,
 aut diutinam in sole moram, aliquem ea
 occupauerit: mox inter inītia sanguis ex
 humerali uena eliciēdus est, & capiti nī-
 dem præsidijs, quæ his affectib; proprie
 dicata sunt, prospiciendum. Ad hæc ca-
 put, modice feruefacta aqua irrigādum;
 & insuper oleum rosaceū, aceto ex uino
 confecto dilutum, ab alto superfundē-
 dum. Similiter & lac muliebri capiti æ-
 gri immulgeri prodest. Naribus quoque
 oleum seminum cucurbitæ domesticæ,
 & muliebri lac, recte indētur. Quinetiā
 in balneum, humectādi facultatem pos-

Cap. 70.

Cap. 63. O

64.

Ex proprio
cerebri affe

tu.

fidens, subinde æger deducetur, & ibidē
 aqua tepēs liberaliter capitī infundetur.
 Præterea egrotans omnia odora, frigida
 facultate prædita, crebro naribus oppor-
 tune obijciat. § Cæterum si modo duo-
 rum præscriptorū affectuum, eius uideli-
 cet qui per consortium est, & qui ex pro-
 prio cerebri affectu dependet, nulla indi-
 cia melancholiam concomitentur: inter
 initia uenam, quæ ex humerali ac axillari
 dextri brachij communis est, incidēs, san-
 guinemq; præscripta ratione ex cōsisten-
 tia ac colore examinabis. Deinceps reli-
 quam medendi atque alendi rationē, in
 priori melancholiæ specie comprehen-
 sam præscribens, ægrotanti subuenies.
 Posteaquam uero hæc auxilia tētaueris,
 aliquot diebus ægrum à medicaminum
 usu quiescere fines: & deinde relectis
 uiribus, ut prius curationem, tantisper
 dum ab omni malo liberetur, aggredie-
 ris. Verum uniuersum studiū, quod
 in melancholicis considerandum existit,
 eò spectat, ut pinguiores corpulentio-
 resq;

Vtrinq; am-
 bigentis cu-
 ratio, ex me-
 lancholia sci-
 licet natura
 li, & san-
 guinea.

Tribus me-
 lanch. specie-
 bus cōia.

resq; crebris balneis potabilis aquæ, et uictu boni succi & humectate, & cum decenti animi delectatione, reddatur, siquidem ilico, simul atq; pingues obesiq; rediti sunt, à propolita noxa liberantur. Proinde cibi illis quammaxime idonei censentur, ueruecina caro, hoedina, gallinacea, & panis similagineus. Furfuraceus nanq; nulla ratione ihs aptus, utilis ue putatur. Vinu autem conuenit tenue ac pellucidum, quonia crassius nigrũq; illis ineptum est. Præter hæc, lac etiam recenter emulctũ, & adhuc tepens his confert. Similiter et saxatiles pisces recentes, & sesama saccharo preparata, atq; oleũ amygdalinum, ex usu sunt. Ad hæc cantilenas, mimosq; ridicularum rerum eos audire, & alias res præ oculis habere, quibus maxime capiuntur, exhilaranturq;, & multi somni, hoc morbo correptis presidio sunt. Contra ex graui & frequenti cogitatione, solitudine, uigilijsq; multis, graues illis noxæ eueniũt. Catapotia bilem atram purgantia, quæ decoctum

paulo ante descriptū ob nauseam respuē
tibus porriguntur. Epithymi Cretenſis
drachmæ uiginti, filiculæ (quam Græci
πολυπόδιον uocant,) agarici, utriusque
drachmæ decem, hellebori nigri drach-

* Sic Ma-
nar. salē In
dicum in-
terpreta-
tur.

mæ quinque, * saccari tantundem, sticha-
dos drachmæ septem, pulueris hieræ pi-
cræ drachmæ quindecim, finguntur ex
his catapotia, & offeruntur eorū drach-
mæ tres, uel minus pro uirium ratione.

Cæterum diebus, quibus à medicamētis
æger liber quiescit, electuarij exhilarans
inſcripti, portionē opportune assumet.

† Alij Ga-
ry. legunt.

Hoc accipit, melissę, corticum citri, † ca-
ryophylorum, galliæ moschatae, masti-
ches, croci Oriētalıs, cinnamomi, nucis

i. neheve-
misk.

* Incogni-
tæ ueterib.

radices, sed
in officinis
prostantes.

myristicæ, cardamomi, peōniæ, * been
albi & rubri, zedoariæ, daronici, § semi-
nis ocimi maioris, feminis ocimi caryo-
philati, singulorum pares portiones, mo-
sci quantum pendet decima pars denarij
unius, insuper sumito myrobalanos che-
bularum numero uiginti, & emblicas nume-
ro triginta, has conterito, & in tribus li-

olusq

bris

bris aquæ ad duarum librarum euapora-
tionem concoquito, & per colum traijci-
to. Iam percolato iuri, adijcito mellis li-
bram unam, & dein rursus decoquito,
quousq; uniuersa aqua euaporatu absu-
matur, postremo tribus huius cocti mel-
lis partibus, partem unam prædictorum
medicaminū in puluerem detritorū, adij-
cito. Cum autē usus postulauerit, huius
antidoti, nucis auellanæ instar, offero.
Sanè electuarium hoc, animi hilaritatē,
coloris iucunditatem ac amœnitatē, bo-
namq; concoctionem creat, adhæc cani-
ciem quoq; retardat.

*Frigidis
scilicet
quàm ido-
neum.*

De distillatione, raucitate, & grauedine.

Caput XIII.

CVM aliquis post balnei usum, aut
exercitium, aut aliam quampiam
occasionem calefacientem, caput in aëre
ambiente frigidiore, & uentis aquilonijs
flantibus detexerit, & inde naribus & pa-
lato pruritus ac titillatio, nimirū in spon-
giosis ossibus, & commotio sternutatio-
nesq; prouenerint, adhibeat linteum ca-

*Ab aëre fr-
gido cer-
brū comp-
mente.*

C 4 lefactum

lesactum capiti: atq; id tantisper, dum calorem in profundū capitis penetrare sentiat, relinquat. Deinde nigellam naribus odoris gratia admoueat: & eius etiā puluere, aut struthij nariū foraminibus inspirato, sternutationes prouocet. Præterea ne peccans humor in dorsalē medullam fluat, supinum decubitum uitet: multam quoq; ciborum ingestionem, præsertim uaporosorum, ac uini potum fugiat.

*Cum calida
intēperie.*

Quod si affectus linthei excalesacti usu nihil remittat, sanguinē humerali uena secta mittere, ac uētram remedijs aluum lenientibus atq; emolliētibus ducere expedit. Tale est subsequens decoctū, quod tusse & thoracis asperitate correpto, aluiq; solutione indigēti, potui datur. Accipit autē * sericas numero uiginti, * myxas triginta, uuarum passarum ab acinis liberatarū drachmas decem, uiolarū exiccatarum drachmas quatuor, dulcis radicis à cortice liberæ, & nonnihil contusæ drachmas quinque, ficus caricas decē, omnia in tribus libris aquæ, ad duarum absumptionem

* Sic iuu-
bas, & sebe-
ren inter-
pretor.

sumptionem decoquuntur, deinde per colum trañciuntur: & in percolato hoc decocto cassiæ fistulæ drachmæ septem, manne (quam antiqui mel aërium appellant) drachmæ decem dissoluuntur. Cæterū, si neq; uenæ humeralis incisio, neq; alui deiectio præsentī affectui opem attulerint, & materia quoq; in thoracē defluerit: ad hæc si cum tussē febris infestauerit, ilico uenā axillari, aut ea quæ ex axillari & humerali communis est, secta, sanguinem mittes, & à carniū & uini usu ægrum arcebis. Item quādiu ingens calor, tussisq; aspera & arida perseuerauerint, potui porriges hordei decoctū, aut iuleb uiolatū (Græcis iozulapon appellatum) quod ad hunc modum cōficitur. Violarum uncia tres, in tribus sextarijs aquæ per diem macerantur: excolatæq; aquæ, libræ tres sacchari adijciuntur. Verum calore se remittente, tussēq; sicca in humidam uersa, ut iam æger expuat: infra scriptum decoctum unā cum iam narrato iuleb uiolato indies tantisper, dum

pectus

pectus expurgetur, & tussi æger liberetur, uoxq; pristinae claritati restituatur, propinandum est. Quod decoctum accipit, ficus caricæ quinq; sericæ decē, myxas uiginti, uuarum passarum albarū ab acinis mundatarū drachmas decem, dulcis radicis, cui cortex ablatu sit, drachmas quinq; omnia donec tabuerint aquæ incocta, per colum trañciuntur. Huius decocti quotidie uncia tres, admixtis iuleb uiolati drachmis quinq; exigēte usu porriguntur. Porro si inueterauerit tussis, molestaq; esse perrexerit: curationem eius, ut Capite de tussis præsiidijs persequar, aggredieris. Cæterū si defluxus humorū ad nares, Latinis grauedo, Graecis *κόρυζα* appellatus, perseuerauerit: suffitibus per infumibulum, aut calamum in naribus transmisis, cōhibebitur. Proinde si humor, qui ad nares decumbit, tenuis, acris, mordax, sup pallidusq; extiterit, suffumigationem ex * sulphure, aceto macerato posteaq; resiccato, tētabimus. Aut si libet, ex hordeo fabisue decortica

* Legendū
puto si resu-
re, cū Auic.
non sulphu-
re, cum Me-
sue.

tis, acetoq; cōmaceratis, ac deinde exicca-
tis, aut ex saccharo cādido, sandaloq; al-
bo, suffitu prædicta ratione utemur. At
si nullā caloris notam facies præ se ferat,
suffumina ex costo, uel thure apparabi-
mus, nā & hæc quoq; fluxus reprimunt.

Opportum
hos suffitus
purgatio
præcedet

De lippitudine, quæ ὀφθαλμία Græcis
uocatur. Cap. XV.

QVando adhærescens oculi mēbra-
na, quæ natura alba est, ob sangui-
nis affluxum cruenta apparet, & ex ocu-
lis lachrymæ refudant, atq; in maioribus
oculi angulis sordes quædam colligun-
tur, ægrum lippitudine infestari certum
est: quæ pro symptomatum numero ue-
hemētiaq; modo grauis, modo lenis exi-
stit. Verū inter huius uitij species, deterrī-
ma ea esse fertur, quæ oculorū alba adeo
inflata tumidaq; habet, ut nigredinem
(quæ corneæ pars tota est, adhærēte mē-
brana non obtecta) obtegere, palpebras
q; inuertere uideatur. Mox itaq; per oph-
thalmiæ curationis initia, uenam hu-
meralem patienti oculo oppositam, in
* extrema

* Puto, illā
non ex sola
cōstare hu-
merali, sed
ex ea & cō
muni factā.

* extrema manu pollicis uicinam, aut su-
pra cubitum, secare iuuat: nisi leue ma-
lum fuerit. Siquidem tunc ē directo par-
tis læsæ, secta humeralis uena, ut & in cō-
sistēte fluxus, opē fert. Quocirca quan-
to uehementior affectus est, tanto maio-
rem sanguinis copiam detrahare decet.
Post sanguinis autem detractionem, al-
uus myrobalanis citrinis, manna (ueteri-
bus mel aërium appellata) & fructuum
quorundam, ut prunorum, tamarindo-
rum succo, ducenda est. Aeger quidem à
carne, uino, & cibis dulcioribus arcen-
dus: parcior quoq; uictus illi præscriben-
dus est. Quod si hæc inefficacia fuerint,

* Id in aug
mēto cōmo-
dū, in prin-
cipio solare
percutiētia
conueniūt.

* collyrium album lacte mulieris puellā
lactantis leuigatum, oculis illinetur. At
si sordiū multitudo in oculis collecta sit,
specillo lana mollī inuoluto, ac aquæ ro-
satae immerso, oculum à suis sordibus li-
berare cōpetit. Dehinc puluis albus in-
spargendus, oculisq; mollis lana * mu-
liebri lacte imbuta, cum laxa fascia (ne
puluis lachrymis eluatur) illiganda est.

* Huius la-
tis natura
pud Plin.
li. 28. ca. 7.

Deinde

Deinde oculis ita molliter astrictis, & ægro in tenebrosam domum deducto, omni studio & conatu somnum illi conciliabimus, summopere cauentes, ne in affectum oculum, aut capite depresso & inclinato decumbat. Sint itaque omnia capitibus indumēta laxiora, ac minus stricta: nec diu pronus, imò potius supinus cubet. Porro si à uenæ sectione, atq; alui deiectione, oculus leuior, & dolor eius sedatus, & * tumor mollior, & lachrymæ imminutæ fuerint, balneum subinde æger conscendat. Siquidem hoc morbi reliquias dissipabit, ac depellet. Cæterū humidis sordibus oculiq; grauitate permanentibus, puluerem citrinum accommodo oculo inspirabis. Ex horum remediorum genere, quod lippitudine uexatis multum conducit, etiam est linimentum subscriptū, epithematis instar frontis ac palpebris accommodatum. Quod recipit: Glaucij præparati succi, rosarū, aloës, lycij, sandali rubri, nucis Indicæ, croci * Orientalis, singulorū æquas portiones.

* Id in quibusdā exemplaribus deest.

Epithema ad palpebrarum tumorem. confer fol. 61.

* Ita à crico id Rhazes distinguit.

tionēs, ex quibus omnib. inter se coriandri succo commixtis, finguntur collyria: & ubi usus exoptulauerit, unum illorū coriandri aut intybi succo, aut rosacea aqua læuigatum, dictis iam partibus inungitur. Hoc remedio si eger usus fuerit, superis fauentibus, sanitati restituetur.

Collyriū album: Cerussæ ablutæ drachmæ decem, sarcocollæ crassioris drachmæ tres, tragaganthę drachma una, opij sedrachma, hæc iuuenulæ lacte detrita in collyria, lenticulæ instar digerūtur. Puluis citrinus: Sarcocollæ crassioris drachmæ decem, aloës drachmę duę, croci tantundem, myrrhæ drachma, lycij drachmæ duę, his in pollinem subactis, ubi usus erit, puluis oculo inspirabitur. Puluis albus, Sarcocolla alba & pinguis, lacte mulieris potissimum iuuenulæ macerata, in umbra tantisper dum exieceratur, relinquatur, deinde exactissime conteratur: & singulis eius pulueris drachmis decē, adijciantur glaucij succi drachmæ duę, hæc rursus in puluerem tenuissimum

simum detrita reponuntur, postulantēq;
usu oculo insparguntur.

De oculorum ulceribus. Cap. XVI.

Abscessum oculo innatum præsa-
giunt, ingens & uehemens puncti-
lis ac pulsabilis dolor, multæ profluentes
ab oculis lachrymæ, & uniuersus ocu-
lus, aut abhærescens mēbrana sola, cruo-
re suffusa: quorum ruborem apertis ocu-
lis, aut inuersis palpebris, intueri licet.
Deinde in oculo unus locus altero san-
guinolentior, aut in cornea conspicua
parte locus aliquis albus apparens, ocu-
li quoq; abscessum indicāt. Cæterum ad
præsentis affectus auxilia instituēda ad-
mouendaq;, Medico in oculorum ægri-
tudinibus profligandis exercitatissimo,
& natura sagaci, opus est. Veruntamen
nos curationis capita & summam, atque
præcipuam medicaminū rationem, pro-
sequemur. Dicimus itaque, ulcera in
coherente membrana (quā oculi albū
nonnulli appellant) oborta, non ita esse
perniciosa periculosaūe, ut sunt ea quæ
corneæ

corneæ parti adnata mēbrana non obte-
ctæ innascuntur. At omnium pernicio-
sissimum ulcus est, quod corneæ è pupil-
læ regione euenit, siquidē hoc ulcus pu-
pillæ procidentia subsequi quàm ocys-
me solet. Huius itaq; inflammationis cu-
rationem, à uenę humeralis incisione au-
spicabimur, sanguinis copiam quoad fie-
ri poterit, imminuentes, dein ad alui solu-
tionem properabimus. Et æger à carniū
& uini dulcis usu arcebitur, solarūq; inte-
rim refrigerantium herbarū, ut intybæ,
portulacæ, lactucæ esu, atq; aquæ potu
contentus uiuet. Oculo uero per initia,
collyrium album muliebri lacte detritū,
immittendum erit. Quod si modo dolo-
ris pulsatis uehementia, cæteraq; sym-
ptomata remitti uideantur, spes est mor-
bum sine suppuratione solutum iri. At si
pulsatis dolor post detractum sangui-
nem, & deiectum uentrem, atq; collyrii
albi usum, neque quiescat, neque remit-
tat, exigua spes superest, inflammationē
illam sine puris collectione curari posse.

Quare

*Inflamatio
nis nondum
suppuratis
curatio.*

*Iam suppu-
ratis inflā.
& ulceris
curatio.*

Quare tunc oculo collyriū ex thure inducendum est, & hapsus aliquis ex molli lana admotus, illigādus est. Verū priusquam inflammatio suppureſcat, oculū leniter ne dolore excruciet, abſq; hapsu lanæ conſtringere decet. Nec tūc quoq; à collyrij ex thure uſu abſtinere cōpetit: quoniam tantisper dum inflāmatio ſuppuretur, illud illinere confert. Pure uero iam nato, collyrium ex plumbo, quouſq; cauitas tota abſceſſus impleatur, uniuerſaq; caro regeneretur, quā conuenientiſimū erit. Hæc autem præſidia abſceſſu non magno exiſtente, opportune tentantur. Nam ſi magnus pupillæq; uicinus abſceſſus ſit, operæ precium erit, collyrium Eleiſier, mox ad finē capitis ſubſcribendum, cydoniorum malorum nucleorum læuigatum oculo accommodare, ac eodem tempore hapsum quoq; ex tenera lana, molliter oculo alligare decet, ne ulceris occaſiōe pupilla procidat. Proinde ad hæc ſupinus decubitus, depreſſo non nihil capite, & à uehementio-

re motu ocium & quies ægro conueniunt: Cæterum carne iam in abscessus ac ulceris loco regenerata, uniuersaq; cavitata impleta, relinquetur in oculo alba quædam cicatrix: quæ si profundius ulcus fuerit, crassior: si uero in † corneæ tantum superficie extiterit, tenuior superficiariaq; erit. Cicatrix tamen illa seu calculus, si remotius ab oculi pupilla ulcus constitit, nihil incommodi adferre potest. Sin autem pupillæ uicinior, post ulceris curationem, alba cicatrix relicta fuerit, uicinitatis ratione uisionem abolebit. Quapropter tum illis præsijs, quibus albugines absterguntur tollunturq;, utendum erit. Collyrium ex thure. Ammoniâci, sarcocollæ, utriusq; drachmæ quinque, thuris drachmæ decem, croci drachmæ duæ, omnia læuigata, ac fœnogræci succo excepta, in collyria digeruntur.

Collyrium de plumbo. Plumbi usti & loti, stibij, pompholygis ablutî, æris usti, gummi Arabici, tragacanthæ, singulorū drachmæ septem; opij sedrachma, hæc simul

Cuiusq; partibus sua quædam caro.

† *Alias carnis.*

Collyrium ex thure.

Collyrium de plumbo.

mul contrita, per tenuissimum pannum sericum cernuntur, & puluere aqua pluviali consperso, informantur ex eo collyria. Collyrium deperditam ulceris oculi carnē regenerans, & pupillae procidentiam prohibens, & relictam cicatricē seu callum extenuās, abstergensq; Cadmiæ ablutæ, pompholygis loti, ferussæ, stibij, thuris, singulorum drachmæ duæ, myrrhæ drachma una, sarcocollæ crassioris sesquidrachma, cinnabaris, aloës, opij, singulorum drachma una, finguntur ex his collyria. Collyrium autem Eleifer uocatum, quo ex ulcere procidentia pupillae metuētes utimur, in hunc modum se habet; Stibij, lapidis hæmatitis, utriusque drachmæ decem, acaciæ drachmæ tres, aloës drachma una, his cydoniorū nucleorum succo subactis, informantur collyria: ac dum usus expetit, oculo accommodantur.

*Collyrium
polychre-
ston,
carnis ge-
nerationi.*

*Collyrium
Eleifer.*

Ad ea quæ oculis incidūt educēda. Ca. XVII.

SI pilus, festuca, aut quid aliud oculo fortuito inciderit, sumito specillū re-

lina pinea illitum, uoluitoq̄ per oculū,
& adtrahet id quod oculo illapsum est.
Idem succinum attritu calefactum, ocu-
loq̄ admotum præstat.

De albugine oculo innata. Cap. XVIII.

QVæ oculis innascitur albugo, cicatrix est, post ulcerum curationem, dum eorum continui solutio restituitur, relicta. Quæ si in puerorum oculis oboriatur, facilioris curæ erit, quàm in seniorum. Siquidem in senibus facta albugo, haudquaquam curationē admittit, nisi perquam tenuis & superficiaria ac nebula instar extiterit. Præsentem porrò affectum, præsidij his discuties. Postq̄ æger balneo corpus emolliente egressus fuerit, aut facie quàm minime prona, uapore aquæ calidæ, aut fœnogræci tepentis decocti, tantisper dum ipsa rubeat, receperit, infra scripti pulueris portionem oculo insparges. At si id remediū uenas turgidas ac sanguinolentas effecerit, doloremq̄ inflammatorium concitauerit, ab eo cōquiesces, donec hi affectus oculi

remissi

Etiã si seniorum nō curamus, ad fucū tamen eas tingimus.

remissi fuerint, dein idem subsidium repetes. Medicamen præstantissimum, albuginem probe detergēs, citoq; discutiens: quo ego in exterendis albuginibus, neq; efficacius, neque generosius, aut ulli par comperi. Accipe massacumia (quod ex plumbo, uitro, silice conficitur, quo scilicet fictilia uasa illinunt) halcyonij, quod alij spumam maris uocant, stercoris magnæ lacertæ, nitri naturalis non factitij, sacchari albissimi, singulorum pares portiones, dein fume acori, chelidonij * utriusque drachmas decem, & decoque in libra una aquæ, ad trium partium cōsumptionem: postea percolato, & hoc decocto comprehensas medicinas subigito, & liquore imbibito, in umbra exiccādas seponito, ac denuo contritas, & ut prius asperfas exiccato, id ubi quater præstiteris, rursus omnia, ut prius exiccato, cōteritoq; ac oculo puluerem inspargito. Siquidē hoc medicamen nulli in detergendis albuginibus, ut dixi, est secundum. nam crassiores albugines, etiam bruto-

*Descriptiō
est ex libro
Secretorū,
qui falso Ga
leno ascribi
tur.*

** Aliq ad
dunt fœni-
culum.*

rum, ut equorum & bouum oculis innatas, extergit.

De scabricie & tunicula. Cap. XIX.

Ab erodēte humore.

A suffuso sanguine in adherētē tunica.

Cum palpebram inuersam, interius rubro colore suffusam, & asperam inæqualemq; aspexeris, scabie ea molestatur. Et quando super oculorū alba & nigredinem, quiddam tuniculæ instar, uenis multis cruentis & turgidis contextum cernis, affectus adest, qui Arabibus à tunicæ forma Sebel dicitur. Sanè utraque hæc uitiā grauiā sunt, & diuturna, atque ad curādum contumaciā. Nihilominus tamē inter inītia, dum æger sanus est, nec affectus inualuit, uenæ sectione brachij & frontis, & alui solutione utatur. Et ab esu palmularum, & sesamī melle præparati, & temulētia abstineat. Præterea uacuum corpore, nec cibus distentum ægrotantem subinde ad balnea deducere, identidem quoque laborātī oculo collyrium rubrum illinere, profunt.

Collyrium rubrum, Lapidis hæmatitis, æris floris cremati ac loti, utriusq; drach-

mæ

mæ tres, æris usti drachmæ duæ, croci drachma una, myrrhæ tantundem, pipe ris lōgi sedrachma. posteaquam uino ueteri ea læuigaueris, redigito in collyria. Præter ista collyrium uiride, Capite de ungui descriptū, si illinatur, opem fert. Quod si morbi hi in uetustatē proruperint, scabies, inuersa palpebra & instrumento (quod à palpebrarum rasura *ελεφαρόξυστρον* Græci appellant) per summa derafa. tunica uero suppuratione & concoquētium usu perfanari debent. At horum curationem præsentis libri metæ, quum ad manualementem pertineat, haudquaquam admittunt.

Ad maiorum angulorum carunculas pruritu uexatas. Cap. XX.

SVmito intybum tenellum ac uirens, & eo manibus exacte contrito, infornato globulos paruos instar oculi, & oleo uiolaceo circumlitos, ac oculis clausis superaccommodatos, ægrotanti somnum inuito, illigato. Verum rosaceum pposito affectui generosius est, citiusq;

C 4 auxiliū

Horum curatione latiss.
lib. 4.
Secundū locos.

A mordac succo.

auxilium præstat. At si hæc inualida fuerint, accipito lentes excorticatas, rhus obsoniorū, rosas rubras, & mali punici acinorum succum, hæc trita sapa, hoc est decocto uino, conspergito, ac in morem emplastrī pruriginoso angulo inducito. Quod si ne hæc quidem suffecerint, humeralem ægrotantis uenam primum incidito: deinde eam, quæ recta in frōte repit, ac eas quæ ad maiores oculi angulos sunt. Ventrem quoque subinde medicaminibus bilem flauam ciētibus deijcito. Item egrum identidem ad reprimēdum humorum acrimoniam, in balnea dulcis aquæ deducito.

De ungui oculorum, quod πτερυγίου
Græcis uocatur. Cap. XXI.

Ob cōcoctri-
cis uel ex-
pultriciis im-
becillitatē.

QVando aliquid membranulæ neruosæ instar, ex angulo oculi nares spectante oriri, & oculi album obtegere, ac ad usq; nigredinem eiusdem protēdi cernitur, affectus unguis appellatus, oculo innascitur. Huius noxa tunc demum peior censetur, dum ad nigredinem, quæ è regione

ē regiōe pupillę est, malū preperit. Hac itaq; mēbranula tenui existente, collyrio uiridi, & collyrio ex æris flore, eā elidere tentandū est. Sed postq̄ in uetustatem & crassiciē unguis deuenierit, scalpello ad id parato est euellēdus. Collyrium uiride, quod tuniculę Sebel dictę, ungui & albę cicatrici auxilium præstat. Aeruginis drachmę tres, æris floris combusti drachmę sex, auripigmenti rubri, nītri, halcyonię, singulorum drachma una, salis ammoniaci drachma semissis, guttę ammoniaci drachmę duę. ammoniacū in rutę succo dissoluitur, & reliquis medicinis eo aspersis, informantur mirificę uirtutis * collyria, etiā si paulo uehementiora sint. Collyriū ex æris flore, quod unguem exerit, Aeris cremati, æris floris, utriusque drachmę quinque, æruginis drachmę duę, salis ammoniaci, nītri, * auripigmenti, quod sublimatū sit, singulorum drachma una: conteruntur omnia: & septimanę spacio, ut melius exiccantur, reponuntur. deinde illis rutę

Chirurgia
apud Aëtiiū
lib. 7. c. 60.

* Præstātissima sunt, si ne liquore detrita, siue instar pulueris admota.

* Id inter reliqua est mordacissimum.

58 PARA. IN NONVM
succo conspersis, finguntur collyria, quibus unguis affricatur.

De uibice, ac cruentis suffusionibus ex ictu
aliãue causa. Cap. XXII.

Ob paruarum uenularum diuortium.

Vehemens multum.

QVando in oculo ex plaga, seu alia quauis occasione, maculam sanguinolentam fieri contigerit, sanguis ibidem ex affluxu collectus (postquam æstus & fluxio conquieuerint) discutiendus est. Sumito itaque auripigmenti rubri, thuris, myrrhæ, ammoniaci, singulorum æquas portiones: his coriandri succo detritis, formato collyria, ac illa coriandri succo læuigata, oculo exigente usu ilinito. Verum quam diu dolor perseuerauerit, albumen oui oleo rosaceo commisceto, & lanam teneram illis imbutam oculo illigato. Etiam columbæ sanguinem ex teneris alis expressum, statim per initia opportune post uenæ sectionem, si opus sit, instillabis.

A frigido humoris affluxu.

Ad lachrymas. Cap. XXIII.
CVM maiores oculorum angulos continenter

tinenter uidos ac madentes conspexeris, egrum quotidie ieiunum, & corpore expurgato, ad balnea deducito: & oculo hunc subscriptum puluerem, tenuitate atomis non absimilem, inspargito. Puluis quidem iste accipit, pompholygis drachmas decem, corallij rubri & albi, myrobalani citrinae & contritae, aloes, singulorū drachmas duas, piperis drachma semissem, haec in pollinem tenuissimum detrita, oculo crebro inspirantur.

Presente calore amoue piper.

De uisus debilitate. Cap. XXIII.

SI cum uisus imbecillitate, manifestae humiditatis notae apparuerint, quae tempore inediae & exercitij non nihil remitti uideantur, catapotia coctia, leuioribus purgantibus praesidijs tentatis, subinde egrotanti porrigere, & alimenta siccantia & extenuantia administrare oportebit. Vomitum quoque subinde post assumptos cibos incidentes, ad pituitae educationem, irritare opportunū est. Oculis autem pulueres siccandi uim possident,

Ex humiditate, aut spirituum crassitie.

Ex siccitate, aut spirituum penuria.

tes, utiliter inspargentur. Quod si iam dictum affectum siccitas, corporisq; macies concomitentur, copiosius & humectans alimentum, & uini potus, ex usu erunt. Item aqua egelida capiti liberaliter infundenda, atq; ad tepentis aquæ uaporem facies inclinanda est. Naribus autem ac auribus, oleum amygdalarū dulcium instillandum, ac oculis lac mulieris adoleſcētulæ quotidie, idq; sepius est infundendum. Hæc porro imbecilli uisus species, famis tempore & uacua aluo, increſcit, magisq; intenditur. Compositio pulueris tenuissimi, uisum qui humiditatem suæ imbecillitatis causam obtinet, exacuens. Accipito pompholygis rosacea aqua abluti siccati q; drachmas uiginti, deinde exprimito sampſuchi uirentis succum, et posteaquam nocte una quousq; fæces subsiderint, requieuit, eū percolato, & eo succo aspersum pōpholygē, donec exiccetur seponito, posteaq; conterito, Insuper sumito zingiberis, piperis nigri, piperis longi, chelidoni, singulorum

*Puluis ad
humiditatē
oculi.*

gulorum drachmas duas, salis ammoniaci drachmā unam, pompholygis ad prescriptum modū præparati drachmas viginti, hæc omnia cōterito, & succo uirentis fœniculi aspergito, & rursus siccata ac contrita reponito, & exposcēte usu, oculis iniiciens utere, Præter ista quoq; proposito affectui collyrium ex fellibus illitum optime facit: sed ualde acre & mordax est.

Ad palpebrarum tumorem, Græcis χέμοσιϋ
appellatum. Cap. XXV.

OCulo epithema humorū affluxum reprimens, Capite de oculi lippitudine descriptum, illinito.

*A sanguinis
influxu.*

Fol. 45.

Ad palpebrarum pilos, oculos iritantes.
Cap. XXVI.

SI pilus unus alterūe oculo infestus fuerit, alijs rectis palpebrarum pilis, mastichæ, aut oleo sesamino, illū agglutinato, aut radicitus eos euellito: ac locū, à quo euulseris, mucronato ferro, aut acurito. Verum si multi pili oculum iritaerint, necessitas tarsum præscindere cogit.

Ob siccitatem, aut pororum obliquitatem.

git, Cæterum eius negocij tractatio, nostri propositi libri limites transcendit.

*De suffusione, siue humorum in oculum
affluxu. Cap. XXVII.*

QVandoque ante oculos culices alii-
cui, uel alia tenuia, lucentia, caligi-
nosaq; corpuscula perperam obuersari
uidentur. Quod nonnunquam propriæ
noxæ oculi, nonnunquam uentriculi af-
fectui fertur acceptum. Quare inter hæc
dico discrimen habendum est, neque sanè
hoc symptoma homines infestans parui
pendendum est. Quod si ob uentriculi ui-
tium euenerit, non metuendum, ne ocu-
lo magnam noxam adferat. Sin ex pro-
prio oculi affectu sit, metu grauioris ma-
li non caret: siquidem id suffusionis ini-
tium esse consuevit. Cæterum affectus
hic, dum recens est, nondumq; radices
egit, medicamentis eliditur. At ubi uetu-
stus perfectusq; extiterit, sola punctori
styli mucronis per corneam pertusione,
curari potest: licet fortasse nec pertusio
quidem, ipsiusq; membranulæ a pupillæ
regione

*Paul. lib. 6.
cap. 21.*

regione depressio, opem adlatura sint.
 Quā ob causam inter hæc duo iam enar-
 rata, merito discrimen summo studio in-
 quirendum est. Quod autem id sit, per-
 stringam. Cum igitur utrique oculo, mi-
 scæ, aut culices, aut quid simile occurrere
 uideatur, pro certo habēdum, ex affectu
 uentriculi malum pendere. Si autem alte-
 ro tantum oculo huiuscemodī apparitio-
 nes conspiciantur, uitiū oculo propriū
 esse iudicatur. Sic etiam quando cibus di-
 stenso uentriculo, & eo ingesta male con-
 coquente, nauseaq; laborante, solito plu-
 res cerni uideantur: tempore uero inedia,
 aut exercitiū, pauciores hallucinationes
 eueniant, & tunc quoque sciendum est,
 ab ore uentriculi affectum pendere, idq;
 maxime si duobus tribusue, aut etiā plu-
 ribus mensibus suffusionis apparuerint
 accidentia, contemplantiq; tibi pupillā
 nihil tenebrosū cōspiciatur. Dum ita-
 que harum coniecturarum congeriem
 congesseris, catapotia coccia porrigito:
 quibus si affectus in totū extirpatur, præ-
 dictis

dictis notis indicationibusq; fidē dabis, utpote affectu à uentriculī uitio dependente. Cæterum si altero tantum oculo uisa fuerint, & singulis diebus perpetuo huiuscemodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet die interueniente, qui omni reprehensione caruerit, censendū est suffusionis (quam aquam aliī uocāt) adesse initia: præsertim si altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut (ut breuiter dicā) non exacte pura uidetur, quæ si ita se habeant, certo certius est suffusionem esse.

Mali, ex oculi uitio curatio.

Quando itaq; affectus hic ex propria dispositione oculi pendet, ~~prohibendum~~ ægro, ~~ne cucurbitulis~~, neque ex uenis in manum distributis, sanguinē extrahat; similiter quoque, ut piscium, & eorum quæ humectāt, pituitosumq; succum generant, esum fugiat hortaberis. Aluum uero frequēter catapotijs coccijs deijcies, & ægrotum calefaciētibus siccantibusq; ales, atque hydromel potui illi propinabis. Oculis uero collyriū ex fellibus oportune illines, Collyrium ex fellibus, quod

*In initio Paulus et Aëtius uenā secāt. Præstiterit ante leuio-
ra à Galeno descripta tentasse.*

quod auxiliatur incipienti suffusioni, & pupillæ dilatationi, & his qui post occasum solis non uident, & hebetudini uisus, humiditatem sui occasionem habentibus, hac ratione conficies. Fellis gruis, fellis piscis, Arabibus * sabot dicti, fellis hircini, fellis accipitris, fellis aquilæ, fellis perdicis, singulorum siccorum unum, aut plura, horum aridorum drachmis decem, adijcias euphorbii, syluestris cucurbitæ, fagapeni, singulorum drachmā unam, his simul omnibus attritis, & succo uirētis feniculi aspersis, formato collyria. Exigente quidem usu, unum lacte muliebri, aut oui candido læuigatum, oculo illinito.

*Nos Lucij utemur, Galen. quoque callonymi meminit.

Ad nocturnam cæcitudinem, quæ *νυκταλω* Græcis dicitur. Cap. XXVIII.

HVic affectui idoneum est, hepar caprinum scissum, & sectionibus singulis iniectum piper longum: & pipere eisdem sectionibus occluso, in clibanum hepar mittitur, & tantisper dum assetur exicceturque, non tamen uratur, relinquitur, quo affato, piper longum extractum,

Ab aquei humoris et spirituum crassitie.

E diligenter

diligenter cum moschi momento cōteritur, ac sanie, quę ex asso iecore resudauit, conspargitur, & exiccatur in pulueremq̄ detritum, oculo crebro insufflatur. Iam quoque ipsum iecur opportune edendū porrigitur. Aut caprillum fel mellis commixtum, in æneo uase super ignem decoquito, & dein specillum fellī intinctum, oculo admoueto, magis tamen profeceris, si collyrium ex fellibus muliebri lacte detritum oculo inunxeris. Porrò si hæc omnia inefficacia fuerint, aluum deijcito, ac sanguinem ex utrisq̄ humerarijs, & frontis uena detrahitō, uictusq̄ rationem extenuato.

De dilatatione pupillæ. Cap. XXIX.

A siccitate.

Cum pupilla, hoc est foramen, quod propter uueam tunicam à natura perforatur in nigredine oculi cernitur, usque adeò dilatatur ac patescit, ut omni ex parte alba oculi attingat: & si id post uehementem capitis dolorem euenerit, modica eius restitutionis spes habenda est. Exigua autem existente dilatatione,

Ab humoris copia.

uentrem

uentrem catapotijs coccijs subinde deij-
cies, ac identidem collyrium ex fellibus
oculo illines. Cæterum si pupillam pro-
pter ictum dilatari obtigerit, haud quæ-
formidandum: quia nisi uuea tunica di-
uulsa sit, pristinae integritati restituetur.
Parabis itaque ad huiuscemodi uitium,
emplastrum ex fabarum farina, chamæme-
lo & althæa: & hæc in uino & aqua con-
tusa, oculo (non statim tamen a princi-
pio,) induces.

A plaga.

De fistulis maioribus oculi angulis acciden-
tibus. Cap. XXX.

SI quādo angulus maior madet, cūq;
comprimitur, fanies & pus emanāt,
fistula ægrum molestat, cui ignito ferro
præsentissime succurritur. Verum eius
usum docere, ab huius libri tractatione
alienum censetur. Nihilominus tamen
subiungam remedium: quod si accōmo-
ueris, ipsam resudationem per mēses plu-
res ita comprimes, ut eger conualuisse ui-
deatur. Medicamen hoc accipit, Aloës,
thuris, sarcocollæ, cinnabaris, balaustij,

A putri &
erodēte hu-
more.Apud Cel.
lib. 5. ca. 28.

stibij, aluminis, singulorū pares portiones, æruginis quantū pēdet quarta pars unius, hæc trita, ac plātaginis succo subacta, in collyria redigito. Cū aut̄ usus expetit, fistulā, donec uniuersa sanies in ea coaceruata pfluxerit, præmito, deide ægro in latus sanū, fistulæq; non obnoxiiū decūbēte, iam descripti collyrii in succo plātaginis, aut iure decoctæ gallę immature dissoluti, tres guttas, aut quatuor, nō simul quidē, sed unam post aliam, iusto interposito interuallo, in magnum oculi angulum, fistula tentatū, instillato. Quo peracto, æger trium horarū spacio, prædicta figura decumbet. In aurora insecuti diei, rursus fistulam exacte comprimito, ac eandem curationem reiterato, atq; deinde septimana una, aut quam diu fistula pressa resudat, idem repetito. Siqui dem hac curatione, locus fistulę infestatus, ficans multis mensibus seruabitur.

*Fusissime li.
4. Secūdum
locos Gale-
ni.*

De oculorum autem præsijs, quantū præsens institutum exigat, iam satis pertractatū existimo. Reliqua uero quum

ad

ad curationes, quæ ferro ac manus admi-
nistratiōe peraguntur, pertinent, relin-
quam, quoniam multis remedijs, atque
longa pertractatione opus habent. Sunt
tamen nonnulla ex horum genere in his
libris, quib. de decoratione, & fucis, tuē-
daq; sanitate egimus, descripta.

De aurium dolore. Cap. XXXI.

SI aurium dolorem, faciei & auri vi-
scinarum partium inflammatio do-
lorq; pulsatilis concomitentur, sangui-
nem ex humerali uena secta, jægrotanti
detrahito. Item oleum rosaceū, oleumq;
de floribus salicum, modice ad auris sen-
sum calentia, cum aceti pauxillulo, in au-
ditorium meatum infundito: ac ea hap-
sua lanæ mollis excepta, & paululum refrige-
rata, foris admoueto. Lac quoque ita ca-
lidum, uti est recēter emulctum, subin-
de cum oui candido, auri instillato. Ven-
trem autem myrobalanis citrinis, scam-
monio, & aloë, uehementer ducito. Præ-
parabis autē huiuscemodī medicamen,
in hunc modum. Sumito myrobalano-

*In. 4. scili-
cet, & 5. ad
regem Al-
mansor.*

*Ex inflama-
tione cōtra-
cto.*

rum citrinarum drachmas uiginti, & in puluerem contritas, duabus libris aquæ quousque ad duas tertias libræ unius ea absumatur incoquito, deinde decoctum per colū trañcito. Insuper accipito aloës drachmam unam, scammoni obolum unum, hæc discocto cydoniorum succo aspersa, atque in catapotia septem digesta porrigit: & deinde post duarum horarum intercapedinē decoctum, quo catapotia foelicius agant, præbeto. Quod si dolor minime conquiescens urget, opij momentum, oleo rosaceo temperatum, auri immittito. Et si post opij usum, dolor pulsatilis, priori similis redierit, tri-duoq; talis perseuerauerit, oleum ex sesami semine, in quo anatis aut gallinæ adeps dissolutus fuerit, subinde sensim auri infundito. Siquidem tunc auri abscessus inest, quem suppurare decet. Quando itaque dolor sedatus fuerit, suppurationem perfectam esse scito, & subitam insperatamq; ab aure puris profusionē exspectato. Cæterum dum dolor aurium,

A crassis uiscosisq; humoribus.

rium, post fastidiosam repletionem, aut uentos frigidos, molestauerit, oleum in quo ruta cepaue incocta est, tepidum auri immittito. Quod si hoc inualidum fuerit, oleum in quo turbit decoctum sit, auditorio meatui instillato. Aut oleum liliorum, (cui ad singulas uncias, euphorbij recentis & castorei utriusque drachma una exactissime leuigata, adiecta sit,) infusum non minus iuuat. Porrò si ne hoc quidem auxilium praestiterit, aluum catapotijs coccijs ducito, & laconicum primam balnei partem (in quo sudore prouocet) intrare aegrum iubeto. Vinum similiter uetus ac robustum illi propinato, reliquamque uictus rationem calefacientem & incidentem instituito. Si uero aurium dolori adsint sonitus, tinnitus, et flatus, panicum siue milium in frixorio torrefactum, identidem feruidum per sacculos superaccommodato. Aurem quoque aegri ad uaporem aquae, cui mentastrum, stichas Arabica & sampsuchus incocta sint, inclinato. Ad haec castorei & eu-

Præstat leuiorib. ante corporis uacuationem uti.

Ex flatuoso spiritu.

phorbij, utriusque pondus quatuor granorū hordei: in iofmini olei denarijs duobus diffolutum, & deinde auri infusum, ac forinsecus illitum, magnum adfert præsidium.

De auris ulcere.

Cap. XXXII.

Primo ut ulcus mūdet, secundo ut cōglutinet, utitur.

PVre ab aure profluente, mulsa tepida crebro in uno die infundēda est: deinde infrā scriptum hoc medicamen, præsentī affectū multum accommodū, est iniiciendum. Sarcocollæ, aloës, cinna baris, thuris, singulorum drachma semis, squame ferri, æruginis, utriusq; obolus. omnibus aceto læuigatis, in aurem, quod satis est, infundatur. Vel linimētū tortile ex linteo, melle imbutum, ac dicto iam liquori intinctum, in aurem mittitur. Aeger quidem tantisper hoc medicamine, & mulsa, dum auris curetur, oportune uti poterit.

De sonitu & tinnitu aurium. Cap. XXXIII.

Nonnunquam hoc vitium ob exquisitum auditus sensum, eiusq; acrimoniam oboritur, cuius certissimum indicium

indiciū putatur, si tempore inediæ increuerit, crapulæ uero & repletionis remissior fuerit. Hic igitur affectus, cum lenior sit, sibi dedicatam curationem nullam exposcit, nisi forte aggrauescat. Tū enim opij grana duo, oleo rosaceo soluta, ac in aurem dimissa, illi (sensu nonnihil stupefacto) abunde auxiliantur. Si uero huiuscemodi affectus capitis grauitatem, & auditus imbecillitatem sibi comites fortiti fuerint, oleum seminis raphani, & oleum amygdalarum amararum, & oleum rosaceum, in quo castoreū fuerit detritum, auditus meatui instillabis. Aures quoque ad uaporem aquæ, cui sampsuchus, stichas Arabica, absinthiū, mentastrum & origanum incocta sint, opportune inclinabis. Et aluum catapotijs coccijs deiciēs, & uinum ægrotanti subtrahes, parceq; ales.

Ad grauem auditum. Cap. XXXIII.

Cum autem auditus grauitas hominem occupat, perpendendum est, an in aure sordes (quas à consistentia ce-

Ex euaporatu crudi humoris.

Post euaporationes olea accōmodo de instillantur.

ram nominant) coaceruatae sint. Quoniam huiuscemodi sordibus ibidem inueneratis, pharmacis mihi supra ad auris ulcera narratis, aut nitro in aceto subacto, aut manuali opera expurgabuntur.

Acridis huius moribus.

Verum si non sint sordibus infectae, & auditus grauitas post copiosam ciborum ingestionem, aut morbum acutum, humores ad aurem in eius iudicatione protrudentem, oborta sit, aure uaporem aquae, cui paulo ante dicta decocta sint, recipies: idcirco per infumibulum, quo totus uapor in aurem penetret. Curabis autem id rectissime ad hunc modum. Mentastrum, absinthium, samolium, suchum, aliaque superius praecedente Capite commemorata, in aeneo uase aqua pleno, & ad hunc usum idoneo, ore scilicet angustiore, decoqto, ac deinde infumibulum uasis ori accommodato, & ne uapor exhalet, linteis infumibulum & uasis os circumuoluito, ac deinceps aure super infumibili orificium inclinata, uaporem aeger uentriculo tibi non distenso recipiat. Praeterea collyrium

lyrium hoc, deinde auditorio meatui in-
 stillato. Sylvestris cucurbitæ drachma
 una, nitri scrupulum unum, castorei, ari-
 stolochiæ rotundæ, succi absinthij, singu-
 lorum drachma semissis, costi sesquiobo-
 lus, euphorbij obolus, fellis uaccini quã-
 tum ad simplicia excipienda sat est. infor-
 mato ex his collyria: & cum usus exigit,
 unum oleo amygdalarum amararum de-
 tritum, auri pedetentim ac continue in-
 fundito. Hoc enim præstâtissimum ad-
 fert præsidium dolori, qui ex pituita est,
 & sibilo, tinnitui ac sonitui, flatulentos
 spiritus causam habentibus. Præterea sur-
 ditati quoq; quæ viscosorũ crudorumq;
 humorũ soboles est. Porro si auditus gra-
 uitas post ieiunia, crebrasq; uigilias, obo-
 riatur, & fuerit facies emaciata, & oculi
 concaui, æger balneum dulcis aquæ pe-
 tat, & copiosiori potu, ac cibo humectã-
 te utatur, somnosq; plures sibi conciliet.
 Caput quoque aqua tepida cum oleo hu-
 mectandi uim obtinẽte, donec sanescat,
 perfundat. Quod si à phrenitide hoc

Ex siccitate.

Ab expurgato humore per crisi-

genus uitij inuaserit, præsijs Capite de aurium sonitu descriptis, curatur.

Ad aurium uermes, & animalcula auditus meatum irrepentia. Cap. XXXV. •

CVm auditorium meatum titillatio, pruritus & dolor molestant, & uermes inde excidunt, mentastri succum, aut foliorum persicorum, aut oleum nucleorum malorum persicorū, aut aloem in succo absinthij detritā, auri immitte, hæc nanque uermes, & animalcula aurem irrepentia, aut in ulceribus nata, interimunt.

Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt, euellenda. Cap. XXXVI.

QVādo aliquid meatui auditorio infigitur, oleum tepidum illi infundito, & ægrum in balneum potabilis aquæ deducito, atque in eo tantisper dum mollius corpus eius reddatur, immorari finito. Deinde naribus struthium in puluerē subactum inspirato: aëremq; per inspirationem attractum, donec sternutatio iritetur, ægrotātem retinere iubeto. huiusmodi

*cauendum
e illapsum
corpus hu-
midorū usu
tumescat,
pisa, faba*

scemodí nanque ex sternutatione & concussu, fortasse id quod meatui illapsum est, eijcietur. Si uero maius fuerit, quàm quod excidere possit, forpicula, aut ferro instar retusi hamí in aurem demisso, ope ræprecium est extrahere. Quinetiã idem quoq; in naribus, si usus expetit, tentandum est. Porrò si in porum auditorium aqua defluerit, capite uersus eam partem, in qua patiens auris est, inclinato, in uno pede subsiliat æger. Quod si nõ excernitur, sternutationẽ ut præcipi, pro-uocato; deinde tepidum oleum subinde aurí instillato. Neq; hoc malum parum nos anxios reddere debet, præcipue si id quod in aurem inciderit, aut ingressum sit, tetra qualitate pollet. Inde enim grauis cruciatus subsequi, & in aure inflammata, si intus maneat, conuulsiones adferri solent.

Ad sanguinem è naribus erumpentem.

Cap. XXXVII.

EX eorum genere, quæ sanguinis è naribus profluuium sistunt, est succus

Multi lacerata, capite, auri illigata, ut in alijs utuntur.

Succio utilisissima est.

cūs ōcimi maioris, in quo camphora læuigata sit, & naribus ita immiffus. Auxiliatur enim huiuscemodi *succus hoc affectu implicari folitis, aut ante fluxū sanguinis, aut tempore profluij naribus illitus. Vel accipito gypfum, cinerem chartæ ex linteis præparatæ, gallam, cinnabarim, calcem uiuam, chalcitidem, & hæc simul in puluerem detrita, naribus in spirato. Vel linimentū tortile ex linteo, his pulueribus albumine ouī exceptis imbutum, naribus immittito. Aut alumen sciffile, in puluerem longe tenuiffimum actum, cum pari portione amyli, naribus insufflato. Quod si copiofe sanguis profluere perfeuerat, brachiorū partes axillis uicinas, zonis, aut cordulis uincito. Quinetiam ut sanguinem in cōtrarium melius trahas, fœmora quoque ac testes uinculis intercipito. Porrò si affectus inualefcatur, incifa humerali partis illius unde sanguis profluit, sanguinem per interualla modice detrahare confert. Siquidem nec hac ratione sistitur, magnas cucurbitulas

* Id ex facultate fit, quoniã calidus est, nec crustam inducit.

curbitulas ignitas hypochondrijs, ea parte qua sanguis fluit affigere, cutemq; si opus sit leniter incidere, consiliū est. Medicamen sistendo sanguini longe efficacissimum. Accipies calcem albam & leuem, qua aurifabri uti cōsueuere, & subinde tritam, citra cunctationem naribus inspirabis, † uel linimentum funiculare ouī cādido liquore illitum, eaq; calce imbutum, narium foraminibus immittes.

Ad narium crustas & ulcera. Cap. XXXVIII.

CRUSTIS, quas Græci *εοχολδας* uocāt, in naribus obortis, ceram et oleum humectans, cuiusmodi uiolaceum est, & gallinaceū adipem illines. Ad hęc ægrinaribus crebro, diebus aliquot, aquæ calidæ, cui emollientia & humectantia incocta sint, uaporem mane obijcies. Cæterū crustis iam emollitis ac prolabi incipientibus, linimentum tortile aceto acerrimo sale contemperato intinctum, naso inferes, ac crustis ipsis acetum cum sale superaccommodabis, siquidem eo aceto exiccatae, diutius naribus non inhærebunt.

† alijs, &c.

Ob materia
ex caustico
rū usu adu-
sionem.

bunt. Quod si ulcera ibidem oboriātur, unguēto cerussę opportune ea restitues, præcipue si calidam admixtam habeant intemperiem.

De polypo & sarcomate. Cap. XXXIX.

*A materie
affluxu &
concoc. &
expul. imbe
cillitate.*

CUm parte inferiore narium, caro superflua, mollis, & quasi laxa & rubra albaue innascitur, & nares quoq; crassescere incipiūt, iamq; dicta carne impleri, humeralem uenam primum incidere iuuat. Deinde linimentum tortile unguento uiridi imbutum, naribus positum bene facit. Eius quidem unguenti libro septimo Almanfiori dedicato, Capite septimo, De carnem exedentibus remedijs, meminit. § Constat autem æruginis & despumati mellis utriusque uncia, quibus nonnulli addunt sarcocollæ drachmam semissem, & ammoniaci tantundem: quæ unâ cum ærugine, melle & aceto excipiunt, atque in formâ unguenti digerunt. § Verum si hoc non usque adeo efficax fuerit, * medicamē mordax ibidem à me descriptum, tantisper dum planè

** Mesteze-
bereg. Ara.
uocant.*

planè locus expurgatus exesusq; fuerit, partì laborãti inducẽ. Præterea affectui huic nonnunquam ferro, excindendo radicatus carunculam illã, succurritur. At medici id tentantes, interdũ grauius delinquant, ac ægrum (affectus differentiã non perpendentes,) in magnum uitium inducunt. Nam in naribus quoque cancer subinde nasci solet, quem sine discrimine cum polypo confundunt. Quum itaque hoc in loco obortus cãcer, neque mordacia fert medicamina, neq; quæ ferro fit præcisionem: consilium est, leniter illum attrectare, & præsiðijs leniẽtib; & sanguinis missione, & alui solutione ipsum tollere. Cognoscitur uero, an huiuscemodi affectus cancer sit, ex eo uide licet, si durus est, & uenas tumidas habet, & ad palatum usq; nonnunquam prore pit. Proinde naribus siccis durisq; existẽtib; ac nullo ab illis manante humore, summopere cauẽdum est, ne præsens affectus, aut huic similis, ferro acribus uè medicamentis iritetur. Verum si, quæ na-

ribus caro innascitur, laxa mollisque fuerit, & humores e naribus profluxerint, ac si pressus nasus, mollem, nec tactu durum sese offerat, non metuendum est, quin acrium medicaminum usu, & ferro subueniri illi possit.

De oblesâ olfaciendi facultate. Cap. XL.

Ob frigidū
humore or-
ganis olfa-
ctus impa-
ctum.

Quando sensus, quo odores percipimus, deperditus debilisue est, & naribus nulla superflua caro increuit, & aer solito more per nares attrahitur, & oculi sensuumque reliquorum organa, naturalibus munijs apte funguntur, naribus puluerem tenuissimum ex struthio, cyclamine, & sale ammoniaco, inspirabis. Aegro quoque, ut nares uapori excalescenti aceti subinde admoueat, precipies. Verum si hæc inefficacia sint, subsequens medicamen naribus illinetur. Cuius compositio in hunc modum se habet. Nigellæ, fellis gruis, cucurbitæ syluestris, ueratri albi, singulorum pares portiones. hæc detrita in puluerem, *urina cameli Arabici, quantum ad contegendas medicinas

† Alias, artemisia.

Vtilis erit ante localium usum, totius & capitis purgatio.

* Eius usum docet Plin.

l. 28. ca. 8.

cinas fat est, excipiuntur: deinde ad solem
 exiccanda reposita, tandem in pastillos
 lentium instar, digeruntur. exigente au-
 tem usu, unus illorum oleo † sampsuchi
 solutus, naribus inducendus est. Siqui-
 dem hoc remedium, presentii affectui est
 aptissimum. Quod si hoc medicamentum
 suo calore & mordaci facultate, magnam
 dolorem excitauerit, oleum seminum cu-
 curbitae domestice, narium foraminibus
 inunges, & capiti aquam calidam libera-
 liter infundes. Sorbitiones quoque actu
 calidae & humectantes, aegro conducunt.
 ex quorum numero sunt ptisana, & fur-
 furum decoctum, eaque quae farina & alijs
 frumentaceis seminibus praeparatur. Et
 subsequens quidem praesidium ad deper-
 ditum olfactum efficacissimum putatur,
 quod in hunc modum conficies. Conte-
 rito nigellam prius aceto peracri mace-
 ratam, in puluerem tenuissimum, et cum
 ueteri oleo subigito, deinde aegri capite
 (ore aqua impleto) quantum licet retror-
 sum reclinato, comprehensi medicamif-

† *Varia exē-
 plaria uar-
 ria habent
 olea, uideli-
 cet sambuci,
 & tosmini.*

nis aliquot guttas naribus instillato, & laborantem quoad potest, aërem ambientem attrahere præcipito, hocq; tribus insequentibus diebus & ternis uicibus factum. Cæterum si ob medicamenti acrimoniam rosio aliqua cõcitetur, ea quæ prius dolori utilia præcepi, naribus, admouebis.

De dentium & gingiuarũ dolore. Cap. XII.

Ex inflãmatione.

SI contingat gingiuam unã cum dentium dolore cruentam simul & tumidam, & rubro colore suffusam esse, tumoreq; tumore pulsatili, cucurbitulis scopulis, aut inferiori mādibulæ affixis, sanguinem detrahitum, prius tamen secta humerali uena. Deinde ore aliquãdiu acetum cum rosaceo, donec tepuerit, retinendum præbeto: quo eiectum, idem rursus repetat, ac postea solum rosaceum frigidum ore retineat. Verum si ea ratione affectus nõ sopiatur, sitq; cum inflammatione uehemens pulsatilis dolor, camphoram unã cum pyrethro contritam, dentium radicibus ad gingiuas applicato, et postq; puluis defluerit, à saliuãq; elutus fuerit, aliud secundo

Aëtius in hoc affectu acetum tanquã hostilẽ gladiũ uitandum suadet, ac asininum lac probat.

secundo diligenter inspargito. Præterea lanam mollem oleo rosaceo imbutā, denti applicato. Quod si dolor non remissus aliquando incrudescit, grauiorq; red dicitur, opij obolum rosaceo læuigato, & illo circumlitam lanulam quāminime sordidam, radici affecti dentis adhibeto. Si ne sic quidem dolor requieuerit, gingiuis scalpello leniter incisis, sanguifugas admoueto. Porro si gingiua neq; cruenta, neque tumida sit, neque pulsatili dolore infestetur, & facies absque inflammatione cernatur, sed dentium dolor à nausea, & copiosa ciborū ingestione & cœna ægrum inuaserit, ægerq; multis cibis refrigerantibus usus fuerit, aluum catapotijs coccijs deijcito. Et dolore affectorum dentium radices, subscripto medicamento circumlinito. Quod accipit, pyrethrum, sinapi, thapsiam Indicam, nitrū, piper & zingiber: quibus in puluerē detritis, dentium radices infricabis. Lanam quoque tenellam melle imbutam, ac illo puluere inuolutam, dentiū finibus circa

*Ex frigidi
humoris af
fluxu.*

gingiuas apponito: prius tamen ore, aceto, in quo pyrethrū, mentastrum, & origanum ebullierint, abluto. Extrinsecus autem panicum, siue milium in frixorio cum p̄auxillulo uini & aceti tostum, faculoq; insutum, generis accommodato. Aut piperis puluere melle subacto, dentem eiusq; radicem infricato. At si hæc inualida fuerint, dentium finibus hæc theriacam superponito. Castorei; laserpitiij, hoc est succi Cyrenaici, piperis, gingiberis, styracis, opiij, singulorum pares portiones; hæc melle leuigata, denti inducito. Aeger quoque ad tempus à cibo abstinebit, et subinde laconicum primã balnei partem, ut sudor copiosus erumpat, ingrediatur. Et quo minus corpus pituitosum maneat, subinde utiliter æger sese exercebit. Si autem nec sic dolor sedatus sit, ferro candenti dentium radices subinde contingito, uel penitus dolentem dentem extirpato. At erosionem tentato denti, medicamenta sequentia, ut quæ uehementer exedant, imponito,

aut

Ob præstantiã ab autore theriaca appellatur.

Candentis stili usus, multis probatur.

aut in totum dentem euellito.

Medicamenta eradicantia & confringentia
dentes. Cap. XLII.

Medicamen quod exeso denti im-
missum, ipsius remittit dolorem,
ac ipsum † comminuit. Sumito * herbā
lactariam foeminam (quam Græci *τιδύ-
μαλον μυσίτην* uocant) & piper, his com-
misce cedri resinā, dentiꝫ excauato im-
ponito. Medicamen imbecillos ac do-
lentes dentes eradicās. Accipito radices
mori, radices capparīs, pyrethrum, lac tī
thymali, liquorem uolubilis maioris (qui
Græcis *κισσάμπελον* dicitur) cucurbitæ
syluestris radicem, auripigmentum ru-
brum, his tritis, acetum quantum ut in-
ter se cohareant satis est, inspargito. Et
deinde aliud acetum unius hebdomadæ
spacio (ut exacte conglutinentur pulue-
res) singulis diebus parī modo, ut prius,
adijçito. Deinde dentes circumquaqꝫ
scalpello rasos, prædicto medicamine in
aceto detrīto decies in die; donec facile
moueanitur illinīto, eaꝫ ratione extrahi

† Alias, cō-
*stringit.
Nonnulli
Kebekengi
ranunculi
interpretā-
tur.

Plurimi py-
rethri 40.
dieb. aceto
maceratū,
deinde tritū
denti exeso
imponunt.

to. Aut plusculis diebus dentē fœce aceti acerrimi madefacito, ut mobilem postea extirpes. Vel fluuiatiles * ranas, oleo tantisper dum marcescant, incoquito, & exigente usu, dentes prius tamen circumcisos, huiuscemodī oleo subinde illinito: ac sic dētes euellēdos, iam laxatos, instrumento ad id parato, eradico.

Ad stuporem dentium. Cap. XLIII.

Hic affectui portulaca & amygdala amara, uel quæ uiribus his respōdent, commanducata, auxiliū præstant. Sal quoq; si eo perfricētur, aut cera commasticetur, non parum iuuant.

† Ad dentium refractionem. Cap. XLIII.

Oleum excalesfactum, linteoque exoptum, admoueto: aut oui uitellum assum, aut calentem panem masticandū porrigito, aut balsamo oleoue iridis dentes affricato.

De linguæ orisq; superficialijs ulceribus.

Cap. XLV.

§ **S**I ulcera subrubra ac sanguinolenta sint, accipito rosarū seminis, amyli, cinerulæ,

* Potius adeps ranæ uiridis in arboribus de gentis.

† Aliās, Ad dētes, frigidī contactu indolescentes.

cinerulæ, lentium excorticatarum, seminis portulacæ, coriandri exiccati, seminis senæ ex Mecha aduecti, singulorum pares portiones, camphoræ pauxillum. his in puluerem subactis, aphthas affricato. *A sanguine.*
 Præterea eadem quoque aceto cum rosa ceo oleo, et rosacea aqua excepta, ore retinenda præbeto, sanguinemq; cucurbitulis, scoptulis & faucibus à foris affixis, minuito. *Ex pituito-
so succo.* At si albicantes papulæ sint, sale & melle illinito, & syrupū acetosum uocatum, aut muriam, ad oris collutionem porrigito.

De gingiuis sanguine humentibus. Cap. XLVI.

AD gingiuis sanguine tenuiore perpetuo fluentes sanandas, accipito auripigmenti rubri & citrini, calcis, gal- *A mordaci
& erodēte
humore.
Vehemens
hoc, & cru-
stam indu-
cens est.*
 larum immaturarum, aluminis, singulorum pares portiones, his in puluerē subactis, & aceto peracri exceptis, informato pastillos exiguos, & ubi usus exigit, eorum obolū sumito, eoq; adamussim detrito, gingiuis infricato. iam postquam puluis ille gingiuis aliquandiu adhæse-

rit, osq; plantaginis aqua, aut lacte ablu-
tum fuerit, rosaceum oleum ægro retinē-
dum præbeto. Est enim id præsentī affe-
ctui, tum putredini, & herpeti exedenti,
qui os infestare consuevit, remediū præ-
sentissimum.

De laxatione procidentiaue gurgulionis.

Cap. XLVII.

Columella.

CUm ægro radici linguæ, aut fauci-
bus uideatur quippiam incumbere,
& quando os adaperit, seu linguam exe-
rit, eius gargareo laxatus elongatusq;
propendere conspicitur, sumito compo-
sitionem ramech ab Arabibus uocatā,
in quam gallæ immaturæ, & uuæ passæ
ingrediuntur, deinde accipito salem am-
moniacum, ac ea in tenuissimum pulue-
rem simul redacta, instrumento ad hoc
apto, super columellam inspirato, atque
huius instrumenti mucroni narrati pul-
ueris momento apposito, ad columellæ
radicem sensim contingendā instrumen-
tum dirigitō, columellamq; eo pauxillū
foras attrahito, Id autem instrumenti ge-

*Scribonius
eius loco gal-
lā cōtusam
habet, quæ
in princi-
pio erit cō-
modior.*

nus ab uua attollenda *σφουλίπυτον* dicitur. Aut si uoles ex malo punico acido, unà cum sua carne contrito, gargarizationes parato. Cæterum si diutius ita *Vua.* producta propenderit, ipsiusq; pars superior, qua scilicet palato adnectitur, tenuior extiterit, caput uero quo linguam spectat uuæ instar, rotundum atque orbiculare increuerit, radicitus eam (candēti ferro ad id parato, ac per * canalem aliquem ori immisso) præscindito. Caueto tamen, ne priusquam ad eam figuram columella perueniat, eam amputes. siquidem talis sectio interdum tantum concitat sanguinis profluxum, ut nullis præsi-
dijs sisti queat.

* Archigenes
 nes oui putamine
 utrinq; per-
 tuso utebatur.

De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus fortuito irreptantibus. Cap. XLVIII.

DVM quis in gutture pruritus titillationemq; experitur, & sanguis tenuis & rubicundus modicè inde refudat, suspicio est, hirudinem deuoratam esse: præcipue si aquã, cui hirudines in-
 natant, hauserit. Aegro itaque ore ma-
 gnũm

gnūm hiare, & linguam exerere præcipi-
 to, & linguæ basi pressa, fauces ad solem
 inspicito. Iam si sanguisugam propè ad-
 hærescere conspexeris, ægrotātem ab ea
 ad hunc modū liberato, uulsella, qua tela
 extrahi consueuerūt, sanguisugæ caput
 comprimito, ac postea sanguisugā euelli-
 to. Verum si conspectum hirudo fugiat,
 æger subinde sinapi cum aceto gargari-
 zet: siquidem acibus incitata, à loco cui
 inhæret dimouebit. Vel ex aceto & suc-
 co Cyrenaico, aut ex sale, & aceto garga-
 rizationes ad eandem utilitatē ægrotan-
 ti porriges. Præterea nigellam & sinapi,
 trita, gutturi utiliter inspirabis. Item ex
 cepæ succo gargarizationes præbebis.
 Cæterum si post euulsam hirudinē, san-
 guis fluere perseverat, ex iure cui mali-
 punici cortices, balaustia & rhus coria-
 rium incocta sunt, gargarizationes pa-
 rato. Gutturi quoque balaustiorum pul-
 uerem, thus, cinnabarim & amyli insu-
 flato. Atsi stomacho hirudo adhæserit,
 medicamina quibus uermes propellun-
 tur,

tur, propinato, Ex horum quoque genere, quæ hircines diuertunt, prima balnei domus censetur, si illi æger tantisper dum multa sitis ipsum urgeat, immoretur: ac deinde aquam frigidissimam, nive scilicet infrigeratam, ore contineat: & quæ aqua tepuerit, eam reiciat, aliamque frigidam in ore recipiat. Hirudo siquidem aliquoties frigoris cupida, ad os prorepat.

De his quæ in os, seu œsophagum prolabuntur.

Caput XLIX.

SI quædo, quod in guttur deuoluitur, illi aut œsophago, tanquam infarctum inhæreat, sitque id aut bolus aliquis gradior, aut quippiam illi non absimile, nimirum quod nec asperum, nec angulosum sit, aut partibus inter se diuisis constet, iuuat identidem egrum ceruicem concutere, ac liberaliter aquam transglutire, ea namque ratione forsitan ad inferiora illapsum in œsophagum corpus, propellatur. Aeger præterea balneum potabilis aquæ ingressus, oleum, aut alia emollientia

*Multi oblo-
ga cerea cā-
dela oleo te-
penti intin-
eta utūtur.*

tia ac humectātia bibat, ac deinceps ma-
gnos bolos deglutiat. Si uerò ne tum qui-
dem in uentriculum procidit, instrumen-
tum corporibus ex œsophago propellen-
dis adaptatū, ori immittetur. Est autem
hoc instrumenti genus ex plumbo factū,
quodq; cum longū sit, retisq; instar con-
fabricatū, in omnem gibbositatem faci-
le effingitur: ac ea industria œsophago
inuolutum corpus, in uentriculum pro-
truditur.

*Ad oblaesum linguæ sensum, ac deficientem
motum. Cap. L.*

*Ex pituitæ
affluxu.*

QVando lingua cæteris membris il-
læsis, torpida redditur, nulla tamen
febris, aut alius acutus & ardēs morbus,
ægrum infestat, sumito salem ammonia-
cum, piper, zingiber, sinapi album, pyre-
thrum, herbæ pediculariæ semen, nitrū,
origanum, saccharum, nigellā, sampsu-
chum aridū: ac ex his simul in aqua deco-
ctis, gargarizationes parato. interim ta-
men prospiciat sibi æger, ne portionem
aliquā huius liquoris deglutiat. Profunt

*Rhazes hic
ut sæpius a-
ias, corpo-
is euacua-
tionē factā
subintelli-
git.*

quoq;

quoque pluribus diebus ieiuno egro, col-
lutiones ex muria Nabathææ, aut ace-
to & pyrethro, præparatæ. Vbi uero æ-
ger os colluere his cessauerit, accipito sa-
lis ammoniaci, pyrethri, piperis, sinapis,
singulorum æqualia pōdera: & his in te-
nuissimum pollinem subactis, linguam
diu huiuscemodi puluere infricato.

Quod si linguæ stupiditatem, auditus, re-
liquorumq; sensuum torpor concomita-
tur, laboranti præfidijs neruorum resolu-
tioni dicatis, subuenies. Porro si in acu-
tis febribus sermo difficilis fuerit, uide-
risq; cum sermonis difficultate, extenua-
tam & breuiorem conuulsamq; esse lin-
guam, aqua calida in qua herbæ emolli-
entes humectantesq; ebullierint, super
colli uertebras, & aurium præincipia, ubi
scilicet mandibularum articulatio est, op-
portune superfundetur. Præterea par-
tes illæ humectante oleo, cuius generis
uiolaceum & amygdalarū dulcium cen-
sentur, infricandæ sunt, & ægrotanti oleū
modicè inferuifacrum, ore retinendum.

*Ex cerebri
confortio.*

*Animia sic-
citate.*

Et si

Et si multum temporis lapsum fuerit, ex quo sermo aboleri uisus fuerit, aut si à primo ortu primæ conformatione id euenit, operæ precium est indagare, an lingua faucibus linguam colligans, præter naturam excreuerit. Quod si inueneris, parum eam præscindito, ac uulneri chalcitidis puluerem ad crustam inducendam inspargito.

Hi Græcis
ἀγυλόγλωσσοι
dicuntur.
Apud Aëtium
Ser. 8. c. 35.
est administratio.

Ad linguam in nimiam molem intumescentem.

Caput LI.

CVM lingua in tantā molem increuerit, ut ore retineri nequeat, fricanda est cepis, aut citrorū acido succo, aut *ribes, aut malo punico acido, donec multa salua defluerit. Ea namque ratione decrescet, pristinaeque formæ restituetur. Si uero id tamen non suffecerit, aceto & sale diligenter linguam infricatio: & si hoc quoque inualidum extiterit, primum sanguinem ex duabus humeralibus, deinde ex uenis sub lingua latitantibus, detrahitō.

*Veteribus
incognitū.
Manardus
eius loco ru-
micis succo
utitur.

De tumore

De tumore sub lingua enato, qui ranula
dicitur. Cap. LII.

TVmore huiuscemodī maligno sub
lingua accidente, inter inītia lingua
sale ammoniaco, & gallis confricāda est.
Verum eo tumore in uetustatem protra-
cto, medicamine cruentis gingiuis dica-
to, lingua infricabitur, hoc autē acre, &
crustam ulceribus inducens medicamen-
est. Deinde post eius usum, ægrotantem,
acetum cum sale temperatum ore re-
tinere, utile erit.

Græce βδ-
ῖραχος.

Ad pustulas ac tumores linguæ. Cap. LIII.

HIs eisdem remedijs, quibus aphthis
supra comprehēsis, & anginae me-
demur, succurritur.

De angina. Cap. LIII.

Affectum Latinis anginam, Græ-
cis στωάγχην, appellatum, testatur
inter deglutiendum ac respirādum, per-
cepta difficultas molestiāq;. Qui morbus
modo grauior, modo leuior, pro trās glu-
tiendi respirandiq; difficultatis magnitu-
dine pronūciatur. Quocirca quando

G transglu-

Ex sangui-
nis copia.

transglutiendi noxę adfunt faciei, & oculorum rubor, corporisq; repletio, in ipsius curationis initio humeralis incidenda est, & gargarizatio ex malo punico acido cum sua carne, præparanda. Vel ex succo malorum syluestrium, igne, uel sole incrassato, aut rubi fructus succo similiter gargarizationem. Et deinde ex rosacea aqua, cui rhus coriarium immaceratum sit, collutionem porrigito. Postquam hæc triduo diligenter sint facta, & alius succo fructuum ueluti prunorum, tamarindorum, cassia fistula, manna, (quam ueteres mel aërium appellarunt) fuerit soluta, gargarizationes ex decocto ficuum caricarum, et uuarum passarum, uel è medulla cassiæ fistulæ cum hydro-melite porrigito. Si autem malum longius prorogatur, gargarizationibus & inspiratione acrium medicaminum, quę infra subiiciam, utemur. At si nullo in facie rubore æger suffusus fuerit, & copiosa pituita ab ore profluxerit, ad hæc si ægrotans frigida humidaq; temperie sit, statim

*A pituitoso
succo.*

statim inter initia aluum catapotijs coc-
 cijs deſcicto, & acriorem clyſterem Capi-
 te de apoplexia deſcriptum, infundito.
 Sed ſi malū incœperit, gargarizationes
 propinato ex ſyrupo acido, q̄ aceto, ſac-
 charo, & aqua potabili præparatur, uel
 ex hydromelite & pipere & oxymelite.
 Temporis uero ſucceſſu ex muria Naba-
 thææ: & deinde quoque ex hydromelite
 & ſinapí collutiones adminiſtrato. Ex
 corū genere, quæ malignis anginis, poſt
 aliorum & retrahentiū & euacuantium
 uſum, auxiliū præſtant, ſunt & ſanguis
 nis ex uenis ſub lingua latitantibus im-
 minutio, & cucurbitulæ, † ſine cutis inci-
 ſione, collo affixæ. Sunt præterea collo
 applicanda epithemata humida ex mel-
 le, quod anacardinum ſuprà appellauim-
 us, idēq; tantisper, dum ueſiculæ excitē-
 tur. Sic quoque ad eundē uſum, ex ſina-
 pí gargarizatio utiliter exhibetur. Fauci-
 bus autem ſubſequentem puluerem inſpi-
 rato. Qui accipit ſinapis, ſalis ammoniaci,
 pyrethri, niſtri, ſucci Cyrenaici, pipe-
 ris,

*Sūmè peri-
 culofæ angī
 n.e curatio.*

† *Alibi, cū.*

*Hec omnia
 inter initia
 uitare oportet.*

ris, mentastri, partes aliquot, hæc in pul-
uerē detrita, faucibus insufflato, aut cum
hydromelite gargarizationis loco por-
rigo.

De tussi.

Cap. LV.

A calid. &
sic.
i. muraba
alibi inter-
pretatur et
Aliqui per
muraba uio-
las saccha-
ro conditas
intelligunt.

CVM tussis aspera & arida cum ru-
bore æstuq; molesta est, laboranti
aqua cui uiolæ immaceratæ sunt, cuiq;
saccharum in condimentū adiectum sit,
& ptisana propinabuntur. fabas quoq;
excorticatas, & spinachiam uocatā her-
bam, cum oleo amygdalarum dulcium,
inter cibos assumet. Aquæ autem, quæ
potui porrigeat, uiolaceus syrupus cōmi-
scēdus est. In ore uero sub lingua æger re-
tinebit globulos: qui quum ad pellendā
tussim faciunt, à Græcis Βίχλεας appellan-
tur. Quorum compositio hæc est: Succus
dulcis radicis, sacchari albi, utriusque
drachmę decem, amyli, tragacanthæ, a-
mygdalarum dulcium cortice liberata-
rum, singulorum drachmæ quinque. hæc
nucleorum cotoneorum cremore exce-
pta, in globulos redigito. At industrium
esse



esse oportet eum, qui medicamentum lingua subijcit, ut paulatim eo liquefcente, larynx id quod in eam defluit excipiat, quod tussi resistens optime curabit.

Porro si tussi praesens glutinosi sputi copia expuitioni contumax, noxam inferat, quae tamen feбри & uehementi alui solutione uacat, subsequentes pastilli infirmo porrigendi erunt. Qui constant, seminis foeniculi, seminis apij, succi dulcis radicis, adianti, amygdalarum amararum, singulorum aequis portionibus, haec simul lini seminis succo excepta, in pastillos digeruntur, quorum denarii tres offeruntur. Decoctum uero, quo in proposito affectu utimur, quoque iam comprehensos pastillos aegrotanti eos exhibituri, laeuigamus, Capite quo distillationis subsidia scribuntur, praecipuum est, illi tamen drachmae quinque adianti, & hyssopi momentum opportune in praesenti affectu, adijciuntur. Si uero eò uetustatis & malicie tussis deuenierit, ut laborantem uigilijs excruciet, globuli ex styrace illi porri-

A pituitae copia.

gendi sunt. Qui recipiunt, myrrhæ, styra-
cis, opiij, singulorum pares portiones, sin-
guntur ex his globuli lupinorum instar:

& horum unus, aut alter ore sub lingua
retinendus, (ut eliquescens deuorari queat)

offertur. Aut quum ab huiuscemodî glo-
bulis abstinetur, dormituro ægro syrapi

papaueris uncia, uel albi papaueris semē
cum saccharo, ad manducandum præbe-

tur. Is autem qui hoc malo corripitur, ab
omni acidorum, falsorum, austerorum

acriumq; esu, coarcendus est. Suffumi-
gatio ad ueterē tussim, fœtidaq; sputa effi-

cax. Sumito aristolochiæ, myrrhæ, styra-
cis, galbani, singulorū pares modos, auri

pigmenti rubri quantū omnia pendent,
hæc in puluerem subacta, butyro uacci-

no subigito, ac ex eis probe mazas pilæ
instar, cōfingito: & quum usus exegerit,

ieiuno ægro harum unam carbonib. su-
perpositam, per infumibulum suffito.

De difficultate spirandi, quàm Græci *ἄσπυα*

appellant.

Cap. LVI.

DVm quis crebra tussi correptus,
fre-

7. Secundū
locos, habes
generosum
diacodyon.

Mirificē
exiccāt.

A glutinosa
pituita pul-
monis mca-
tib. impacta

frequenter respirat, quemadmodum so-
 lent citatiore cursu, aut uehementi exer-
 citio fatigati; & quando supinus decum-
 bit grauius, dum uero recta ceruice sedet
 minus afficitur, subscriptum decoctū illi
 propinādum est. Accipit autem ficuum
 caricarum drachmas decem, palmularū
 pinguium ac recentium, seminis apij, se-
 minis fœniculi, adianti, dulcis radicis,
 hyssopi, marubij, singulorum drachmas
 quinque, incoquuntur simul tribus libris
 aquæ dulcis ad duarum librarum euapo-
 rationem, & deinde percolantur. Huius
 decocti iuris suspensiosus triduo uncias
 quinque bibet, adiectis interim subscri-
 ptæ cōfectionis drachmis tribus, quæ ad
 hunc modū se habet. Dulcis radicis suc-
 ci, hyssopi, adianti, singulorū drachmæ
 decem: cardamomi, piperis, amygdala-
 rum amararum, aristolochiæ rotundæ,
 seminis urticæ, singulorū drachmæ quin-
 que, mellis despumati quod satis est. Cō-
 fectio hæc efficiendis è thorace recremen-
 tis quàm aptissima est, quocirca septima-

na una continuo utiliter æger ea utetur. Deinde post sinapis & mellis esum, uomitus iritandus est, aliusq; catapotijs his ducenda. Accipiunt autem, agarici quãtum pendent hordei grana octodecim, cucurbitæ syluestris carnis grana sex, succi cucumeris asinini quantũ pendent hordei grana quatuor, dulcisradicis succi sesquidrachmam, finguntur ex his catapotia, quæ unì propinationi sufficiunt. Post hæc decoctum unà cum confectio- nis usu repetendum est. Postremo uomitum quoque & uētris deiectionem reite- rare conuenit. Et hæc uniuersa quoad sa- nitati æger restituatur, sunt tentanda, in- terim uero, à crassorum & acidorum & austerorum esu, ægrotus diligēter arcen- dus est.

De laterali dolore, qui πλευρίτις Græcis
diciur. Cap. LVII.

CVM quis in membrana costas suc-
cingente, dolore punctili laborat,
præcipue si tussis sicca & febris illũ con-
comitentur, competit, si dolor, qui à sum-
ma

Pulsus his
adeft durus
& serrati-
lis cū spirã
di difficul-
tate.

ma humerorum compage ad extremas costarum cartilagines est, usque ad claviculam peruenit, sanguinē ex axillari eius partis, quam dolor infestat, minuere: nisi forte uniuersum corpus sanguine plenū plethoricūq; fuerit. Tunc enim ex latere opposito sanguinis detractio, celebrabitur. Porro si morbus ad dies aliquot ægrum adflixerit, fluxusq; cōstitit, sanguis missus ex cubito affecti lateris, remedio est. Si autem ad inferiora costarum interualla circa hypochondria dolor descendit, alius decocto, Capite de distillatione comprehenso, ducenda erit. Cæterum ueriti turbationem, quam purgatio accersere solet, præstabit uenam incidere, deinde hordei decoctum cui saccharum admixtum sit, in potu propinare. Quod si tussis admodum arida sit, mane singulis diebus iuleb uiolatum porriges. Deinceps uero hordei decoctum ægrotanti non inutiliter præbebis. Et si ægri uires deiectæ fuerint, pane modice fermentato, ac

Hip. et Gal. ac alij Græci ferè oēs, affluentem sanguinē in contrarium reuellētes, atq; iam in partē fluxum à loco uicino unā deriuātes, è directo lateris affecti uenā etiam in corpore plethorico, ac inter iniuria, opportune secant. aliter quā

Arab. & eorū sequaces, quos uinoq; merito q; ob id appellauerit.

Officinae quasdā mazaras ex sarē

G 5 *quam*
na, amygdalis, saccharo, & rosarum aqua, ad delicias parant.

quàmminimè falso, frigidaq; abluto, si-
mul cum saccharo, eum cibabis, Robu-
stis autem uiribus, hordei ius usque ad
diem quartū sufficiet, Vbi uero iam spu-
ta deijcere ægrotans cœperit, decocto ad
distillationes curandas superius descri-
pto, perpetuo ante hordei decocti potū,
donec restituatur æger, uteris. Porro si
febris, uehementiaq; morbi perseueraue-
rint, atque ægre sputa educere ægrotus
ualuerit, decoctum capite de respirandi
difficultate comprehensum præbebis.

Quod etiam dum æger saniem expuet,
utiliter administrabis. Cæterum si inter
morbi initia sputa ualde nigra flauaue
apparuerint, & ita continuata fuerint, et
neque febris, neq; calor ante septimum
diem se remiserint, haudquaquam affe-
ctus timore uacat. Præterea si præter hæc,
eadem spirandi difficultas permaneat, et
simul audiatur in thoracis cauitate mur-
mur aliquod, similiter si genæ ac oculi
multo rubore suffunduntur ac dolent,
affectus in maturam mortē præcipitat.

Quod

Quod si lateris parte exteriori, rubor aliquis suffusus, tumorue conspicitur, & locus affectus tactu indolescat, ad curbitularum usum (antè summa cute leniter incisa) properandum est. Aut emplastrum ex sinapi & ficibus recte, donec modice locum exulceret, imponetur. § Prius tamen opportuna uenæ sectione, aut purgatione, quæ huic malo idonea esse posset, & humoris affluxi leni resolutione, tentatis. § Sanè ex imperitorum Medicorum hallucinatione, multa huic malo accidunt augmenta, ueluti quum in membrana costas ambiente, crassos flatus infartos coniecturantes, confectionem diamoschum appellatam, aut huic in discutiendo & incidendo uiribus parem, intempestiue porrigunt: siquidem ea ratione medicandi, ægrum plane iugulant. Affectus porro, qui in spurias costas integente membrana, ex inflammatione oboritur, Arabibus Persica dictione birsen (quasi thoracis noxa) dictus est.

Noth.eplen
ritidis cura
tio.

De pulmonum inflammatione, quæ πρῆσιπνευ-
 μονία Græcis dicitur. Cap. LVIII.

Quando hominem febris ardēs cor-
 ripit, tantaq; inter spirandum diffi-
 cultas oboritur, ut se strangulari existi-
 met, & quum tanto rubore malæ suffusæ
 sunt, ut tinctæ uideri possint, ac dum tus-
 sis et thoracis parte anteriori distētio, &
 thoracis grauitas (tamen absque dolore
 punctili) prēmunt, quodq; per sputa de-
 ſcitur spumofum est, is æger, si omnia
 concomitentur, ualentem ac acutam pul-
 monis inflammationem suffert. Quod si
 quoque pelliculæ ipsius, quæ cum thora-
 ce secundum ipsius longitudinem sunt
 connexæ, inflammentur, etiam dolorem
 punctilem æger percipit. In curationis
 itaque initio ē uena axillari § dextra §
 sanguinis detractio prodest. § Nam so-
 la ratione plethorię, aut affluxuri humo-
 ris, uena pertusa, in hoc affectu iuuat. Ni-
 hil enim à pulmonibus cordisq; dextro
 uentriculo uenæ sectione educi posse,
 membranarum dextræ uentriculi cordis,
 anatomica

*Aëtius in u-
 troq; cubito
 per interual-
 la secat.*

anatomica administratio apparēter demonstrat, § Deinde post uenæ sectionē, reliqua curatio h̄isdem, quibus pleuritidi medemur, tentanda est.

De cruentis ac purulentis exptionibus.

Caput LIX.

Sanguis si screatu, aut paucō strepitu, qui absque tussi est, educitur, nullus erit inde ægro metus, siquidem astrigentibus & humorum impetum reprimentibus, gargarizationibus, in Capite ad anginam præceptis, & ratione uictus tenuiori, sanari poterit. Vomitu quoque si erumpat sanguis, nec inde ingens ægro formido incuti debet. Venæ sectione nã que, & astrigentium usu, quale omphacinum est, & rhus obsoniorum, atque his persimilibus, persanari hoc uitij genus poterit. Sumito itaque lapidis Armenij, gummi Arabici, balaustiorum, cinnabaris, thuris, omnium æqualia pondera, & horum drachmas tres simplici discocto cydoniorum succo subactas, propinato.

A quibusdam uero sanguis, per circuitus

Ex faucibus.

Ex uentriculo.

Diuersis in nixi scopis uarias uenas in hoc affectu incidimus.

tus quosdam, expui cōsuevit, unde non modo nulla noxa illis imminet, uerum etiam id ualeitudini multū prodest. Proinde is minime suppressendus putatur.

*Ex pectore, à uenarum
parta, crosta,
aut aperta.*

Sin autem cum tussi sanguis prorumpit, non immerito formido nos occupat: nihilominus tamen ægri curationem, uenæ axillaris sectione incipies, partita interim sanguinis missione. Deinde subscriptos pastillos potui porriges. Qui cōstant, thuris, cinnabaris, utriusq; drachmis tribus et scrupulo uno, succini drachmis quinque, lapidis hæmatitis, *terre sigillatæ, utriusque drachmis decem, aluminis drachmis duabus cum semisse, baustiorum drachmis tribus, opiij drachmis duabus, rheobarbari Seni tantundem, ex his portulacæ succo aspersis, informantur decem pastilli, quorum quoti die unum succo ocimi maioris, aut portulacæ læuigatum, propinabis. Atsi uehementior morbus extiterit, sanguinisq; eruptio incrudescit, alterum pastillum, ægro somnum inuito, porriges. Crura quoq;

** Carent no
stræ officinæ
uera.*

*His præcipue ne tussis
fiat, prospici
es debet.*

quoque circa inguina, & brachia ad scapulas, aut potius in tenuioribus partibus (utpote magis nervosis et dolorificis) uinculis intercipito, ac unà summas extremasque partes ad reuellendum sanguinē, fortiter infricato. Pectus quoque, præcipue si dolore quoopiā iritetur, epithematibus ex paulo antè comprehensis pastillis, aceto & aqua subactis, præparatis, crebro illinendum est. Aegri quidem cibis, rhus obsoniorum & omphacinum, eisque persimilia admisceto. Item *terræ sigillatam, interpositis interuallis subinde cōmanducandam præbeto. Inter decubitus autem, supinus, ac propemodū (absque dolore tamen) erectus, maxime necessarius, ac perquam utilis est.

De tabe, quæ φθίσις Græcis dicitur.

Cap. LX.

SI quis partiū colliquationem à tussi, quæ ex diuturno morbo sit, aut post crebra cruenta sputa, aut multas puris reiectiones patitur, illi lac asininum utiliter potandum porriges, at si eius lactis facultas

*Nos lapide Armenio portulacæ succo macerato, utemur.

Proprie pulmonum est exulceratio. Gale. humani lac præstantissimū esse asserit.

tas nō detur, caprinum, cui sacchari momentum commixtum sit, offerro. Quod etiam posteaquam aliquid panis illi adieceris, ægro esui dabis. Quinetiam si huiuscemodi generis lacte capit, illud quoque aquæ loco, quoties sitit, propinabis. Interdum tamen, tenue ac temperatum uinum potandum exhibebis. Cibum uero ex auium & hoedorum carnibus administrabis. Aegrotus præterea ieiunus & à cibo, balneo haudquaquam calido, sed tepente utatur, solioq; dulcis aquæ diutius immoretur. Et inter cetera, ne aluus fluat turbeturue, diligenter præcauere æger debet. Si quidem soluta fuerit, huius pulueris potu constringetur. Accipit autem, gummii Arabici, * spodij, lapidis Armenij, seminis myrti, singulorum partes æquales, subiguntur omnia in puluerem, & eius uno die drachmę tres cum syrupo albi papaueris, & myrti succo digesto exhibentur. Hic puluis ad hunc modum in potu administratus, eos qui tussi & cita aluo laborant, strenue iuuat. Verū huic

* Subsequē
tibus capiti
bus nostras
officinæ
ebur cōbu-
stum acci-
piunt.

huic interdum, ut maiorem astringendi vim obtineat, utiliter adiunguntur * xylocaractæ ex Syria, & bdellium ex Mecha aduectum. Porrò si è lactis usu in febrim æger rapiatur, ptisana pota subtracto lacte bene facit. Verum febre cõquiescẽte, ad lactis usum rursus pperandum est. Si aut denuo febris molestauerit, lac fugiendum est, & ptisana quousq; febris abigatur offerẽda: qua iterum propulsa, lactis usus repetitus prodest. Hęc quandiu necessitas urget, quadam uicissitudine sunt facienda. Interea uero summo studio, ne aluius lubrica fluat, prospiciendum.

De cordis palpitatione. Cap. LXI.

SI febris pulsusq; uelox cordis tremorem concomitatur, egro axillari dextra secta, sanguinem detrahito, & potui pastillos ex camphora, succo malorum acidorum læuigatos, in potu præbeto. Hi accipiunt spodiij, seminis cucumeris citrinati, intybi, lactucæ, portulacæ, rosarũ, sandali albi, omnium æquas portiones, & horum singulis drachmis,

H adiungito

* Sunt quorũdã astringentium liquorũ putamina.

A calida occasione.

*Videtur
Rhazes cū
Græcis in
his vltijs pa-
rum tribulſe
ſe croco.*

adijcito camphoræ pondus trium grano-
rum hordei, ac his omnibus malorū ſyl-
ueſtrium acidorum ſucco detritis, infor-
mato paſtillos, & eorū quotidie duabus
ſeptimanis continuis, drachmam unam
malorum ſylueſtrium acidorū ſucco de-
tritā, in potu porrigito. Porro ſi hæc præ-
ſidia morbo ceſſerint, lac ex quo butyrū
preſſum eſt, ne forte continuus paſtillo-
rum uſus noceat, potui præbeto. Alimen-
ta uero erūt, pulli ex aceto, & uuæ imma-
turæ ſucco, aut alio quopiam acido con-
dimento elixi. Syrupus quoque aceto-
ſus appellatus, qui ex ſaccharo appa-
tus ſit, potui utiliter dat̃. At ſi cordis pal-
pitatio febrī uacat, ex moſcho compo-
ſitos paſtillos in potu offeres. Qui recipi-
unt, maſtiches, ſpicæ, ligni aloës, cinna-
momi, caryophylorum, galliæ moſcha-
tæ, nucis myriſticæ, * cubebe, cardamo-
mi maioris & minoris, corticis citri, ſin-
gulorum ſeſquidrachmam, moſchi obo-
lum. his uino odoro aſperſis, informato
paſtillos, qui ſyncopi ac cordis palpi-
tationi

*A frigida
cauſa.*

** Nō con-
ſtāt inter ſe
Arabes. nos
ſub eo nomi-
ne ſemina
acria habe-
mus.*

tionistrenue auxiliantur. Electuariū
 ex moscho sumptuosum, defectui animi,
 tristitię, cordis palpitationi & fastidio uti
 lissimum. Mastiches, cinnamomi, semi-
 nis ocimi maioris, seminis ocymi citrina
 ti, seminis melissę, seminis sisymbrii, semi-
 nis sampuchi, piperis longi, singulorū
 par pondus, ex his omnib. in puluerē re-
 dactis, drachmæ decem sumuntur, marga-
 ritarum cōminutarū, coralli rubri, * cu-
 bebe, bombycis crudæ, hoc est nondū in
 filum cōtortę in textaęq; succini, been al-
 bi & rubri, folij Græcis *μαλαβαίρον* dicti,
 singulorū quocq; drachmæ decē, moschi
 Tubabetici syncerioris sedrachma, om-
 nia hæc, melle maceratarum myrobala-
 norum chebularum excipito. Hoc fanē
 electuariū uentriculi frigiditati, ac con-
 coctricis imbecillitati, mirum in modum
 prodest.

*Nostrariū
 officinarum
 semen pro-
 posito non
 est inutile.

De cholera, morbo. Cap. LXII.

QVando dolor punctilis atque ero-
 dens, tormina, & nausea aliquem
 inuadunt, & si his adsint, aut subsequan-

Abiliost huius
 moris co-
 pia.

H 2 tur

† Alijs, & ut Paulus ac Aëtius habent.

tur uomitus, † uel uentris per inferiora turbatio, aqua modice inferuefacta copiosissima crebro propinari debet: deinde uomere oportet, digito, aut pinna ori indita. Item alui ductione adiutuandus est stomachus. Sin autē uomitus, & alui fluor non conquieuerint, ad tepentem aquam rursus confugiendum est. bilioso enim humore circūcirca adhærente, unā cum aqua reiecto, stomachus elotus, ac leuior redditus, oblatum sibi cibum retinet. Quocirca ubi morbus remitti cœperit, æger in balneum potabilis aquæ deducatur: cui unius horæ spacio, aut pro uirium robore, immoretur. Egressus autem balneo, & cibis cōcoctu facilibus, ac boni succi, ut pullorum carniū expresso, & uino subastringente enutritus, ac præcordijs oleo ad id idoneo perunctis, somnum sibi conciliare debet. Et licet immodica uentriculī perturbatio, suprā infraq̃, ac reliqua grauiā symptomata su perueniant, non ideo animus abiiciendus erit, quin potius medicinīs subsequētibz

Humores ad superficiem retrahit, ac exiccationē uacuationē corpus humectat.

Relicto morbo, symptomatum curatio.

tibus malo auxilium ferendum est. Initio itaque pastilli ex thure, aqua, aut niue, & malorum punicorum discocto succo læuigati, semel propinandi sunt. Qui, si uomitus ingruerit, secundo quoque porrigentur. Ad hæc extremas quoque brachiorum & scemorum partes circa inguina, uincire oportet. Præterea aquã niue infrigidatam, cruribus & pedibus ab alto instillare, ac etiã in gelidã aquam eas extremas partes immittere, illiç immorari, strenue auxiliatur. Venter porro epithematis, quæ sandalis, rosis, camphora, gallia moschata, simul rosarum aqua aspersis, cõficiuntur, irrorãdus est. Confert item linteum aqua rosacea niue refrigerata immersum, si uentri opportunè, post epithematum illinitionem apponatur. Quod posteaç tepuerit, ne concalescens nocent, abijciatur, et aliud in eius locum superaccõmodabit. Aut cataplasma ex palmulis, cum uitis agrestis floribus, & acacia, item hypocistidis & mali punici succo, est inducendum. Porro pau

Paulus hæc calida fieri præcepit.

latim uinum uetus decocto malorū pun-
nicorum succo temperatum, propinabi-
tur. Et quotienscunq; æger id euome-
rit, toties aliud post modicum interuallū
offeremus. Cibus autem panis malorum
punicorum succo maceratus, unā cum
uino subastringente erit: quem si uomi-
tu eructet, rursus quousque uomitus se-
detur, alium porrigemus. Si uero animi
deliquio ob ingentē euacuationem, dis-
solutis scilicet spiritibus, æger corripia-
tur, moschum hordei grani instar, uino
¶ leuigatum, dare prodest. Proinde si os
clausum teneat, uī aperiendum est, & ui-
num id infundendū. Sic quoque hædo-
rum & pullorum carniū expressum, &
mali cydonij succus, uino commixta, uti-
liter porriguntur. Præter hæc, ante ægri
nares affos pullos discerpere iuuat, si mo-
do carniū uaporem non abhorreat.
Thus quoque, ad uentriculī retentricem
facultatem corroborandam, ore com-
manducandū, ut paulatim eger id trans-
glutiat, dandū est. Postremo * bolus Co-
raceus

† Alibi adij-
citur, uel
rob grana-
torum.

* Pli. ut opi-
nor, Tauri
lygdiniū la-
p: dē. uocat.

racessius camphora conditus, & in pulve-
rem adamussim tritus, atque cum astrin-
gēte uino porrectus iuuat. At omnibus,
quæ huic malo commoda præcepimus,
præsidij, donec uomitus cesset, uentricu-
lusq; alimentum sentiat, erit insistēdum.
Postquam uero uentriculus cibum am-
plecti cœperit, cibandus eger est, & mo-
dicum uini ueteris ac odori, potui porri-
gendum, somnusq; ad restituendas uires
conciliandus. Pastilli ex thūre, uomitui
sacri. Boli * Coracessij, thuris, amborum
drachmas decē * cubebe, cardamomi, u-
triusque drachmæ duæ cum semisse: cam-
phore, galliæ moschatę, caryophylorum
singulorū obolus, his rumicis succo de-
tritīs, informato pastillos pondere sesqui
drachmæ, ad uomitum mire efficaces.

Decoctione quidem mali punici suc-
cum incrassatum, ad hunc modum appa-
rabis. Sumito malorum punicorum aci-
dorum succum, ac per noctem, pauloūe
amplius, quod crassum est, in fundum re-
sidere finito, deinde quod purius est, tan-

H 4 tisper

* Nos no-
stro Arme-
nio, & acri
semine ute-
mur.

¶ *Aliàs,
myrti.*

tisper dum mulsi spissitudinem accipiat, decoquito, & diligenter spumam detrahitō, ac dein succo ab igni remoto (tamē adhuc calenti) † menthę uiridis coliculos illi inijcito, eosq; cum succus iam refrigeratus est, extrahito. Ad huius formā cydoniorum malorum, & malorum syluestrium acidorum syrupos, ad retentricis facultatis robur augendum efficaces, fieri decet. Si autē uomitus aliquoties plurimum inualuerit, proruperitq; cucurbita magna cum multa flamma, ori uentriculi affixa, ac uī abstracta, eaq; secundo ac tertio agglutinata, plurimum ægro auxiliatur.

De uentriculi imbecillitate. Cap. LXIII.

*Ob frigidā
distemperiam.*

Ventriculi imbecillitas si cum modica siti, & longa cibi in uentriculo mora, ructibusq; acidis, ægrum affligit: & symptomata hæc pauca, neque admodum uetera sint: uentriculus pastillis ex rosis confectis, sanitati restituetur. Quorum eger singulis diebus mane denarios duos, & totidem obolos, cum uncia seminum

num incidētium decocto dissolutos, de-
 uorabit. Seminum autem decoctum in
 hunc modum præparatur. Cumini Na-
 bathææ & ammeos utriusque drachmæ
 duæ, in mīnā aquæ tantisper dum ea ru-
 befcit incoquuntur; de qua deinde cum
 pastillis ex rosis ægro mēfura suprā com-
 prehensa propinatur. Pastilli uero ex ro-
 sis, accipiunt pulueris rosarum rubrarū
 drachmas tres; ligni aloës, spicæ, masti-
 ches, casie lignee, iunci odorati, floris cin-
 namomi, absinthij, singulorum drach-
 mam unam, hæc uino ueteri conspersa,
 in pastillos rediguntur. Verum interim
 æger alendus est cibus quàm minimū hu-
 mectantibus, & concoctu facilibus, pa-
 rumq; excremētitijs, ex quorum genere
 pulmenta aromatibus & odoratis inci-
 dentibusq; seminibus præparata, & alij
 qui simul & calefaciunt & incidunt cibi,
 sunt. Aegrotanti præterea ante cibum
 multa exercitatio, minorq; solito aquæ
 frigidaë usus, & postquam cibus in uen-
 triculi fundum descenderit, profundus

somnus, illito prius uētre oleo nardino,
 magnopere iuuant. Vino autem ueteri
 & mero parce, ne cibus in uentriculo flu-
 ctuet, utetur, atque omnino uictus ratio-
 nem extenuabit. Quod si hæc sympto-
 mata inueterauerint in cruduerintq̄, ele-
 ctuarij ex cumino, & electuarij ex thure,
 utriusq̄ sesquidrachma, cum uncia uini
 ueteris ac meri diluta, recte exhibebitur,
 & uictus ratio eadē cum paulo ante præ-
 scripta instituetur. Electuarium ex cumi-
 no. Cumini Carmaniani drachmæ cen-
 tum, zingiberis drachmę uiginti * piperis
 drachmæ decem, foliorum rutæ, nitri na-
 turalis & integrioris utriusque drachmæ
 decem, omnia despumato melle excipi-
 to, & huius antidoti, si aluus non respon-
 deat, portionem aliquam porrigito. Sin
 autem cita sit, electuariū ex thure præbe-
 to: cuius cōpositio infra Capite de uen-
 tris profluuiō describit̄. § Sed si aluus
 neque nimis stricta, neque plus iusto so-
 luta fuerit, utrunq̄ electuariū, ut iam di-
 ximus, offeret̄. § Porro si hæc inefficacia

*A maiori
 causa.*

*Alibi, albi
 additur.*

Ant,

sint, ferri recrementum uino laeuigatum, aut potius quæ ex eo est, compositionem dato. Præparabis quidem stercoris ferri compositionem, ad hunc modum. Seminis apij, seminis fœniculi, anisi, cumini, ammeos, * aniuden, origani, ligustici, cari, seminis coriandri, piperis nigri, piperis lōgi, cinnamomi, thuris, spice, caryophylorum, nucis myristice, cyperi, zingiberis, singulorum sesquidrachma, stercoris ferri drachmæ quindecim, omnibus uini centuplū addito, & ad dimidias decoquito, percolatoq̄. Eius percolati medicamenti ægrotanti drachmas triginta ex uino administrato, ac unâ uictus rationem tenuiorem instituito. Hæc tribus septimanis commode repetuntur, & recte ab acidis & recentioribus fructibus, & frigida aqua potu, abstinetur, uinumq̄ moderate utiliter propinatur. Cataplasma ad uentriculum calefaciendū corroborandumq̄ multum efficax. Sumito styracem, spicam, iunci rotundi florem, absinthium, calamum aromaticum, mastichen,

* Arbor est
apud Auic.
sub nomine
Assæ.

stichen: & ea uino ueteri & cydoniorum succo aspersa, in cataplasma uentriculo superinducendum, dirigito. Ad hæc optime facit uentriculo, ex oleo nardino & cyprino frictio, illinitioq;. Quinetiã & lana succida prædicto oleo tepete imbuta, linteoq; uentriculo superligata, multum iuuat. Potui autem ægrotanti uinum uetus calidũq;, aut hydromel propinabitur. Mane uero ægrotante ieiuno, aut saltem tribus horis ante cibum, diacydonium (Arabibus miua appellatum) mediocris mystri modo dandum est. Apparatur autẽ ex malis cotoneis pharmacum hoc modo. Ex malis cotoneis maiora iucundioraq; & minus acerba, quæ uel delictet struthia appellantur eligito: expressumq; eorũ succũ, diem & noctẽ totam, quo resideat, relinque, deinde eo percolato, ex puriore succo partes duas sumito, sacchari partem unã, uini ueteris unam: & lente supra prunas, donec mellis spissitudinem recipiãt, decoquito. (hac enim crassitudine, stomachica medicamenta preparari

præparari solēt.) deinde spumã diligēter auferto. Postea ad singulas totius libras accipies, zingiberis, spicæ, cinnamomi, caryophylorū, singulorū drachmã unã, mastiches drachmas duas: quæ omnia in puluerem tenuissimum detrita, lineoq̃ panno illigata, adhuc feruenti decocto iniicies, & quum à prunis amotum refrigerit, linteum diligenter expressum eximes, ac medicamen ad hūc modum usui futuro recondes. Quod si concoctionis offensæ adsint, cibi fastidiū, nidorosi oletosiq̃ ructus, & sitis uehemens, uocatum cotoneorum malorum acetosum syrupum propinabis, quem ad hunc modum conficies. Succu cotoneorum acidorum pars una, sacchari albi totidem, acetu albi ac perlucidi quarta pars. omnia simul tantisper dum iustam spissitudinem obtineant, decoques. Sanè hic syrupus uentriculum corroborat, & præterquam quod eius munia ad actionē excitat, uehementem quoque eius inflammationē & estum mirifice reprimit, Aegro autem
 cibus,

Gal. & Alexan. pulueres iniiciūt.

A calida in temperie.

cibus, qui simul & acidus ac austerus fit, preparabitur, cuius generis est caro cum immaturarū uuarum & malorum syluestrium acidorum expresso, & * ribes decocta, & columbæ quoq; uentrem mentha infartum habētes, cum momento salis & omphacino decoctæ, aliâq; aciditate & austeritate his correspondentia, alimenta sunt. Præterea puluis hic crebro sumendus offertur. Qui accipit, rosarum rubrarum drachmas decē, spodiij drachmas tres, seminis coriandri drachmas quinque, huius pulueris drachmæ duæ succo malorum punicorum acidorum, & syrupo acetoso cydoniorum insparsæ porriguntur. Cæterum si paulo ante dictis symptomatibus corporis macies inflammatioq; adsint, laborātilac & hordei decoctum propinetur, ac herbis humectantibus refrigerantibusq;, ex quorum genere lactucæ, maluæ, cucurbitæ & citrinati cucumeres sunt, æger enutritur, non nimis liberaliter tamen. Iam etiā hœdorum & lactantium agnorū carnes,

* Nos Acetosa uocata herba utimur.

A sicca & calida in temperie.

& recentes in petrosis aquis degentes pisces, ægro ex usu sunt. Ad hæc balneum dulcis aquæ, tepentis, quotidie conscendat, solioq; ad tempus insideat. Vinum etiam perlucidum & perquam dilutum bibat, ac subinde quieti se det, motumq; omnem & exercitium fugiat. In summa, uictus ratio, ac reliquum uiuendi genus tale sit, quod obœsilitatem pariat. Sed si hunc affectum inflammatio, æstusq; uehementissimus cõcomitetur, uentriculo refrigerantibus inunctionibus, ut oleo quod immaturæ oliuæ fuderunt, & melino, atque uiolacei momẽto succurres, & hordei decoctum potui præbebis, ægro tantiq; eandem medendi rationem cum hæctica feбри correptis, institues.

*Ab intensiore
re intemperie.*

De oris uentriculi dolore, ac inflammatione.

Cap. LXIII.

SI oris uentriculi dolorem, eiusdẽ subuersio, & erosio, nauseaq; subsequantur, egro liberaliori aqua modice incalēfacta porrecta, ut uomat (digito, aut pinna oleo madente, in fauces inserta) præcipiemus.

*Absq; infla-
tione calido hinc
more.*

piemus. Cæterum si hoc inualidum fuerit, alius hiera picra, ut in uentriculi tuni-
cis impactum succum expurgemus, du-
cenda est. Accipit autem amarū hoc me-
dicamen, pulueris rosarum rubrarū, spi-
cæ, mastiches, ligni balsamī, fructus bal-
samī, cinnamomī, casiaë ligneaë, asari, sin-
gulorum drachmas quinque; aloës ruffi
coloris, iocinorisq; modo cōcreti, duplū
omnium, quod diligenter detritum, alijs
simplicibus medicaminibus leuigatis, &
incerniculo ex tenuissimis setis, aut serico
constructo, cribratis, commiscetur,
atque rursus omnia simul cum aloë con-
teruntur. Huius autem quantitas, ab au-
reis duobus ad denarios duos usq;, offer-
tur. Laboranti quoque quotidie panem
uino austero, & malī punici succo supra
descripto, cotoneorumq; acidorum syru
po maceratum, præbeto. Si autem do-
lori acidorum & flatuosorum ructuum
copia, uentriculicq; distētio, ac singultus
affuerint, exhibeto electuarium diacymi-
nū, & diacalamēthes, & alia consimilia,
quibus

*Differt à
Gal. 7. Me-
thodi.*

*Alibi à 3. ij.
ad aureos
ij. legitur.*

*Ob frigidū
succū & fla-
tus.*

*Nō inuili-
ter hæc pre-
cedet, pitui
si humoris*

uacuatia.

quibus flatuosos spiritus discutiendi vis
 adest, quæ Capite de intestini laxioris vi-
 ti præsidij sequar. Cibi autem ægri
 erunt pulmenta aromatib, & calefacien-
 tibus seminibus apparatus. Potui quidē
 pauxillulum vini veteris et meri propina-
 bitur. Exercitia quoque, & medicamen-
 tofarum aquarū, aut in laconico balnea,
 non mediocriter iuuant. Quinetiā uen-
 triculi penicillo, nardino oleo, aut quo-
 piam alio calefaciente, & subastringēte, *Cum inflā-*
 imbutō, fouere conducit. Porro si oris *matione.*
 uentriculi dolorem, febris unā cum ma-
 nifestæ inflammationis indicij, & æstu,
 qui tactu de iudicari possit, subsequatur,
 mox inter curationis inītia, axillari dex-
 tra secta, sanguinem detrahito, et dolenti
 loco sandala, rosas & camphoram, simul
 rosarum aqua & cotoneorum succo leui-
 gata, superaccommodato. Aegro uero
 præter ptisanam nullum cibum offerre
 debes. proinde à carniū esu, uino & com-
 positionibus ex melle cōfectis, in primis
 arcendus est. At corroborandi gratia, in-
 terdum

*Hodie epi-
 themata li-
 quidiora,
 quam apud
 ueteres, pa-
 rantur.*

terdum malorum punicorum acidorum succum, & cum qui ex reliquis fructibus frigidam & astringentem uim possidentibus, igni aut sole decoquitur, utiliter propinabis. § Siquidem inflammatio oris uentriculi, & iocinoris, astringētia desiderant, nam si solo relaxante præsidio curationē tentes, uitæ periculū intuleris. §

Aestus porrò uehementia remissa, cassiam fistulam intybi succo dissolutam, & simul cum eo decoctā, ac diligenter à spuma liberatam, ægro offerre conducit.

*Scirrhi uen-
tri. curatio.*

Cum uero longius morbus prorogatus fuerit, et ardor omnino quieuerit, inflammatio autem in duriciem & scirrhum deciderit, emplastrū istud affecto loco superligato. Violarum aridarum drachmæ decem, rosarum rubrarum drachmæ quinque, spicæ odoratæ, mastiches utriusque drachmæ tres, cyperi, iunci rotundi floris, calami aromatici, cuiuscq; drachmæ duæ, farinæ fœnogræci drachmæ uiginti, florum chamæmeli, seminis althææ, hordeaceæ farinæ, singulorū drachmæ decem.

omnia

omnia seminis lini succo aspersa, in em-
 platri formā redigito, ac horis quatuor
 ante ciborum ingestionem, uentriculi re-
 gioni superinducito, uentriculo tamen
 prius nardino oleo feto. Deinde conco-
 cto, & e uentriculo depulso cibo, uentri-
 culi locus lana nardino oleo immerfa,
 uti iussi irrorandus est, præscriptumq̃
 cataplasma rursus inducendum. Confe-
 ctio quidem olei, seu unguenti nardini
 simplicis, in hunc modum se habet. Olei
 *glandis unguentariæ, quod proprie ba-
 laninū dicitur, libra, spicæ semuncia, ma-
 stiches, costi, cyperi, iunci rotundi floris,
 calami aromatici, singulorum drachma
 una, uniuersa hæc in pollinem subacta,
 dictoq̃ oleo iniecta, soli septimana una,
 in uase obturato ore, exponuntur, & dein-
 de percolantur. Porro feces sordesc̃ ma-
 nibus inter colandum hærentes, cataplas-
 matibus proposito uitio dicatis, admix-
 tæ, plurimum iuuant. Cæterum oris
 uentriculi inflammatione in tantam ue-
 rustatē protracta, ut in abscessum erum-

*Oleum nar-
 dinum.*

* Mesuas
 magis pro-
 bat sesami-
 num.

*Abscessus
 circa.*

*Arculanus
Rhazen hic
iëtriculi œ-
lema cura-
e autumat.*

pat, pastilli ex spica propinati, optime faciunt. Accipiunt quidem hi, florū iunci rotūdi, casiaë lignee, theobarbari Seni, calami aromatici, spicaë, cuiusq; drachmas tres: croci, myrrhaë, anisi, costi, piperis, singulorum drachmam unam, bdelliij variij drachmas tres, mastiches drachmas duas, ammoniaci drachmam unam, finguntur ex his pastilli pōdere sesquidena-rij, quorum quotidie unus sapa detritus exhibebitur. Emplastrum ad prædictū affectū ualde efficax, quod hac ratione præparatur. Bdelliij mollis drachmæ decem, ammoniaci drachmæ quinç; glandis unguentariaë drachmæ decem, apij seminis tantundē, spicaë, mastiches nigraë, utriusque drachmæ quinç; ceræ drachmæ tres, olei nardini drachmæ quindecim, gummi uino subastringente diluuntur, & eis omnia cōmixta, in emplastrum digeruntur. In uentriculi itaque & iocinoris affectibus profligādis, medico erudito & natura sagaci opus est, ut qui accurate ipsorū dispositiones distinguere,

*Emplastrū
audatissi-
mum.*

ac

ac curare queat, Nihilominus quātum-
uis succinctus fuerim, Capita et rerū sum-
mas, quæ his affectibus præsidio esse pos-
sent, hoc Nono libro persecutus sum.

De singultu. Cap. LXV.

QVando singultus post crassorū ci-
borum ingestionem, aut uini per-
quā diluti copiosiorē usum, aut cibum
alioqui sua nimia humiditate flatuosum,
inuadit, aqua calida, cui cuminum, men-
tha, mentastrum & thuris pauxillulum
incocta sint, crebro in potu offerēda est,
& ægro, ut sibi somnum conciliet, præci-
piendum. Ventri quoque, uesicę, ac fac-
culi huiuscemodī decoctis seminibus, &
herbis calefacientib. discutientibusq; im-
pleti, superligandi sunt. Quinetiā & eis-
dem uentriculus opportune irrigabitur.
Aeger autē tenuiori uictu, eoq; inciden-
te, enutrietur. Ac cum plusculis diebus
moderatori cibo ægotantem alueris, in
laconicum primam balnei domū subin-
de ipsum deduces. Item insecutis aliquot
diebus, illi siccantia & flatus discutientia

*A flatu, &
crudo suc-
co.*

*Profuert
ante huius
usum euo-
muisse.*

alimēta, modice tamen, præbebis. è quo-
rum albo sunt, pulmenta aromatibus se-
minibusq; calefacientibus ac incidenti-
bus condita, & assi montani passeruli.
& pauxillū uini meraci potui ei tum offe-
res, ne forte uini copia, cibi fluctuationē
in uentriculo creet. At si hæc non usque
adeò ualida fuerint, pastillo sex thure por-
rigo. Quos ad hunc modum conficies.
Accipe thuris drachmas quinque, inulæ
campanæ drachmas tres, mentastri, folio-
rum rutę aridorum, utriusque drachmas
duas, seminis † sisimbrii drachmas tres et
semissem. his detritis, & hyssopi succo su-
bactis, informato ex illis pastillos sesqui-
drachmæ pondere, & eorū unum in die,
cumini decocto læuigatum, propinato.

† Alias, ne-
mē, hoc est
serpilli, au-
etiā cum si-
simbrii.

Ex ficci-
tate.

Porrò si singultus cum tremore, aut
nausea, aut siti, aut oris summa ariditate,
post febrim superuenerit, aquam modi-
ce calidam, non liberaliter, sed pedeten-
tīm sorbillandam dabis. Et si tali auxilio
haud quaquam malū propellitur, aqua
cui hordeum incoctum sit, unā cum oleo

amygdæ.

amygdalarum dulcium porrigenda est. Quinetiam uertebras ceruicis & dorsi, humectante oleo tepente perungere, infricareq̄, non mediocriter cōducit. Aegrotanti uero potus, ex herbæ pulicaris feminis & iuleb uiolato, & malorum puniceorum dulcium succo, parabitur. Præter hæc singultui, qui ex repletione est, ac sternutationi spiritus compressio quàm plurimum confert.

De canino appetitu. Cap. LXVI.

SI quis assidua fame crucietur, & tamē Scibus assumptus ita grauet, molestus q̄ sit, ut eū mox aut uomere, aut per inferiora deijcere cogatur, oryza illi utiliter edenda porrigitur: cui fanies ab agno in fornace asso emanans, pinguedinis loco commixta sit. Ad hæc caudæ, & agnorū pedes, & qui his uiscositate & pinguedine respondēt cibi, accommodē offeruntur. Vinum quoque uetus, quodq̄ impense calefaciat, liberaliter (uel non sitiēti agro) haustum, optime facit. Deinde his deyoratis, ut ingesta euomat, egrotā-

Ob eā causam singultibus timentibus timor incutitur.

Ab acido succo.

*Ab immodi-
ca trāspira-
tione, aut ca-
lido succo.*

ti præcipiendum. Ac isto curationis mo-
do, tātisperdum ab omni malo liberetur
æger, ut utatur, consilium est. Sin ue-
ro à cibo nulla molestia afficiatur, neque
per uomitū, neque per aluum illum deij-
ciat, carnes bubulæ, & alia cōcoctu per-
uicacia edulia, porrigenda sunt. Quocir-
ca triticum pultis instar elixum, & oryza
cum lacte decocta, accommode exhiben-
tur. Potui autem, gelida aqua detur.
Quinetiam optima ratione æger in aëre
frigidiori ac perspirabili delitescet, & ab
omni acidorum, & austerorum, & acer-
borum atque acrium esu, quum ea scili-
cet appetitum prouocent, abstinebit, so-
lisq; dulcibus ac glutinosis, concoctu ta-
men peruicacibus, enutrietur.

De iocinoris dolore. Cap. LXVII.

*Ex intēpe-
rie aut hu-
more cali-
do.*

SI decoloratus aliquis, corporis ine-
ptum habitum, ac dolorem dextri la-
teris sub hypochondrijs, ad nothas ac po-
sticæ costas, comites sibi habuerit, & si
color, quo suffunditur, flauus conspicit-
tur, magna quoq; oris ariditas, ingensq;
fritis

sitis ægrum torquent, hordei decocti ius, & herbarum infrigidantium succi, syrupo acetoso ex albo saccharo decocto diluti, utiliter porrigentur. Huius autem generis herbarum sunt, intybum, solanũ, * amplexicaulis. A foris autem, epithemata, ac aspergines ex duobus sandalis, rosarum floribus, camphora, et momẽto spicæ, in aqua rosacea simul detritis, ad hunc modum accommodabis. Accipies linteum aliquod, & hoc liquore refrigerante & subastringente imbutum, loco laboranti superinduces, & priusquam tepescat, illo amoto, aliud in eius locum applicabis, partemq; diligenter irrorabis. Potui uero malorum puniceorũ succus, ac similes decoctione incrassati succi, facultatem refrigerandi obtinentes, exhibitũ profunt. Quare æger à uino, & his que melle condiuntur, ac calefacientibus incidentibusq; cibis, arcendus est. Item pastilli ex acidæ spinæ baccis porrecti, non mediocri auxilio sunt. Qui recipiunt, succibaccarum acidæ spinæ drachmas de-

* Theo-
phrastus cu-
scutã lino-
derã uo-
cat.

cem: seminis intybi, seminis cucumeris citrinati, seminis portulacæ, cuiusq; drachmas tres, rosarum drachmas duas, rheobarbari Seni drachmam unam, spicæ fedrachmam, redigito hæc in pastillos, pondere drachmæ & semissis, atque eorum unum syrupo acetoso, saccharo præparato, aut malorum punicorum succo solutum, propinato. Aluum quoq; si necessitas urget, succo fructuum, ut prunorum & tamarindorum, ac saccharo albo, deijcito. Porro si uitiatus color, iocinoris dolorem subsequens, cum uirore albicâs, mediustq; inter colorem colliquatione laborantium partium, & colorem tumidarum, extiterit: præterea si ægrotati aluus laxa fluxerit: & palpebrarum, ac summorum partium tumor, digitorum tactui cedens, ac laxitas affuerint: pastilli ex rheobarbaro Seni, syrupo acetoso melle composito subacti, porrigendi sunt. Hi consistant, mastiches, succi eupatoriij, succi absinthij, seminis fœniculi, anisi, singulorum drachmis duabus, rheobarbari Seni drachmis

*Ab intemp.
aut materia
frigida.*

chmis decem, hæc absinthij succo detrita in pastillos pondere drachmæ unius et semissis digeruntur: quorum exigente usu, unus quotidie commemorato syrupo dilutus, propinabitur. Præter hæc, emplastrum ad præsentem affectum efficax, ad hunc modum præparabis. Accipito spicam, mastichen, cyperum, iunci rotundi florem, calamum aromaticum, crocū & myrrhā: deinde myrrham unā cum mastiche in uino odorato subigito, ac alijs his commixtis, finge emplastrum, iocino ricq̃ superinducito. Interim uero à cibis crassis, refrigerantibus, multamq̃ pituitam gignentibus, ægrotātem arceto. At si huiuscemodī inefficacia fuerint, pastillos ex cācamo * radicū decoctorum iure solutos, exhibebis. Recipiunt autem pastilli ex cācamo: cācami, rheobarbari Seni, utriusq̃ drachmas tres: spicæ, seminis apij, ammeos, mastiches, iunci rotundi floris, baccarum iuniperi, amygdalarum amararum, costi amari, rubiæ fatiuræ, succi eupatoriij, asari, aristolochiæ rotundæ.

Emplastrū
de spica.

* Hodie no
strates officinæ laccā
uocant.

*Quidā ad-
dunt sibi-
nam.*

rōtundę, gentianę, cuiusq; sesquidrach-
mam, cancamo & eupatoriij succo uino
subactis, reliquisq; medicaminibus illis
admixtis, formantur pastilli, pendent
singuli drachmam & semissem. Radi-
cum quidē ius, hac ratione præparatur.

Corticū radicū apij, corticum radicis fœ-
niculi, utriusque drachmę decem, semi-
nis apij, seminis fœniculi, iunci odorati
floris, ammeos, singulorū drachmę quin-
que; rosarum rubrarū drachmę tres, spi-
cæ odoratę tantundem, omnia in aqua
libra ad tertias bulliūtur, ac ita decoctum
ius cum commemoratis pastillis assumi-
tur. At si inflammatione abscessu uē
iecur cōflictetur, eisdem auxilijs, quibus
oris uentriculi inflāmationi & abscessui
medemur, illi succurrendum est.

*Hodie medi-
ci decoctio-
nes suas ma-
gis dilutas
parant.*

De morbo regio, qui & in se & dicitur.

Cap. LXVIII.

MOrbo regio si febris affuerit, inty-
bi & solani succi, & hordei deco-
cti ius, potui offeruntur: & cucurbitis do-
mesticis, atriplice, cucumeribus citrina-
tis,

tis, & alijs herbis in frigidādi facultate his
 paribus, æger enutrietur. Locinori uero
 emplastrū inflammationē arcens, quod
 duobus * sandalis conficitur, illigato, ac
 aluum prunorum tamarindorum succo
 & saccharo deijcito. Quæ si minus effica
 cia fuerint, pastillos ex camphora succo
 punicorum malorum acidorū detritos,
 præbeto. Pastilli de camphora. Saccha
 ri, spodij, rosarum rubrarum, cuiusque
 drachmæ tres; feminis intybi, feminis cu
 cumeris citrinati, feminis cucurbitæ, se
 minis lactucæ, feminis portulacæ, sanda
 li rubri, cuiusq; drachma una. fingito ex
 his solani succo, aut illi cōsimili subactis,
 pastillos drachmas duas pendētes, & ho
 rum unum quotidie cum camphoræ obo
 lo, aut minus pro morbi ac uirium ratio
 ne, propinato. Si æger sanguine plenus,
 multo tempore uenam non secuit, uena
 axillari dextra pertusa, sanguinem detra
 here expedit. Quod si arquatius citra
 febrim contingat, aluum catapotijs his,
 (postquam leuiora tentaueris) recte pur
 gabis.

*Mesuas ce
 rotū sanda
 linū quoq;
 describit.

A meatum
 obturatiōe.

* Satisfecerint duabus vicibus.

gabis. Aloës drachma una, scammonij sesquiobolus, agarici scrupula duo, succi eupatoriij scrupulum unum. hæc intybi succo excepta in catapotia dirigit, & una dosi exhibeto. Insuper pastillos ex cancamo, radicum incidentium decocto subactos, præbeto. Porrò si bilis suffusio in morbo regio oculos dehonestare non cessauerit, æger subinde acetū acerrimum olfaciet, & naribus solio dulcis aquæ insidens idem attrahet, & mirifice iurabitur, si pressis naribus paulisper id contineat. Oculis quoque ictero cum febrilaborantis, aqua rosacea instillanda est. Præter ista arquato implicito, in mali declinatione, tribus hebdomadibus lactis serum potui porrectum, non paruum præstat auxilium.

Nō inutiliter in eo incidentia mactantur.

De aqua inter cutem, quæ ὀδῶν & Græcis dicitur. Cap. LXIX.

ἰόντιος.

CVM post iocinoris dolores & febres, abdomen intumescere cœperit, ac fumen (quod spacium inter umbilicum & pectinē est) prominere, & huius regionis

regionis cutis extenuari albescereq; uisa fuerit: & quum concusso abdomine talis auditur sonus, qualē percussī uteri aqua non omnino pleni, elidere solēt: siq; unā cum his urināe rubrae sint, parua adipiscēdā sanitatis ægro spes reliqua est, potissimum si is uirium robore destituatur. At cui uires constant, et uenter quoq; aridus est, catapotia ex * rheobarbaro Seni, cha
 mæleam in earum mīxtura recipientia, porriguntur. Habent autem huiuscemodi catapotia, rheobarbari Seni, succi eupatoriī, seminis intybi, cuiusq; drachmas tres, agarici drachmas quinque, chamæleæ drachmas decem, finguntur catapotia, quæ ut plurimum quantitate drachmarum * duarum cum semisse, accōmode singulis septimanis exhibentur. Cæterum uiribus prostratis, pastillos ex chamælea præbeto, qui constant, seminis intybi drachmis decem, chamæleæ drachma una, agarici scrupulis duobus, succi eupatoriī tantundem: rosarum, † seminis cucumeris citrinati, utriusque drachmis

* Nos nostro utemur

* Suffecerit 3. 1. et. f.

† Aliis, nucleorū cydoniorum

mis duabus cum semisse, hæc in decē pa-
 stillos redigito, ac eorum unum in die sy-
 rupo acetoso ex saccharo preparato dilu-
 tum, offerito. Aluo autem cita profluente,
 pastillos ex acidæ spinæ baccis, syrupo
 acetoso læuigatos, porrigito. Aegrotan-
 tem præterea montanis auiculis assis, &
 carne minutim concissa, ac cum oui vitel-
 lis frixa, enutrito: & potui succum coto-
 neorum, cum pari sacchari portione &
 quarta parte aceti decoctum, administra-
 to. Verum si aluus plurimum lubrica fue-
 rit, ut symptomati occurras, impermix-
 tum cydoniorum malorum decoctū suc-
 cum propinato. Cæterum si à morbo uri-
 narum rubor, & æstus, & cutis suppal-
 lidus coloris suffusio abfuerit, subsequen-
 tia catapotia magno auxilio deglutun-
 tur. Constant autem hæc: Chamæleg, sa-
 gapeni, utriusque sedrachma: sacchari,
 * columbarum ruralium fimi, utriusque
 obolo uno. Largiter quidem hæc catapo-
 tia aquam ducunt, ac per inferiora miri-
 fice protrudunt. Pastilli præterea ex can-
 camo,

* Illud aui
 mei manu
 scriptū exē
 plar nō ha-
 bet.
 Vna uice
 hæc multis
 porriguntur

camo, radicum incidentium elixarum iure diluti, propinandi sunt. Emplastrum quod aquæ subter cutem speciei, ἀσπίτης ab utero sic dictæ, strenuè auxiliatur. Farinæ hordeaceæ, cyperi, stercoris † ouilli ueteris, nitri naturalis, lapidis Armenici; cuiusq; æquæ portiones, sulphuris uiui momētum, quibus omnibus muria, aut aceto mulso subactis, toti abdomini emplastrum adaptatur: quod insigni uī in exiccandis humoribus pollet. Cæterū si in palpebris, alijsq; summis corporis partibus, digitorum tactui cedētes tumores (οἰδηματῶν Græci uocant) oboriantur, & testes quoq; ac scrotum intumescant, & facies unā cum totius corporis habitu laxa spongiarū instar, & albicans; pituitosaq; emortui similis appareat, hydrophis species, ἀνασάρκα, & λευκοπλευματία appellata, hominem affligit. Aegro itaq; hac implicito, pastillos ex cancamo radicum decocto subactos, porrigito. Aluū autem singulis septimanis, catapotijs ex rheobarbaro subducito. Ad hæc, egrum

† Alias, bu
buli.

ὑποσάρκα.

Pillule Me
sues de ra-
ued sūt for-
tiores.

fabulo arenaq; excalesfacta faburato, ac uacuo cibus uentriculo exercitium uehemens & frequens in sole, & famē sitimq; ægrotanti præscribito. Porrò si uenter inflatus distentusq; fuerit, & concussus tympani crepitum ediderit, aquæ subter cutem speciē, *τυμπανίτηρ* dictam, adesse certū est. Qua qui implicitus est, ab omni olerum usu, & flatus gignētibus cibus, circuncidendus est: & abdomen eius indies panico tosto, & momento falis, ac furfurib. sacculo insutis, fouendū. Huic præterea cucurbitulæ leues, cum multa flamma crebro toti uentri suffixæ, maximè profunt. Quinetiam remedia discutendis digerendisq; flatibus inscripta, et ad urinas efficacia, eligenda sunt. e quorum genere sunt diacyminum, et ex bacis lauri electuariū, quod Capite de ilei morbi curatione prosequar. Deidē huic quoque ægrotanti multa exercitia, & famēs ingens, strenuè auxiliantur. Sic quoque collyria, seu glandes flatulentis spiri- tibus amouendis dicata, & alia à me. Cap-

pite ad coli intestini uitiū remedia describenda, quàm maxime accommoda censentur. Proinde clysteribus ex huiusmodi glandibus liquore quopiam detritis, uti expediet. Item uentrem etiā aspero linteo, tantisper dum rubor excitetur, perfricare, & clysteres ex oleo rutaceo infundere, consiliū est.

De lienis dolore. Cap. LXX.

Splenis dolorem si æstus, & urine rufæ, febrisq; subsequantur, infra scriptorum pastillorum portionem: ægro porriges. Pastilli ex agno casto. Seminis agni casti, fructus tamaricis, utriusque drachmæ decem, seminis intybi drachmæ quinque, seminis portulacæ tantundem, his aceto acri detritis, informato pastillos, & eorum unum drachmarū trium pondere, aut aliās pro morbi magnitudine, syrupo acetoso ex saccharo preparato, subactum, porrigito. Si uero ægrotantis uenæ uniuersi corporis sanguine distentæ

Ab inflammatione.

* Ea uix solus axillaris ueneramus est.

*1. venit, et
salivata alla
nuncupatur.*

num, inter paruum ac anularem digitos
reperit, secabis, & sanguinem quantum pro
laborantis corporis habitu satis esse con
ieceris, fluere sines. Lienis quoque frustum
huius generis panis, quem vulgo filtrum
uocant, aceto excalesfacto imbutum ap
ponatur, & a dulcium crassorumque esu
aeger abstineat. Porro si absque ardo
re quopiam lienis dolor aegrotantem tor
quet, pastilli de capparib. appellati, sum
me auxiliantur. Recipiunt autem: corti
cis radicum capparidis, seminis agni casti,
utriusque drachmas decem: scolopendrii
drachmas septem: aristolochiae tenuis, fo
liorum rutae, seminis nasturtii, acori, ni
gellae, singulorum drachmas tres, ammo
niaci drachmas tres, ammoniacum ace
to diluitur, & ceteris omnibus eo asper
sis, finguntur pastilli drachmarum dua
rum pondere, quorum unus syrupo aci
do melle composito, & radicum decocto
dissolutus, potui datur. Porro si inten
sus tumidusque splen absque magno gra
uitatis sensu fuerit, & cum premitur rugi
tus

*A frigido
humore.*

Ex flatu.

tus aliquis sub tangentis manu auditur, iam comprehensos pastillos, radicū decocto dilutos, præbeto. Potui autem uinum uetus ac meraculum porrigito, & quoad fieri potest, frigida usum subduci to. Emplastrum ad lienis flatus, eiusdemq; duriciem, optimè faciens. Foliorum rutæ drachmę decem, nitri, mentastri aridi, utriusque drachmæ tres, ammoniaci drachmæ septem, ammoniacum uino ueteri subigito, & eo cetera perfusa in emplastrum digerito, lienisq; regioni fascia aut instita illigato.

De morbis intestini plenioris, & tenuioris.

quorum hic ἰλεϞ, ille κώλικϞ Græcis dicitur. Cap. LXXI.

SI uentris dolor, unà cum eiusdē astrictione, & ciborum fastidio offendit, absque tamen omni ardore & feбри, ea quæ aluum citra uomitus iritationē dulcunt, porrigēda sunt: cuius notæ electuarium ex gallia moschata est. Quod accipit, mastiches, caryophylorum, zingiberis, piperis nigri, piperis longi, cinnamo

ileus à frigido humore.

Non inutilis erit inter initia, uel lenis clyster.

* Pastilli
sunt, & ad-
feruntur ex
oriēte non
bene parati,
Manard.

Videtur in
hoc medica-
mine ali-
quot drach-
mæ turbit
deesse.

mi, nucis myristicæ, * galliæ moschate,
singulorū drachmas decē, scāmōnij dra-
chmas decē, deinde exprimit cotoneorū
acidorū et recētū succus, qui equa mellis
portione, donec medicinarū pōderi am-
bo respōdēt, cōmiscet, & deinceps simul
omnia pedetentim supra prunas, ad de-
bitā crassitiē decocta, futuro usui repo-
nūtur. Quantitas aut præsentis antidoti
una uice exhibenda, est inter drachmas
duas, et duas cum semisse, Quod si dolor
uehementi ciborum nausea uacat, & æ-
ger deuorata medicamina uomitu haud
quaquam diuertit, catapotia ileo morbo
sacra exhibentur. Quæ constant, cucur-
bitæ syluestris, sagapeni, utriusque drach-
mis decem, scammonij drachmis tribus
& scrupulo. finguntur catapotia, ex qui-
bus oboli quinque administrantur, hæc
etenim tenuioris intestini morbū depel-
lunt. Cæterum si ileus intantum seuiat,
ut alium ducentia pharmaca inualida
sint, ægrotanti hanc infra scriptam glan-
dem subdes, Salis cibarij drachmę decē,
medullæ

medullæ cucurbitæ syluestris drachmæ
 duæ cum semisse, scammonij tātundem,
 his melle læuigatis, informato glādes ad
 longitudinem longaonis, ac ita subijci-
 to. At si nihil auxiliij præstiterint, clysterē
 hunc lenem (ut sua mora feces molliat)
 infundito: qui accipit, ficus caricas quin-
 que, furfuris manipulum, altheæ tantun-
 dem, betæ folia decem, hæc linteo illiga-
 to, ac in librīs duabus aquæ ad dimidias
 decoquito, deinceps decoctū ius per lin-
 teum colato, & sesquidrachmam nitri, &
 olei sesamini unciam unam illi adijcito,
 sicq; apparatus enema inijcito. Verū si
 hoc infusum acrius reddi desideres, iam
 comprehensę glandis drachmam & se-
 missem ei contemperato. Clyster stre-
 nue feces subducens, & superfluos suc-
 cos abstergens: quo alio medicamentis
 non cedente, neque aliās illis adiuuanti-
 bus utimur. Carnis cucurbitæ syluestris
 drachmę decem, centauri drachmę quin-
 que, utriusque cyclaminis speciei drach-
 mę duæ: mentastri, rutæ, origani, cuiusq;

* Sic Leoni
cenus alchi-
tram uocat.

manipulus unus, omnia in aquæ libris
tribus ad duas tertias decoquuntur, &
percolato decocto, commiscentur * resi-
næ cedrinæ, mellis singulorum drachmæ
tres, castorei, sagapeni, opopanacis, præ-
scriptæ glandis, cuiusque drachmæ duæ,
omnibus pistillo cōtusis, & iam tepidis,
clyster inijcitur. Ceterum si aluus indura-
tum, ac quasi in nucleos diuisum stercus
(quod Greci σκύβαλον appellāt) minime
egerit, in clysteris usu, donec illud expel-
latur, persistendum est. Siquidem cōpre-
hensum enema, in ilei intestini uitijis atro-
cibus ac uastis, & seuo colico affectu, qui
cum magno ciborum prostrato appeti-
tu, nullaq; per aluum deiectione affligit,
utiliter subijcitur. Presentem quoque te-
nuioris intestini affectum, præter tradita
symptomata, foetidū ructus, & fæcū non-
nunquam per os eiectione, cōcomitari con-
sueuerunt. Quæ quum hominem affli-
gunt, mortem subindè minitantur.

Colicus ex
flatu.

Porro si uentris dolor, tam ingenti alui
constrictione uacat, et si flatibus distētus
uenter,

uenter, murmure multo ægrū molestia
 afficiat, electuariū ex baccis lauri porri-
 gitur. Hoc recipit: Foliorum rutæ arido-
 rum drachmas decē, ammeos, cumini, li-
 gustici, origani, nigellæ, cari Alexādrini,
 feminis petroselini, amygdalarum ama-
 rarum, piperis nigri, piperis lōgi, menta-
 stri, dauci, acori, baccarū lauri, castorei,
 cuiusq; drachmas duas, sagapeni drach-
 mas quatuor, opopanacis drachmas tres,
 excipiuntur omnia mellis æqua portio-
 ne: & eius electuarij nucis auellanæ, aut
 alterius paruę nucis Indicæ instar, indies
 datur, cū uini ueteris & calefacti uncia,
 aut radicū incidētium decoctorum iu-
 ris uncia. Hoc * electuario ad dirigēdos
 flatuosos spiritus, nihil est efficacius. Pre-
 terea glandem hanc spiritibus depellen-
 dis ac discutiendis idoneam, aluo indito.
 Cumini, foliorum rutę uiridis, utriusque
 tantum quantum manus apprehendit,
 utriusq; cyclaminis speciei drachmę tres,
 nitri drachma una, deterito hæc melle, et
 lanam spongiam uē illis circumlitam in

* Electua-
 ria uocata
 sub antidoti
 nomine cō-
 prehendere
 licet, item
 et confe-
 ctionis.

Satius erit
 mel in cras-
 sari, quam
 spōgia uti.

anum dimittito. Abdomen quoque penicillo, calidiorē, flatusque dissipāte liquore, imbuto, subinde foueto, ac irrorato. Quinetiam agrum in labrum huiusmodi flatus discutiēdi uim obtinens, deducito. Si uero his malum non cesserit, cucurbitulas magnas cum flamma & leues toti abdomini defigere, locumque rudiori ac aspero linteo perfricari præstat. Deinde crebræ inunctiones, ex rutaceo oleo, aut alio huic in calefaciendo finitimo, non alienæ sunt. Iam quoque castorei & euphorbij utriusque sedrachma, huiusmodi oleo læuigata, clysteris forma utiliter infunditur, admixto tamen quopiam incidenti ac flatus digerenti decocto, quod clysteris materiam præbeat.

Qui autem hoc malo teneri consueuit, dū sanus est, à uini diluti & frigida aquæ potu, & herbarum infrigerantium, & lactis, & aliorum flatuosos spiritus gignentium alimentorum esu, se arceat. At uini meri potu utatur, uictusque rationem reliquam calefacientem ac incidentem instituat.

tuat. Philonium, quod ileosis ad discu-
 tiendos flatus, & soporem sensitivæq; fa-
 cultatis stuporem inducendum, propina-
 tur, cum scilicet summis tenentur crucia-
 tibus, animiq; deficientis suspicio ingruit.
 Piperis, ammeos, foliorum rutæ, menta-
 stri, castorei, baccarum lauri, cumini, cu-
 iusque uncia una; opij, mandragoræ, se-
 minis alterci, singulorum semuncia, subi-
 guntur simul cum mellis pari modo. por-
 rigit uero eius medicamenti sesquidrach-
 ma, aut minus, pro uirium robore. Ple-
 runq; etiam huic pharmaco commisce-
 tur, scammonij tertia pars uncia unius,
 unde & alium quoque citat. § Philonis
 uero Tharsei anodynon habet, croci
 drachmas quinque, pyrethri unam, euphor-
 bij unam, spice nardi unam, piperis albi,
 alterci utriusque drachmas uiginti, opij
 drachmas decem. excipe melle, & ad eos
 qui stercorea in maximis dolorib. peruo-
 mitum reiiciunt, dato magnitudine fabæ,
 ex ternis aut quaternis cyathis aque frigi-
 dæ §. Cæterum si dolori febris adsit, cas-

Ex 9. Secū
 dum locos
 Gale. & 9.
 Sermōe Aē
 tij, restitut
 descriptio.

Abilio
 humore.

fia fistula succo intybi decocto ac despu-
 mato, diluta, ægro offertur, potui quoq;
 syrupus uiolaceus utiliter porrigitur. At
 cibus, quibus herbæ emollientes & frigi-
 diores adiectæ sunt, oleoq; amygdalarū
 dulcium præparatis, enutrietur. Item le-
 uiores infusiones, ut ex oleo in quo fœno-
 græcum aut althæa ebullierint, & anseri-
 no adipe, ab inferioribus partibus ægro-
 tanti iniiciuntur. Porro si locus abdo-
 minis, qui à sinistro rene ad dextrum, per
 uentriculi fundum cincturæ modo perti-
 net, tumidus conspicitur, & laxum inte-
 stinum quoque inflammatione correptū
 apparet, sine mora aperta dextri cubiti
 uena, sanguis minuendus est, & cassia fi-
 stula herbarum refrigerantium succo sub-
 acta, subinde propinanda. Item si tenue
 intestinum inflammatione infestetur, ea-
 dem præsidia præstāda sunt. Cibus uero
 ægro huiuscemodi, coli uitio per circui-
 tus quosdam torqueri solito, conueniet,
 qui herbis aluum emollientibus præpa-
 ratus, oleum quoque sesaminum in con-
 dimentum

Ex san-
 guine.

dimentum accipit. Ab omni porro acidorum, austerorum, crassorum, aluumque astringentium esu, in totum abstinendum est. Eum uero quem cum dolore flatus quoque implicare solent, pulmentis aromaticis speciebus, aut calidioribus, incidentibusque seminibus conditis, nutrire conuenit. Proinde est contrarium ab olerum, lactis, & flatus excitantium ciborum ingestione, abstinere ex usu est. Potui uero uinum uehemens incorruptumque propinabitur, aut hydromel, cui medicamina incidentia excalescentiaque in condimentum iniecta sunt, ex quorum numero piper est, porrigetur. Huiuscemodi autem hydromel, quod modo subiicitur, est. Conmisceto mellis puri libram, aquae potabilis libris sex, & tantisper dum zula pou crassiciem ambo recipiant, decoquito, spumamque detrahit, quo diligenter peracto, ad singulas libras hydromelitis, piperis contriti drachmas duas linteolo illigatas, quousque hydromel adamussim decoctum sit, immittito: & ubi refrixerit, diligenter expellum

Victus ratio in doloribus ex flatibus.

expressum linteolum eximito. poscente quidem usu, eius portionem liberaliter propinato. Eos quoque quibus ex flatibus & crassis crudisque humoribus dolor esse consuevit, strenue iuuat ricini fruticis oleum, recenti feminum decocto temperatum. Præsens quidem feminum ius accipit: Ammeos, cumini, ligustici, cnicici, origani, nigellæ, cuiusque quantum trinis digitis comprehenditur, hæc aquæ libris tribus immissa, ad dimidias decoquuntur, usus autem eius est, si ipsius uncijs duabus, olei ricini in drachmas tres dilueris, pluribusque diebus ea quantitate potui porrexeris. Verum si dolorem arboris comitetur, sumito pruna uiginti, ficus caricæ quinque, uuarum passerarum ab acinis mundatarum drachmas quinque, decoquito & percolato, ac posteaque cassiam fistulã in eo decocto subegeris, secundo per colum traicito, & amygdalarum oleo adiecto, potandum porrigitur. Vel decoctum in Capite de distillatione commemoratum, eius loco offero.

Cæterum

Raro hodie hæc pinguis potanda porriguntur.

Hoc laudatissimum in his affectibus est.

Cæterum si aluus uehemēter astricta fuerit, huic iuri adiſcientur filicule, turbit, utriusque drachmæ duæ: & his simul decoctis, tantisper dum aluus respōdet, eo iure utemur. Posteaquā uero cita ea profluxerit, polypodium, & turbit amouebuntur. † Puluis qui aluum ducēdo, simul flatus & grauitates reprimat. Turbit albi & amygdalarum dulcium oleo irrorati, ac in puluerem adamussim contriti drachmæ uiginti, sacchari drachmę triginta, zingiberis drachmæ decē, huius quidem pulueris ut plurimū drachmæ * tres impermixtæ, aut alicui ad id idoneo liquorī iniectæ, offeruntur. Catapotia quorum unum deuoratum, uentrē deijcit, & appetitum incitat, & flatuosos spiritus grauitatesq; reprimat, ad hæc ciborum concoctionē iuuat. Mastiches, zingiberis, cinnamomi, caryophylorū, pœonia, piperis nigri, piperis longi, scammoni, sacchari, uiolarū, cuiusq; uncia una, fingunt catapotia cicerū instar, & eorum unū trāsglutitū, aluū semel bisue deijcit.

† Alias, electuarium.

* Suffecerint due.

*Lienteria à
calido hu-
more.*

** Brabãtia
sub eo nomi-
ne paruos
quosdã ru-
bros fru-
ctus habet,
ad proposi-
tum aptissi-
mos.*

*Nos primũ
ius lenticulæ
effunde-
mus.*

QVando assumptus cibus solita mo-
ra in uentriculo non retētus, citius
paululum immutatus egeritur, & si huic
uitio ob excrementorum acrimoniã uen-
tris erosio & cruciatus ac sitis affuerint,
quæ etiam plerunq; concomitaturalui
profluuium, in quo excrementa ante ci-
borum ingestionẽ excreta, saniem quam
piam admixtam habent, ægrotãti ex im-
maturis uuis decoctione inspissatus suc-
cus, aut * ribes, aut malorum punicorũ,
cum spodij & rosarum utriusq; drachma
una propinabitur. Pastilli quoq; ex spo-
dio astringentes, identidem utiliter offe-
runtur. Cibi porrò sunt, lenticula cum
aqua, aceto & croci momento decocta,
& pulli cũ aceto elixi, idemq; assi, & om-
phacino intincti. Potui uero rhois deco-
ctum rosacea aqua dilutum, aut malorũ
punicorum succus exhibebitur. Præte-
rea cibus rhus obsoniorum in condimen-
tum accipientibus cibabitur, & breuiter
totam uictus rationem ad restrictionẽ &
afriktionem

astrictio em dirigere consilium erit,

Cæterum si absque huiuscemodi erosione alius lubrica molesta sit, si quoque quod fluxu egeritur nullam sanie admixtam habeat, sed albidū glutinosum quod id cernitur: præter hæc etiam, si inflāmatio modica, sitis exigua et ructus acidi affuerint, laboranti betam, & sinapi, & salitos pisces aliaue incidēdi uim possidentia, administrabis, & deinde anethum simul cum salis momento in aqua decoques, & posteaquam percolaueris, adijcies percolato iuri, mellis quod satis est, & sic post incidentia pituitam ingesta, propinabis: eo quod pacto digito, aut pinna ori indita, uomitum ægrotanti prouocabis. At si affectus, ob humorum copiam uentriculi tunicis imbutam, illo curationis modo non cōquieuerit, pituitam ducens pharmacum præbebis. Cuius generis quod iam subsequitur cēsetur. Aloës drachma una, cucurbitæ syluestris carnis drachmæ quatuor, sacchari tantundem, turbīt drachma una, ex his forman-

Lient, à cru
do & frigi-
do succo.

Liēteria po-
tissimū à cœ-
liaco affe-
ctu erudita
re secerntur.

L tur

*Potius tri-
bus, et in ro-
busto cor-
pore.

Liēteria ex
naturalū fa-
cultatū im-
becillitate à
frig. & hu-
mid. intēp.

*Alibi far-
cimina sale
conūta.
alibi etia
substantia.

tur catapotia, quæ *uni propinationi suf-
ficiunt. Ad hæc uomitu ex incidentibus
sæpius uti expedit. Cibos autem, quibus
æger uescitur, in muriã intingere iuuat,
ut inde incidendi & calefaciēdi uim obti-
neant. Proinde quoque *cibis sale con-
ditis, ac acri gustu præditis, breuiter suo
calore appetitum incitātibus edulijs, op-
portune ægrum cibabis. Si id quod
per aluū deſcitur, nihil superflui biliosi,
nihil saniosum, nihilq; pituitosum ad-
mixtū habeat, uinum merū robustumq;
offeretur. Similiter electuarium quoque
ex thure præbetur, quod accipit, thuris
drachmas decē, piperis, ammeos, spicæ,
ligustici, anisi, nigellæ, cuiusque drach-
mas duas, balaustiorum drachmas de-
cem mellis dispumati quantum ad prædi-
ctas medicinas excipiēdas sat est. Huius
uero antidoti usus probatur, quoniã uen-
triculum impense calefaciat, mirificeq;
exiccet. Seminum quoque decoctum,
ad plenioris intestini morbū idoneum,
propinabitur, uinique meri potu æger
assuehet.

affueſce. Cæterum ſi aſſumptus cibus crudus haud quaſi egerit, ſed aquoſa queſdam & alba tenuiſq; ſubſtantia, præſentibus iocinoris imbecilli notis, excernitur, egro ex ferri ſtercore electuarium, & id quod ex thure fit, porrigentur. Et paſtilli quoq; quos calefaciēdo iocinori inſcripti, & electuarium diacalaminthes, utiliter adminiſtrabuntur. Diacalaminthes autem, cōpoſitio eſt huiuſcemodi: Foliorum rutæ, foliorū calaminthæ excicatorū, ammeos, cari, liguſtici, zingiberis, cinnamomi, longi piperis, ſingulorū æquæ portiones, omnia decocto melle excipiuntur. Item præter hæc, ad ea quæ calefaciendo corroborādōq; iocinori ſuperius comprehenſa ſunt, recurrendum eſt. Porro ſi commoratus affectus, iocinoris imbecilli indicijs caruerit, ſicq; qd fluxu egeritur, tenue ſubalbidumq; unā cum uentriculī grauitate extiterit, malorum punicorum puluis deuorandus dabitur. Præparatur autem, ex acinorū mali punici acidi, aſſorum, & in tenuiſſimū

Coeliacus affectus ob iocinoris obſtructionē & attrac. imbecillitatem.

Differt à Galeni. 4. de ſanitate tuenda.

Cœli. ex uētriculī & graciliū inſteſtinorum uitio.

* *Opinor
quorundam
lignorū a-
stringentiū
putamina.*

pulverem actorum drachmis centū: cari, seminis coriandri, utriusque in aceto acerrimo maceratorum, ac deinceps torrefactorum drachmis uiginti, * xylocaractæ, rhois Syrenaiici, balaustiorū, cuiusque drachmis decem. omnia in tenuissimum pulverem teruntur, qui deinceps transglutiendus offertur, aut malorum cydoniorū succo immixtus, porrigitur. Electuarium quoque Cazi inscriptū, opportunè administratur. Cuius mixtura in hunc modum se habet. Acinorū uuæ passæ in tenuissimum pulverem tritorum libra una, baccarum mirti aridarū, ac pari ratione subactarum libra † semis, xylocratæ Nabathææ, balaustij seminis tamaricis, ammeos, singulorum drachmæ decem. conficiuntur omnia saccharo arundinibus innato, seu apum melle quam exactissime spuma liberato, & deinceps huius portio p morbi magnitudine præbetur. At si defluuij alui recrementa flaua, & anum mordicantia inueniātur, & æger siti febricq; corripatur, pastilli astringētes

† *Alias,
quinq;.*

*Diarrhoea
ob bilis copiam
in uentriculo
et intestino
reurgit. atē*

astringētes ex spodio, & aqua crudæ pol-
lentæ hordei, prospere porrigētur, Pastil-
lorum autem astringentiū ex spodio mix-
tura, ad hūc modum se habet. Rosarum
rubrarum, spodij, singulorum drachmæ
decem: seminis rumicis, rhois Syrenaici,
balaustij, gummi Arabici, cuiusq; drach-
mæ quinq; redigūtur in pastillos drach-
marum duarum pondere, quorum unus
uncia decocto cydoniorū succo, & sex-
tante succi plantaginis dissolutus, potui
datur, Aquam quidem pollentæ hordei,
hac ratione præparabis. Hordeum con-
fractum, in aqua quæ ipsum tegit, tantū-
isper dum aqua modice inspissetur, deco-
quito, deinde percolato, & eius uncias
quatuor cū spodij, & gūmi Arabici utri-
usq; drachmis tribus dilutas, porrigito.

Quod si uentris fluxui, intestinorū exul-
ceratio serpendo depascens, superuene-
rit, lapidis Armenij puluerem deuoran-
dum exhibeas, Qui constat, seminis her-
bæ pulicaris drachmis uiginti, seminis
plantaginis drachmis decem, gūmi Ara-

Dysenteria.

bici, lapidis Armenij, utriusq; drachmis tribus. publicaris herbæ femine torrefacto, omnia simul cum illo in puluerē subiges, ac eum in aurora drachmarū triū pōdere, cum discocto cotoneorū succo, potui porriges: ac somnū inīturo ægro, tantūdem probe offeres. Inter cibos quīdem administrabis pulmentum, ex punīcorum malorum acinis, & uuis passis, in aqua cum paxillulo aceti decoctis. Præterea edulium cum immaturarū uuarum succo confectum, & quod rhus obsoniorum in condimentum accipit, ægrotantī utiliter offeres. Similiter quoque ex herbis aluum emollientibus, cum rhoī præparatum edulium, & id genus alia, edenda appones. Ad hæc pastillos de balauſtijs continuæ leuitati intestinorum (quæ Græcis λευτεγία dicitur) dicatos, si modo alius continenter fluat, propinabis. nec refert, an eius uentris profluuij recrementa sanguine tincta, intinctaue sint. Recipiunt itaque pastilli commemorati, Gallarum, siliquarum Nabathææ, seminis tamaricis,

Potui lac
scissum por
rectum ab
Alex. pro-
batur.

tamaricis, thuris, balauftij, fingulorum
 æquas partes: opij, gummi Arabici, utri-
 usque partem dimidiam, his in puluerem
 subactis, ac cydoniorũ malorum succo
 aspersis, informato pastillos * duarum
 drachmarũ pondere, atq; unum, si neq;
 fiti, neque febr̃i crucietur æger, uino læui
 gatum præbeto. Præsenti autẽ febr̃i, de-
 coctione inspissato cotoneorum aridorũ
 succo pastillos detritos, propinato. Sane
 hi pastilli in magnis & continentib, alui
 fluoribus, ut efficacissimi commendan-
 tur. Pastilli tenesimo sacri, qui malignis
 flatibus, & murmure infestãtib, absen-
 te tamen calore, porrigẽdi sunt. Seminis
 hyoscyami albi, seminis anethi, seminis
 fœniculi, fingulorum drachmæ quinq;
 ammeos drachmæ duę cum semisse, opij
 drachmæ tres, seminis apij drachmæ de-
 cem, hæc uino subacta in pastillos redigi-
 to, ac unum sesquidrachmæ p̃dere, aut
 minoris, pro uirium & morbi ratione, uĩ
 no læuigatum, potui offereto. Compo-
 sitio electuarij de styrace, uetusto uentris

* Propter
 nimia stupe-
 faciendi uim
 à 3. i. inci-
 piemus.

Teneſmus.

fluori, et tenesimo cum flatibus malignis, absque febrī & ardore infestante, utilissima. Castorei, opij, asari, styracis liquide, myrrhæ, seminis alterci nigri, thuris, cuiusq; aquæ portiones, * mellis quantum ad simplicium medicinarum exceptionē sat est, huius quidem pondus inter duas drachmas & tres, ut plurimum propinabitur. Si tenesmus post decimū diem protractus fuerit, nec medicamina quicquam præsidij attulisse cernantur, & ægrum circa pectinem dolor aliquis exercet, ad subscriptum clysterem recurrendum est. Panacis, oryzæ, lētium, quibus tribus cortices detractæ sint, rosarum siccarum, balaustiorum, calicum gladium, cuiusque manipulus unus, omnia tribus libris aquæ potabilis ad dimidias incoquantur, & deinceps percolatur, insuper sumuntur cerussæ, cineris * chartæ Baby Ionice, aut si eius facultas non est, cineris alterius chartæ, utriusque drachma una: lapidis Armenij sedrachma, vitellus oui assus induratusq; unus, olei rosacei semuncia.

* Plurimū
4. mellis
partes ad
unā medica
minū accipi
mus.

* Opinor
ex Diosco.
papyro fie-
ri.

muncia, hæc omnia iam narrato decocto subacta, commixtaq̄, semel bisue clysteris forma ægrotanti infunduntur. Por- A putri
pituita.
rò si tenesmus in uetustatem inciderit, ac nullus sanguis, sed rasura alba & mucosa, mucori saniosi non absimilis, proflu-
xerit, pharmaco putredinibus sacro, uidelicet Capite quo gingiuarũ putrescentium curationem persecuti sumus descripto, rectissimè ad hunc modum uteris. Portionem aliquam eius medicamēti in pauloante descripto decocto subigito, et clysterem unum atque alterum in aluum ex eo dimittito. Quod si alui fluorem ex huius clysteris acrimonia, intestinorũ & sedis musculorum ardor ac erosio consequantur, enema ex rosaceo oleo tepente iniiciendum erit. Sin uero nullum notabilem præscripti clysteris infusio rosionẽ induxerit, tantisper dum affectus restituitur, in eius usu persistere consilium est.

Epithema quo uenter uehemēti & continuo profiuuio afflictus, ac uirũ robore Ad frigidũ
affectum
utile est.
languidus, illinendus est, Gallix moscha

tæ, acaciæ, cyperi, myrrhæ, gallarum, cur-
pressi, thuris, omniũ partes æquales, his
uino ueteri & subastringente, aut coto-
neorum succo aspersis, uenter crebro ir-
rorandus est. Huic quoque nonnunquã
panis bis coctus ex Syria commiscetur.

*ad calidũ
affectum
utile est.*

Cæterum si morbum ardor concomite-
tur; epithema quod duobus sandalis, ro-
sis à fibris liberis, lapide Armenio, nuce
Indica, galla, pane bis cocto, & succo ma-
lorum punicorum acidorũ, aut cotoneo-
rum, aut succo myrtino, cõstat, præsidio
erit. Si autem uehementi ac graui tenes-
mo eger tenetur, sæpequã ad secessum pro-
perat, nihil tamen nisi forte mucosum
quid egerit, glans ista subiicienda est, si qui-
dem mirifice tenesimum, sensoriæ faculta-
tis torporem inducens, sedit, Thuris, lycij,
croci, gummi Arabici, cuiusquã drachma
una: opij drachmæ duæ, informantur *
glandes, quæ ano induntur.

* Alexã. ad
nuclei pini
magnitudi-
nẽ, paulõue
maiores eas
fieri præci-
pit.

A partium
debilitate.

De urinæ difficultate. Cap. LXXIII.

QUod si urina modica excernitur,
aut in totum supprimitur, nullo ta-
men

men in inguinibus apparente tumore, nullaq; præfente grauitate aut dolore, qui aut renes, aut urinę meatus infestet, infrã scriptis medicaminibus, urinę ciendę uim possidentibus, malo subueniendum est. Cuius notę, hoc quod modo subiicitur est. Seminis apij, nitri naturalis, rubię fatiurę, olufatri, baccarum iuniperi, seminis asari, ammeos, seminis foeniculi, spicę, amygdalarum amararum, cuiusque drachmę uiginti, seminis melonũ drachmę decem: cantharidum, quarum * alę * *Fuchsius* & capita abiecta sunt, drachma una, amoniaci drachmę tres, ammoniacum uino diluĩt, ac eo reliquis exceptis, formatur formulę auellanę nucis instar: quarum portio inter drachmã unam & tres una propinatione ex cicerũ decocto offertur. Sanẽ hoc medicamẽ habitus mollicię, eiusdem laxitati, hypofarcę, eijciẽdisq; his quorũ occasione corpus exicare cogimur, accommodum censetur.

Si urinę difficultas à casu, aut foemorum, aut ani circumiacetium uel partium *Ab externa causa.*
plaga

plaga apprehēdit, ægrotāti sanguis axil-
 lari uena pertusa (partita interim sangui-
 nis missione) detrahet̃, & locus affectus
 egelida aqua subinde irrorabitur, & cali-
 dioribus doloremq; sedantibus oleis, ad
 mediꝝ diei spacium infricabitur. Aeger
 quoq; ad urinæ excretionem cohortan-
 dus est, quam optime spiritus retētionē,
 & musculorū octo abdominis compres-
 sione, perficiet. At si suppressio urinę
 uesica plena ac intensa, molestat, præfer-
 tim post sanguinis aut puris eruptionē,
 medicamina, quæ grumos sanguinis &
 puris in uesica cōcreti discutere colliqua-
 req; solent, propinanda sunt. Medica-
 men grumis sanguinis, & puris uesicæ
 amouendis, uehemēter generosum. Car-
 damomi, myrrhæ, rubiæ fatiua, qua ue-
 stes inficiuntur, baccarum iuniperi, am-
 moniaci, liquoris Cyrenaiici, singulorū
 æquæ portiones, ammoniacum foenicu-
 li succo, aut simili aliquo læuigatur, & eo
 alia excepta, in catapotia digeruntur: ex
 quibus drachma una quater in die, cum
 superius

*A corpore
 urine me-
 tum obtu-
 rante.*

curatō da

superius comprehensi seminum decocti uncijs tribus, propinatur. Syrupus quoque acetosus, ex aceto acerrimo preparatus, subinde porrigendus est. Ad hæc per syphonem aqua sale diluta, aut lixiuuum opportune iniicitur. Compositio autem lixiuij ad id efficacis, ad hunc modum præparatur. Cineris† ilicis, cineris sarmentorum, * cali calcis, cuiusq; debitæ portiones, his aqua quousq; tegantur, superadditur, triduoq; ita seponuntur, deinde illis per colum transmissis, lixiuuum reconditur, & eius modica portio per syphonem in uesicam demittitur. Cnici etiam folia, & blitum cum modico olei amygdalarum decocta, affecto loco recte superaccommodantur. In folio præterea infusus, cui chamæmelum, stichas Arabica, sampsuchus & sisymbrium incocta sint, ægro strenue auxiliantur. Poterit quoq; huiusmodi folium ex brassicarum summitatibus, & blito, & stercore columbino in aqua decoctis, adaptari. Sanè in his decoctis quoad per uires licebit, magno præsidio

*Arculanus
syrupū per
syphonē im
mitendum
existimat.*

† *Aliàs,
glandium.
* Serapio
usne Græco
rū esse ait.
Leonicius
uero tele-
phon.*

dio æger desidebit, atq; ex iam compre-
 hēsis herbis, cataplasmata ac fotsus ingui-
 nibus & circumiacentibus partibus, uti-
 liter inducet. Quando autem solio inse-
 dit, ea quæ urinas citant ac mouent, po-
 tui dare confert. Verum si hæc uniuersa
 inefficacia sunt, ad instrumentum urinis
 eliciendis aptum (syphonem, aut cathe-
 ram uocant) recurrendum est. Si uero
 urinæ difficultas post calculi indicia obo-
 riatur, ægrum supine procumbētem, pe-
 des ac genua uarijs motionibus in altum
 conquassare concutereq; decet. Cæterū
 si urina non profluxerit, operæ precium
 erit, & hic quoque ad depellendum cal-
 culum, colli uesicæ orificio incumbente,
 instrumēto (quo in uesicam demisso uri-
 na emollitur) auxiliū præstare. Perca-
 uendum tamen, ne uesicæ ceruix inflam-
 matione tentata, eius instrumenti dimis-
 sione iritetur. Ad suppressam urinam
 inter cætera mirifice conducūt, frequen-
 tes in labro calidiorē infessus, & ex oleis
 calidioribus emolliētibusq; crebræ inun-
 ctiones.

*Lapide in
 uesicæ ad-
 buc ceruicæ
 hærente.*

*Totius capi-
 tis epilo-
 gus.*

ctiones. Item medicamēta urinas mouen-
tia epota præsidium præstant. Maxima
igitur diligentia ab acidorum, austero-
rum, acerborum, crassorumq; esu, ægro-
tantem circumcidere conducit.

De renum & uesicæ calculo. Cap. LXXIII.

Lapidem uesicæ declarant, continui
pudendorum ægri pruritus, & cre-
bra manuum cōtrectiones, & frequēs
ipsorum tentigo, subitaq; ipsorum laxa-
tio, & urinæ cum difficultate ac dolore
excretio: in quo affectu longaum quoq;
à uesicæ calculo compressum, interdum
procidere solet. At calculum renibus in-
natum, testantur laborantis cum urinæ
difficultate, uehemens renum & meatu-
um, per quos urinæ renibus in uesicam
distillat, & circumiacentium partium, &
inguinum dolor, & alius initio astricta,
& ciborum nausea. Calculo quidē in
uesica concreto, hæc infra scripta com-
positio utilis est, quoniam ad cōminuen-
dum lapidem etiam uetustiore, mirifi-
ce efficax est. Et ego quoq; eius usu, ma-
gnam

*A crasso ter-
reoq; humo-
re, ignea ca-
litate in-
crassato.*

gnum lapidem minori quadraginta dierum spacio, confregi. Habet autem ea se in hunc modum, Fructus balsami, seminis raphani, dauci, seminis olusatricis, corticum radicum opoponacis, corticum radicum capparis, amygdalarum amara-

*Alij dāno
cochie saxi
fragiā uer-
tunt.

rum, *baccarum lauri, florum iunci rotundi, cyperi, spicæ Indicæ, casia lignæ, scolopendrii, seminis rutæ syluestris, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, asari, cardamomi, ammoniaci, sagapeni, bdellii, piperis, acori, omnium æquæ portiones, gummi in balsami oleo sufficienti, dissoluti, subagitantur: deinde reliquæ ex his conficiantur, finganturq; globuli, quorum singulis diebus drachma seminum incidentium decocto soluta propinetur.

Scorpionū
cineres.

Nonnunquam & obulus cinerum scorpionū unā cum eis porrigitur. Scorpionū porro cineres in hunc modum apparari solent. Accipiuntur scorpiones, qui in ollam fictilem repositi, & olla diligentissime obturata, super tegulam in furnum non usque adeo calidum dimittuntur,

ibiq;

ibiq; ad sex horarum spacium sinuntur, & insuper exempti, ac in tenuissimum cinerem triti, usui futuro in vitreo vase reponuntur. At æger decocto cicerum, & cibis aromatibus seminibusq; calidioribus præparatis, alendus est. A lactis vero, & casei, aliorumq; crassorum & glutinosorum ciborum esu reuocandus, quoniam eorum succus facile in calculū a caliditate induratur. Præterea descendat æger in solium, cui brassicarum folia, samfuchus, * blitum, abrotanum, mentastrum, columbinum stercuris, & medulla seminis cnici incocta sunt. Quinetiā inguina scorpionum oleo inungēda sunt, atque eius momentum in uesicam per syphonem infundendum. Oleum scorpionum, Aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, corticis radicum capparidis, cuiusq; uncia una. Hæc in libra olei amygdalarum amararum soli exposita, marcescere septimana una sinuntur, deinde expressa percolantur, in cuius percolati libra iniiciuntur scorpiones decē, & iam

*Virib. no
stre spina-
chie respō-
det.

Mesuas du-
plex descri-
bit, secundū
hinc sum-
ptum est.

M omnia

omnia rursus in uasculū adamūssim oc-
 clusum, ad solē duabus hebdomadis ex-
 ponuntur, dein per cōlum transmissa fu-
 turo usui reconduntur. Quum itaq; hoc
 genus olei quā optimum ac laudatissi-
 mum ad propositum affectum existima-
 tur, eius portio per guttulas in ægri pe-
 nem, postquam è folio descēderit, rectissi-
 mē inditur. Cæterum si lapis in uesica im-
 pendio increuerit, illi nullum, nisi à ma-
 nuali incisione, qua euelli queat, remedi-
 um præstari potest. Verum huius sectio-
 nem perscribere, nostri propositi libri li-
 mites haudquaquam admittunt. Cum
 autem renibus calculus innatus est, eger
 in solium emolliendī uī præditū, frequen-
 ter se demittet, & renes, et lumbos, nuper
 enarratis oleis inunget. Ac lintea quoq;
 calefaciendī uim obtinentib. liquoribus
 immersa, dolētī loco admouebit. ex quo-
 rum classe ea, quæ hactenus enumerau-
 mus medicamina sunt. Potui autem, cal-
 culos confringētia diffecantiaq; non ta-
 men manifesto calefacientia, præbeto.

Verum

*Apud Paul.
 lib. 6. c. 60.
 & Cel. lib.
 7. cap. 26.*

Verum si euenerit calculum ex renibus per meatus urinarios, quos Græci *ὀφθαλμίας* uocant, in uesicam decumbere, eaq̃ occasione uesicæ ceruicem obturare: aut si idem à uesicæ calculo fiat, aqua calida paulatim ab alto, pudendorum partibus, donec rubore suffunduntur, instillanda est, post hanc, oleum tepidum guttatim superfundatur, partesq̃ illæ infricentur.

Porro extrema urgente necessitate, ad exteriora succio remedio erit, siquidē ea calculū dimouebit, & cum urina fortasse extra penem simul alliciet. Quoniam si angulosus magnusue extiterit, inferiore uesicæ ceruicis partem, qua scilicet eius corpus spectat, incidere necessitas iubet, ut hinc lapis manuali arte euelli queat.

De renum & uesicæ inflammatione. Ca. LXXV.

Phlegmonem renum, cōcomitatur *Renum.* febris inordinata, nec usque adeo ardens, sed quæ cum horrore, & rigore egrotantem apprehēdit, & frequens mictus, & inferiorum dorsalium partium dolor grauis, unde si quando æger dimouetur,

in his partibus pondus tanquam ab illis
suspensum, propendere sentit. Cum itaq;
hæ notæ conspiciuntur, si modo nihil

*In princi-
pio quoque
Gal. axilla-
rem secat,
aliàs autem
in poplite.
ex Basilica.*

aliud prohibet, citra cunctationē in prin-
cipio, axillari uena è directo partis dolen-
tis grauitateq; implicitæ secta, sanguinē
ægro minuemus. Regioni quoq; dolenti
forinsecus cataplasmata, & fots, q me-
diocrem refrigerandi uim obtinent, ac-
commodabuntur. Quorum usu si affe-
ctus propellitur, bonū putabitur, quo-
niam nulla suppuratio expectanda erit.
Cæterum si neq; dolor, neq; febris, neq;
grauitas horum applicatione conquieue-
rint, urinæq; frequēs stillicidium ægrum
laboriose molestauerit, pus hac in parte
colligi indicium est. Tunc itaq; cataplas-
ma dorso induces, quod chamæmelo, se-
mine lini & furfuribus, oleo sesami simul
exceptis, constat. Iam etiam in solio ex
emollientib, herbis parato, in seffus sum-
mè profunt. Porrò si æger pus minxerit,
semina subsequente Capite ad urinæ ar-
dorem recensenda, donec imminuatur
decrescatq;

decreſcatꝫ pus, ægrotanti offeres. Dein
de paſtillos in capite ſanguinis & puris
miſtui proprio deſcribēdos, exhibebis.

Inflammationi autem veſicæ comites *veſicæ.*
ſunt, febris * continua ardens, & urinæ * Inter-
reddendæ impotentia, & eiufdem ſtillici *pres con-*
dium: & ceruicis veſicæ, & fœmorū imi- *cluſa.*
ꝫ uētris dolor. Quare uenam axillarem *ſcirticā*
hoc affectu implicito, incidere præſidio
eſt, & alia quæ renum inflammationi ac-
commoda retulimus, adhibere, confert.

Cæterum non omnis renum inflāma- *Scirrhi re-*
tio in uomicam tranſit, ſeu diſcutitur, ſed *num cura-*
aliqua in duriciē etiam occalleſcit, cuius *tio.*
grauitas in renibus tanquam ab illis ſu-
ſpenſa, abſente feбри, moleſtiam ægro in-
fert. Huic igitur clyſteres infuli ex ſæno
græci, & feminis lini cremoribus, atꝫ ex
chamæmeli, braſſicarum, meliloti, mal-
uæ ſylueſtris & furfurum decocto, uehe-
menter conducunt. Nec minus iritatus
uomitus, ob materiæ diuerſionem, adiu-
uat. Cataplaſmata quoꝫ ex iam compre-
henſis emollientibus medicamentis præ-

parata, regioni renum accommodata, non parum auxiliantur. Iam si urina modica egeritur, prædictis, ea quæ urinæ ciendæ sunt, accommode adijciuntur, Sanè huic quidem affectui non mediocrè curam diligentiamq; adhibere conuenit, quoniam huiuscemodi renum duricies (quam Græci σκίρροϋ appellât) aquæ inter cutem interdū autor, non aliter quàm iocinoris aut lienis duricies esse confueuit.

De urinae ardore. Cap. LXXVI.

Ob urinae à calidis succis acrimoniam.

QVando agro inter mingendum ardor, punctilesq; cruciatus in uesicæ ceruice oboriuntur, à salis, acidis & acris circumscindendus est. Et cibus humectantibus ac aluum emolliētibus herbis præparatis, & iusculis, hisq; in leniendo uentre paribus, alendus. Quinetiam ad reprimendum humorum acrimoniam, subsequens medicamen porrigendū est. Seminis melonum excorticati drachmæ triginta, seminis cucumeris citrinati, seminis cucurbitæ domesticæ, seminis portulacæ,

tulacæ, seminis papaueris albi, singulorum drachmæ tres, seminis alterci albi drachmæ duæ, sacchari albissimi quantum simul omnia pendet, huius pulueris quotidie drachmæ tres mane, & tantundem rursus sub uesperâ dormituro ægro cum uncia syrupi uiolacei, aut iozulapou, & dulcis radicis decocto, offeruntur. Ad hanc quoque noxam quam diligentissime attentum Medicum esse oportet, siquidẽ urinae acrimonia, dum perseverat, uelice & urine meatum exulcerationem creare solet.

Ad sanguinem & pus mingentes.

Cap. LXXVII.

SI à casu, aut plaga alicui sanguis per *Ob uenæ rupturam.*
 Spem erumpat, uena axillaris (partita interim sanguinis detractione) recte secatur, & pastilli ex succino potui accommodè porriguntur. Pastilli de succino. Succini, gummi Arabici, utriusq; drachmæ quinq; balauftiorum drachmæ duæ cum semisse, hypocistidos tantundẽ, thuris drachmæ duæ; seminis apij, opij, utri-

usq; drachma una, rediguntur in pastillos
 sesquidrachmæ pondere, quorum unus
 quotidie rhois decocto dilutus, utiliter of-
 fertur. Inter cibos quidem, conueniunt
 glutinosæ & uiscosæ carnes cum rhu ob-
 soniorum, aut omphacino elixæ. A falsis
 autem & acris opportune æger arce-
 tur. Verum ic̄to loco cataplasma ex lapi-
 de Armenio, acacia, aloë & lycio, posca
 exceptis, superaccōmodabitur. Si san-
 guinis mictu post acrium esum, aut uini
 acrioris, calidiorisq; usum, eger angitur,
 uena axillaris ad sanguinis retractionem
 incidenda est, atq; pastilli ex succino ex-
 hibēdi. Vniuersa quoq; uictus ratio pla-
 nē eadem cum præcedentium erit. Cæ-
 terum si ex ulcere erosionē cōcitato, pus
 minxerit, pastillos hos præbeto. Constāt
 autem, seminis melonum, seminis cucu-
 meris citrinati, cucurbitæ domesticæ, sin-
 gulorum corticibus liberatorum drach-
 mis uiginti, lapidis Armenij, gūmi Ara-
 bici, thuris pinguioris, cinnabaris, singu-
 lorum drachmis decem, opij drachmis
 tribus,

Ex uenarū
 erosionē.

tribus, seminis apij drachmis duabus, finguntur ex his pastilli drachmarum duarum pondere, quorum unus uncia syrupi albi papaveris detritus, singulis diebus potui offertur. Quinetiam ceruici uesicæ, infra scripti collyrii portio, per syphonem utiliter inditur. Collyrium de cerussa.

Cerussæ, sarcocollæ, thuris, gummi Arabici, opij, cinnabaris, singulorum æque portiones: hæc succo portulacæ aspersa, in collyria rediguntur. Deinde per syphonem mulsa ægro in uesicam infunditur, ac ad urinæ excretionem ægrotas ab astantibus utiliter incitatur, insuper postquam urinam eminxerit, huius collyrii portio asinino lacte soluta, per syphonem uesicæ infunditur.

De his qui inuiti urinam reddunt.

Cap. LXXVIII.

SI æger magnam urinæ portionem semingit, nullam tamem inter mingendum acrimoniam ardoremue percipiat: aut si quis noctu se commingit, uerum neque siti, neque aliqua corporis macie, colli-

M 5 qua

quatione uero inde tenetur, ea quę urine re-
 stringendę sunt, utiliter utrisque offerun-
 tur. Quale quod iam subsequitur medi-
 camen est. Glandium drachma una, thu-
 ris drachmę triginta, seminis coriandri
 exiccati, gummi Arabici, lapidis Arme-
 nię, singulorum drachmę decem, omnia
 in puluerę subiguntur, cuius mane drach-
 mę tres, & totidem sub noctem, cum mo-
 mento decoctionis inulę campanę, ut
 medicamen ad uesicam usque deueniat,
 propinantur. § Quoniam uero hic affe-
 ctus, renum retentricis imbecillitatem,
 aut urinę meatum ambientem musculũ
 relaxatum, aut aliam quampiam frigidã
 uel humidam occasionẽ sui autorem ha-
 bere solet, non immerito his dum pulue-
 rem offers, ipsis dicatis remedijs prospici-
 cere debes. § Quod si æger in hoc affe-
 ctu, siti inexplebili, quę nimio cruciatu
 clamorem ægrotanti excitet, cõficiatur,
 et potio protinus qualis assumpta est, per
 urinas transmittitur, hordeı decoctum
 cum herbę pulicaris seminis cremore,
 porrigendum

porrigendum est, & æger immaturarum
 uuarum succo, & cibus illo & rhoi obso-
 niorum præparatis, & alijs his persimili-
 bus eduljjs, enutriendus est, Lac quoque
 acidum, ex quo butyrum coactum sit, &
 quæ ex hordeo cortice libero parat̃ puls,
 magno auxilio offeruntur. Potui autem,
 decoctiõe ignis aut solis inspissati succi,
 qui acida qualitate pollent, propinabun-
 tur, & ab omni exercitio, & mulierũ con-
 cubitu æger arcebitur. Præclarè uero
 faciunt hi pastilli, potui oblati. Spodij
 drachmæ decem, seminis lactucæ, semini-
 nis portulacæ, utriusque drachmæ quin-
 decim, coriandri exiccati drachma una,
 rosarum rubrarum, lapidis Armenij, sin-
 gulorũ drachmæ quinq; balaustij drach-
 mæ duæ, camphorę sedrachma, teruntur
 in puluerem, & plantaginis succo exce-
 pta, digeruntur in pastillos: quorũ drach-
 ma malorum punicorum acidorum suc-
 co subacta, porrigitur. Herbae etiam in-
 frigidates, cuius generis sunt portulaca,
 plantago, & solanum, commodè renum
 regioni

*Aëtius lac
 scissum ha-
 bet.*

*Arab. Rob
 uocant.*

regioni superligantur. Ab omni quidem calidorum ciborū esu, & uino, ac his quę urinas citant, imprimis abstinere cōfert.

Inter ea quę stolidorū imperitorumq; medicorum inscitia, in hoc affectu delin- qui solēt, totius corporis tabes, colliqua- tioūe, primas obtinet: in quā agrum pro- pinatione calidorum medicaminū & uri- nas promouentiū, euestigio inducunt.

De lumbricis in ano ac uentre natis. C.LXXIX.

*Prolixius
agit Aëtius
Sermo. 9.
cap. 39.*

Qui hoc malo torqueri solet, à cras- sis & glutinosi ac pinguibus cibis, nimiaq; alimenti infarcione abstineat o- portet, & indies panis offulas, sinapi mu- riaq; immerfas, ante cibos magna utilita- te assumet, siquidem ea ratione, lumbri- cos procreari prohibebit. § quoniā ori- go omnium trium generū uermium, ui- delicet lumbricorū, teredum, et ascaridū, ex cruda, crassa, pituitosaq; materia pu- tredini accommoda, existit § . Si tamen nihilominus post horū incidentiū usum intestinis innascantur, nullū ab expulsio- ne remediū est, Medicamen porrò tere- tes,

tes, & longos rotundosq; lumbricos expellens, preparatur ex femine *burungij excorticato, hoc est, erisymi, aut ut alijs placet, melissophyli, aut erucæ syluestris, quando scilicet ægro fame uexato, eius feminis drachmæ septem in lacte leuigata, porriguntur. Medicamentum aliud generosum, agens lumbricos, Burungij feminis excorticatis, feminis nigelle, turbit, cuiusque pares modi: lupinorum, nasturcij, arenulæ rubræ ex Mecha aduectæ (quam Arabes *kanabel appellant) singulorum pars dimidia, omnia in puluerem subiguntur. Exposcente autem usu, æger per triduum lac recenter mulctum & calidum bibet: & deinde tertio die uictu tenuissimo enutritus, commemorati pulueris drachmas septem lacti adhuc ex uberibus calenti, & aceto iniectas, assumet, idq; eo potissimum tempore, quo fames ipsum cruciat. Ascarides uero uermes minuti, in extremo longaone & ani fibula nati, sunt, quamobrem ibidem pruritus (cuius gratia anus subinde infricatur) excitant.

* Alij abrotanum interpretantur.

I. cabill.
 *Ita Venetis sua semetina Arabice uocat, tamē nec Au. nec Sera. est. Vnde de Antonium Musā 279. simplici.

tant. Depelluntur uero huiuscemodi uermes, lana molli oleo in quo porrum ebullierit imbuta, ac in ani fibulam cum specillo detrusa, potest autem lana tenera citri mali oleo, aut mentastri liquore, aut momento aloës, uaccino felle soluto, intincta, in anum etiam ad eundem usum subijci.

De hæmorrhoidibus, ^{scissuris,} & fistulis ani.

Cap. LXXX.

Hæmorrhoides.

DVm sanguis purus citra dolorē ab ano per certa interualla emanat, minime supprimendus est, nisi forte sua profluuij copia laborantis uires deicerit, siquidem huiuscemodi sanguinis proruptio, multis affectibus hoc uitio detentum, immunem reddit. Cæterū si eo sanguine ab oris uenarum, tanq̃ ex capitulis quibusdā surgentibus profluente, ægri robur deijcitur, suppressio ex usu erit. Proinde pastilli de succino, rhois decocto soluti, cōmode offeruntur. Cibis autē rhus obsoniorū in condimentū accipientibus, & succo immaturarū uuarum preparatis,

paratis, hisq̄ per similibus, quibus alendi facultas est, rectissime enutrietur. Porro si vires plurimum prosternantur, expresso carniū, cui plerunq̄ cotoneorū succus, & uinū subastringens admixta sint, alēdus est. Vinū quoq̄ austerū propinā- dum. Præterea iocinori emplastrū de spica, Capite de iecoris dolorib. inscriptū, utiliter superaccommodabitur. At si hæc inefficacia fuerint, confectio ex ferri stercore apparatus, porriget̄. Ea accipit, myrobalanorū Indicarum, belliricarū, emblicarum, singulorū drachmā semissem: spicæ, iunci odorati floris, cyperi, zingiberis, piperis, ammeos, thuris, cuiusque drachmas duas: stercoris ferri in aceto septimana una macerati, ac deinde combusti drachmæ quindecim, excipiūtur omnia despumato melle simul cum myrobalanorum emblicarum iure decocto, ueluti Capite de melancholia comprehensum est. Huius iuglandis instar quotidie exhibebitur, ea namq̄ cōfectio, ē uenulis ani, & ex ijs per quas menses mulierib. repur-

pag. 139.

gantur.

*Græci cōdy-
lomata uo-
care solent.*

gantur, manantem sanguinem sistit. Preter hæc quoq; diuturno uentris proflu-
uio, nō mediocri ea præsidio est. Quod
si excrescentia aliqua eminēs, & magnos
excitans cruciatus in ano oboritur, ue-
rum à qua nihil refudat: cepæ succū, aut
fel uaccinum modica lana illitum, excre-
scentiæ applicato, Glandē quoq; oblon-
gam ex malo terræ paratā, in anum ægri
tota nocte retinendā indito, & si forte for-
tuna glans ex ani fibula propellitur, rur-
sus donec excrescētia eius acrimonia in-
cidatur, atq; adaperiatur, sanguisq; pro-
fluat, eam subiicito. Cæterum si quādo
cum uehementi dolore, inflāmatio quo-
que ingens anum infestet, uena ægro se-
canda est, atq; emplastrum infrā scriptū
superligandum, quoniam hoc probe hæ-
morrhoidum dolorem subleuat, potissi-
mum si adiunctam habeāt inflammatio-
nem. Accipito itaq; ad eius emplastrī cō-
positionem, iuris decoctionis meliloti, &
chamæmeli tantisper dum tabuerint in
aqua elixatorum, tantum quantum uola

una

una continere potes, & deinde oui assilur
 teum unum, croci drachmā unam, opij
 drachmas duas, seminis lini contriti, fœ
 nograci, maluæ syluestris, singulorū ma
 nipulū : excipito omnia sapa, hoc est de
 cocto uino, in quo bdellij drachmæ tres
 dilutæ sunt. Iam postq̃ excrescentiæ su
 perficiē oleo sesami, in quo gallinaceus
 adeps, aut anatis solutus fuerit, in unxe
 ris, prædicta emplastri modo adhuc ege
 lida dolenti loco admoueto, extrinsecus
 betæ, aut lactuæ folijs tuendi gratia im
 positis. Aliud remediū, dolorem inflam
 mationemq̃ remittens. Cepam albam
 quā optime coctam, unā cum butyro
 uaccino tantisper dum emolliatur, conte
 rito, & ita ambo modicè calentia ano in
 flammatione tentato submittito. id nāq̃
 mirifice dolorē reprimit. Quod si lan
 guētis anus scissuris, (quas Græci *παράδες*
 appellāt) infestatur, quæ exiccata aluo ob
 fæcum duriciē cruciatus, dum æger ege
 rit, inferūt, catapotia ex bdellio subinde
 propinata, strenue auxiliant. Quæ con
 stant, myrobalanorū nigrarum, chebula

*Scissura
 sive Pa
 gada.*

N rum,

rum, utriusq; drachmis decem, sagapeni drachmis tribus, nasturtij albi drachmis duabus, bdellij mollioris & pinguioris drachmis quindecim, oia porri succo, in quo bdelliū subactū sit, excepta in catapotia rediguntur, quorū dosis identidē assumpta inter drachmā unā & † quatuor est. Si autē affectā partē ardor affligit, unguento de cerussa eam circumungito. Absente quidē aestu, unguine ex cameli gibbi adipe, et bdellio preparato, affectā partem illinito, quod Arabes unguentū de Sene uocāt. Huius autē cōpositio in hunc modū se habet. Cerę luteæ, olei sesami, adipis anatis, medullæ cruris uaccini, adipis ex cameli gibbo collecti, bdellij, cuiusq; paria pondera bdelliū seminis lini cremore soluit, & alia eo excepta, in linimentum rediguntur, cui nullū uiribus par est. Quod si ægrum profundiores scissuræ, a quib. foetidū pus resudat, implicēt, medicamen acre Capite de ulcerib. descriptū, ijs admoueto, et ut biduum admotū eger sustineat, sollicitato. At si reliquię aliquæ per sudores erūpentes remāserint, rursus

† Alibi, tres

7. ad Al-
man. cōstat
ex eruginis
et mellis æ-
quis portio
nibus.

tantis per

tantisper dū locus exiccetur, et nihil pro-
manet, nuper dictū medicamen superac-
cōmodo. Si autē ea, quæ hac in parte
innascuntur, in tantū prominēt propen-
dentēq; ut arida ac liuida fiant, butyrū te-
pidū donec liuor amoueat, subinde ijs in-
ungito. Verū si denuo huiuscemodi de-
fluens sudor, egrum in posterū molestat,
* medicamē acre, et ad saniosa ulcera op-
timè faciēs, iam secūdo applicato. Sin autē
nihil resudat, unguento de * cerussa opti-
me huiuscemodi excrescētij subuenies.

Est & quādo uenulę sanguine manan-
tes, & foris propendētes, ignito ferramē-
to curant, sed eius rei tractationē, propo-
situs liber minime admittit. Cæterū iter
reliquas corporis partes facillime anus si-
stulis tentat, quum arctis & oblōgis fini-
bus ex sua figura subiectus sit. Fistulæ au-
tem hęc nonnunq; penitus penetrāt, non-
nunq; cæcę sunt. Proinde si utrinq; pertu-
sæ fuerint, flatus & sicciora recrementa
per eas protrudunt. Si autē una tantū par-
te foratæ sunt, neq; stercus, neq; flatus in-
de prorumpūt. Harū autē præsidia cōple

*Hæc omnia
ferè septi-
mo libro ad
Al. descri-
buntur.*

*Paul. lib. 7.
cap. 79.*

Fistule.

*Pulchre a-
pud Paul.
li. 6. Ca. 66.*

tè percēdere, plus est, quàm suscepto hoc libro limitari posset. Verū quia mortales pene omnes in harū curationibus, q̄ s̄a-
 pissime in maximos errores labunt̄, quo nō exiguæ noxæ subsequi solēt, perstrin-
 gemus illa, quæ huic affectui cōgrua prę-
 sidia putamus, quac̄q̄ ratione ab huiusce-
 modi vitij sibi præcauere poterunt, exe-
 quemur. Existimamus itaq̄ fistulā utrin-
 q̄ pertusam, & in ano penitus delitescē-
 tem, nulla ratione esse ferro cōtingendā,
 siquidē in his ferri incisio, stercoris præter
 uoluntatē egestionē cōcitāt, licet et aliud
 quoq̄ sit, phibens fistulā perfossam ferra-
 mēto tentari: nimirū quū quoad uixerit
 æger, hoc in statu à ferro nō læsus, perma-
 nere possit, nullā inde scilicet insignē no-
 xam, præter saniei refudationē perceptu-
 rus. Verū si id quod è fistula profundit̄,
 acre & mordax odoreq̄ foedū existit, cu-
 iusq̄ copia indies increfcit, fistula putri-
 da quę herpetē exedentē sibi comitem ha-
 bet, egrū infestat. Cui medicamine acri,
 erodētēq̄, & deinde deperditā carnē resti-
 tuētē, priusq̄ malū dilatescat augeaturq̄,
 subuenire

*Opinor id
 esse, quod
 melle & æ-
 rugine con-
 stat, &c.*

subuenire debes, antea tamē leuiore quo-
 piam tentato. Porrò si id qd' refudat, exi-
 guū, nec mordax, nec odore foedū fuerit,
 sicq; malū non serpsierit, nulla inde præter
 refudationē & fluxū habēda suspicio est.
 Poterimus tamē huic, ut exiccet, et subli-
 deat, & nisi per lōga interualla quicq; re-
 sudet, subuenire: atq; rursus ubi sanies e-
 manat, præscriptū medicamen ad fistu-
 las, huic quoq; fistulæ accōmodare, eaq; *Eas curatio-
 nes pallea-
 tas practici
 uocant.*
 rationē totā egri uita, blādīre illi nitēmur,
 nullā inde notabilē noxam egrotāte per-
 cepturo. Rationē autē administrādī me-
 dicaminis hāc censeto. Ante omnia fistu-
 lam, donec quicquid in ea conseruatū sit
 pfluxerit, cōprimito, deinde collyriū Ca-
 pite de oculi fistula descripti, portionē ali-
 quā succo plantaginis, aut pluuiāli aqua
 læuigato. Iam si fistula specillū recipere
 possit, specillū molli lana inuolutū, hocq;
 liquore imbutū, fistulæ imponito. Si autē
 ob angustīā, aut loci distantīā, fistula spe-
 cillū recipere nequeat, resupinato ægro,
 alteroq; foemore puluīnari incūbēte, col-
 liriū succo plātiginis, aut illi simili solu-
 tum,

tum, guttatim ꝑ interualla fistulæ immanare linito. Hoc qđē tribus infecutis diebus mane, et sub uesperā, opportune perages. Pręterea in aq̄ æneo uase calefacta infessus, & ex eadē lotiones, ex usu erūt.

Ad procidentia ani & uulue. Cap. LXXXI.

Ani. **S**I anus inflammatione liber ꝑcidit, itaq̄ se habet, ut impulsus in pristinū locū protrudi ac retineri queat, sumito cerusæ, balaustrij, gallarū, aluminis, stibij, singulorū pares modos, & ea in tenuissimū pollinē deterito, procidentiq̄ ano inspargito, ipso prius oleo rosaceo calēte circūlito, aut uino austero deterfo. Deinde suo loco repositū anum, deligato. Id tamen ꝑprijssime, postq̄ æger excreuit, tētābis, ne statim ad egerēdū necessitas ipsum urgeat. Sumunt quoq̄ ad pręsens uitiū, gal læ, balaustria, glandularū calices, myrti folia, quæ simul aque donec ea rubescat incoquuntur, & deinde ex huiuscemodí decocto infessus & lotiones parant. Cæterum si anus ob inflammationē tumidus, imponi nequeat, æger in aquā calidā cōscendet, & ei ad tēpus immorabitur, atq̄
anum

anum cera, cui chamemelinū oleum, aut anethinū temperatū sit, illinere, quo usq; reponi queat, consiliū est. Postq; uero recōdi potest, suprā præscriptis astringendi uim possidentibus pulueribus, & fasciis illi rei adaptatis, utendū erit. Vt rus uero si declinauerit, eadē ratione illi subuenire decet. At in hoc uitio uinculis fortioribus uti, & ægram supinam & eleuatis foeminibus, ijsq; sibi mutuo innitentibus, decumbere necessarium est.

Ad menses cōfertim erūpentes sistēdos. C. LXXXII.

In moderate profluentibus, mēsis retinendis, pastilli ex succino, astringente quo piā liquore laeuigati, atq; septimana una ita ppinati, optime faciunt. Quibus si nō cōquieuerint, cōfectio quæ ferri ster cus accipit, exhibebitur, & uena cubitū perreptās, opportune (partita interim sāguinis missione) incidetur. Cucurbitulæ quoq; sub māmillis infigēde sunt, et cibus austeris ac refrigerātibus utendū. Sūmē etiā facit medicamen hoc, in egræ sinum instar pelli immissum. Thuris, balaustij, gallæ, stibij, acaciæ, aluminis, singulorū

Vulue.

*Græci ad id
pessis astringentibus
utuntur.*

*Ob tenuem
& mordacem humorem.*

æquæ portiones, his in tenuissimū pollinem redactis, lana quæ ad pectus fat est, eo puluere circumlinitur, ac ita in mulieris pudendū inditur. Epithemata quoq; Capite de uentris profluuiō cōprehensa, in guinibus & lumbis inducere, & in aquā æneo uase calefactā conscendere, opportunū est. Porro si hæc nō profuerint, acutior pessus, ut q̄ crustas sua uī inducit, in uterī collū diutius retinēdus, subiicitur.

Ad suppressos menses citandos. Cap. LXXXIII.

CVM mēstruæ purgationis strāgula tui magna subsequitur noxa, pastillos ex myrrha porrigito. Recipiūt autē, Myrrhæ drachmas tres, seminis lupini adamussim cōtriti drachmas quinq; foliorum rute, mētastrī, pulegij, cumīni, rubię fatiuæ qua uestes inficiunt, liquoris Syrenaicī, sagapeni, opoponacis singulorum drachmas duas, his baccarū iuniperi iure subactis, informantur pastilli duarū drachmarū pōdere, & unus iure decoctiōis baccarū iuniperi detritus, in die exhibet. Sanè hoc medicamen adeo in ducendis mensib, pollet, ut etiā foetus educat, et in-

Pag. 169, et 170. describuntur duo, et ad calidum scilicet affectū, et ad frigidū.

A cōstipatis frigore matribus, aut crasso sanguine.

ter primos dies conceptionē facile impe-
diat, si quæ eo identidē utatur. Ad hæc cu-
curbitulas popliti agglutinare, ac uenam
interiorem malleolum perreptātem, aut
poplitis incidere cōfert. Postremo foemi-
nibus cucurbitulas cum cutis incisione
defigere, non infimū auxilium præstat.

Ad uulvæ scissuras. Cap. LXXXIII.

His curādīs, medicamē ani rimis, seu
fissis sacrū, ex usu erit. Præparatur
quoq; ad idē pessus ex anatis adipe, cesy-
po, hoc est lanæ succidæ sordibus, cruris
ceruini medulla, hæc cera, oleo lilij aut
narcissi subacta, excipiunt, atq; ex ijs for-
matus pessus in egræ sinū dimittit, dūmo-
do neq; febris, neq; ardor ægrā molestat.
Quoniā si rimis æstus cū erosiōne adfue-
rit, oleum rosaceū illitū optime facit: nec
minus quoq; ex cerussæ unguēto pessus
subditus iuuat. At si uehemētior calor æ-
grā affligit, sumito portulacę, aut lactuce
succū, aut herbæ * pulicaris feminis cre-
morē, fingito q; laminā plumbeā leuitati
marmoris cui colores interunt similit, &
illī in circuitu labrū inflectito, ac deinde

* De hac ut
alij Arabes,
Rhazes nō
perperans
sentit.

dictorū succorū aliquē laminæ infūdito, et correspōdēte leuitati pistillo plūbeo, laminā donec succus debitā spissitudinē recipiat, plumbicq; nō exigua portio ipsi admisceatur, terito. Iam * illi succo rosaceū oleum admisceto, ac informato pello, in ægræ sinum ipsū subijcito. Hoc enim remedium uterī cancro exulcerato, eiq; consimilibus uitijs auxiliō est.

De uulvæ inflammatione. Cap. LXXXV.

INflammationē si febris ardorq; cōcomitef, sanguis ex† axillari minuendus est, & ægra ptifana enutrienda. Renibus quoq; & lūbīs, & fœmoribus, et sumini, epithemata calidiorib. tumoribus dicata superaccōmodabimus, & locū alijs refrigerātibus (à forti ligatura abstinentes) uehemēter infrigidabimus. Verū si febris et æstus cōquieuerint, ac aliquæ inflāmationis calidæ reliquiæ in duriciē occallescentes supermāserint, liquidis & emollientibus unctiōib. ac iniectiōibus per inferiora utēdū erit, & mulier in decocta suppurādī emolliēdicq; uī pollētia desidebit.

Pessus induratas uterī inflammationes emolliens,

* Aëtius no-
αὐβλου χρυ-
λόφ vocat.

cancro me
detur.

* Aliās hu-
merali,
cephali-
ca
Basiliica.

* Apud Gal.
2. de arte cu-
ratiua, re-
percutiens
emplastrū.

emolliēs, ac eius cruciatib, leniēdis, pede
tētīmꝑ; sedādīs quā aptissimus: Adipis
anatis, medullæ cruris ceruini uel uacci-
ni, bdellij molliusculi, croci, lutei oui assī,
fæcis olei feminis lini, fēcīs olei lilij, singu-
lorum pares modi, omnia simul in sapa,
aut alio quouis dulci uino subigūtur, sin-
giturꝑ; pessus dolorib, mitigādīs, et uul-
uæ duricieī emolliēdis maxime oportu-
nus. Cōducūt præter hæc infessus ī deco-
cto fœnogræci, feminis lini, chamemeli,
meliloti et brassicarū sūmitatū: q̄ singula
p̄ se, aut simul oīa dulci aque incoquunt̄.

De exulceratione, abscessu & cancro uteri.

Cap. LXXXVI.

VTeri exulcerationē testat̄ pus, aut
sanies à uulua p̄fluēs. si itaq; prom-
pta in cōspectum uenerit exulceratio, &
pus aut sanies à primis partibus p̄fluxe-
rit, nullaq; cauitas fœda putridaūe ægrā
molestauerit, accipito aloē, thus, myrrhā,
cinnabarim, sarcocollā, & ea in pollinē
detrita, laborātī partī inspargito, tātis per-
dū solutionē unitatis puluere illo restitua-
tam uideas. Aut eū puluerē liquore aliq̄
perfusum,

perfulum, in unguēti formā redigito, ac ita utere. Sin autē altē pus profluit, pēssio ad sāguinis & puris eruptiōes inscripto, & succo plātaginis soluto, in uterū clysterem infūdito. At si qđ effluit, foedū malignoq; odore fuerit, pessum secundū priorē acriorē, dictoq; modo læuigatū, in uulvam indito: prius tamen utero mulsā pereneū oriculariū clysterē immissa, abluto. Porro si præter materiæ fluxū, cruciatus pūctiles & tumor durus, qđ tactu deprehēdi possit, adsint, magno studio ne locus acriorib. iriteſ, præcauendū est. Proinde succo plūbi, quē attritu supra apparauimus, aut ceruissā unguēto opportune utemur, uenāq; cubitū preptantē utiliter incidemus. Est præterea ægra ab his q̄ atrābilē accumulare solēt, et aromatis, & seminib. calidioribus, et icidētibus, quibusq; cōdita calidiora apparari cōsueuerūt, arceda. De uulvæ strangulatu. C.LXXXVII.

SI quā mulierē diutius sanguinē menstruū retinuisse acciderit, ac ad multū interuallū uirū non admisisse, quū tamē ad uenerē ea procliuis extiterit: præterea
figra

*Cancro me
dctur.*

*Ex uitiatō
semine, aut
mensibus.*

si gravitatē & dolorē in demissioribus lū<sup>1. femo-
ris.</sup>
 minis partib. perceperit, ad hæc si quēdā
 ueluti ad superiora ex pubis partibus cō-
 tractum senserit, animi deliquiū fortasse
 hæc comitabit, & ueluti emortua morbo
 ue comitali correpta mulier prosterneſ.
 Vnde quoq; ægerrime eam aērē inspira-
 re, uel arterias pulsare, ꝑcipiemus. Et for-
 sitan his accidētib. oppressa, suffocata pe-
 ribit, fortasseq; (licet difficulter) sanitati
 restituetur. Quapropter hunc affectū sta
 tim atq; implicat, ꝑpellito. Incipito itaq; ^{Dū est satis}
 curationē, a pedum & crurū fictione, eo <sup>urium Cel.
uenā secat.</sup>
 rundēq; dolorificis uinculis astrictiōe, se-
 cundū hæc per magnarū cucurbitarū in
 pube et fœminib. agglutationē, Obste-
 trici quoq; digitū odorato oleo intingere
 præcipito, ut eo in uteri collo inserto, &
 penitius q̄si ad uulvæ os demisso, circūli-
 nitu & titillatione corruptū semē eliciat.
 Naribus etiā struthiū inspirandū, ac auri
 bus † prolatae uoces sonoræ in clamandæ
 sunt. Itē nihil iucūdo grato uē odore pol-
 lens narib. admouēdū, imò odorata, cu-
 ius generis gallia moschata est, recte abij
 ciuntur. <sup>† Aliqui cen-
tas ridicu-
las uoces
prescribūt.</sup>

ciuntur.

ciuntur, Inguina autē, ac illis cōtermina
 loca, odoratis epithematis foueto, & ea q̄
 tetra foedoūe odore sunt, naribus induci
 to, cuius notæ stercus, castoreū, sulphur,
 & extinctū ex lucerna linimentū, cēsēt.

*Pli. addit ca
 pillos mulie
 ris crema-
 tos.*

Cæterū muliere ualeitudini restituta, iā re
 cēsendis præsijs, ne denuo affectus exer
 ceat, eā a noxa præseruare pfuerit. Proin
 de si morbus post mēsiū suppressionē na
 scaī, ea quæ mēsiibus cīedis sunt præbeto.
 Itē ē pedis uenis sanguinē detrahitō, in
 guinibusq̄ ac coxis cucurbitulas affigi-

*post longā
 rivi diffun
 ctionem
 dijsuetudī
 nem l*

to. Porro si post diu intermissum cōcubitū
 (q̄ subīde huius mali autor esse cōsueuit)

huiuscemodi noxa inuasērit, summē au
 xiliabitur cū uiro coitus: aut si eius occa
 sio non datur, obstetrix, aut ipsa mulier
 præscripta ratione interpositis interual
 lis semen prouocabit. Vel semen extin
 guētia, quæ suo loco executus sum, offer
 to. Item pastillos ex myrrha Capite de ci
 tandis mensibus inscriptos porrigito.

*Circa finem
 quinti ad
 Almāsorē.*

De mola uteri. Cap. LXXXVIII.

*Ex mulie
 bri semine
 et affluētib.
 mensibus.*

INterdū mulieres affectus quidā angit,
 qui per inītia cōcepti foetus suspiciōnē
 adfert.

adfert, illis em̄ uēter intumescit, & decolorata apparēt, mensesq; supprimunt. Motus tamē qui in hoc morbo est, ab eo q; ab infantib; fit, dissimilis percipit. mola nāq; digitis uiolēter iniectis, à suo loco aliter q̄ foetus dimouet. Ceterū circa finē malī cū magnis laborib; doloribusq; informē aliā quam carneā massam, nō aliter q̄ si parent, educūt. Interim aut̄ interdū soli flatus, & humorū copia, ab utero prūpunt. Vnde uēter sidere solet, atq; enumerata symptomata ab agrotante offerri. Porro postq̄ *tēpus, q̄ foetus utero gesti moueri solēt, lapsus est, pastilli ex myrrha seminū incidentiū decocto laeuigati, ppinādi sunt, oleūq; † balsami inguinibus, & uteri collo inungēdū. Ad hāc pessus, q; ruta et mēastro cōstāt, & alios Capite de mēsum puocatiōe, foetusq; eductiōe cōscriptos, subiicere cōuenit. Quantitas quoq; catapotis foetidis una uice porrigēdis inscripta, pluries ppinabit, siquidē his omnibus, affectae propediem liberabuntur.

S De ramicū generibus. Cap. LXXXIX.

SI alicui in abdomine pars aliqua pro-

Quae motū educunt.

**Id ferē 4. aut. 5. mense est.*

† Aliās, cheisim, hoc est ligustici.

Aliās de rasiim.

Laxato, aut rupto ad uer-

minet,

*sa semina -
ria perito -
neo.* minet, quæ resupinato ægro, & leniter di-
 gitis parti admotis, sidit: quæq; rursus se-
 dente ægro prouoluit, affectus ramex di-
 ctus agrum molestat. Quocirca hoc mor-
 bo implicitus, à uehementi motu, nēpe cur-
 su, saltu, clamore, & id genus alijs, præser-
 tim post ingestum cibum, cohibendus est, ac à
 fabarum, & imprimis phaselorum, lenticule,
 oleorum, horumq; quibus inflandi uis adest cō-
 mestione, omnino arcendus. Verum inter cæ-
 tera maxima laboranti sollicitudo, ut alius
 cita fluat, habenda est, siquidē ea ratione, for-
 tassis quo minus doleat præcauebit. Præ-
 ter hæc, loco deligaturam cōuenientem, præ-
 cipue dum occasio motum præcipit, accō-
 modare cōfert. Tamē si uehementius uen-
 ter eminet, et grauat, à motu omnino ab-
 stinendum, nisi forti fasciâ, aut alio ad id ido-
 neo uinculo, inguinibus, præcinctis. Em-
 plastrum ad ramicem, Gallarum, cupressi, utri-
 usq; partes duas: myrrhæ, cyperi, sampsu-
 chi, acaciæ, thuris, gummi Arabici, cuiusli-
 bet pars una, gummi uino læuigant, & reli-
 qua in puluerem præbe coacta, illis adijciun-
 tur, deinde contusa, & resupinato ægro
 instar

instar emplastri admota recte deligant, et insoluta ad † triduū, aut quatrinduū sinuntur. Tunc itaq; rursus supino procūbēte aegro, fascia laxatur, eoq; emplastro abiecto, aliud in eius uicē applicat, ea nāq; ratione, ne dilatescat malū, cauet. Quum ramex ad testes pertinet, scrotū increscit ac intumet, idēq; uel ob coaceruatos flatus, uel alicuius humoris coluuiē ibidem collectā, aut propter intestinū aliquod in eam partē deuolutū. Si itaq; ob plapsum intestinū cōtingit, grauis & excrucias, tactuq; indolēs ramex erit. Proinde illi eandem quoq; quam præscripsimus uiuēdi rationē instituemus, ac pauloante dicto emplastro superaccōmodato, locū contiuo fasciis cōstringemus: siquidē ramex uinculis nō cōpressus, indies magis dilatescit augeturq;. Si uero ob coaceruatā humoris colluuiē euenerit, scrotū ipsum turbidum, tersum ac intēsum conspiciet. Huic itaq; aquoso ramici epithema Capi tede aqua subter cutem ad *solitū* descriptū, circumlinendū, aut potius emplastri modo superaccōmodandū. In hoc præ-

† Aliās, ad sex, aut septem dies, nec malē.

Hactenus de inguinū ramice egit.

senti affectu, aqua interdum ad inferiora
 procūbit, per quę etiā nonnunq̄ resudat,
 & aliquādo parte scalpro pertusa, p̄fluit.
 quibus occasionib. æger ad tēpus malo
 liberatur, at tēporis successu morbus re-
 petit. Proinde post effluxum humorē, æ-
 grotāti ignitis ferris, et medicaminib. stre-
 nuē siccātibus ac astringētibus, succurrē-
 dum est. Quoniā illorū remediōrū usu,
 mali restitutio fit, nec aliās huiuscemodi
 noxa ægri tentant. Cæterum harum ma-
 nualium curationū tractatio, propositi li-
 bri instituti non est. Quando autē huius
 affectus, flatuosus spiritus autor est, locū
 perfricare benefacit, & oleo iosmino in
 quo castoreum & euphorbium læuigata
 sunt, recte pars tumida subungitur, ac in
 penē quoq̄ guttatim huius portio, com-
 modē per syphonem instillatur.

De podagra, reliquisq̄. articularijs morbis. C. XC.

SI quando articulos dolor cū tumore
 exercet, & tactu locus calidus, colo-
 req̄ rubro perfusus percipitur, ægrotāti
 si dextro pede laboret, ex extrema dextra
 manu, aut cubito: si sinistro, ex summa læ-

Apud Paul.
 lib. 6. C. 62.
 Cel. lib. 7.
 cap. 21.

A calidi hu-
 moris af-
 fluxu.

ua manu, aut cubito, sanguinem detrahi
 to. Partē quoq; affectā, ad reprimendū
 humorū influxum, doloremq; remitten-
 dum, hoc epithemate irrorato. Rosarum
 rubrarū, sandali rubri, nucis Indicę, glau-
 cij succi preparati, lapidis Armenij, opij,
 singulorū æquæ portiones, his aqua &
 aceto subactis, epithema inducitur, ac ne
 concalescētū noceat, subinde repetitur.
 Itē herbæ pulicaris semen aceto macera-
 tum, & chartæ, uel alicui linteo ad id ido-
 neo inductū, tātis per dum tepuerit, dolē-
 ti parti superaccomodato. Quando autē
 tepuerit, illo amoto, in eius locum aliud
 debile refrigeratū, applicato. Ad hæc al-
 lum myrobalanorū et hermodactylorū
 iure deſcito. Præparabis aut huiuscemo-
 di ius hac ratione. Accipies myrobalano-
 rum citrinarū drachmas quindecim, pul-
 ueris turbit oleo amygdalarū dulciū cir-
 cumlitū, filiculæ (quam Græci πολυπόδιον
 uocant) utriusq; drachmas tres, foliorum
 arboris fenæ drachmas quatuor, seminis
 fumaricæ herbæ tantundē, hermodactyli
 albi, seminis intybi, seminis apij, rosarū,

singulorū drachmę duę, omnia in tribus
 libris aquę, ad duarū consumptionē de-
 coques, & insup manibus adamussim cō-
 fracta percolabis, ac eius excolati iuris
 uncias sex, aut septē cum sacchari albissi-
 mi drachmis decē, prospere porriges. Ve-
 rum si quis præsens decoctū fastidiuerit,
 catapotia præbeto, quę lecto decumben-
 tes surgere, moueri, & obābulare faciūt.
 Cōpositio quidē eorum in hunc modū
 se habet, Aloës drachma una, scāmonij*
 obolus semissis, rosę rubrę cōtritę obo-
 lus unus, hermodactyli albi drachma se-
 mis, redigito hæc in catapotia, ac una ui-
 ce porrigito, habito interim respectu ui-
 riū ægroti, Caterū æger cibus infrigidati-
 bus & austeris enutriendus est, & à uini
 potu & carne, hisq; quę melle parantur
 circumcidēdus. Cū uero tumoris ardor
 inflāmatioq; cōquieuerint, his quę cali-
 diorib; tumoribus discutiendis sunt, affe-
 ctus sanabit. Eius quidē notæ hoc est: Ce-
 ra oleo lilij soluta, succo fœnogræci, & se-
 minis lini cōmiscetur, simulq; ad debitā
 mixturā pistillo terunt, & deinde epithe-
 matis

*Interpres
 male quar-
 tam partē
 drachmę
 uertit.

Plura et me-
 liora. 7. ad
 A!mā. libro
 describuntur

matris instar ægræ parti accōmodantur.

Interuallis uero quibus sanus, ac ab accessionibus æger liber est, uenæ sectione circa tēpus quo malo torqueri solet, idē potissimū in uere, est utendū: ac alius his quæ flauam bilē purgāt deijcienda, atq; à uini, & eorum quæ melle apparātur, & carnis usu abstinentū. Proinde cibus acidis & austeris, hisq; frigiditate paribus, enutrietur. Porrò partes huiuscemodi uitio cruciari solitas, paulatim à consueto exercitio dissuescere confert, maximè dū accessionis tempus expectatur, et corpus & uenæ sanguine turgēt, & quādo à uenæ sectione, atq; alui solutione, ad longū interuallū æger sibi tēperauerit. Cæterū si quādo articulorū dolorē neq; ardor, neque rubor concomitetur, & æger frigida temperie sit, locusq; tactu algidus percipitur, inter curatiōis initia, catapotia maiora de hermodactylis porrigenda sunt. Quorū mixtura talis est: Hermodactyli, satyrii, chamæleæ, cuiusq; drachmę quinque, hieræ picræ drachmæ decē, cucurbitæ syluestris, cētaurii minoris, utriusque

Huius morbi præseruatio.

Acetū tamē quū sit neruis inimicū nō cōuenit.

A crudo hu morc.

drachmę qnq; euphorbii drachmę duę,
 turbit drachmę decē, thapsię Indicę, zin-
 giberis, sinapis, piperis, castorei, singulo-
 rum drachma una. omnia simul rosarū
 melle excepta, in catapotia digerunt. ho-
 rum pōdus à drachmis duabus cū semis-
 se, ad tres datur. Sanè mirifice hæc catapo-
 tia profunt, siquidē ægre surgētes ad am-
 bulationē promouent. Epithema ad fri-
 gidū pedum articulare morbũ efficac.
 Styracis liquidę, castorei, euphorbii, myr-
 rhæ, aloës, acacię, singulorū æquę portio-
 nes, his uino ueteri affuso, format epithe-
 ma. Cæterū dolore se remittēte, laborāti
 calidæ aquæ ab alto instillatiōe, & olei li-
 liorū inunctiōe, prospere subueniemus.
 Emplastrū præterea ex bdellio molli, sty-
 race, fœnogręco, semine lini et ammonia
 co præparatū, utiliter dolenti parti indu-
 cemus. Adaptabimus autē id ad hūc mo-
 dum. ammoniacū cum bdellio uino uete-
 ri diluemus, quo reliqua excepta, ac si-
 mul linteo aliquo accōmodata, loco in-
 star emplastrī superponemus. Id quidē
 articularū uitium, quod in lapideā duri-
 ciem

*Practici ho-
 rū usum, cō-
 coquentia
 præcessisse
 uolunt.*

§

*Viūtur nul-
 li cat. Mes.
 ex hermo.
 quia nō a-
 deò uehe-
 mentes.*

*Tophi arti-
 culorum.*

ciem occallefcit, quodq; cola & articula
 mēta tophis adimplet, præſentis affectus,
 de quo iā paulo antelocutus ſum, ſpecies
 cenſet. Quare hoc quoq; uitio implicitoſ
 à faſtidioſa ciborū repletionē, frigidaē po
 tu, cibis glutinoſis & craſſis, & crebra te
 mulētia, merito arcere cōuenit. At poſtq̄
 ſanitati reſtituti fuerint, mediocre exerci
 tium, præſertim ante cibū illis imperādū
 eſt, & à uenere imprimis uentriculo cibis
 diſtenſo, ſunt colibēdi. Ad hæc à balneo
 dulcis aquæ abſtinere, & poſt aſſumptoſ
 ciboſ quiēſcere, cōſiliū eſt. Potui uero eiſ
 uinum merū ac uetus, & ea que urinas ci
 tant medicamina, dum ſani uiuūt, porri
 gētur. Affectus à parte implicita coxen
 dix appellatus, iſ dicit̄, qui ab oſſe lato &
 coxendicis per fœmur ad genua uſq; pro
 tendit̄, quiq; nōnunq̄ etiā in longū uirgē
 inſtar, per totū crus dimiſſuſ ad ſummū
 uſq; pedē pertingit. In hoc itaq; affectu,
 ſi intemperie calor præualet, urineq; co
 loratæ ſint, ſanguis primū uena cubitum
 perreptāte lateris dolentis pertuſa, ob ple
 thoriā minuēduſ eſt; deinde poplitiſ, aut

Ex calore
 medicami -
 nū craſſis re
 liquiſ indu
 ratiſ, & te
 nuibuſ reſo
 lutiſ.
 Mali à frig.
 humore præ
 ſeruatio.

Coxendix,
 ſive ſciantica.

Aſanguine.

ea quę exteriorē malleolū. perreptat, deri-
 uationis gratia secta, opem fert. Item ea
 quę ad calidū articulare pedum do-
 lorem inscripsimus, præter humorum
 tamen in partem impetum reprimētia,
 summopere cōfert. Cæterum si æger fri-
 gida temperie fuerit, colorq; exalbidus et
 aquę subter cutem similis, subinde rapha-
 ni decocto, & syrupo acetoso, uomitū iri-
 tato. Coxā uero, & fœmur, et tibiā totam
 oleo in quo castoreum, euphorbiū & sty-
 rax læuigata sunt, cōtinuo inungito. At
 si coxendicis dolor diuturnus, & solutu
 cōtumax fuerit. ægrotāti clysteres ex mu-
 ria Nabathęæ & nitro præparatos, infun-
 dito. Collyriū quoq; ex cyclamine & syl-
 uestri cucurbita confectū, & raphani &
 cepæ decocto solutū, quousq; locus leni-
 ter exulceretur, superaccomodato: quo-
 niam papulis cōcitatatis, affectus subinde
 restitui consueuit. Si uero morbus in ue-
 tustatem inciderit, sumito sinapis & ster-
 coris columbini æquas partes, & eas tri-
 tas ficuum decocto excipito, ac in morē
 emplastrī coxendicis regioni superindu-
 cito,

A crudo
 succo.

1. Bauarichria

Has exulce-
 rationes ne
 cito cicatri-
 ce obducantur,
 brassicę folijs te-
 gunt.

cito, ac tantisper dum ex concitatis uel-
 culis sanies profluat, finito, & deinde lo-
 cum aqua calida irrorato. Post hæc die-
 bus aliquot, ægrum à medicaminum usu
 liberum reddito, siq̃ illis sanitati non re-
 stituitur, eandem curandi rationem repe-
 tito, ac ita ægrotanti succurrito. Porro si
 affectus diuturnus ad multum tempus
 exercet, suspicioq̃ sit luxationis capitis
 fœmoris ex coxendricis cotile, ob uiscosi
 humoris uitium, aut si articulus iam luxa-
 tus fuerit, ad uisionem descendere oport-
 tet. Proinde ferreo instrumẽto † instar ro-
 tæ adaptato, locum circa articulationis
 latera urito, & in latè ossis summitatis, ac
 fœmoris capitis cute, ignito ferro aliam
 crustam inducito, prioremq̃ ea ratione
 augeto. Verum huius rei tractationẽ præ-
 sentis libri terminì haudquaquam admit-
 tunt. Præter autẽ omnia iam comprehen-
 sa, dum ualet æger, uomitum sibi familia-
 rem reddet, ac aluum facile respondentẽ
 sibi procurabit. Præterea uictus rationẽ
 (crassos cibos, multamq̃ temulentium à
 earcendo) extenuabit.

† Aliter idẽ
 autor in li-
 bro de ar-
 ticularijs
 morbis, ca-
 pite. 25.

Recetiores
 Græci tres
 crustas u-
 runt.

Ad incipientem gibbum. Cap. XCI.

Ab humore
frigido.† Aliàs, bal
sami.Aliàs olei
de rosim,
vel de
chaisimAb inflam-
matione.

QUum gibbus primū nasci cœperit, catapotia maiora ex hermodactylis porrigito, ac subinde olei † ligustici drachmas tres, cū seminū calidorū decocti uncijs tribus, propinato. Ad hæc, partem oleo iosmini, in quo styrax liquida, castoreum, euphorbiū subacta sunt, illinito, & à crassis refrigerantibusq; cibis ægrum arceto. Præterea aquam calidā, cui mentastrū, sampsuchus & stichas Arabica seu Gallica ioccta sint, parti ab alto superfundito: insuper frequētes frictions, atq; ex calidiorib. oleis inunctiones, tentato. Quod si hoc morbo correptus puer fuerit, tepentis aquę balnea, ac ex iā enarratis oleis inunctiones, abunde auxiliabuntur. Verum si nunc primū nascētem gibbum febris concomitetur, à iam dicta curandi ratione, planè est discedendum, & ex herbis infrigidantibus decoctum cum cassia fistula potui propinandum. Item uena quoq; axillaris pertundenda, atq; emplastra ad dolentē locum usq; ui sua refrigerandi perreptātia, affectæ

etæ partî superaccommodanda sunt.

De varicibus.

Cap. XCII.

SI uenæ dilatatæ & turgidæ, & uariis
 Sorbibus simplicate, uiridioresq; in cru
 re cōspiciantur, affectus à plerisque uitis ap- *Acrasso &*
 pellatus, ob similitudinē quam cum uitis *melancholi*
 maioribus ramis inæqualiter distributis *co sanguine.*
 habet, hominē afficit. Quo morbo mul-
 tos labores pedibus subire soliti, cibisq;
 melancholicū sanguinē coaceruantibus
 copiose se implētes, subinde offenduntur.
 Inter inītia itaq; præsidiorū uenā axillare
 incidere expedit, ac his quæ bilē atrā edu-
 cunt, quorū Capite de melācholia memi-
 nimus, alius rectissimè subducent. Et hæc
 pluries reiteranda sunt, & ab omnibus à
 quibus melācholicī arcent, omnino præ-
 senti affectu impliciti, cohibendi sunt.
 Postq̄ autē ad dies aliquot præscripta cu-
 rādî rōne usi sumus, sanguinis detractio-
 nē è uenis cruris intumescētibus, moliri
 opportunū erit, ex quibus tantisper dum
 quicquid in illis collectū sit, effluxerit, san-
 guis manare sinetur. In summa igitur, æ- *Excindun-*
 grum bilē atrā euacuantib. uti, uenamq; *tur interdū*
 axillarem *uaries, ut*

apud Paul.

li. 6. ca. 82.

1. basilicam
omisso venarum
vocabulo.

axillarem pertundere confert; proinde et ab omnibus melancholicū succum generantibus, abstinere opportunum est.

De elephantia.

Cap. XCIII.

Inter reliqua remedia Græci adustionem capitis probant.

Hic affectus postq̄ penitius radices infixerit, nunquā curationē admittit. At si recens adhuc malū est, & manū quis ei recte adhibet, eoq̄ quo debet modo præsidia applicet, restituitur, aut saltē ne inualescat augeaturq̄, illi p̄spicitur. Quando itaq̄ crura intumescunt, & totus habitus atro colore suffunditur, venæq̄ quas varices appellant apparēt, frequentē uomitū à radícula assumpta, aut cibis imperare cōducit. similiter quoq̄ à nimia obambulatione, & à recto corporis statu abstinere cōfert. Præterea uenter secundū uomitū, catapotijs maiorib. ex hermodactylis ducēdus est, & deinde uomitus reiterādus. Hæc nanq̄ subinde repetita iuuant, & æger à crassiorū esu utiliter arcetur. Itē tibiam totā ligatura ex canina pelle intercípere conuenit, idq̄ uinculo prius in calcaneū iniecto, atq̄ ita sursum ad genu deducto. Verū ante ligationem,

nē, epithemata ex aloē, myrrha, acacia, hypocistide, & alumine, simul omnib. in aceto acri detritis, preparata, cruri admo- uere ex usu est. Venā quoq; interiorē cu- bīti, si res ex postulauerit, manus opposi- tae incidere oportet: idq; magis uere, in q̄ potissimū hæc lues & nascitur, & intēdi- tur. Caueat etiam eger, ne rectus stet, nisi uniuerso crure exactissime deligato, & nulla ratione ab huiuscemodi epithema- tum usu abstineat. Itē uomitu quoq; idē- tidē utatur. Quod si eger statim à uomitu quietē petat, is brassicarū seminibus, sti- chade Arabica, sarmentorū cinere, lupi- nis, nitro, caprino stercore, fœnogræci fa- rina, simul in salita aqua decoctis, euapo- rādus est. Præterea uno atq; altero die ex

*lixiuio fatus, optime facit. nā hoc p̄posi- ti affectus, præcipuam partē discutit, aut saltem illum leniorē mitioremq; efficit.

De lumborum rubore, seu exulceratione.

Cap. XCIII.

CVm quispiam diutius supinus dor- so incumbit, renū regio rubet, un- de et †parua ulcuscula nōnunq; eueniūt.

Quando

i. mentaf-
tro

* Hoc lixi-
uiū multi ex
quercus ci-
neribus, ace-
to peracri,
& uino ca-
lidiorē pa-
rant.

† Aliis,
ligna.

Quando itaq; rubor intendi cōspicitur, miliū, aut panicū, aut salicis folia subster-
nenda sunt, ægerq; frequenter ab incubi-
tu subleuādus est. Ac hæc loca rubentia,
aqua rosacea niue aut fonte refrigerata,
irrorare, & flabellis ea euētilare, cōducit.
Verum calore non conquiescēte, epithe-
ma Arabibus alhubrati dictū, ex aqua ro-
facea, cāphora & alijs quibusdā refrige-
rantibus succis præparatū, ueluti Capite
de phlegmone descriptū est, summa utili-
tate superaccommodabitur. Vel succus
plumbi, supra ad uulvæ scissuras inscri-
ptus, utiliter loco inducetur. Iam si papu-
læ, atque exulcerationes oboriantur, un-
guento quod * cerussa constat circumli-
tæ, restituentur.

*De doloribus extremarum, summārumiue
partium. Cap. XCV.*

DVm dolor aliquis, manū aut pedē
exercet, æger interrogādus est, an
is illi ex ictu, uel incidente quopiam corpo-
re, uel diuturno in partē innixu, uel alia
quacūq; manifesta causa, euenerit. Quo-
niā si eius doloris externa causa autor nō
fuerit,

*Li. 7. ad Al
mās. ca. 10.*

** Officinæ
albū Rasīs
uocant.*

fuerit, affectū locum intueri oportet, an
 ne scilicet cæteris partibus plus minus uē
 rubeat, siquidem si uniuerso corpore ma
 gis rubore suffusus fuerit, præsidia phleg-
 moni dicata ex usu erunt. At si neq; cali-
 dior, neq; sanguinolētiior percipiāt, sed si
 indies liuescat exicceturq; aquā calidam
 ab alto illi instillare cōfert. Item cera oleo
 macerata, inuncta, & tātis per dū cōquie-
 uerit dolor, in parte relicta, subsidiū præ-
 stat. Cæterū si pars subtumida, manuū
 tactui subfrigidā temperiē referat, subin-
 de eam infricare expedit, ac aquā calidā
 ī qua sampsuchus, chamemelū & stichas
 Arabica ebulierint, parti infundere, uti
 iā diximus, utile putat. Dehinc oleo *lu-
 tearum uiolarū, quæ antiquis parietibus
 innascūtur, locus irrorabitur. At æger ui-
 ctus rationem extenuabit, multoq; exer-
 citio utetur. Item in laconicum primam
 balnei domū, ut sudorē prouocet, utiliter
 ingrediatur. Verum si hæc inualida fue-
 rint, alius serosum succū expurgātib, re-
 medijs, ducēda est. Pars præterea si tactu
 frigida

Li. 7. ad Al
 māf. ca. 10.

* Officinæ
 cheieri uo-
 cant.

224 PARA. IN NONVM

frigida experiatur, primum fricanda est,
 1. sambuci-
 2. de baen^{no} deinde oleo costino, & oleo iofimini &
 balanino, & his uiribus paribus, modi-
 ceq; tepentibus, circumlinetur. At si hæc
 quoque inefficacia fuerint, unguentis,
 Capite de neruorum resolutione supe-
 rius compræhensis, donec probe
 omni molestia æger libere
 tur, inter unguendum
 utemur.

PARAPHRASEOS ANDREAE
 vvesaliij Bruxellensis in nonum Rhazæ
 ad Regem Almanforem, de affe-
 ctuum singularum corporis
 partium cura-
 tione,

F I N I S.

ANDREAS

ANDREAS VVESA-

LIVS BRUXELLEN-

sis Candido Lectori S. D.



BREOR optime Lector, undecumque delicatoribus auribus satisfactum non esse, quum interdum in hac nostra Paraphrasi uoces quasdam ab Arabibus, & ferè omnibus nostri temporis Medicis in medendi usu tritas reliquerim, quæ tamen nec uerè Latinæ dici possint, nec ab eruditis in Latina lingua scriptoribus (Plinium dico, Celsum, Largum, Varronem, & Columellam) receptæ sint. Quare te hoc loco admonendum duxi, non id ubiq; sed interdum & necessario factum, nimirum in quibusdam simplicium medicaminum Græcis illisq; autoribus incognitis nominibus, & aliquibus compositorum medicaminum formulis: cuiusmodi sunt, myrobalanorum Arabibus usurpata genera, tamarindi, camphora, iuleb, syrupus, electuarius, aliæq; (si quæ reperiantur) similia. Quicquid tamen sit, nullam omnino eius generis relictam existimo, quam non alicubi in libri marginibus, quibus interdum Lectori consulere statui, aut orationis serie, prout res postulare uidebatur, explicauerim, meumq; quid de ea sentirem iudicium ad scripserim. Neq; uero me fugit

P. esse non-

E P I S T O L A

esse nonnullas, quæ Latinè quidem, Græcè ut ex-
 primi potuissent. Sed quoniam autores de his
 parum inter se consentire uiderentur, satius pu-
 tavi, eas quoque quales reperissem relinquere. Ta-
 lia sunt, turbit, Arabum spodium, kanabel, cali,
 & si quæ hæc sunt cognatæ dictiones: quas tamen
 omnes huiuscemodi ferè nota * uel semel saltem
 signari curauimus, quemadmodum & hac † di-
 uersam ubique lectionem iudicare placuit. Præter
 quas et hanc § in ipso cõtextu dictionisq; serie col-
 locatam reperies, ut nimirum intelligas, quod quic-
 quid ea includitur, id Rhazæ omnino non sit.

Quamquam nec omnia, quæ paraphrastica liber-
 tate interieci, his statim quoque characteribus ceu
 terminis intercipienda duximus: at ea duntaxat,
 in quibus, aut propter prolixitatem, aut nouam
 inuentionem, à morosiori quopiam petulantio-
 risq; linguæ incusari possem. Licet & id rarius,
 quum magis paraphrastæ, quàm interpretis offi-
 cium insecutus sim. Vale candidissime Lector;

& hunc nostrum laborem, quem primus in-
 ter eos, qui aliquid posteris in medici-
 na reliquerunt subiui, boni
 consule.

ELENCHVS BREVIS EORVM,

quæ singulis huius libri Capiti-
bus continetur.

Cap. 1	De capitis dolore.	Cap. 1. Pag. 1
2	De vertigine, quam Græci σκότωμα uocant.	2.8
3	De phrenitide.	3.10
4	De apoplexia.	4.13
5	De sopore.	5.16
6	De congelatis, quibus semper oculi inconniuentes ma- nent.	6.17
10	De neruorum resolutione, quæ παράλυσις dicitur.	7. ead.
11	De stupore & tremore.	8.21
12	De oris distortionem.	9.23
13	De conuulsione, quam σπασμὸν Græci uocant.	10.24
8	De morbo comitiali, πλῆψία dicto.	11.25
7	De incubone, qui affectus ἰφιάλτης Græcis dicitur.	12.30
9	De melancholia.	13.31
14	De distillatione, raucitate, & grauedine.	14.39.
15	De lippitudine, quæ ὀφθαλμία Græcis uocatur.	15.43
16	De oculorum ulceribus.	16.47
17	Ad ea quæ oculis incidunt educenda.	17.51
18	De albugine oculo innata.	18.52
19	De scabricie & tunricula.	19.54.
20	Ad maiorum angulorum carunculas pruritu uexatas.	20.55
21	De ungui oculorū, quod ἡμύροσθον Græcis uocatur.	21.56.

ELENCHVS

- cap. 22 De uibice, ac cruentis suffusionibus ex ictu, aliaue causa.
22. 58.
- 23 Ad lachrymas. 23. ead.
- 24 De uisus debilitate. 24. 59.
- 25 Ad palpebrarum tumorem, Græcis χίμωσις appellatum
25. 61.
- 26 Ad palpebrarum pilos, oculos iritantes. 26. ead.
- 27 De suffusione, siue humorum in oculum affluxu. 27. 62
- 28 Ad nocturnam cæcitudinem, quæ νυκταλω† Græcis dicitur.
28. 65
- 29 De dilatatione pupille. 29. 66
- 30 De fistulis, maioribus oculi angulis accidentibus. 30. 67
- 31 De aurium dolore. 31. 69.
- 32 De auris ulcere. 32. 72
- 33 De sonitu & tinnitu aurium. 33. eadem
- 34 Ad grauem audicium. 34. 73
- ibid. Ad aurium uermes, et animalcula auditus meatum irrepentia. 35. 76
- ibid. Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt euellenda.
36. eadem pagina 76.
- 35 Ad sanguinem è naribus erumpentem. 37. 77
- 36 Ad narium crustas & ulcera. 38. 79.
- 37 De polypo & sarcomate. 39. 80
- 38 De oblesâ olfaciendi facultate. 40. 82.
- 39 De dentium & gingiuarum dolore. 41. 84
- ibid. Medicamenta eradicantia & confringentia dentes. 42.
87.

Ad stuporem

CAPITVM.

<i>Cox. 40</i> Ad stuporem dentium.	43.88
<i>ibid.</i> Ad dentium restrictionem.	44. ead.
<i>ajone</i> De lingua orisq; superficialijs ulceribus.	45. ead.
41 De gingiuis sanguine humentibus.	46.89
42 De laxatione procidentiauc gargarionis.	47.90
43 De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus fortuito irreptantibus.	48.91
44 De his que in os, seu cesophagum prolabuntur.	49.93
45 Ad oblesum lingue sensum, ac deficientem motu.	50.94
46 Ad linguam in nimiam molem intumescentem.	51.96
47 De tumore sub lingua enato, qui ranula dicitur.	52.97
<i>ibid.</i> Ad pustulas ac tumores lingue.	53. ead.
48 De angina.	54. ead.
49 De tussi.	55.100
50 De difficultate spirandi, quam Græci ἄσθμα appellat. e 56.102.	
51 De laterali dolore, qui πλευρίτις Græcis dicitur.	57.104
52 De pulmonum inflammatione, que περιπνευμονία Græcis dicitur.	58.108
53 De cruentis ac purulentis exputationibus.	59.109
54 De tabe, que φθίσις Græcis dicitur.	60.111
55 De cordis palpitatione.	61.113
1 De cholera morbo.	62.115
2 De uentriculi imbecillitate.	63.120
3 De oris uentriculi dolore, ac inflammatione.	64.127
4 De singultu.	65.133
<i>nota in libro de gradu adjecit Cox. 5. de vomitu.</i>	
6 De canino appetitu.	66.135

ELENCHVS CAPITVM

cap. 7	De iocinoris dolore.	67. 136
8	De morbo regio, qui ἰκτερίῃ Græcis dicitur.	68. 140
9	De aqua inter cutem, quæ ὑδρωψὶ Græcis dicitur.	69. 142
10	De lienis dolore.	70. 147
11	De morbis intestini plenioris & tenuioris. hic ἰκλιῶ, ἵλλε κώλικῃ Græcis dicitur.	71. 149
12	De uentris profluuiio.	72. 160 (culo. 74. 175)
13	De urinæ difficultate. 73. 170. De renum & uesticæ cal-	
14	De renum & uesticæ inflammatione.	75. 179
16	De urinæ ardore.	76. 182
17	Ad sanguinem & pus mingentes.	77. 183
18	De his qui inuiti urinam reddunt.	78. 185
19	De lumbricis in ano ac uentre patis.	79. 188
20	De hæmorrhoidibus, scissuris, & fistulis ani.	80. 190
21	Ad procidentiam ani & uulue.	81. 198
23	Ad menses confertim erumpentes.	82. 199
24	Ad suppressos menses citandos.	83. 200
25	De uulue scissuris.	84. 201
26	De uulue inflammatione.	85. 202
27	De exulceratione, abscessu et cancro uteri	86. 203
28	De uulue strangulatu.	87. 204
29	De mola uteri.	88. 206
30	De ramicum generibus.	89. 209
31	De podagra, reliquisq; articularijs morbis.	90. 210. 214
33	Ad incipientem gibbum.	91. 218
34	De uaricibus.	92. 219
35	De elephantia.	93. 220.
36	De lumborum rubore, seu exulceratione.	94. 221
37	De doloribus extremarū, summarumue partium.	95. 222

nota. matth. de Graui de reut tractatu. de febribus.



ERRATA INTER IMPRIMEN-
dum fortè commissâ, sic
emendabis.

Pagina 18. in margine, uersu 9. exhibenda sunt.
38. 22. myrobalanos. 53. 1. remiss. 73. 18. opportu-
ne. 77. 21. è naribus. 79. 15. gallinaceum adipem.
101. 16. quôq;. 105. in margine, Hip. & Gal. ac aliâ
Græci, &c. 114. in marg. uers. 12. sub eo nomine.
145. 17. albicans. 147. 14. casti. 166. 2. tribus, pul-
caris. 168. in marg. 4. unam.

BASILEAE IN OFFICINA
Roberti VVinter.
A N N O
M. D. XXXVII.
Mense Martio. .