

08732690



Pepcid Complete

*Actúa con Una Sola Tableta!
Works with Just One Tablet!*
15 Tabletas Masticables
sabor *Mezcla de Bayas*
Berry Blend flavored
Chewable Tablets

Pepcid Complete

Reductor de Ácido + Antiácido / Acid Reducer + Antacid
CON/WITH ACCIÓN DOBLE/DUAL ACTION
**Reduce y Neutraliza el Ácido/
Reduces AND Neutralizes Acid**

Alivia La Acidez Ocasional Por Indigestión/
Relieves Heartburn Due to Acid Indigestion

*Actúa con Una Sola Tableta!
Works with Just One Tablet!*
15 Tabletas Masticables
sabor *Mezcla de Bayas*
Berry Blend flavored
Chewable Tablets

**ABRIR POR ARRIBA/
OPEN FROM TOP**



Distribuido por/Distributed by:
Pfizer Consumer Pharmaceuticals Co.
FORT WASHINGTON, PA 19044 USA
Reg. Patent Trademark of Merck & Co., Inc.
For Favor, Home at 1.800.468.6746
Questions or Comments:
Please Call 1.800.755.4028
Please visit our website at www.pepcid.com/canada

Drug Facts (continued)
Inactive Ingredients: Cellulose, croscarmellose sodium, hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl starch, sodium lauryl sulfate, sugar.
Questions or Comments?
1.800.755.4028 (English) or 1.800.468.6746 (Spanish)

Other Information
• This product contains 15 masticable tablets.
• Do not use more than 2 masticable tablets in 24 hours.
• Do not use more than 12 weeks and over 12 weeks and children 12 years and over.
• Do not swallow whole tablets. Chew completely.
• Do not use in conjunction with other antacids.
• Do not use in conjunction with other drugs.
• Do not use in conjunction with other prescription drugs.
• Do not use in conjunction with other antacids.
• Do not use in conjunction with other prescription drugs.
• Do not use in conjunction with other antacids.
• Do not use in conjunction with other prescription drugs.

Drug Facts (continued)
Warnings
• Do not use if you are allergic to any of the ingredients in this product.
• Do not use if you are allergic to any of the ingredients in this product.
• Do not use if you are allergic to any of the ingredients in this product.
• Do not use if you are allergic to any of the ingredients in this product.
• Do not use if you are allergic to any of the ingredients in this product.
• Do not use if you are allergic to any of the ingredients in this product.


08732690

08732690

Labeling Format Information:
Fonts: Univers condensed, bold and bold italic.
Drug Facts: 9 pt
Leading: 625-6.5 pt
Header: 8 pt
Bullets: 5 pt
Subheader: 6 pt
Barlines: 2.5 pt
Body Text: 6 pt
Drug Facts (continued): 8 pt
Horizontal Scale: 78-90%
Average Kerning: 0



NO USAR SI LA ENVOLTURA INDIVIDUAL ESTÁ ABIERTA O RASGADA. LO QUE USTED DEBE SABER ACERCA DE:



Reductor de Ácido + Antácido

PROSPECTO INCLUIDO

Un medicamento para el estómago vendido sin receta

PEPCID COMPLETE combina un reductor de ácido (famotidina) con antácidos (Carbonato de calcio e Hidróxido de magnesio) para aliviar la acidez de dos maneras diferentes: Los reductores de ácido reducen la producción de más ácido en el estómago, los antácidos neutralizan el ácido que ya se encuentra en el estómago. Los ingredientes activos en PEPCID COMPLETE han sido utilizados durante años para tratar problemas relacionados con el ácido en millones de personas de manera segura y eficaz.

- Tan solo 1 tableta alivia la acidez causada por indigestión ácido.

Cómo utilizar PEPCID COMPLETE

Tome PEPCID COMPLETE para aliviar la acidez causada por la indigestión ácido y el ardor estomacal. Niños menores de 12 años de edad: consultar con un médico.

PARA ALIVIAR SÍNTOMAS
Mástique 1 tableta completamente antes de tragar.

PEPCID COMPLETE puede ingerirse hasta dos veces por día (hasta 2 tabletas masticables en 24 horas).

Ácido en exceso: un problema de ardor estomacal

Es normal que el estómago produzca ácido, especialmente después de ingerir alimentos y bebidas. Sin embargo, el ácido estomacal puede desplazarse en la dirección equivocada (el esófago), causando ardor y malestar que interfieren con las actividades cotidianas.

Acidez—Causada por el ácido en el esófago

El esfínter esofágico inferior (EEI), un músculo similar a una válvula, está relajado en posición abierta.

El ácido se desliza hacia arriba desde el estómago.

Ardores y malestar en el esófago

El ácido se desliza hacia arriba desde el estómago.

Consejos para controlar la acidez

- No se acueste ni se incline después de comer.
- No se acueste ni se incline antes de ir a dormir.
- Ciertos alimentos o bebidas aumentan la probabilidad de producir ácido, tales como comidas sustanciosas, picantes, grasosas y fritas, chocolate, café, alcohol y hasta ciertas frutas y vegetales.
- Como lentamente y no ingiera demasiada comida.
- Si tiene sobrepeso, baje de peso.
- Si fuma, deje de fumarlo.
- Eleve la altura de la cabecera de la cama.
- Use vestimenta suelta sobre el área del estómago.

Advertencias

Alerta de alergia: No ingerir si es alérgico a la famotidina u otros reductores de ácido

No ingerir

- Si tiene dificultad o dolor al tragar alimentos, vómito con sangre, o heces con sangre o color negro.
- Estos síntomas podrían indicar una condición grave. Consulte a su médico con otros reductores de ácido.

Antes de usar, consulte con su médico si:

- No ha tomado ácido durante 3 meses. Esto podría indicar que se trata de una condición más grave.
- Otros síntomas de desnutrición, temblores, o nervios.
- Otros síntomas de dolor en el pecho o dolor en el cuello con dificultad para respirar, transpiración, olores que se expanden a los brazos, o el cuello o hinchazón de la garganta.
- Otros síntomas de desnutrición.
- Otros síntomas de dolor en el pecho.

Preguntas o comentarios?

© Marca registrada de Merck & Co., Inc.
Distribuido por: **Johnson & Johnson**
CONSUMER PHARMACEUTICALS CO.
FORT WASHINGTON, PA 19034 USA
767.959.603

DO NOT USE IF THE INDIVIDUAL TOUCH IS OPEN OR TORN

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT:

Acid Reducer + Antacid

Pepcid Complete

A non-prescription stomach medicine

PEPCID COMPLETE combines an acid reducer (famotidine) with antacids (calcium carbonate and magnesium hydroxide) to relieve heartburn in two different ways: Acid reducers decrease the production of new stomach acid, while antacids neutralize acid that is already in the stomach. The active ingredients in PEPCID COMPLETE have been used for years to treat acid-related problems in millions of people safely and effectively.

Just 1 Tablet relieves heartburn due to acid indigestion.

PEPCID COMPLETE can be taken up to 2 times daily (up to 2 masticable tablets in 24 hours).

TO RELIEVE SYMPTOMS
Chew 1 Tablet completely before swallowing.

How to use PEPCID COMPLETE

Just 1 Tablet relieves heartburn due to acid indigestion.

Warnings

Many sleep Do not use if you are allergic to famotidine or other acid reducers.

Do not use if you have trouble or pain swallowing food, vomiting with blood or black stools. These may be signs of a serious condition. See your doctor.

Ask a doctor or pharmacist before use if you are currently taking a prescription drug. Alcohol may interact with certain prescription drugs.

Stop use and ask a doctor if:

- Your heartburn continues or worsens.
- You need to take this product for more than 14 days.
- You experience faintness, dizziness, or weakness.
- You have symptoms of dehydration, such as a dry mouth, decreased urination, or weakness.
- You experience symptoms of low potassium, such as muscle weakness, cramps, or dizziness.
- You experience symptoms of low magnesium, such as muscle weakness, cramps, or dizziness.

Questions or comments?

Please call 1-800-755-4008 for more information and control heartburn.

Distributed by: **Johnson & Johnson**
CONSUMER PHARMACEUTICALS CO.
FORT WASHINGTON, PA 19034 USA

GLUE TO
BASE LABEL



Pepcid Complete
NDC 16937-688-25

Reductor de Acido / Antiacido / Acid Reducer / Antacid

CON ACCION DOBLE/DUAL ACTION
Reduce y Neutraliza el Acido /
Reduces and Neutralizes Acid

Activa con *Un Solo Uso Sobrio*
Activates with *One Tablet*

25 Tabletas Masticables
with *25 Chewable Tablets*

Cool Mint *and*
Chewable Tablets

Tabletas Masticables Con Sabor a Menta Fresca
Cool Mint *and* **Chewable Tablets**

NO USAR SI EL SELLO METÁLCICO IMPRESO DE ALUM. DE LA TAPA DEL ENVASE
ESTÁ ROTO O FALTANDO. DO NOT USE IF PRINTED FOR SEAL UNDER
BOTTLE CAP IS OPEN OR TORN.

Datos del Medicamento/Drug Facts

Ingredientes activos (in each chewable tablet) / Ingredientes activos (in each chewable tablet) Purpose

Famotidina 10 mg.....	Reductor de ácido / Acid reducer
Famotidina 10 mg.....	Acid reducer
Carbonato de calcio 800 mg.....	Antiacido / Antacid
Calcium carbonate 800 mg.....	Antacid
Hidróxido de magnesio 165 mg.....	Antiacido / Antacid
Magnesium hydroxide 165 mg.....	Antacid

Preguntas? 1-800-466-6746/Questions? 1-800-755-4008

Llévate la botella para abrir o para leer las advertencias e instrucciones/Use Tab for Use, Warnings and Directions

Datos del Medicamento (continuación)

- para aliviar los síntomas, mastique 1 tableta antes de tragar
- no ingiera más de 2 tabletas en 24 horas
- niños menores de 12 años de edad: consultar con un médico

Información adicional

- almacenar a 20°-30°C (68°-86°F) - proteger contra la humedad
- leer las instrucciones y advertencias antes de ingerir
- conservar este prospecto. Contiene información importante.

Ingredientes inactivos acetato de celulosa, almidón de maíz, dextratos, saborizantes, hidroxipropilcelulosa, hipromelosa, lactosa, estearato magnésico, almidón pregelatinizado, óxido de hierro rojo, laurilsulfato sódico, ácido cítrico

Preguntas o comentarios?
1-800-755-4008 (Inglés) o 1-800-466-6746 (Español)

Drug Facts (continued)

Other information

- store at 20°-30°C (68°-86°F) - protect from moisture
- read the directions and warnings before use
- keep this booklet. It contains important information.

Inactive ingredients: cellulose acetate, corn starch, dextrates, flavors, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, lactose, magnesium stearate, pregelatinized starch, red iron oxide, sodium lauryl sulfate, sugar


Questions or comments?
1-800-755-4008 (English) or 1-800-466-6746 (Spanish)

UN MEDICAMENTO PARA EL ESTÓMAGO VENDIDO SIN RECETA

PEPCID COMPLETE cambia un reductor de ácido (famotidina) con antácidos (carbonato de calcio y hidróxido de magnesio) para aliviar la acidez de dos maneras diferentes. Los reductores de ácido reducen la producción de más ácido en el estómago. Los antácidos neutralizan el ácido que ya se encuentra en el estómago. Los ingredientes activos en PEPCID COMPLETE son más efectivos durante más tiempo para tratar problemas relacionados con el ácido en millones de personas de manera segura y eficaz.

A NON-PRESCRIPTION STOMACH MEDICINE

PEPCID COMPLETE combines an acid reducer (famotidine) with antacids (calcium carbonate and magnesium hydroxide) to relieve heartburn in two different ways. Acid reducers decrease the production of new stomach acid; antacids neutralize acid that is already in the stomach. The active ingredients in PEPCID COMPLETE have been used for years to treat acid-related problems in millions of people safely and effectively.



Las beneficias reductoras de ácido de Pepcid Complete acid-reducing benefits in Pepcid AC

Las beneficias neutralizadoras de antácidos/acid-reducing benefits in Pepcid AC

Combinadas en una sola tableta masticable

Tamaño real/Shown actual size

ÁCIDO EN EXCESO: UN PROBLEMA DE ARDOR ESTOMACAL/EXCESS ACID: A BURNING PROBLEM

Es normal que el estómago produzca ácido, especialmente después de ingerir alimentos y bebidas. Sin embargo, el ácido estomacal puede desplazarse en la dirección equivocada (al esófago), causando ardor y malestar que interfieren con las actividades cotidianas. It is normal for the stomach to produce acid, especially after consuming food and beverages. However, acid in the stomach may move up into the wrong place (the esophagus), causing burning pain and discomfort that interfere with everyday activities.

Acidez—Causada por el ácido en el esófago/Heartburn—Caused by acid in the esophagus

- Ardor/malestar en el esófago/Burning pain/discomfort in esophagus
- El esfínter esofágico inferior (EEI), un músculo similar a una válvula, está relajado en posición abierta/A valve-like muscle called the lower esophageal sphincter (LES) is relaxed in an open position
- El ácido se desliza hacia arriba desde el estómago/Acid moves up from stomach

Datos del Medicamento (continuación)

- tiene dolor en el pecho o dolor en el hombro con dificultad para respirar, transpiración, dolor que se extiende a los brazos, el cuello o hombros, o sensación de desorientación
- Antes de usar, consulte con un médico o farmacéutico si en la actualidad toma algún medicamento vendido bajo receta. Los antácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos vendidos bajo receta.
- Deje de tomar este medicamento y consulte con un médico si:
 - la acidez continúa o empeora
 - tiene que tomar este producto por más de 14 días.
- Si está embarazada o amamantando, consulte con su médico antes de usar.
- Manténgase lejos del alcance de los niños. En caso de sobredosis, recurra a un médico inmediatamente o comuníquese con un Centro de Toxicología

Instrucciones

- adultos y niños de 12 años de edad en adelante:
 - no trague la tableta entera; mastíquela completamente

Drug Facts (continued)

Ask a doctor or pharmacist before use if you are presently taking a prescription drug. Antacids may interact with certain prescription drugs.

Stop use and ask a doctor if:

- your heartburn continues or worsens
- you need to take this product for more than 14 days

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions

- adults and children 12 years and over:
 - do not swallow tablet whole; chew completely
 - to relieve symptoms, chew 1 tablet before swallowing
 - do not use more than 2 tablets in 24 hours
- children under 12 years: ask a doctor

Datos del Medicamento (continuación)

SU USO alivia la acidez relacionada con la indigestión ácida y el ardor estomacal

Advertencias

- Alerta de alergia: No ingerir si es alérgico a la famotidina o a otros reductores de ácido
- No ingerir
 - si tiene dificultad o dolor al tragar alimentos, vómito con sangre o heces con sangre roja o negra. Estos síntomas podrían indicar una condición grave. Consulte a su médico.
 - con otros reductores de ácido
- Antes de usar, consulte con un médico si:
 - tiene frecuente dolor en el pecho - tiene pérdida de peso inexplicable
 - tiene náuseas o vómito - tiene dolor estomacal
 - tiene respiración jadeante frecuente, particularmente con acidez
 - ha tenido acidez durante 3 meses. Esto podría indicar que se trata de una condición más grave
 - tiene acidez con sensación de desorientación, transpiración o mareos

Drug Facts (continued)

Use relieves heartburn associated with acid indigestion and sour stomach

Warnings

Allergy alert: Do not use if you are allergic to famotidine or other acid reducers

Do not use

- if you have trouble or pain swallowing food, vomiting with blood, or bloody or black stools. These may be signs of a serious condition. See your doctor.
- with other acid reducers

Ask a doctor before use if you have:

- frequent chest pain - unexplained weight loss
- nausea or vomiting - stomach pain
- frequent wheezing, particularly with heartburn - had heartburn over 3 months. This may be a sign of a more serious condition
- heartburn with lightheadedness, sweating or dizziness
- chest pain or shoulder pain with shortness of breath, sweating, pain spreading to arms, neck or shoulders, or lightheadedness

CONSEJOS PARA CONTROLAR LA ACIDEZ/TIPS FOR MANAGING HEARTBURN

- No se acostar ni se acurrar después de comer / Do not lie flat or bend over soon after eating.
- No cenar tarde o antes de ir a dormir. / Do not eat late at night, or just before bedtime.
- Ciertos alimentos o bebidas aumentan la probabilidad de producir acidez, tales como comidas sustanciosas, picantes, grasosas y fritas, chocolate, cafeína, alcohol y hasta ciertas frutas y verduras. / Certain foods or drinks are more likely to cause heartburn, such as rich, spicy, fatty, and fried foods, chocolate, caffeine, alcohol, and even some fruits and vegetables.
- Coma lentamente y no ingiera demasiada comida / Eat slowly and do not eat big meals
- Si tiene sobrepeso, baje de peso / If you are overweight, lose weight
- Si fuma, deje de hacerlo / If you smoke, quit smoking
- Eleve la altura de la cabecera de la cama / Raise the head of your bed
- Use vestimenta suelta sobre el área del estómago / Wear loose fitting clothing around your stomach

PREGUNTAS O COMENTARIOS/QUESTIONS OR COMMENTS:

Llámanos al 1-800-466-6746 para obtener más información y una guía sobre cómo ayudar a controlar la acidez./Please call 1-800-755-4008 for more information and a guide on how to help control heartburn.

Distribuido por/
Distributed by: **Johann-Johnson** y **MERCK**

CONSUMER PHARMACEUTICALS CO.
FORT WASHINGTON, PA 19034 USA
© Marca registrada de Merck & Co., Inc./
® Registered trademark of Merck & Co., Inc.


Labeling Format Information:

Fonts: Univers condensed, bold and bold italic.

Drug Facts:	9 pt	Leading:	6-6.5 pt
Header:	8 pt	Bullets:	5 pt
Subheader:	6 pt	Barlines:	2.5 pt
Body Text:	6 pt	Hairlines:	5 pt
Drug Facts (continued):	8 pt		

Horizontal Scale: 80-93% Average Kerning: 0

GLUE APPLIED
HERE



LOT:
EXP: