



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

GARRIDO FINO DE VILLANUEVA

SUMIDAD.- A. abierta, afelpado, borde carminado. B. media, vellosa, verde claro bordes carmin.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegada al haz, haz arañoso, envés vellosa, verde rojizo.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendida, haz algo arañoso, envés más, verde rojizo.

SARMIENTO HERBACEO.- Sin lenticelas, sección transversal circular-irregular, contorno con costillas, glabro, arañoso zona terminal, verde, rayas rojas.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 00110011001101011011011010.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, media algo pequeña, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo algo plegado al haz, lóbulos torcidos, ángulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos ó rectilíneos, de color verde oscuro, poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, un poco arañoso, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grandes, medio, pedúnculo visible, agostado hasta la 1ª ramificación. longitud relativa 1/10. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color amarillo-verdoso, poca pruina, coloración irregular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa, sabor insípido, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color amarillo, separación regular, Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 1 ó 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 1,58 cm. de largo, no muy fuerte, no muy ramificada, corteza desprendida algo, sección transversal circular, superficie estriada, poca pruina, nudos aplanados, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,0 cm. de color amarillo-gris, nudos más oscuros, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	GARRIDO FINO DE VILLANUEVA
1.- SUMIDAD	A. abierta, afelpada, borde carminado. B. media, <u>ve</u> llosa, verde claro bordes carmín.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegada al haz, haz arañoso, envés vellosa, -- verde rojizo.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendida, haz algo arañoso, envés más, verde roji- zo.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular-irregu- lar, contorno con costillas, glabro, arañoso zona - terminal, verde, rayas rojas.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 00110011001101011011011010.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	^{Pentagonal} Orbicular , media algo pequeña, seno peciolar en li- ra, pentalobulada, seno lateral superior en lira, - seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés -- arañoso, haz y envés de 5 nervios, limbo algo plega- do al haz, lóbulos torcidos, ángulo del vertice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de - lados convexos ó rectilíneos, de color verde oscuro poco brillo, limbo medio, nervios de orden 4º no sa- lientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, grueso, un poco arañoso, sección poco eviden- te.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grandes, medio, pedúnculo visible, agostado hasta - la 1ª ramificación, longitud relativa 1/10. Ver fo- tografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color amarillo, verdoso, - poca pruina, coloración irregular, forma discoide, ombligo persistente, sección transversal regular, - zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa, sabor in- sípido, pedicelo medio, de color verde, rodete evi- dente, de color verde, pincel medio, de color amari- llo, separación regular. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1 ó 2. Ver foto- grafía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde.
14.- SARMIENTO	158 cm. de largo, no muy fuerte, no muy ramificado, corteza desprendida algo, sección transversal circu- lar, superficie estriada, poca pruina, nudos aplas- tados, totalmente glabro, entrenudos de longitud me- dia 9,0 cm. de color amarillo-gris, nudos más oscu- ros, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

12-11

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

GARRIDO FINO DE VILLANUEVA (ca)

