



Acramite®

**TOUS LES STADES D'ACARIENS
SOUS CONTRÔLE !**

Oeufs



Adultes



Nymphes



Larves



Acramite®

- ✓ EFFICACE SUR TOUS LES STADES D'ACARIENS
- ✓ S'INTÈGRE DANS LES PROGRAMMES DE LUTTE INTÉGRÉE
- ✓ APPLICABLE AU PLUS PRÈS DES RÉCOLTES

DE SANGOSSE
ino
protection

La protection est dans notre nature

DE SANGOSSE

www.desangosse.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

MODE D'ACTION




Tetranychus urticae

L'activité principale d'ACRAMITE® porte sur le Tétranyque tisserand (*Tetranychus urticae*) et le Tétranyque carmin (*Tetranychus cinnabarinus*)


ACRAMITE® contrôle tous les stades d'acariens : oeufs, larves, nymphes, adultes. ACRAMITE® agit sur le système nerveux du ravageur, provoquant un arrêt rapide de l'alimentation et une mortalité dans les jours qui suivent :

- Quelques heures après l'application, les dégâts sur la culture sont stoppés.
- Longue persistance d'action




EFFICACITÉ PROUVÉE

ESSAI SUR TOMATE SOUS ABRI



Variété : Petula
1 application à BBCH61 avec une infestation moyenne de 137 acariens / 10 feuilles - volume de bouillie 1000L/ha

SYNTHÈSE DE 3 ESSAIS SUR FRAISE FRAISES PLEIN CHAMP ET SOUS ABRI



Dose d'emploi ACRAMITE®: 0,2 l/ha - Volume de bouillie : Essai 1 : 373 l/ha - Essais 2 et 3 : 1000 l/ha

HOMOLOGATIONS ET PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

USAGES	CULTURES	DOSE A.M.M.	NOMBRE MAXIMUM D'APPLICATIONS	DÉLAI AVANT RÉCOLTE (DAR)
Concombre* Traitement des parties aériennes* Acariens	Concombre et courgette uniquement (plein champ et sous abri)			
Tomate* Traitement des parties aériennes* Acariens (uniquement acariens)	Tomate, aubergine, poivron (plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	2 (respecter un délai de 7 jours entre 2 applications)	3 jours
Fraisier* traitement des parties aériennes* Acariens (uniquement acariens)	Fraisier (plein champ et sous abri)			

- Traiter dès l'apparition des premiers acariens
- Soigner la pulvérisation d'ACRAMITE® pour assurer son action de contact
- Adapter le volume de bouillie à la végétation :
 - traiter au point de ruissellement
- Assurer une couverture homogène et totale :
 - couvrir les faces supérieure et inférieure des feuilles
- 2 applications maximum, à 7 jours d'intervalle au minimum
- Alternier ACRAMITE® avec d'autres familles chimiques pour réduire le risque d'apparition des résistances

